

# FRIDERICI HOFFMANNI

CONSILIARII REGIS BORUSSIÆ INTIMI,  
ET ARCHIATRI,

PROFESSORIS MEDICINÆ PRIMARIJ IN ACADEMIA HALENSI,

## OPERA OMNIA PHYSICO-MEDICA

Denuò revisa, correcta & aucta,

IN SEX TOMOS DISTRIBUTA;

QUIBUS CONTINENTUR

DOCTRINÆ SOLIDIS PRINCIPIIS PHYSICO-MECHANICIS,  
& anatomicis, atque etiam observationibus clinico-practicis superstructæ.

METHODO FACILI AC DEMONSTRATIVA DEDUCTÆ,  
& per experientiam LVII. annorum stabilitæ.

CUM VITA AUCTORIS.

Et ejus PRÆFATIONE de differente medicinæ & medicorum statu atque conditione,  
& criteriis boni ac periti medici.

TOMUS SECUNDUS.



GENEVÆ,

Apud FRATRES DE TOURNES.

M. DCCXL.





# CONSPECTUS TOMI SECUNDI.

Medicinæ Rationalis Syftematicæ Tomi Quarti Pars Prima.

*De omnis generis Febris.*

Ejufdem Tomi Quarti Pars Secunda.

*De Hæmorrhagiis & Doloribus.*





FRIDERICI  
**HOFFMANNI**  
MEDICINÆ  
RATIONALIS SYSTEMATICÆ  
TOMUS QUARTUS,

Q U O

SPECIALIS MORBORUM PATHOLOGIA  
& huic superstructa solida Therapia cum  
medendi methodo,

CAUTELIS CLINICIS ET MORBORUM  
ENARRATIONIBUS ADJUNCTA EPICRISI EXHIBENTUR.

P A R S   P R I M A ,

DOCTRINAM DE OMNIS GENERIS FEBRIBUS  
*tam intermittentibus quàm continuis & acutis inflammatoriis, perspicua  
& demonstrativa metodo tradens.*

IOVENI EGREGIO  
**FRIDERICO HOFFMANNO**

DOCTORI ARTIS MEDICÆ EXPERIENTISSIMO  
STRENUO ET SOLERTI RERUM PHYSICARUM  
MATHEMATICARUM ET MEDICARUM

CULTORI

**FILIO SUO DILECTISSIMO**

NEC NON

**OMNIBUS DISCIPLINÆ SUÆ ALUMNIS**

DOCTIS ET SEDULIS UTILISSIMUM HUNC LIBRUM

DICAT ET PLURIMUM COMMENDAT

**AUCTOR.**

## P R Æ F A T I O.



**F**ANDEM prodit in lucem promissus diu & expectatus quartus Medicinæ rationalis systematicæ tomus, qui morborum pathologicam & practicam specialem disquisitionem, cum cautelis & observationibus clinicis, nec non morborum curationumque historiis complectitur, & quidem prima ipsius pars, de omnis generis febribus. Multa quidem scripti & plura edidi, ex quo per triginta & septem fere annos Professoris munere hac in Academia functus sum; sed à primo statim tempore firmum cepi propositum, maturæ tandem ætati reservare medicinæ systema, non quod nutanti hypothesium sustentaculo, sed veritatibus inter se connexis & methodo demonstrativa propositis, niteretur, ad artem nostram, multis, in pathologicis præsertim & incedendi methodo, laborantem imperfectionibus, perficiendam, & certam ipsius rationem adstruendam. Ance decem igitur annos evulgavi primum hujus operis systematici tomum, qui philosophiam corporis humani vivi & sani, & doctrinam sanitatem tuendi vitamque conservandi tractat, ac haud ita pridem auctior & emendatior recusus est. Successit dein secundus tomus, quo philosophiam corporis humani ægrotantis tradidi, & varii generis causas, quibus functiones in corpore varie læduntur, congruo ordine, accurate & copiose exposui, ut Medicus rerum insalubrium, quæ morbis ingenerandis veliscantur, cognitionem haberet exquisitam. Novissime in tertio tomo id egi, ut viam sternerem, ad recte ac penitus percipiendam, & pathologiam, & therapiam. Hinc docui, quo pacto morborum historiæ colligendæ, morbi dignoscendi & perite de iis judicandum, genuinam medendi methodum, ex naturæ legibus, arti imitandis & exsequendis, monstravi, & redactis in genera'es quatuor classes remediis cunctis, longo usu probata selegi, eorumque physico-mechanicum in corpus operandi & dextre applicandi modum, candide exposui. Restitit itaque adhuc quartus tomus, specialissimam morborum ætiologiam & therapiam, pro tot individuorum & causarum morbificarum varietate, exhibiturus, cujus nunc primam partem, febrium doctrinam habentem, eruditorum & saniorum Medicorum judicio publice expono, in non penitendum, uti spero, usum eorum, qui in artis operibus versantur. Neque vero me pœnitet, editionem practici hujus operis diu & ad hoc usque tempus distulisse, quo longa & sufficienti experientia instructus, certa ubique cum ratione id elaborare possum. Ego enim non sine animi indignatione & agridudine vidi, quam temere ludant de hominum corio medentum imperiti, & quot quantaque damna inconsulta medicina inferant. Tædet etiam prorsus multorum, immo plurimorum practico'rum librorum, qui immaturo adhuc judicio, & insufficiente, aut plane nulla experientia, ex aliis compilati conscribuntur, erroribus decumanis referti, qui sic cum magno ægrotantium detrimento in vulgus emanant. Ad condendum vero practicum systema, quod firmis & demonstrativis principiis nitatur, ante omnia amplissimo observationum practicarum apparatu opus esse, quisque judicio pollens intelliget facile. Vera enim pathologia, quæ generationem morborum ex concurrentibus variis causis tradit, genuinum & therapie certæ, in curandis & arcendis morbo'sis afflictionibus occupatæ, fundamentum ac basis. Sanare quoque nihil aliud est, quam causas morborum proximas earumque effectus tollere, & præservare à morbis idem, ac primas morborum origines earumque antecedentes causas, avertere, vel per congrua remedia remove're. Ideo necessarium quam maxime est, ut causæ nocentes morbificæ, quæ innumerabiles & mirum natura ac operatione differunt, sufficienter & penitus cognoscantur, ut deinceps, remediorum, causis morborum ceu contraria opponendorum, quæ innumera pariter sunt & natura ac efficacia, pro corporis dispositione, admodum diversa, vires & facultates indagentur, & intime percipiantur. Ad obtinendam autem hanc cognitionem, via datur alia nulla, quam per numerosa observata clinica, cum cura notata in tot individuis, ratione ætatis, sexus, nativitat's, hæreditariæ dispositionis, consuetudinis, victus & vitæ generis, sensibilitatis, valetudinis perpe'ssæ,

differentibus, & quod maximum in morbis non tantum simplicibus & solitariis, verum etiam, qui frequentissimi, complicatis. In ipsa curatione id utique certum, non ullum morbum curari posse eadem methodo in genere, sed quemvis, propter differentem causarum & individuorum indolem, curandi rationem poscere diversam, individualem scilicet & specialissimam. Quæ quum firmum requirat iudicium, quo observatis & expensis curate circumstantiis singulis, quid de morbo sentiendum, quomodo curatio instituenda, quibus auxiliis utendum, & quo ordine ac dosi hæc adhibenda; omnino necessarium est, ut ex numero pluribus observationibus addiscatur hæc & colligatur. Interim solæ observationes, etiam curatissime conscriptæ, neutiquam sufficiunt, ad evitandos tam in iudicando, quam usu remedium erroris, sed clave opus est, qua rerum in historiis obviarum facti causas eruere, detegere, aperire, clare demonstrare, tandemque ex observatis particularibus plurimis, axiomata universalis, magnæ ad pathologiæ & therapie incrementa utilitatis, elicere possimus. Jam hæc clavis nihil aliud est, quam illa rerum medicarum scientia, quæ de prompta est ex principis in sensum & conceptum cadentibus, anatomicis nempe & physico-mechanicis, ita, ut illorum ope ea, quæ ad corporis humani ejusque partium intimam structuram & ex hac dependentes singularum functiones pertinent, & horum beneficio, indoles & facultates rerum corporearum, quæ non pro arbitrio, sed ex necessitate à summo creatore indita immutabili, in corpus agunt, ac unice vitam, sanitatem, mortem & morbos, horumque & præservationem, & curationem, dispensant, cognoscantur. Præ omnibus tamen opus est deducta ex his principis pathologia vera, qua si quis destituitur, nihil solidi, nihil recti, de medicamentorum viribus, an in hoc vel illo morbo & individuo, salubria sint, vel insalubria, judicare valet. Quam manca autem & hiulca sit, quamque infirmis fundamentis niratur, & veterum & recentiorum plurimorum pathologia, nemo qui penitus eandem sine præiudicio expendit, inficias ire poterit, sed dicere illud & palam scribere, tam odiosum est, quam veritatem eloqui. Ita tamen omnino est. Et ne gravius aut ex affectu forsitan scriptum videatur, exemplo sint definitiones, ubivis obviæ. Veras hæc & reales, genuinum ac firmum esse principium, ex quo conclusiones & demonstrationes, de essentia, causis & differentiis definiti formandæ, accuratiores Philosophi, profitentur & asserunt omnes. Quæ autem in medica disciplina passim circumferuntur, de arte imprimis medica, de vita, sanitate, morbis, morte, de febre, inflammatione, morbo spasmodico hypochondriaco definitiones, ita sunt comparatæ, ut vix ulla sit, in qua non multum desiderari queat. Quin, quum in physiologicis cerebri & systematis nervosi functio & usus penitus habeatur, & à plurimis tantum non ignoretur; ultro innotescit, morbos ex horum vitio etiam ignorari, & mutilam præterea admodum esse, non modo morborum, sed & symptomatum ætiologiam. De therapie porro, nostro tempore receptæ, imperfectione, testimonio est indubio, illa propudiosa inter Medicos vigens dissensio, de remedium viribus & usu. Lacerantur hæc passim maximæ virtutis auxilia, venæ sectio, fonticuli, velicatoria, purgantia, emetica, martialia, adstringentia, imprimis chinæ cortex, camphorata, volatilia, opiata & mercurialia, quæ nonnulli in totum, nonnulli sub certa tantum conditione rejiciunt, alii vicissim mire laudant ac concelebrant. Luculentius hanc in therapeuticis ignorantiam prodit ingens illa remedium suppellex atque farrago, simplicium & compositorum, Galenicorum & Chymicorum, quam tamen plurimi necessariam iudicant ad oppugnandos tam multos & varios morbos. Alii contra universalia tantum crepant, & paucissima numero in usum vocanda esse, contendunt. Ab utraque vero parte diætetica & quasi domestica, illa maximarum in chronicis morbis virium præsidia, quibus Veteres, Chymicæ & Pharmacie ignari, gravissimos morbos debellarunt, aqua nimirum, vel pura fontana, vel mineralis, lac, serum lactis, trisane, decocta & infusa specierum vegetabilium, balnea, frictions, abstinencia quoque & inedia, vel plane ignorantur, vel minimum negliguntur, neque ex merito asstantur. Sed sic obvios nævos atque defectus Medicinæ, uti hodie fere est, terigisse sufficiat & iterum inculcasse, quæ satis inculcari possunt nunquam. Jam quo pacto lapsus hi vitandi, & quam ego ob id hoc in opere servaverim tractationis rationem, ostendam. Sane quum vita & sanitas res sit adeo pretiosa & inestimabilis, princeps & præcipua omnino est cura, ne quippiam admittatur, quod eandem ullo modo labefactare, multo minus destruire, queat. Eo potius summo exitendum est studio,

ut morbi & præmatura mors arceantur. In hoc enim præcipuum medentis posurum est officium, tum quod magis in ipsius potestate situm, tum quod ex centum, vix unus eam attingit ætatem, ut ex scientia rerum salubrium & insalubrium, præsentem morbum depellere tuto & certo norit. Ut itaque officio suo recte satisfaciatur artifex, per remedia, quæ ipsius manus & instrumenta, nihil plane agere debet ex opinione, quæ secundum Hippocratem de decent. orn. in crimen verti debet eam adhibentibus, sed simplex sectanda veritas, cujus genuinus character, si ex indubiis & inconcussæ veritatis principiis, apta connexionem ita potest deduci & demonstrari, ut animum convincat, nec dubitatio amplius superfit. Ursit hanc demonstrationem serio jam primus artis conditor, Hippocrates, passim. Sic enim graphice scribit *epist. XXVII. ad Athen.* oportet non solum dicere, sed etiam demonstrare, quod verum est ut Medicina. Idem lib. de art. pag. 9. vult, ut morborum tam manifestorum, quam obscurorum, certæ & infallibiles medelæ sint. Et lib. de loc. in hom. pag. 398. constans, ait, & infirma est tota Medicina & doctrina optime in ea compositæ, minime fortuito casu egere videntur. Arque etiam ego existimo, medicam disciplinam ad demonstrationes conficiendas omnium esse aptissimam. Magnus enim est numerus causarum naturalium, non naturalium & præternaturalium, quæ concurrere debent ad proximam causam, à qua functiones læduntur immediate & morbus fit. Quo vero major rerum vel causarum series & ordo; eo pulciores, pleniores & perfectiores conficiuntur demonstrationes. Jam, uti supra dictum, secundum optimos demonstrandi magistros, definitiones reales sunt illud principium & fundamentum, ex quo conclusiones firma argumentatione deducendæ, & in quod veritates singulæ tandem resolvuntur. Quare in adornanda hac morborum perveſtigatione, hanc mihi præfixi methodum, ut primo loco veram morbi definitionem collocarem, per quam ipse morbus ejusque causa cognosci & ab aliis ratione suæ essentia dignosci possit. Dein subjunxi statim generalem morbi historiam, completam cum omnibus necessariis circumstantiis, de promptam partim ex propria, partim aliorum peritissimorum Medicorum experientia, eumque in finem magno cum fructu usus sum ex antiquissimis Hippocratis & Aretæi, neque minus Celsi, Cælii Aureliani & Tralliani scriptis, qui accuratius recentioribus morborum consignarunt historias, è quibus ob id eximiora loca passim inferui. Enarrata historia, in proximam & adæquatam cujusvis morbi causam, quæ symptomatum genitrix, inquisivi, & simplici simul ac facili methodo cum hac connexi causas antecedentes remotas, item naturales, nonnaturales & præternaturales, ostendendo apte & intelligenter, qua ratione hæ ad primam in effectum traducendam conspirent. Tum exposui signa, è quibus de morbi eventu judicandum perire, ac, ut sedes morbi & mortis causa innotesceret, addidi demum, quæ in cadaveribus defunctorum reperiantur. Sic tradita morbi theoria, accessi statim ad medicationem & curatorias indicationes, quæ perperam plerumque seorsum tractantur. Curatio enim & medendi methodus, opponi debent causis, ideoque etiam proxime cum his connecti, quo eo melius in oculos incurrant & animo infigantur. Prisca hæc fuit Hippocratis sententia, quam lib. de flat. pag. 400. sic prodidit: si quis causas corporis affecti probe cognovit, potens est valde ea afferre, quæ corpori commodent, nimirum contraria, morborum natura perspicua. Est enim secundum naturam Medicina, id est, Medicina in naturalem statum debet reducere ægrotum. Sed in medicatione merito tenendum: nec Medicum, nec medicamenta, sed ipsam naturam, per quam nihil aliud intelligo, quam corporis machinam potentiis moricibus in solidis & fluidis, nec non ex variis secretoriis & excretoriis artificiosissime constructam, solam sæpe morbum sanare, causasque ipsius debito tempore & ordine per congrua emunctoria eliminare. Hanc itaque methodum, hunc ordinem naturæ & leges, Medicus, ceu peritus ipsius minister, cum cura observare & imitari, ac si deficit, in motibus eandem juvare, vel si excedit, ad moderamen & æquilibrium reducere debet. Quod, quo pacto recte sit faciendum, leges quasdam, naturæ legibus conformes omnino, tradidi & uberius exposui in *Med. ration. system. tom. III. Sect. II. cap. I. & II.* quæ tam in ratione, fundatæ, quam multiplici experientia sunt comprobatæ. Has qui in medicatione omni observabit curare, peccabit nunquam; qui autem deliquit, certissime contra harum præceptum impiegit. Quare omnibus & singulis qui artis exercitio manum admoveere volunt, aut jam in eo versantur, sedulo legenda, pendenda & probe tenenda commendo etiam atque etiam, quæ in citato

tato *tomus tertio*, maximeque *Secl. II. cap. I. II. III. & IV. seqq.* attuli. Inde enim amplissimum fructum ad resolvendas morborum historias & danda salutaria consilia percipient, & intelligent, specialia hoc in opere practica præcepta, niti universa illis omnia. Habeant præterea disciplinæ meæ alumni sibi commendatos casus, quos cuivis capiti subjunxi cum addita epicrisi. Heic enim, ubi recte actum, perspicient applicationem præceptorum, ubi lecus factum esse, candide sine ullius injuria dixi, aliorum damno sapere & cautiore fieri discant. Videbunt etiam ex historiis deprompta salutaria monita, amplissimi in similibus casibus usus. Omnia autem erunt incitamento, ut diligentes sint in annotandis curate morborum historiis, è quibus, ope theoriæ solidæ, ad usum accommodæ, ipsi eruere poterunt canones atque cautelas ad incrementa & pathologiæ & therapie longe utilissimas. Nolo tamen, ut mea tantum sectentur, sed ut ex aliis etiam decerpant, quæ vera & ad usum scripta, eademque cum prudentia sibi imitanda proponant. Quem in finem habeo ut commendem *Hippocratem, Aræteum, Trallianum & Celsum*, ex veteribus, ex recentioribus *Gallis, Ballonium*, & felicissimum Practicum *Rivarium*; ex *Italis* optimum *Hippocratis* scholiasten, *Mercurialem* nec non *Lancisum & Baglevum*; ex *Anglis* *Willisum, Sydenhamum & Mortonem*; ex *Belgis* *Sylvium & Boerhaven*; ex *Germanis* *Sennertum, Hildanum ac Estmullerum*, non neglectis eorum laboribus, qui novissime in nostra æque ac aliis Germaniæ Academiis, veris principiis & sufficienti experientia instructi, scripserunt. Hæc tam in genere, quam de scribendi ratione & usu hujus libri monuisse sufficiat. Optassem quidem, ut practicum opus universum, uti animo concepi, luci publicæ simul exponere potuissem, sed late nimis patuit campus, quam ut uno semestri, in tanta ægrotorum, & domi, & foris, consilium & opem exquirentium, in tanta negotiorum & causarum, ex magistratu, quem gero academico, multitudine, & sub valetudine adversa, qua sub initium anni longius quam per mensem sui detentus, eundem potuerim emetiri. Selegi igitur potissimam de febribus doctrinam, eandemque in prima hac parte mihi sumpti explanandam. Dabo tamen operam, ut quam primum fieri poterit, reliquorum adhuc morborum, eodem modo instituta tractatio, si Deus vitam viresque concesserit, vertente forsitan anno, lucem aspiciat. Interim ut hic noster labor in medentium & ægrotantium fructum cedat amplissimum, voveo. Scribebam Halæ Magdeb. Idibus Maii anni cfs lcccxxix.



# CONSPECTUS PARTIS PRIMÆ SECTIO I.

De Febribus Intermittentibus tam simplicibus quàm com-  
positis & anomalis Catarrhalibus, item  
Exanthematicis & Malignis nec  
non Erysipelacea.

## PROLEGOMENA.

De Febrium natura in genere.

- CAPUT I. *De febre tertiana.*  
 II. *De febre quartana.*  
 III. *De febre quotidiana.*  
 IV. *De febribus intermittentibus epidemicis anomalis mali moris.*  
 V. *De febre semitertiana.*  
 VI. *De febre catarrhali benigna.*  
 VII. *De febre variolosa.*  
 VIII. *De febre morbillosa.*  
 IX. *De febre purpurata rubra & alba miliari.*  
 X. *De febribus epidemicis exanthematicis catarrhalibus sive petechizan-  
tibus.*  
 XI. *De febribus petechialibus veris.*  
 XII. *De febre pestilentiali.*  
 XIII. *De febre erysipelacea.*

## SECTIO II.

De Febribus acutis inflammatoriis, item lentis putridis heëticis  
nec non symptomaticis.

- CAPUT I. *De febribus inflammatoriis in genere, speciatim de febre acuta sangui-  
nea, Græcis synocha.*  
 II. *De febre ardente, nec non cholericæ.*  
 III. *De febre stomachica inflammatoria.*  
 IV. *De angina.*  
 V. *De febre phrenetica sive phrenitide.*  
 VI. *De febribus pneumonicis, sive pleuritide & peripneumonia.*  
 VII. *De febre hepatica, sive hepatitide.*  
 VIII. *De febre nephritica.*

- IX. *De inflammatione vesicæ.*  
X. *De inflammatione & febre uterina.*  
XI. *De inflammatione oculorum, cum & sine febre.*  
XII. *De febre intestinorum inflammatoria ex mesenterio.*  
XIII. *De febris lentis & hecticis.*  
XIV. *De febris symptomaticis.*







# SECTIO PRIMA

D E

*FEBRIBUS INTERMITTENTIBUS,  
tam simplicibus quam Anomalis atque compositis,  
item Catarrhalibus, Exanthematicis &  
Malignis, nec non Erysipelacea.*

## PROLEGOMENA

*De Febrium natura in genere.*

### § I.

*Febri-  
s fr-  
gredi-  
tibus.*



Nullus morbus recte meretur appellari universalis, certe est ipsa febris. Hæc enim universum nervosarum partium genus vehementer exagitat, omniumque in corpore partium functiones graviter pervertit, ut nec solutorum, cordis & arteriarum motus, æquabilis sit atque legitimus, nec sanguinis reliquorumque humorum progressus liber & naturalis, nec saluberrimæ secretiones & excretiones recte succedant, neque etiam ipse animus sibi omnino constet, sed quandoque febri impetu turbatus, delirat plane. Deinceps omnibus omnino hominibus ex æquo incumbit hic morbus, cupiscunque sint ætatis, sexus & temperamenti, quocunque sub cælo vivant & quocunque etiam victu & vitæ regimine utantur. Quin epidemice hæc raro grassatur multosque simul magna corripit atrocitas ac mendicibus multum facillit negotii. Neque tantum per se sanitatem subvertit & morbus est primarius, sed sæpe etiam aliis passionibus, uti cachexiæ, scorbuti, phthisi, lûi veneræ, hydropi, accedit seu symptoma, cædemque acerbiores reddit & periculosiores: Ut adeo, calculo exaltius subducto, decima mortalium pars, morbo vix alio tollitur è medio, quam febri.

### § II.

Licet autem febris humano generi tam infestus & perniciosus sit morbus; hæc tamen peculiarem obtinet facultatem, ut motu instans & progressivo, quo absolvitur, auctiori, cau-

sam suam destruat ac se ipsam sanare possit, immo aliis gravibus & longis morbis superveniens, eosdem vincat atque expugnet. Ipse Hippocrates & Celsus febrem habuerunt medicinam & morborum præsidium, quo magni etiam morbi curantur, paralytes, epilepsie, convulsivi motus, affectus spasmodici, sic dicti hypochondriaci; quin consilium duxerunt, suppressa citius febre, novam accendere. Et testatur etiam observationes, quod valentiniani, post febrem, firmam & longam sanitatem fuerint adepti, quin, quod temperamentum & mores fuerint immutari, qua de re laus videri potest, dissertatio nostra de febrium salubritate.

### § III.

Quam igitur febris tantam potentiam, tam ad mortem, quam sanitatem habeat; in proclivi est judicare: ipsius veram & intimam, quoad indolem, generationem atque effectus cognitionem, utilem esse medico & scina necessariam. Jam, secundum logicas regulas, vera rei cupidum definitio, naturam, differentiationem & causas ipsius comprehendens, verum & optimum est demonstrandi principium, ex quo reliqua phenomena apte deducenda. Hinc omnino etiam de vera, adæquata & reali febris definitione debemus esse solliciti. Sed pudet & tæter dicere, tam multas tamque varias veterum æque ac recentiorum proflare febri definitiones; & tamen vix ullam, ullius, aut non nisi exigui esse momenti, ad genuinam ipsius indolem veraque causas exponendas. Mihi itaque ad veritatem accommodare sic definienda videtur febris: quod sit spasmodica universi systematis nervosi & vasculosi affectio, juncta cum omnium in corpore functionum lesione, orta à causa nervosas partes ad intensiorem contractionem irritante, ita quidem, ut accedente ipsa, fluida vitalia primum ad interiora, cor & majora vasa ab externo ambitu agantur, & postea, aucta cordis & arteriarum systole, celeriter cum æstu per strictiora vasa exterius

*Febri-  
s fr-  
gredi-  
tibus.*

*Sept. an-  
no 1763.*

torum pellantur, donec spasmo laxato excretiones succedant & febris definit.

## §. I V.

*Causa febrilis*

Affero igitur, formalem febris rationem, siue, ut ita loquar, fundamentalem causam, consistere in spasmodico universi generis nervosi & fibrosi affectione, quae maxime ex spuali medulla procedit, & successive ab exterioribus ad interiores partes vergit. Docui id pluribus & momentosis rationibus in *dissertatione, de vera morum febrilium indole ac sede*. Idem vero etiam luculenter arguunt omnia, quae in febre praesto sunt pathemata atque phenomena, dolor scilicet dorsi, praesertim circa lumbos, horror, rigor, frigus, praesertim extremorum eorum, unguum livor, vasorum in manibus & pedibus deumefactio, cutis contracta & arida, oscitatio, pandiculatio, pallidus & lividus faciei-color, tremens & palpitans cordis motus, praecordiorum anxietas, spiratio aegra, inquietudo, corporis iactatio, sensus ebullientis circa praecordia sanguinis, pulsus contractus, parvus ac debilis, nausea & inclinatio ad vomitum, alvi & perspirationis suppressio, cum urina tenui & aequa.

## §. V.

*Causa morborum varia*

Hinc prona jam fuit consequentia, quod omnia, quae totum nervosarum & vasculorum partium systema ad spasmos irritare & sollicitare possunt, ad ingenerandam febrem sint aptissima. Horum classem ducunt, vehementes animi commotiones, terror in primis & ira, materia venenata & subtilis causifica, vel innata, vel per contagium suscepta, intercepta perspiratio, sudores critici cohibiti, exanthemata retropulsa, materia purulenta ulcerosa, pulsus in partibus obhaerescens, alimenta nimis acrida, corruptae & biliosae praeis in viis haerentes cruditates, nimiae vigilae, dolor vehement ac nervosarum partium sensus, in inflammationibus, tumoribus & abscessibus, laesiones nervosarum partium ab acuto instrumento, ab acridi & corrosivo pharmaco, balnea frigida & vicissim nimis calida, aut adstringentia. Sed pro differentie harum causarum indole & vario, quo nervosum genus inserrant, modo, differunt etiam prognatae inde febres, ut nonnullae sint benigniores, nonnullae maligniores, aliae intermittentes, aliae continuas, simplices, vel compositae, regulares, vel anormales, exanthematice, putridae, haecicae, vel lenae, ut porro quaedam facilius, vel difficilius sanationem admittant, quaedam cito decurrant, quaedam longius exarantur, quaedam etiam hominem perimant. De qua febrium origine earumque causis & differentiis, pluribus ego in *dissertatione, de generatione febrium*.

## §. VI.

*Febris duplex morborum*

Neque vero omnis celerior cordis & arteriarum systole, ex pulsi frequentiori cognoscenda; nec auctus cum calore intensiori sanguinis circulus febris est. Saepè enim talis à vehementi corporis exercitatione, vel sanguinis percalida & spiritulosa commotione accidit. Sed ille tantum intensior fluidorum circulus & illa auctior cordis & arteriarum systole, febris dicenda, quae à causis internis inducitur & sequitur horrorem, rigorem & frigus partium exterarum. Duplex enim in febre locutus motus, unus qui à peripheria ad centrum, siue à partibus externis ad internas, cor & pulmones, vergit; alter qui hunc sequitur contrarius, à centro ad

corporis peripheriam. Illi junctus pulsus parvus, contractus, debilis cum praecordiorum anxietate & spirandi angustia; huic auctior arteriarum motus, pulsus magnus & altus, extremas etiam corporis partes occupans. Duplex hunc febrem absolvere motum pridem jam notavit primus artis nostrae parens Hippocrates, eundemque diversis verbis fule descripsit lib. de flat. hunc in sensum: *in febre per brevem sanguinem ab extremis corporis partibus, quae exsangues & propter frigus palpiant, decedere & concurrere ad locos maxime calidos, & ob sanguinis ibi collecti abundantiam suscitari calorem, ad externa demum transirentem*.

## §. VII.

Duplex hic motus diversè plane indolis atque virtutis est. Primus ille, à peripheria ad centrum, minus salutaris, sed non *exiguus* morbosus, quam interdum moriens. Quin enim morimur ex Febre, siue continua sit, siue intermittens, acuta, siue chronica, pereunt sub spasmo, frigore, horrore & rigore partium exterarum convulsionibus, quia cor, pulmones & cerebrum, sanguine intus congesto nimium obruta, eundem ob debilitatem amplius repellere nequeunt. Alter vero ab interioribus & centro, ad circumferentiam & minima vascula motus, salutaris est & vitalis, immo medicinalis & conservatorius. Sub hoc enim & per hunc, ipsa materia, spasmodum febrem ceteris, successu temporis corrigitur, discutitur, ejicitur & ipsa febris soluitur.

## §. VIII.

Nimirum quam causa morus febrilis sit *spasmodica* universalis, nunquam penitus cessat ille, nisi hic fuerit solutus. Hunc autem solum esse indicant, si perspiratio fit liberior, mador, vel sudor in cute appareat, pulsus antea durus, impetuosis & celer, mollior fit, moderatus ac tardior, si urina sedimentum ponit & vires successive redeunt. Haec junctum apparentia, morbi solutionem nunciant, & crisis nomine veniunt, quia ex his medicus iudicium de morbo ferre potest. Hoc etiam sensu exponenda est veterum definitio febris; quod sit lucta cum morbo. Quod si scilicet spasmus, fucos ad interiora urgens, cordis & arteriarum motu, ad externa repellente validior est, morbus vincit & mors incidit. Si autem motus per spasmodum retrogradus superatur à vitali cordis & arteriarum systole extoriorum sanguinem trudente, morbus abigitur & sanitas redit. Quae quidem naturae post luctam hanc victoria, certis, septenario potissimum numero computatis, diebus accidit, qui ob id vocantur cricis, quibusque medico de morbi eventu iudicandum.

## §. IX.

Ineffabilis igitur divina providentia merito celebranda, quae corporis nostri machinam animalem, tam sapienter potentis & facultatibus instructi moribus, ut ipse morbus, qui nunquam non cum laesione functionum partium & vires sanitarum periculo accidet, ad expugnandam ipsam suam causam suae curationem facillime vergat & vergere possit. Atque adeo, quam ipsa natura sit optima morborum, etiam ipsius febris, medicatrix, periculosissimum omnino est molimen, febres in salutem tendentes motus, imprudenter medicina suspendere, suppressere, aut plane tollere velle. Secundandum potius naturae saluberrimum opus, quod per auctiorem progressum humorum motum, ad

*Ung. mapp. legi.*

*Altera fac. locari.*

*Febris fac. locari.*

*Per auct. rem & auct. praesentia.*

cor-

# Secl. I. Cap. I. De Febre tertiana.

84

correctionem & resolutionem materie morbi-  
ficæ ipsiusque tandem excretionem dirigitur. Id  
quod optime perficitur diuersionibus, humectan-  
tibus, temperantibus, aperientibus, roborantibus  
& nris, nec non iis, quæ, tempore præ-  
ferunt intermissionis, congruas excretionem pro-  
mouent.

## §. X.

Coniugio.

Hæc est nostra febris & rationalis febrium  
theoria, causis manifestis, intellectui obuiis  
ex necessitate agentibus, physico-mechanicis,  
nitens, ex qua omnia, quæ circa febrilem mo-  
uum negotium occurrunt, phenomena, sym-  
ptomata & effectus, ordine concinno & apta  
conexione deduci possunt & explicari. Quod  
quo pacto sit faciendum, & qua ratione etiam  
ex hac theoria methodus medendi congrua eli-  
cienda, causisque opponenda remedia, uberius  
parebit ex iis, quæ in speciali quarumvis feb-  
rium tractatione jam dicemus.

## CAPUT I.

### De Febre tertiana.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

Tertiana  
quæ dicitur

**N**ulla febris est, quæ tam exacte mon-  
strabitur in genere, quæ & vasa, & nervo-  
sas partes infestat, & Hippocrati Græcique  
rigoris nomine quasi per excellentiæ venit,  
naturam ac genus manifestat, & quæ tam  
frequenter affigit, nec ulli ætati, temperamen-  
to vel sexui parit, quam quæ alterius diebus  
cum rigore & horrore invadit, subsequente ce-  
leri, qui ex frequentia cognoscitur, pulsû, nec  
non anxio & ardenti calore, ac tertiana dicitur.

##### §. II.

Diffusio  
causæ  
symptom-  
atis.

\*Hæc, præsertim si regularis & legitima, his  
incedit symptomatibus. Caput primum dolet,  
artus languent, lumborum percipitur dolor circa  
primam dorsalem vertebram, qui per dorsi  
longitudinem versus epigastrium ascendit, cum  
dolorifico tensionis in hypochondriis sensu, al-  
vique stricтура: accedit partium exterarum,  
præsertim narium & aurium, refrigeratio, pan-  
diculario, oscitatio & horrore, membra lævis  
gravior concutitur, pulsû simul parvo, con-  
tracto & debili, interdum quoque ægro sitien-  
te. Sequitur dein nausea, cum inani ad vo-  
mendum conatu, vel etiam ipsa vomitio mat-  
erie biliosæ & piniosæ, quandoque viridis,  
iuncta sæpius nulli molesta cum pituitæ rejec-  
tione, ex stomachi cruditatibus acido-viscidis oriunda.  
Tum universum corpus fervor, live anxias,  
ardens & siccus calor occupat, facies antea col-  
lapsa & pallida, cutis contracta & rigida, vas-  
que in manibus ac pedibus inanis resurgunt,  
rubescere ac tumescere incipiunt, arteriarum  
quoque pulsû major, plenior & citior micat,  
inquietudo interior spiritusque difficilior fit, &  
ægrî oculis vix clausis aliena multa loquuntur.  
Decrescit postea sensim hæc symptomata, æ-  
nus minuitur, cutis laxatur & madescit, urina  
emittitur flammæ coloris, qualis comparat in  
defillatione spiritus nitri, vel aquæ fortis, sine  
sedimento tamen; arene simul molibus tangen-  
tis maxum ferunt & sudore pronupte po-

roxysmus discedit; qui tamen pro differentia na-  
turarum & causæ morbi ficæ quoad durationem  
varius, ita quidem, ut in quibusdam ad decem  
vel undecim, in quibusdam ad viginti horas  
protrahatur. Subsequenti intercalari die, corpus  
quidem adhuc languet, frigidissimum est, facie  
leque inhorrescit, pulsû tamen sub febris impetu  
citius & vehemens, tardius jam & debilis  
undulat, & urina quoque crassior mingitur, ac  
sedimento puit, vel minimum nubeculam,  
quæ dispositio ad sedimentum, exhibet.

##### §. III.

Sic decurrens paroxysmus febrilis, ipsa sym-  
ptomatum ratione teste, quam optime ad motus  
nervosorum partium universi fere corporis spas-  
modico-convulsivos referri meretur, quo etiam  
fit, ut omnia ea, quæ nervosas partes ad mo-  
tus anormales irritant, uti quidem faciunt animi  
afflicti, fortiori cathartica, nec non cum citis  
vel ære succis materie acres, causticæ & vene-  
nate, item omnia adstringentia, frigida &  
quæ nervis inimica sunt, quæ chylifices acres,  
quos purgantia validiora ingrediantur, tum ad  
generationem, tum recidivam, vel minimum  
exacerbationem febri, plurimum omnino con-  
ferant.

##### §. IV.

Causam horum motuum febrilem in tertiana  
veteres quidem bilem inemperatam, ab aliis  
humoribus separatam & exorta venas in imo  
ventre nidulantem, esse censuerunt: est vero  
potius materia, quæ illos excitat & fovet, ex-  
crementitia sulphureæ & activæ indolis,  
quæ nostro quidem iudicio, sedem potissimum  
habet prima in regione, partim in bilisariis  
hæc ductibus, partim in flexura duodeni. Sci-  
licet hoc in cavo humores biliosi, salivales,  
præsertim pancreatici, jam tum visci, mutas  
cum cruditatibus ex prava digestionem consermen-  
tatione ipsaque diuturniori mora & stagnatione,  
ejusmodi virulentum pigmentum materiam, quæ  
huc successive per vasa lactea ad sanguinem &  
cum hoc ad nervos capitis, medullæ spinalis,  
ventriculi, intestinorum & nervos aliorum du-  
ctuum secretorum & excrementorum tunica  
sufficienti quantitate dilata, universalem ejus-  
modi spasmum citet, sub quo sanguis ad inte-  
riora & vasa majora primum urgetur, postea  
vero aucto systolico cordis & arteriarum mo-  
tu, totius massæ sanguineæ & humorum pro-  
gressus intenditur, obstructions in minimis  
nervosorum partium canaliculis expediuntur, &  
remittente spasmu relaxantur excretorii, fe-  
brilis, quæ insedit, materia per cutis spiracula,  
perspiratione, aut sudore opportune ejicitur, in-  
sulsusque cessat, donec per rursus hujus excre-  
menticie materie quantitas ex prima viis ad  
sanguinem tunicaque nervosâ denuo facit trans-  
lata, novumque inducat paroxysmum.

##### §. V.

Expedita autem hujus materie ipsiusque ter-  
tiane genesis est in corpore exaltationis sensus,  
cholentice constitutionis, ad spasmos anormales  
motus proclivi, in ætate plus consistente, quam  
infantis & senilis, regimine assate nimis terri-  
da & stantibus ex aucto & tuto venis; præ-  
sertim si potio frigida fuerit ingurgitata, vel cor-  
pus tempore vespertino, aut nocturno, aut  
frigidiore & humidiori, aut plane interictorum  
minimorum copia circa conphusa de stagna  
referat, diutius expeditum; multo magis quan-  
do venit cruditatibus oppleta, vel cili gravis  
materia,

materie, aut adstringentis facultatis, & maxime omnium cum nausea, affluent.

## §. VI.

*Pro-  
cessus.*

Neque minus frequentis experientia confirmatum habemus, corpora spongiosiora tempore vernali, post largiorem sanguinis missionem, facile in febres tertianas notatas, vel catarrhalis incidere, eo facilius, quando, præsertim grassantibus jam febribus, pluvioso & humido coelo committuntur, & stomachus cibo minus solubili inficitur. Novimus quoque à purpura frigore externo repulsa, scabie limenisorum mercurialium & sulphureorum ope incompellive siccata, ab improvido acidularum & aquarum mineralium, neglecto simul regimine & assuetis radioribus alimencis, potu, nec non à percalido Carolinarum, quæ adstringentis virtutes sunt, thermarum, in corpore præsertim plethorico, impuro & crudisimul repleto, balneo, febrem tertianam, interdum continuam, interdum duplicem & anomalam, accessisse.

## §. VII.

*Divisione  
in legiti-  
mam &  
analem.*

Ex his incapabilis prognata tertiana, non semper una eademque facie incedit, sed discrepat, ideoque merito à medicis in varias displicunt species. Est quippe vel legitima, vel notha. Illa potissimum adori solet homines biliosæ constitutionis & sensu exquisitissimi polentes, in primis sub præcalida æstivi intemperie, acerbioribus etiam stuporibus symptomatibus, horrore scilicet, calore, capitis dolore, siti, vomitu & anxietate, urina scedente intensius flammæ, breviori tamen temporis spatio solvitur atque discedit. *Hippocrati* quidem exquisitam hanc duodecim horis defervere & septimo paroxysmo finiri, passim asserit, sed tam exactæ periodi febres in septentrionalibus nostris humidioribus & frigidioribus regionibus non observantur, & recte hinc perhibet *Mercurialis præfati. Bonn. pag. 190. rarissime tertiana exquisita Hippocrati invenitur, neque ego vix vidi, & jam quadraginta anni sunt, quod praxis exerceat*; id quod ego ipse etiam asseverare possum. In notha autem, sive spuria, minora quidem præsto sunt pathemata, calor non tam ardens, vomitus non ita frequens, urina non adeo flammæ coloris, & vacuo etiam die virium languor, aruum lassitudo cum inappetentia relinquuntur. Ad hæc, signioris magis sanæ homines, sequiores ætatem & qui spongiosioris sunt habitus, autumnali maxime tempore, infestant.

## §. VIII.

*Regula-  
re & in-  
regula-  
re.*

Regularis dein est, vel irregularis, sive anomala & confusa. Illa typum servat æqualem, tam ratione temporis invasionis, quam solutionis, longitudinis ac brevitas paroxysmi & fuerit ceterum incedit symptomatibus. In hac tempus accessions inordinatum, mox ante, mox post meridiem, jam circa vespertim, quin medium noctem, ipse paroxysmus, modo brevior, modo longior, urina, remissionis, vel intermissionis tempore, nihil diminuit, sudor vel nimis parvus, vel nimis largus, vacuo etiam die adest, & passiones complicantur insolite, pro naturarum diversitate diversæ, ut vel alvi fluxus, vel narum hæmorrhagiæ, vel enormes stomachi etiam subversiones, aut graves capitis dolores, mentis alienationes, anxietates cardiacæ summa, aruum dolores ventrique tormina præsto sunt. Et tales irregulares febres, quæ typum non servant, sunt plerumque epidemicæ, ex

præternaturali & insola æstatis vel autumnali constitutione provenientes, ut plurimum continuæ, quæ etiam elapso MDCCXXVII. anno per universam fere Germaniam, post intermissam amissionem per multos menses siccitatem & caliditatem, populares habuerunt circuitus.

## §. IX.

*Simplex  
& duplicis.*

Nonnunquam porro simplex, nonnunquam duplex observatur. Simples paroxysmi alternis diebus recurrunt, duplex autem quotidie accedit, interdum quoque bis, uno die vacuo. Distinguenda tamen duplex à quotidiana, quæ accessions tempora quotidie servat æqualia, quæ in illa paroxysmi recurrit alternis diebus respiciat.

## §. X.

*Conti-  
nua.*

Continua quoque occurrit tertiana, his dignoscenda signis: adori cum horrore, anxietate, vomitu, æstu & ingenti languore, nec sequenti die symptomata hæc prorsus intermittuntur, sed tantum remittunt, pulsusque manet adhuc frequens, cum æstu & languore debilitate; paroxysmi autem die, præcedente levi exteriorum refrigeratione, omnia iterum exasperantur & ingravescent. Et talis febris, si epidemia, durat quandoque per duas vel tres hebdomadas, ænequam in legitimam intermissionem concedat; fit autem crebrius, ut tertiana primum per aliquot dies sit continua & postea in intermissionem bono transcat ordine, malo contra, ex intermissione in continuam.

## §. XI.

*Spolia  
et  
anomalie.*

Plerumque tam simplices & regulares, quam duplices & anomale, sunt epidemicæ & ex insola temporum tempestatibusque, æstatis inprimis, constitutione, proficiuntur. Endemice quæ audiunt, familiares & quasi propriæ sunt certis quibusdam locis, depressioris scilicet situs, uliginosis, pùcibus paludibusque cinctis, calicum & insectorum proveniunt infestis, ita prorsus, ut incolæ rarius annum à febre immunes transigant & advenæ crebrius eadem exerceantur ac difficulter ex toto liberentur.

## §. XII.

*Procedit  
autem  
autem.*

Omnia hæc febres tertianæ genera mitius primum accedunt, repentinis autem paroxysmis vehementia invalescunt, manifestio indicio, inordinatis ipsis, solidorum & fluidorum sub impetu motibus, magis adhuc inquinari magisque intemperatos reddi corporis succos, qui immixto intermissionis diebus perspirationis & excretionum succosus, pejozem adhuc successive indolem contrahunt.

## §. XIII.

*Paroxys-  
mus  
quæ  
modo  
sub  
vacuo t*

Singuli paroxysmi, laxata jam cutis compage, madore, vel sudore solvantur, urina die intercalari crassior mængitur & nubeculam exhibet, vel plane sedimentum ponit, quod eo copiosius, quo plus corpus sanguine & succis abundat. Si vero sub declinatione sudor non prodit, urina etiam tenuis & aquosa die vacuo scedit, alvi que siccas impetior, uti hypochondriaci maxime solemne, adest; valde affectum esse spasmus à materia rebellis febrii nervosarum partium systema arguit.

## §. XIV.

*Febris  
fe-  
bris  
spas-  
modica.*

Tertio ut plurimum vel quarto paroxysmo ulcuscula circa labia prodeunt & lotium cum ardore quodam reddunt, tamque symptomata novabiliter mitescent. Opus autem & sic-

securissime hæc febris à natura vel sola, vel arte adjuva, ex toto solvitur, erumpente bilioso copioso alvi fluxu & auctiori excretionis cuticularia, die à febre immuni, succosâ, quod ex magnitudine & vigore pulvis viriumque incrementis cognoscitur. Qui tamen epidemicis & anomalis laborant, soluta licet febre, difficiliter convalescunt & vires recuperant, ideoque diæta exactiori indigent.

## §. XV.

Nulla ex febrium genere, calore & auctiori sub paroxysmo motu interno, tam celeriter corpus succulentum exsiccat & obesum emaciât, tantumque biliosorum secretamentorum, quæ per vomitum, alvum & urinam secedunt, copiam ingignit, ac tertiana, intensiori ac diuturniori æstu stipata. Er hæc fuit procul dubio ratio, quod veteres febrem hæc à bile intemperata, exuperante derivarint, licet hæc redundantia effectus potius quam causa sit.

## §. XVI.

Longiores & contumaciores sunt autumnales & hyemales tertianæ, tum maxime, quando viscera male constituta, prima regio spæmæ & flatibus repleta, alvus stricior, æger vorax, multumque, præsertim ante accessiorem, ingerit, nec non ubi conveniens regimen in paroxysmo & post eum, suppressum sudorem, negligitur, vel etiam medicatio perperam instituitur, uti plerumque evenit in picebeis & qui marasmi ministerio victum parant, confirmante hæc ipso *Hippocrate Sect. I. aph. IX.* Breiores contra minime accipies sunt, si æstas incidit, prima regio & viscera ad sanitatem disposita & regimen diæticum æque ac diaphoreticum tempore vacuo rite observantur.

## §. XVII.

Licet omnis intermissio non adeo periculosa sit, vix tamen ulla circumspectio diæte ratione & tam provida methodo excipienda, quam tertiana & quartana. Quod, si non servatur, in truculentos & immediabiles morbos adducit ægrotantes, febrem tempore lentam, hecicam, subitum pedum tumorem & hydropem, contructuras & acerbos dolores artuum, malum flatulentum & hypochondriacum varique generis morbos spasmodico-convulsivos, infantes in lethalem plene epilepsiam, qui omnes morbi facile succrescunt post præpositum ac nimium adstringendum, aut sufficientem materie excrementitiæ correctionem & evacuationem, usum. Hinc apprimè ad veritatem *Trallianus lib. XII. cap. 6. tradit: tertiana, inquit, facilius quidem curatur, quam autem à medicis illis, qui non recta ratione & via utuntur, male tractatur, non modo difficilis curatur, sed & infanabilis interdum redditur.*

## §. XVIII.

Ex facili quoque tertiana per medici & laborantis errorem in aliam febrem speciem transit, simplex scilicet in duplicem, quandoque triplicem, immo in quotidianam & lentam, vel plene continuam, aut cholericam.

## §. XIX.

Crebrius demum & facilius quam ullus alius morbus redit tertiana & quartana, imprimis præposita medicatione suppressa. Simul ac enim corpus à febre hæc ita pridem liberatum, æri paullo frigidiore & humidiori renouque æstio-ri ex spersione spiranti exponitur, vel stomachus copioso, aut insalubri cibo plus iusto aggravatur, vel quidam animi motus, ita potissimum

*Frid. Hagemannus Oper. Tom. II.*

aut terror, incidunt, vel etiam purgata paullo acris propinquant; propterea spasmi febriales, dolor in capite, cum partium ipsius externarum, aurium & narium refrigeratione, oscitatio, pendulatio, dolor circa primam lumbarem vertebra, languor artuum, hypochondriorum cum anxietate & alvi strictione tensio, horripilatio & refrigeratio, cum subsequente æstu, accedunt, quamvis sub prima repetentis morbi accessione, non secus ac in principio omnis febriis intermissus, miciora sint hæc, & sequentiis paroxysmis exacerbentur.

## METHODUS PRÆSERVATORIA.

## §. I.

Quam itaque febres tertianæ plerumque epidemicæ sint & populariter grassentur, earumque causa antecedens febrem ingignens, potissimum in aëre visio, vel diuturna intemperie, nec non in cohibita excretionem per cutem & cruditatum prima in regione sentina, continetur; facile patet, tempore, quo circumvenit, intemperatum, impurum & vappidum aërem esse fugiendum, vitando maxime omnium vestimentum humidiorum auram, neque cibo copioso aut gravi stomachum onerandum, neque potum largiorem, multo minus spirituosum, vel acrescentem ingerendum, necque etiam animi affectibus indulgendum.

## §. II.

Inter remedia quæ à febrium insula defendunt, æstas nimis fervida ex usu sunt pulveres leniter nitrosi, absorbentes & diaphoretici, decocta etiam temperata & diluenda, ex radicibus cichorii, scorzonæ, rasea cornu cervi, hordeo mundo, ad potum ordinarium proficua, nec non acidula Selætanæ, vel Wildungenses, quæ simul alvinam excretionem liberam reddunt. Expedit porro quoque, mane insulo theiformi, ex herba sanguinem depurante, ut scordio, veronica, post somnum excretionem per cutis poros elicere ac promovere. Neque enim facile febris alvo soluta & perspiratione libera accedit, ut potius, quandoque illa præter morem adstringitur, corpusque languens & frigidiusculum est, febrem præstolans, hæc fallaci iudicandum sit augurio.

## INDICATIONES CURATORIÆ.

## §. I.

In curatione vero omnis medendi intentio ad causarum proximam remotionem dirigenda. Atque adeo, quum potissimum tenuis, acris mobilis & biliosus humor, nervosorum partium & tunicarum vasorum systema universum, ad universalem spasmus & strictionem existimans in causa sit; recte utique colligunt, generales medendi intentiones his contineri momenti: 1) ut subtilis illa & causifica acrimonia temperetur & emendetur; 2) ut correctæ & præparatæ materia peccans, quæ à perspiratione intercepta in corpore de genita fuit & repleta, per cutis imprimis spiracula leniter diffusetur & evacuetur; 3) ut vehementia spasmorum, qui præsertim sub frigore & horrore læva concitant symptomata, mitigentur; 4) ut cruditatis acido-vicido-biliosæ, in duodeno potissimum stibulantes, quæ radum & hospitium materie febriæ præbent, tempesti-

B

ve

ve invertantur & expurgentur; 5) ut vigor motuum post paroxysmum corpori reddatur & excretionum succellus fervetur, ne, uti quidem post omnem vehementem morbi impetum & parium nervoso-musculosarum spasmus solenne, atonia & moruum languor succellat, nec inde sanguinis & humorum progressus una-cum secretionibus & excretionibus elanguescant, & hac ratione de novo materia febrilis generetur, foveatur & accumulatur, & denique 6) ut, quum hæc febris ex facili redeat, cessante jam hac ipsa, novæ materiæ ad inducendam recidivam aptæ generatio, summo studio impediatur & præcaveatur.

## §. II.

*Humores  
biliofi cum  
paroxysmo*

Ad obtinendum itaque primæ indicationis scopum, acrimoniam nempe biliosam, quæ ob intensiorem æstum fucos succellive collunat omnes, contemperandos, nihil efficacius niro, vulgari tantum rite depurato, quippe quod sulphur volatile, à quo motus insectinus citur, figendo, æstum extinguat & longe præstantioris effectus est acidis, quæ calorem quidem reprimunt, sed humores simul inspissant, quum illud eisdem fluiculis potius fervet ac tenuis. Egrege quoque acrimoniam sulphuream biliosam obtundunt diluentia & humectantia, potui destinanda, cupis generis sunt præstare ex hordeo, radicibus scorzonæ, rasura cornu cervi, succo de corticibus citri, ex aqua pura debito modo decoctis, item decoctum avenarum, vulgo *der Haber-Trank*, serum lactis dulce, aqua Seheranæ, vel etiam cerevisiæ tenuis, bene coctæ ac diureticæ. Et hæc quidem in paroxysmo potissimum ex usu sunt.

## §. III.

*Per paroxysmum*

Ex præscripto secundæ indicationis id agendum meden, quo humores tenuis, excrementitios, biliosos, præparatos nunc & correctos, laxata post paroxysmum porosa & cribrata cute, blande educat. Percutitur hoc apprimè diaphoreticis lenioribus, crustilla scilicet animonii, animonio diaphoretico, cornu cervi ullo & philosophice præparato, nec non infuso theiformi, quod scordium, vel carduum benedictum & cortices citri habet, item essentia scordii, vel cardui benedicti, probe quidem saturata, non tamen adeo spirituosâ, cum liquore nostro anodyno minerali permixta.

## §. IV.

*Spasmi in  
paroxysmo  
mitigandi*

Tertia indicatio vehementiæ spasmorum ipso in paroxysmo mitigande dicata est. In qua quidem explenda præstans utique jam laudatus usus nitrosorum refrigerantium, lenium diaphoreticorum & diluentium blandumque madorem elicentium. Inprimis egregia hoc nomine virtus liquoris nostri anodyni mineralis, vel qui ipsi iurrogari possit, spiritus niri dulcis bene præparatus, quippe qui blando suo & naturæ amico anodyno sulphure effrenes fluidi nervi & solidarum nervosarum & musculosarum parium motus compescit, eo felicius, quando is vel cum pulveribus fucis, vel essentia diaphoreticis maritatur & cum aquis, quæ pariter sedative virtutis, florum scilicet sambuci, tiliæ, primule veris, bistorum convallium, chamomillæ vulgaris, rosarum, acaciæ, ulmaris, item cerastorum nigrorum, propinatur.

## §. V.

*Hordeum  
primum  
regimen  
ad hoc  
abstrahendum*

Quamvis prima corporis regio sordibus maxime excrementis & biliosis scatens mineram & fontem materiæ febrili præbeat, eo, ut quar-

ta præcipit indicatio, quam maxime amittendum, ut confluentes hac ex universo corpore interporati & vitiosi succi atemperentur, & eliminentur. Hinc ubi acidiæ crudissimas exuberant, sola absorbentia, tum terrea alkalina, quam salina, utramque absolunt paginam, & inter hæc speculæ potissimum & securæ virtutis lapides & chelæ cancerorum, nec non testæ ovorum; quæ ut teneriora & facile solubilia, merito anetherenda marinis, rudioribus & ægrius liquefcentibus cumque acido in adstrictivam plane facultatem transeuntibus.

## §. VI.

Quando biliosa pox præstio est acredo, niro, uti meminimus, nihil superius; si vero lenis ac tenaces, viscidis succi innas consistunt, salum neutrorum laudata virtus, tartari quippe violatilis, salis digestivi Sylvi, ex capite mortuo spiritus salis ammoniaci, ex æquali parte salis tartari & salis ammoniaci, confecti, salis quoque ipsius ammoniaci depurati. Qui certe, maxime in robustioribus & victui crasso, duro, marino affuetis, Succis, Batavia, Westphalis, quibus ut plurimum disturnæ esse solent febres, commendari merentur; opus autem est ut cum sufficienti aqueo vehiculo diluta exhibeantur. Hæc quippe, si repetita, vel majori dosi præbentur, præter effectum incidentem, alvum quoque movent & fordes efficaciter evehunt, eoque nomine nostro jam tempore haud mediocrem salubritatem laudem adeptæ salia, ex aquis medicatis parata, Sedlicense scilicet, Egeranum, & ad horum imitationem confectum sic dictum Elbshamense sal, quæ ad unciam dimidiam & plus in aquæ mensura liquata, viscidas & excrementis primarum viarum fordes detergendo & exstirpando, fœcæli adversus intermittentes & qui ex ventriculo oriuntur morbos sunt utilis. Idem præstat decocta à nobis aqua Sedlicensis amara, ad mensuram dimidiam, diebus intercalantibus ter vel quater hausta, ut vel hæc sola tertius sæpe curatas videamus. Quandoque tamen tenior venericali confusio & spasmorum in ipso cum acidis ponicis succis frequentia, un solenne in infantibus, senibus & passione hypochondriaca & cardialgia affectis, salicula, præteritum copiose datorum, usum interdic; ea quæ propter, mannam tamen ad unam vel duas uncias, cum, vel etiam sine rhabarbato, adjecta unæ vel dimidia terræ foliatæ drachma & aliquot olei de cedro gutta, potius offerre expedit.

## §. VII.

Ubi demum ipsum duodenum copioso, bilioso & vitioso humore oppletum, vel plane bilarii ductus lenis & pravus succis fœcili sunt, & re est, ut per superiora emeticorum opo evacuatio instituantur; hunc in finem tenioribus exhibenda radix ipecacuanhæ nodosa, robustioribus autem hæc, tartaro emetico ad granum unum vel duo admixto, ipse quoque tartarus emeticus solus, vel, qui melius adhuc, julepus noster emeticus, ex aqua corticum citri spirituosâ, julepo rosarum & tartaro emetico soluto confectus dandus. Quod si vero non tantum superiora, verum etiam inferiora intestina à recrementis liberare, in inguine maxime dedis, necessarium; utrumque commode obtineri possit infuso mannam, quod unciam unam vel unam cum dimidia maris, terræ foliatæ tartari drachmam & tartari emetici unum vel duo grana habet.

## §. VIII.

Correctis sic & evacuatis noxiis per varia ex-  
cercicula humoribus, ad quintæ indicationis nor-  
mam

*Biliofi &  
viscidis cum  
regenda.*

*Ex vomitu  
aut per  
infusum.*

*Superioribus*

*vel inferioribus*

*Dr. Hæc  
partes re-  
ferendum*

nam eo dirigenda medicatio, quo universum solidarium partium, maximeque ventriculi & intestinorum systema, ob diuturnos spasmos & paroxysmos à robore dejectum firmetur iterum. Versatur in hoc rite perficiendo præcipuum curatiois intermitentium momentum, ita prorsus, ut usurpatia quantumvis diu alterantibus, aperientibus, amaris & evacuantibus, paroxysmus tamen nibilo secius persililat, accommodata contra roborationibus debito modo usurpatis, remittat ac cesset. Scilicet reddito nervosis, vasculosis & musculosis partibus robore, non tam pronæ ac promptæ sunt ad concipiendas humorum stagnationes, spasmorum insultantium causas, sed liberior potius sanguinis omnisque generis succorum fit circuitus, pulsus auctor & respiratio cum secretionibus & excretionibus vegetior, ut non modo paroxysmi fistantur, sed & nova febrialia spasma minora dispellantur, quæ alias, languente vacuo die perspiratione pulsuque tardo, succrescit.

## §. IX.

Ex omnibus vero, quæ hac usque innoverunt specificis antifebribilibus, adstrictiva vi agentibus, corticibus nempe & radicibus adstringentibus, nec non ex marie vel alumine confectis, quoniam etiam paulo calidioribus, nullum quod magis accommodatum, temperatum, omnibus ætatibus, temperamentis & sexui idoneum ac vel mille auspiciis experimentis comprobatum, quin tota, ut aiunt, substantia medicamentum pluribusque indicationibus satisfaciens, quam cortex ille Peruvianus, Chinæ Chinæ nomine notus, quippe qui, si convenienti tempore, modo ac regulariter usurpatur, ut excretionibus naturales non sufflaminet, sed potius promoveat, propter terreum lenè adstringens elementum & balsamicum amaritum, omnibus aliis palmam præripit, & aliquot dosibus tantum, vel ad miraculum, febiles compescit paroxysmos. Longe tamen efficacior est in pulvere & substantia, quam in decocto, infuso, essentia aut extracto, ipsique sic ceteris partibus tempore vacuo exhibito, pulsus fit vividior, calor cum perspiratione auctor, alvus, præsertim in cholerici, fluidior, manifestè facilitat operationis indicio. Multi quidem in frequentiori usu esse electuarium, cujus ope innumeros febrientes persilavi, hac ratione continantur: Recipe rob. sambuci unciam dimidiam, corticis chinæ drachmas sex, pulveris florum chamomillæ vulgaris drachmas duas, extracti centaurei minoris, pulveris caryophyllorum ana drachmam semis, syrupi acetositarum cieri unciam unam semis. M. f. electuarium. D. Admiscere enim quandoque ad faciendum perspirationis successum soleo anemomii diaphoretici, theriacæ veteris, vel etiam salis ammoniaci drachmam dimidiam, & finito paroxysmo, singulis binis horis, ejusmodi electuarium ad drachmæ dimidiæ pondus exhibere. Iis autem, qui exterioris naturæ & stomachi, cortex in formam liquida redactus, propinquant, hunc in modum: Recipe corticis chinæ unciam unam, corticis chaccarillæ, cinnamonos auri, salis tartari singulorum drachmam unam, aquæ florum chamomillæ vulgaris libram unam, vini tannandem; digerantur leni calore, colat. adde syrupi corticum aurantiorum unciam semis. M. D. S. Potio antifebris, binis quibusvis horis ad unciam unam vel duas sumenda.

## §. X.

Ad præcipiendas, qui lentæ indicationis scopum, admodum frequentes intermitentium & maxime quidem tertianæ recidivas, certior vix datur ratio, quam quæ omnia, quæ ad generationem fe-

bis faciunt, evitantur, ac monita superius in præservatione inculcata curatè observantur. Et quam exhausto per febrem corpore, appetitus hac didicente impensior esse solet, ventriculus autem & rarsa adhuc imbecillior, sæpius certe evenit, ut novus cruditiæ primis in viis fiat proveniens, & febri vel lentæ, vel superatæ recidivæ ortum præbeat. Hinc consilium omnino ducimus, ut qui mox à febre convalescant, leviores cenam & facili digestibiles cibos assumant, ac præterea ad succiendum ventriculi robur, ad ducendas prima ex regione sordes, nec non desregendas, si quæ supersint, mortui reliquias, efficacibus, utantur præfidis. Nos quæ hanc in finem commendemus habemus potissimum moderatum, sed eo crebriorem usum pilularum nostrarum balsamicarum confortantium, deglutiendo alterius diebus mane, vel vespere, novem, vel undecim eandem. Totam quippe corpus inde robur nanciscitur, flatus summa cum euphoria discutitur, & alvus clementer movetur, aucta subinde sub pulsu vegetiori ipsa perspiratione. Deinde egregie etiam usus elixirium stomachum roborans, de quo ante prædium XXX. vel XL. guttæ sumende, tamque in rem elixir nostrum balsamicum, in notis ad Pœterium descriptum, elixir stomachale Michælis, in adjuncto clavi Schræderianæ thesauri pharmaceutico inveniendum, vel nostrum methodo præparata essentia stomachica, aut etiam essentia gentianæ rubræ, salis volatilis oleosæ rapæ, item elixir viscerale nostrum apprimè proficiunt.

## METHODUS MEDENDI SPECIALIS.

## §. I.

Quando saburra viscosorum humorum in stomacho ac duodeno efflicta postulat depletionem, quod ex prægressa ingluvie, præcordiorum anxietate, nausea, ructibus & oris amaritie conspiciendum, mox in principio, finito primo vel secundo paroxysmo, de vacuo offerendum emeticum, quale supra commendavimus. Vel, si finitur ventriculus & non modo per superius, sed & inferius os vitiosa semina exturbanda, talem etiam præscriptissimam formulam: Recipe salis Sedlicensis unciam dimidiam, tartari emetici grana duo, vel tria. M. f. pulvis, dissolvendus in libra dimidia aquæ puræ tepidæ & dualis à finito paroxysmo horis sumendus, facilitando postea evacuationem successivo largiori potu jusculi avenacæ tenuioris, pinguedine liberalius imbui. Recuperas autem post evacuationem quodammodo viribus, sine mora electuarii superius descripti antifebribilis aliquot doses sumendas fusi, quo lepillime factum est, ut in prima quasi herba jugulata febris cesserit, & subjuncto exquisito in regimine & victu moderamine, nunquam repertent.

## §. II.

Contra ea, si quæ fuerint, quæ excretionem anoxicam interdixerunt; multum tamen leniti & crudi succi sinus delinquant ac sufficientem evacuationem exegerunt, salibus deterfivis alvum aperientibus medicamentum sum aggressus, hunc conficiendo pulverem: Recipe salis Sedlicensis unciam dimidiam, salis ammoniaci, vel digestivi Sylvii, lapidum cancrorum ana drachmas duas, natri purificati drachmam unam. M. f. pulvis, de quo binis quibusvis horis drachma dimidia in uncia aquæ puræ, vel chamomillæ vulgaris aut peffanæ, ingerenda, superbibendo semper valculum infusi theæ. Quo postquam aliquoties dictum interje-  
tis egregie, blande tamen & per epicrasin, alvus totaque intestinorum canalus expurgatus, febri-

B 2 tamen

Ocyms per  
coram  
stima.Per vom  
stima.cum rlo  
stima.Per salt  
na.cum chlo  
stima.Recidivæ  
præserva  
do.

tamen nec depulsa, nec quoad vehementiam imminuta, vel corticem chinæ salibus aequali pondere admiscui, vel solum electuarium nostrum interponere iussi, & sic etiam brevi tempore tertianas expugnavi, epidemice etiam grassantes & annuales.

## §. III.

per stylum  
res & in  
alium.

Quod si vero ager affectu hypochondriacæ obnoxius, inflati stomachi, alvi obstructionis, exquisitoris sensus, impatiens & ad animi motus proclivis; nec emetica, nec purgantibus salibus, præsertim liberaliori manu, utendum est, sed commodissimum tum locum operam chylothes, ex temperatis carminativis & emollientibus conflari, item pilule nostræ balsamicæ, refractioni doli, ad novem vel undecim, tempore intermissionis deglutire, præminendo aliquot horis, vel postponendo pulveris digestivi, ex cancrorum lapidibus, terra foliata tartari, tartaro viriolato & nitro depurato, usum.

## §. IV.

Quis  
circum  
paroxysmum

In accessione febri ipsique paroxysmo, & maxime quadam rigore; nihil plane à medico tentandum. Abstinentium tum etiam à potione, præsertim frigida, licet sis ipso sub frigore præsto sit. Incretente vero sensim æstu eoque ad vigorem deducto, potum utique, & quidem sufficientem, præbere decet, non tamen magnis haustibus, sed crebrius interpolatis, studendo simul, ut palato non sit ingratum. Propinanda hanc, quæ supra commendavimus, decocta & infusa, & quæ maxime accommoda pilana, seu decoctum hordei, cum scorzonera, adjecto limonum, vel rubi idæi syrupo, nec non spiritu nitri dulci & oleo de cedro. Ad æstum quoque & sitim extinguendam ex usu est pulvis temperans, ex duabus lapidum cancrorum & una turti parte, repetito cum pilana exhibitus.

## §. V.

aut per  
stylum

Erumpens remittente æstu & solito paroxysmo mador, vel etiam sudor, tunc lecti & hypocausti temperie, quam intermis quoque adminiculis blandè proritandis, cumque in finem, præter jam memorata, egregii usus infusum theilforme ex radice scorzonera, herba scorodii & corticibus citri. Postquam vero febris penitus deservit, corpus ab omni tam interna, quam externa refrigeratione defendendum, & curandum potius, ut in iugi fervetur perspiratione, quod accommoda exercitatione & crebriori potum calidorum usu optime impetrari possit.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

Quis  
stylum  
res & in  
alium.

In perita medicamentorum adversus tertianam, simplex sit, sive duplex, aut continuus, administratione, ante omnia observandum à medico, initium paroxysmi, ejusque finis, iudicando illud ex refrigeratione partium extremarum, paniculatione, oscitatione, horrore & pulsu in celeriore & contractu mutato, & solutionem ex pulsu molliori, remissione æstus, mador, vel sudore. Etenim nunquam in accessione, vel mox ante ipsam, sanguinem mittere, vomitorium, purgans, corticem chinæ, aut aliud roborans & adstringens exhibere licet; deservire vero impetu, sudor, ubi expedit, commodè promovendus, & tempore demum à febre proles vacuo, diarrhetica, evacuationis, vel etiam prore nata specifica præbere optimum & accommodatissimum.

## §. II.

Quum tertiana in principio, præsertim in calidioribus, sæpe febrem continuam & ardentem mentianur, nonnisi temperantia, diluentia & modice leniter salina, digestiva, nitrofa conveniunt, omittendo tum emetica, vel acriora calida sudorifera, donec in tertianæ typum concesserit.

## §. III.

Si conuexam est, ut autumnus, vel in quocidianam transit, antifebris illa potio, quam primus Crollius & ex hoc Riverius commendat, ex aqua scilicet defillata, ut cardui benedicti, sale abynthii & spiritu virioli confecta, bis vel ter quotidie data, egregium affert levamen, eo certius, quando pilularum nostrarum balsamicarum usus interponitur. Monendum tamen, hanc servandam esse enchiridem, ut spiritus virioli non immediate cum sale abynthii commisceatur, sed miscela in aqua adometur. Ego quoque sal abynthii oleum tartari per deliquium surrogare soleo, videndo, ut in conuobio punctum saturationis exacte tangam. Et talis potio similem, immo superiorem aquis mineralibus, acidula dielsi, aperientem virtutem possidet.

## §. IV.

Eadem potio in tertiana nimis biliosa, vel in choleicis ex iracundia enata, admodum proficua; vitanda vicissim amara, sudorifera, alexipharmaca, acriora, aromatica, multo magis salia volatilia, & usurpanda potius temperatissima salina, nitrofa & præcipitantia.

## §. V.

Chinæ cortex optimum ante antifebris, ejusque virtutem etiam in grassantibus epidemice febribus præstabilem deprehendi aque securam; semper tamen securior in sensibilibus, calidioribus & vegetioris naturæ subjectis, nec non ubi urina sedimentum ponit ac per cutis poros excreto succedit, quam in seignioribus, melancholicis, phlegmaticis, vel mensium suppressione laborantibus, ac ubi excretionum defectus & urina cruda. Hinc recte ipso assumto, motus corporis, quantum fieri possit, imperandus, & potus non frigidus, sed calidus exhibendus.

## §. VI.

Quandoque ante correctionem & sufficientem matris morbiliferæ evacuationem, paroxysmus per specifica & corticem chinæ compescere oportet; ut postea longe meliori effectu mineræ febris & corrigendæ & eliminandæ congruis præfidiis aliquandiu insili possit.

## §. VII.

Quando æstus & pathemata gravius urgent, viresque exhaustæ, corticem chinæ, nitro nuptum, in forma electuarii, intermissionis tempore, cum bonis ægrotum rebus datum fuisse, multis confirmatum habeo exemplis; ita profutur, ut mox symptomatum mitigatio & virium incrementum successerint. Tenendum tamen, hoc factio, matris febrili & temperandæ, & expurgandæ, medicationem adhuc esse accommodandam.

## §. VIII.

Purgantia acriora, uti, ob spasmorum quod crient incrementum, nunquam in tertiana propinanda; ita eo minus, quando paroxysmi à cortice chinæ, vel aliis remediis cessant, eo quod facile febrem revocant. Sed quando alvus subsistit, chylothes, vel pilulis nostris balsamicis, interpositio saluum usus, officii admonenda.

## §. IX.

Emetica, si indicatio adeit, statim in principio, quo citius, eo melius, offerenda, nec gratis expen-

Quis  
stylum  
res & in  
alium

conuexam  
& in quocidianam  
transit

vel nimis  
biliosa  
agrediente

Chinæ  
quodam  
modo

interdum  
facile efficitur

alvus  
gr. 40.

Purgantia  
acriora.

Emetica  
autem  
dantur



Etandum, donec materia fuerit concocta, sed proxima via extirpanda, priusquam noxam laetius diffundat. Quod si enim febris corpus jam aliquandiu detinuit, et illa ille solentis nimis ventriculum ad inflammationem concipiendam disponit, et emetico postea facile procurandam. Interim quando paroxysmus, sepius, licet mitius, recurrit, & febris vel ex neglecto regimine diaretico, vel perperam instituta medicatione, ad aliquot menses extrahit, utilissime sepius dedi vomitorium. Id digneat servandum, minorem tunc, ac in principio, sufficere dosin, eademque magnam biliosorum humorum colluvien è duodeno extirpari, tam salubri effectu, ut licet febris non penitus cesset, ex facili tamen postea specificis antifebrilibus, & maxime quidem chinæ cortice, subjuncto delibato in viâ & victu moderamine, abigi possit ac persanari.

## §. X.

Sanguinis missio in tertiana summa cum cautione instituenda. Nimirum, quando febris primum accedens continuæ speciem refert, ingens æstus cum delirio urget, æstus regnat, æger atrox vigens, sanguine abundat, biliosus, ad iram pronus & diætæ vinolæ assuetus, utiliter unique vena pertunditur. Pramittenda tamen primarium febrium repurgatio & eligendum tempus a febre immune. Sortellandum etiam paucis ætate, vel post sectionem horis, insulsum thesaurum, imprimis ex floribus chamomillæ vulgaris, singularis; hanc adversus febres virtutis, partim quo sanguis tenuior redditus eo liberius circumferatur, partim quo morus ipsius, quibus tota februm natura continetur, quodammodo placeant. Contra hoc quando prima regio crudæque semina lardescit, corpus non sanguine abundat, nec reliqua præstio sunt phenomena, sanguinem mittere nocivum, eo quod excretionis salutares, maxime ea, quæ fit per cutis poros, inde suffragamur, ipsaque febris, experientia teste, obfirmatur magis & chronica fit.

## §. XI.

Ab opiatâ & anodynâ, quorum in numero etiam sunt pilule de cynoglossâ, in intermittenibus proflus abstinere consilium, quippe quæ insiduo effectu paroxysmum quidem mitigant, vel interitum suspendunt, sed vires simul depiciunt totumque febres decursum cum salutari crisi turbant, ut morbi causa majores acquirat vires & paroxysmus longe gravior postmodum accedat; melioris vero notæ sunt pilule Wildegansii, vel theriaca coelestis.

## §. XII.

Aluminosa & vitriolacea etiam febrium paroxysmos sustinent, sed si quis fortâ in plebeis in uti velit, opus est, ut post eorum usum sudor decolo, vel insulo thesauri calide summo eliciatur, vel corpus monu excutatur, quo alias nocens facultas earundem quodammodo averi possit. Post præpositum enim tam horum, quam aliorum emittentium adstringentium usum, plura sublequuta fuisse incommoda annotavi, maxime in his, qui excretionibus sanguineis affecti, ita ut hæc inde penitus fuerint suppressæ.

## §. XIII.

Cortex chæcarillæ accommodatissimum etiam in intermittenibus est remedium, ob principium quo instructus est balsamicum & sulphureum anodynum terreumque adstringens. Sed quia sanguinem exæstuat & calorem accendere solet, in biliosis & ad motum impetuosis prorsus subleis minus, & non nisi in resictâ dosi ex usu citâ in febribus vero, in phlegmaticis & mulieribus magis, & tunc commodissime cum cortice chinæ miscetur.

Frid. Hofmanni Oper. Tom. II.

## §. XIV.

Absorbentium spectans quidem in febribus effectus, nihil minus tam moderate, quam cum delectu, sunt usurpanda. Copiosius quippe ingesta, solventibus in ventriculo succis minus obediunt, sed integra relictâ, eundem concrant, quin in lentam plane pastam coeundo, anxietates & nauseam cient. Rudiora vero illa, ex marinis maxime depressa, ægrius non modo liquantur, sed & adstrictivam plane postea sortiuntur virtutem.

## §. XV.

Sæpius evenit, ut in paroxysmo præsertim accedente, a sanguine ad caput, potissimum in plethoricis, congesto, exquisita onatur cephalalgia, cum sensuum & phantasie turbatione, cui non promissæ topicis occurrendum. Vidi enim episthemata illa domestica, ex absinthio, ruta, cumino, bacis jungeri, sale communi & panemito, ob vaporem, quo caput replet, plus nocuisse, quam profuissè. Multo minus vero cephalicæ & nervinæ, ut balsimum nostrum viæ, quod alias in doloribus capitis egregii usus, porrigenda sunt.

## §. XVI.

In paroxysmo potus calidus, ut herbe theæ, fabarum coctæ, non confert, quia humores acres, biliosos, plus julto in sanguinem agit & æstus, nec non anxietates, insinificæ augeat; sed potius concedenda potio temperate calida. Recte enim Hippocrates lib. III. de morb. præcipit: *tertiana potus calidus non confert. sed frigida*. Extra paroxysmum autem calidæ ejusmodi potiones commode inveniuntur locum, præsertim quando excretio alvina libera est.

## §. XVII.

Quando febris per specificâ depulsa, non omittenda penitus sunt sanitatis præsidia, sed vitanda sedulo corporis refrigeratio, in appetitu moderata servandum & aliquandiu tam pilularum balsamicarum, quam cibarii stomachici usû insistentum, ut jam superius in sexta pluribus monuimus indicatione.

## §. XVIII.

Quod si vero contigerit, ut ob ingestum largius frigidum potum, vel data præposuere adstringentia, tumores succedat ordinaris, nequaquam in usum vocanda actiora purgantia, martialia, aut salia volatilia, sed omni medicamento salibus abstinentis, pilulis balsamicis & temperato lignorum decocto contenti. Ubi etiam anasarca corpus obsidet, emeticum cum extracto panchy magno Crolii jussu dosi oblatur, miram aquarum copiam evchendo, insignitè juvat.

## §. XIX.

Senes plethoricos & venæ sectioni assuetos, à refrigeratione in atrocem colicum dolorem, subsequente tertiana continua epidemice grassante, incidisse, crebris observavi, quibus sanguinis missio admodum fuit proficua, chinæ cortex autem, mature nimis datus, perniciosus, ita proflus, ut quotidiana hæticæ similis funella inde fuerit enata.

## §. XX.

Pueris octavum vel decimum ætatis annum præagentibus, febre tertiana correptis, exoperto cum successu dedi ponticulum emeticum, & post hanc chylitres ex aniseferibilibus, centauro minoris & cortice chinæ, applicare jussi, febres ex toto quiescente, nec unquam repente.

## §. XXI.

Femine ex mensium suppressione cachecticæ sebecientes, magna circumspicione tractandæ, re-jedlis penitus omnibus validioribus, evacuantibus,

B 3 æque

Vene felle  
quando  
tendunt.

et nocet.

gularis  
mors.

adstrin-  
gunt in-  
fusa.

Chæcarilla  
quasi  
tendunt.

adstrin-  
gunt in-  
fusa.

Tertia  
capitula  
hæm.

Potus calidus  
non  
confert.

Potus  
calidus  
non  
confert.

Quædam  
fæculæ.

Quædam  
fæculæ.

Pueri.

sebecientes.

aque ac roborantibus, emmenagogis tuncque, quæ quidem temperata, sed febre nonnulli discedente, locum inveniunt. Clystères vero ex leniter laxantibus, amaræ & carminativæ, nec non infusa blandæ alvum subducunt, quæ simul amara, coricem chinæ & limaturam maris habent, opem ferunt optimam.

## §. XXII.

Puerpera.

Puerperæ intermittebantur affectu febribus, gravissime inde luum, & si vera pathemata hysterica incurant, nisi lochiorum curate habeatur ratio, tanto magis, quando hæc cum febre per abstergentia marina, vel præcipitantia rudioris texturæ, conchas, corallia, cum, vel sine acido, nimis cito supprimantur. Tum potius insigni virtute splendet, pilulæ nostræ balsamicæ tonicæ, quæ morbis ex uteri vicio ægerime medentur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Pericula  
in illis  
periculis  
saluberrima  
signa.

Incidit vir quinquaginta annorum, cholericus & in iram admodum proclivis, æstivo tempore in tertianum, quæ per aliquot hebdomadam deraciatum persistit, ægerque variis interea animi pathematis, angore, cura, solitudine, quin ita affectus, in paroxysmis subinde conatus ad vomendum perentit. Vocatus in consilium medicus, non alia exhibuit medicamenta, quam salia, arcanum quippe duplicatum, sal ammoniacum, sal tartari, nitrum & id genus plura, & hæc quidem liberali admodum manu & repetitis dosibus. Sed tantum abfuit, ut his, quantumvis diu usurpatis, febris fracta fuerit vehementia, ut potius symptomata magis increverint, angustie præcordiorum cardiacæ intensiores, facies admodum contracta, pallida & livida, extremorum etiam die vacuo refrigeratio, cum perpetuo ad nullum siccam stimulo, vomendi conatu, quin singula, accesserint & simul ac quicquam, ciculentum fuerit, five ponantur, in ventriculum delatum, illico pejus habuerit æger. Nostræ hinc commissæ medicationi, omnia salina seposuit, à vino quoque, licet ejus potui antea assuetus, abstinent, & crebrius jacula hausit ex pullo gallinaceo, cremore hordei & vinello ovorum, nec non decoctum florum chamomillæ vulgaris. Exterius ante paroxysmum epigastrii regionis imposita effi vesica speciebus emollientibus repleta, & alio injectis clyster ex lacte & marna, adjecto stimuli loco nitro & sale. Mitigatis autem hinc symptomatibus, electuarius cum cortice chinæ, julepo rosarum, cheriaca & nitro, intercalari die aliquoties modica doxi dedimus, tam salubri effectu, ut febris penitus discederet nec unquam rediret.

## Epicrisis.

Notata urique dignum est, salium, præstantis alia in intermittebantur virtutis, usum, tam male hoc in ægro cessasse, & inflammationem quasi in ventriculo adductis effusione, ut hinc omnia illa, quæ affixerunt, insulsa pathemata pullularent. Ratio tamen peculiaris hujus effectus in proclivi est; scilicet cholericæ constitutionis erat corpus, æger ad iram pronus & sub ipsa febre animi afflictus agitabatur. Jam vero nihil tam promte & celeriter ventriculum cum rebus intestinis effuso afficit, dispositionem ad inflammationem ibi ingignit & bilem ærem ipsiusque effusioem causant, quem ita, in subiecto præsertim plethorico. Dein notum etiam est, salia, quæcumque fuerint generis, nervosis ventriculi & intestinorum tuni-

cas mirum in modum irritare magisque ad spasmos sollicitare. Atque adeo, his tam exquisitis lenientibus & spastica jam structura affectus paribus, non poterunt non malum augere & finisum plane effectum cedere hæc salina remedia, tanto magis copiose & iterato oblata. Contra ea optimum certe fuit consilium, afflictas hæc partes molere temperantibus, spasmos complacere, & febiles demum motus, diu jam corpori inhaerentes, sistere atque compellere.

## OBSERVATIO II.

Vir quidam generosus, ruri degens, vegetæ naturæ, robustus, sanguine fuciente plenus, sexaginta & sex annos habens, postquam nocturno aëri & incantius commiserat, & sudorem improvida refrigeratione repulerat, tertiana corripiebatur exquisita. Vocatur accedente tertio paroxysmo ego, ægrumque sub frigore deprehendebam omni fere sensu privatum, delirantem, tremantibus ob anxietatem summam manibus pedibusque, cum corporis irrequieta pectinatione, facie inflata & bruni coloris, ac pulsu contracto, duro ac celeri. Meniebam hinc gravem capitis morbum & ex adstantibus quærebam: annon vena fuerit scissa? sed regreabant: ob ingensam naturalem quandam aversionem, nunquam ægrorum ut sanguinem mitteret induci potuisse, neque ipsum, quantumvis plethoricum, unquam spontaneum sanguinem ex naribus, vel ani venis expertum esse fluxum. Ter interea tam graviter febriçana punitum maxime leniam, instar gelatinæ, sanarato bilis colore tinctam, alvo depicebat, & postquam frigus per tres horas duravit, succedebat æstus lex horarum, remittentibusque sensim pathematis, erumpente demum maior, ægro intercalari die bene se habente. Sitis autem sub frigore & horore erat intensior, quam sub calore, & urina in paroxysmo rufa sine sedimento scedebat, quod tamen intermissionis die deponbat. Quam igitur æger omnino penitus sanguinis missionem respueret, ut exanthemum & congestionem sanguinis ad caput omni modo præfunderem, operam dedi, eaque propter loco cretissimæ, & calidior erat de lupulari nimis, pisanam potius præbendam suavi, & in paroxysmo potione temperantem, ex aquæ florum acaciæ, sambuci, tilis, cardui benedicti ana uncis quatuor, pulveris nostri polychrestis bezoardici dicti drachmum duobus, temperantis nitrosi drachma, succi citri cochlearibus binis & sicchari ana dimidia, cujus etiam per intervalla crebrius aliquot pro dosi cepit cochlearia. Declinante impetu, ad madozem elicendum, infusum ex scordio & corticibus citri fortillavi, & extra paroxysmum pulverem ex lapidibus cancrorum, terra foliata tartari & nitro, cum sufficienti quantitate pisanæ, subinde assumpti. His aliquandiu usurpatis, symptomata post notum paroxysmum multum minuebant, & urina multum crasse dimittebat materiam. Quare quum ægrum duabus mane uncis & salis polychrestis drachma dimidio, in pure carnis dissolutis, purgasset prius, ad sistendum paroxysmum electuarius antifebrile, consuetæ methodo & idoneo regimine exhibui. Quo semel adhuc admodum leni insula subsequente, fibræ penitus demum corpus desierunt, usurpatis postea aliquoties alternis diebus pilulis nostris balsamicis, cum pulvere salino aperitivo. Ex ita perfecte cum sanitate sine recidiva in gratiam rediit æger, & in hac usque diem ad septuagesimum septimum ætatis suæ vivit.

Epicrisis.

## Epicrisis.

I. Sub gravioribus & infolitis capitis in hoc agro pathematibus, ab affectu graviter præter naturam nervorum systemæ oriundis, singulari omnino naturæ beneficio evenit, ut minimum bis, vel ter, lentos biliosos succos copiose excerneret, & credibile merito, alvo simul adstricta, ancipitem subsequens fuisse capitis morbum.

II. Si febricitans plethorici, nec tamen venæ sectionem amittent, optimum consilium, æstus temperantibus leniterque alvum subducenibus uti.

III. In corpore plethorico, denegata sanguinis missione & urina cruda prodeunt, febris nunquam cito per specifica jugulanda, sed tutius est decem minimum operiri paroxysmos, qui quasi remedium adversus succorum abundantiam, donec sponte miscantur symptomata, & urina cocta mingatur, ac tum demum, præmissis adhuc alvum moventibus, ad febrem transire depulandam.

## OBSERVATIO III.

Quadragenarius quidam, sanguineo-melancholicus, à longo jam tempore inordinata usum dietæ, æstus, quæ jam tum febres grassabantur, ira gravis incensa & corpus autè vespertinæ frigidiore liberius committens, incidit in arsum lassitudinem, cum somno inquieto, dolore dorsi, capitis & hypochondriorum tensione, succedente horrore de post hinc calore. Tertia die idem redit insulsus, & licet frigus non adeo esset intensum, æstus tamen & reliqua pathemata longe erant acerbiora, anxietas intensissima & mentis plane quardam alienatio. Secutur à medico vena, offertur emeticum, unum tantum vomitum ciens, & post quantum paroxysmum, febris cortice chinæ sistitur. Prodit hinc post aliquot dies in publicum æger, & in hortu fluvio adjacentē bene comatur quidem & potat, sed recidit in febrilem longe vehementiorem paroxysmum, spissum summæ præcordiorum angustia & æstus, nec non vomitione, ita ut non modo ponum, sed & ipsa medicamenta rejiceret. Porriguntur hinc elapsis quatuordecim diebus his pilule ex cortice chinæ & floribus salibus ammoniaci maritatis, cum infuseli effectu, ut tertiana simplex in duplicem degeneraret & vires ægri mirifice antecederet. Notabatur præterea circa ventericuli regionem tumor, ingesta omnia vomitu reddebantur, anxietas erat vix toleranda, pulsus etiam extra paroxysmi tempus celer, urina non semper eadem, interdum crassa cum sedimento, interdum flava tenuis, non nunquam plane rufescens, & clystere injecto, alvus copiosa macida, fetida & biliosa dimittebat.

## Epicrisis cum curatione.

Est hæc febris tertiana duplex, cum metu inflammationis ventericuli, quam immixtionem maxime anxietas, perpetuæ stomachi subversiones, alvi confusio, pulsus continuus celer & tumor ventericuli huad dubie præsignant. Nec levis notæ error in medicatione commissus fuit, quod non modo emeticum in febre tanto æstu & angore stipata oblatum, sed & ante sufficientem materiam febrilis correctionem & primarum viarum expurgationem, paroxysmus præmaturo primario cortice chinæ depulsi, & repetens postea, pilulis ex floribus salis ammoniaci, eminentius adstringente virtute præditis, oppugnata. Ut igitur indolita hinc noxa præficeretur ipsique febris peranaretur, hoc modo medicationem aggressus sum. In insulo theiformi ex scorpi manipulo, florum chamomillæ vulgaris, summæ millefolii ana pugillis quatuor, feminis fœniculi uncia dimidia,

exhibui liquorem anodynum cum elixiro stomachali. Deinde ad ponum ordinarium commendavi decoctum raturæ cornu cervi cum radice scorzonæ, cum quo quandoque propinavi hic pulvis: Recipe pulveris Marchion. drachma, lapidum cancrorum, citri depurati ana drachma dimidia, pulveris castorei grana X.M.F. Pulvis D.S. Pulver auf etliche mahl. pulvis ad aliquas vices. Postea sal alstyndia cum succo citri oblatum. Exterius vero cataplasma, quod habebat florum sambuci, chamomillæ vulgaris, Romanæ, salviæ, hormini, anethi singulorum pugillos sex, herbe mentis crispæ marupulum, nucis moschata, caryophyllorum, cardamomi, feminis fœniculi ana unciam semis, redactis omnibus cum fermento panis, spiritu vini & aceto rosaceo in formam cataplasmatæ, calidæ ventericuli regioni appositi. Quo facto per universum corpus sudor obortus & anxietas cum vomitu cessavit; ac minores quoque sensim factio febris impetu, tandem electuario ex cortice chinæ, floribus chamomillæ & syrupo acetosissimis citri, moribus feliciter pertransiit.

## OBSERVATIO IV.

Senex generosus, septuagesimus & quartum ætatis annum agens, fasus alias adhuc & vegenus, intermiserat consuetam veteris sanguinis missionem, & post impensam totius corporis refrigerationem, atroci primum abdominis dolore infestabatur, cum extremorum frigore & tremore, ad viginti fere horas persistente. Succedebat postea æstus, cum sensuum perturbazione, pulsû vehementi, delirio virumque prostratione. Tandem quidem superveniente leni madore, hæc inducias dabat, sed elapsis aliquot horis levis demum eveniebat parvum extremarum refrigerarium, jilem quam antea symptomatibus stipata, ut non amplius obscurum esset, laborare ægrum febre, tum temporis epidemica, tertiana continua. Accius hinc medicus, cui solennis, statim etiam in principio intermittenrium, electuarii, cuius basis cortex chinæ, usus, & idem hoc suum remedium suadet, sed absolum licet successive dimidia hujus libæ, plus increvere, quam remittere symptomata, subsiquita enormis virium prostratio, continens capitis dolor, sitis, summa præcordiorum anxietas somnique defectus, pulsû semper magno, pleno, citato interdum plane inermittente. Novo morbi die advocabar ego, ægrumque offendebam imbecillimum, graviter de sinistro electuarii, biduo jam omisiss, effectu consequentem, ideoque sanguinis missionem, quæ in principio, meo & aliorum medicorum jadicio, summo opere fuisset necessaria, institui non lui, & nil nisi analeptica & temperantia, cum leniter diaphoreticis suavi. Aderat quidem quotidie symptomatum ad sex vel septem horas remissio, sed totalis virium prostratio pessima omninabatur, ideoque capitalem fore morbum prædixi, ægro enim elapsis aliquot diebus, ipso sub paroxysmo, obeunte.

## Epicrisis.

Quamvis specifica antifebrilis, quorum potissimum cortex chinæ, nec non reliqua quæ mera adstrictione agunt, martialia scilicet, cortex fraxini & Hartmanno familiaria aluminosa, in moderandis, vel plane sedandis febrilibus moribus, non contentanda prudenter usurpata polleant efficacia; nihil minus tamen ego nunquam non gravissimâ inde noxavi noxam, in corporibus plethoricis, spissis obnoxii vehementioribus striculis, hypochondriacis & hysteris, & ubi nondum humorum acrimonia emendata, nec æstus mitigatus.

Tertiana  
simplex  
paroxysma  
intermittens  
non singulis  
diebus  
veniens.

Tertiana  
continua  
in sena fere  
nulla.

Tanto vtro magis cum cautionelanda sunt febribus, quanto major in his ut plurimum humorum spissitudo & crassities, alvi obditiatio, immo haud raro sanguinis redundantia.

## OBSERVATIO V.

*Tertianae  
cum & non  
finitae.*

Annus curebar MDCCXIX. quum Charolomburgi, (quod amoenum prope Berolinum fecerit regio dicantur oppidum, sed ob paladium & flagrorum circumiacentium copiam, febrium, quorundem ibi grassantium proventus, insectum,) plures ex aulicorum ministrorum numero propter ciborum ingluviem, vespertinum improvide admissum frigus & aërem noxiis effluviis repletum, tertianae implicarentur, confusis symptomatibus stipatae. Ex his plures, qui mea utebantur medicatione hac ratione ad sanitatem reduxi. Superato scilicet tertio paroxysmo, intermitente die potionem emetico-laxantem portexi, ex manna & tartaro emetico, in aqua veronicae vel florum acaciae solutis, qua ingens viscosorum humorum colluvies per inferiora & superiora exortabatur. Hoc facto, tribus, vel quatuor, ante subsequens paroxysmum accessione, horis, ad lenem provocandum sudorem, exhibui potionem ex tribus aquae cardui benedicti uncias & dimidia uncia aquae theriacalis, cum drachma salis tartari & triginta spiritus viatrioli guttis. Tum extra paroxysmum corticem chinæ & flores chamomillae vulgaris, vel in forma electuarii, vel potius, binis quibusvis horis, praebui, quibus per aliquot dies usurpatis, febris discessit, inuncta postmodum, ad attendendam novae materiae febrilis generationem, pauciori victus ratione, cum elixiri nostri stomachici usu.

*Epiersis.*

Multiplici edoctus sum experientia, specifica intermitentium praesidia, horumque principem, corticem Peruvianum, felici cum successu dari, vel statim in principio febris, per purgatis prius probe primis viis, vel declinante post aliquot paroxysmos jam sua sponte febris impetu, non tam facile nocere, ac si natura per plures paroxysmos imbecilliori reddita, demum usurpatur. Tum enim magis noxa rimenda & majori opus est prudentia, eo quod per crebriores paroxysmos, motu tam incessino, quam tonico auctiori, tota sanguinis & humorum massa in effermentis sordes fatiscit, quae nisi prius sufficiens expurgata fuerint, per adstrictivam specificorum facultatem intus retentae, peioris notae recidivas, vel novas alias morbos, ingignant.

## OBSERVATIO VI.

*Tertianae  
epidemicæ.*

Ex praecabida, diuturna, infusa plane aëris tempestantumque coëctione, elapso MDCCXXVII. anno, plures febrium species universam fere Germaniam infestantem & laborantes nimio, fere continuo aestu, virium prostratione, anxietate, capitis dolore & non nunquam plane delirio, mirifice affluerunt, ita quidem, ut frequentissime ex illis essent tertianae continuæ, symptomatibus non penitus intermitentibus, sed tantum remittentibus, donec lapsu temporis, succellere vel in quotidianas, vel tertianas legitimas, vel etiam quartanas, transirent. In harum persuatione ego quidem felici cum successu hac usum sum methodo. Sub febre, tribus singulis horis, duo circiter cochlearia praebui potionis ex aqua florum sambuci, tiliae, cerastorum nigrorum una uncias duabus, pulveris precipitantis & bezoardici ana drachma una, succi citri & julepi rosarum ana uncia dimi-

dia. Remissionis tempore oblatum laxans ex mannae uncia cum dimidia, vel duabus, nitri pari & salia polychrestis ana granis XV. in pure carnis vel aqua destillata soluta. Foeminis autem spumodiciis affectibus obnoxias, chylisteris injicere pulsi, leniter discutiennes & demulcentes. Perpurata his prima regione, ad electuarii usum accessi, hac tamen cum differentia, ut ad temperandum aërum, nitrum adiecerem. Fracta hic postero mox die febris atrocitas, ut per aliquot adhuc dies hujus remedium usui insisterent & alvum chylisteribus aperitum fervarent, febre autem penitus evanescente, electum in vita & victu tenerent moderamen, & subinde pilulas nostras balsamicas confortantes deglutiunt, injuncti. Er sic brevi tempore, divino auxilio, aegri convalescerunt, quum alii, iidem febribus laborantes, adhibitis variis remediis, venae sectione, emetico, salibus, amaris & essentis alexipharmacis, diu fuerint afflicti, viribus adeo consumtis, ut longo tempore omnique arte easdem vias posuerint recuperare.

*Epiersis.*

Febres, quae accedentes gravibus stipantur symptomatibus, immo aestu, siti, virium & appetitus dejectione, nisi sint acutae, sed notabiles reverent remissiones, melius in principio specifica febris praesidia ipsarumque chinæ corticem ferunt, ac illae ex tertianis & quartanis, quae lenius invadunt & lentius procedunt. In illis quippe expedit utique effrenes solidorum & fluidorum motus, roboretur & antispasmodicis moderari, vel plane sedare; in his vero languescere jam naturae mores & ad removendam in viscerum infarctum & glandularum obstructionem reposam morbi causam non sufficientes, idem perficere oppido nocivum. Ego certe multis confirmatum habeo exemplis, longe melius antifebrilia preparari in tertianis legimus, cholericis & juvenilibus corpora. graviorum symptomatum indulta infestantibus, quum ubi segnorum & phlegmaticae constitutionis notis implicentur. Nec infrequenter in illis fuit observatum, post Americani corticis usum, alvum obstrictum, sudorem largius mansisse, pulsus intermissionis tempore cum virium incremento increbuisse, quin ipsum salvalent latenter stillasse.

## OBSERVATIO VII.

Prehendebatur verno tempore tertiana epidemica, vir quidam quadragenarius, laxioris habitus, qui milicæ deditus, tam propter effusum per crebriora vulnera sanguinem, quam ab usum vinorum Italico, corpus infirmum atque causarium reddiderat. Advocabatur medicus, febreque ardentem & malignam, propter intensum ardorem & sitim, fore judicans, porrigebat alexipharmacum, ex spiritu cornu cervi & tinctura bezoardica. Sed increbuit inde ardor cum siti & accedebat delirium plane, ut aeger nudum etiam corpus in paroxysmo frigido subiceret aëri, gelidumque largiter ingurgiet aquam. Concedebat tamen febris in tertianae intermitentis typum, atqueque remittebat, debilitas autem insignis, magna ad sudorem proclivitas, & mira paroxysmorum anomalia succedebat. Discedebat tandem penitus febris tertiana, sed sudor cum talls affligebat perpetuus, & quotidie febribus quaedam, licet sine horrore & adeo notabili calore, praesto erat commotio, ac praeterea infra cordis scrobiculum, in media cartilagine ensiformi, tumor quidam praedurus eminebat. Confabulabatur cum hisce pathematibus per brios fere menses aeger, ac interea à multis medicis exquirebat consilia, quorum quisque de affectu & medicatione peculiarera promebat sententiam, uno febrem esse

*Extrema  
aëstus  
maxima  
cum abdo-  
minis.*

he-

hecticam, altero tertianam duplicem, tertio hydropem, quarto glandularum omenti tumorem, affirmant. Errabant autem omnes. Increbat enim subinde tumor & exquisitus pungitivus cum ardore dolor jurgabatur, & apostema potius intra musculos, non intra cavum abdominis, latitare coniciebam. Rejeda discutientibus externis emplastris, solum diachylon simplex fuit admodum & super hoc postum cataplasma emolliens. Sic elapso triduo, attolli & mollescere coepit tumor, purisque subita undulario locum incisionis monstravit, quo quinto die facta, pus fortissimum, ad tres minimum mensuras, paucio cruore intermixto, effluxit sensim. Inde minor illico factus calor, formis quies reddidit, & abcessu injectis balsamicis sensim ad consolidationem perducto, pristinam demum ager recepit sanitatem.

Epi<sup>er</sup>is<sup>is</sup>.

Sanguineum corpus apostemati concipiendo quam maxime est opportunum, ob succos in laxa fibram rextura ex facili subsistentes. In hoc quidem, potius ille frigidus, sub paroxysmo copiose ingessit, quam improvida abdominis refrigeratione sub fervido calore, sanguinem & succos in musculis abdominis consilire fecerunt. Horum ex stasi enatum apostema, factus tumor & materia remota computruit, quae sanguini praevalenti remissa, continuum leniam calorem cum languore induxit, & aperto apostemate, tam fortidum exspiravit odorem.

## OBSERVATIO VIII.

Torsionem  
non illam  
de regis  
domus.

Æstare qua varii generis febres circumstant, vir quadragenarius, post gravem iram, præcordiorum summas anxietates, cum vomendi conatu, incurtebat. Excipiebat hæc postea diebus interitus color, in oculi albo quam maxime conspicuus, nec non serena nuxta, noctu potissimum assidua formæque interurbana. Nihil minus, postulate sic, quo fangebant, muretur, inter fulciplebat, sub quo vero ob auram frigidissimam de delicta, que committente, diætica, febrem nancisciebatur tertianam. Seipabant hæc solitis pathematibus, major tamen in paroxysmo erat anxietas & inquietudo, urina saturate tincta, sine sedimento, æstus per viginti fere horas persistens, & nullis quoque, noctu præsertim & sub frigore, vehementior. Consultebatur medicus, qui propinabat emeticum, ex tribus tartari emetici grans, quo sexies punitos tantum bile leviter remixtus humor ejedus. Hoc facto dabatur electuarium ex radicibus alexipharmacis, pimpinella, gentiana, angelica, addita theriaca veteri & syrupo acetositis citri. Hinc vero mirum exasperabatur febris fereque reddebatur continua, formis cum appetentia intercedebat & continua sine frigore persistebat æstus, sub quo medicus ad suum extinguendam Martisburgensem suadebat cerevisiam. Advocabat ergo, & causam febris cum sympomatibus curatius expendens, rejectis, quæ à medico prescripta fuerant cunctis, conatarum plane medendi ingrediebatur viam. Pro potu quippe suadebam decoctum avenaceum, idque etiam cum feminibus quatuor frigidis & papaveris albi in emulsionis formam redigere, & adjecta convenienti niri portione, pro lubitu liberaliter ingerere præcipiebam. Pulverem dein absorbentem nitrosum, ex animonio diaphoretico, lapidibus cancorum, nitro & tartaro viriolato, bis vel ter quotidie, in de extra paroxysmum sumendum, commendabam. Per quam quotidie liquor noster ano-

dynus mineralis ad guttas XX. in superiori decocto offerebatur. Redditi per hæc micoribus cunctis, elapsis quinque diebus, electuarium anisebrile ex rob sambuci uncis duabus, corticis chinæ drachmis sex, syrupo acetositis citri uncis duabus, pulveris florum chamomillæ drachmis duabus, antimonii diaphoretici, extracti centaurii minoris, niri, singulorum drachma, quovis lithorio ad drachmas duas, per quadriiduum exhibebam. Quo ex toto cessavit febris, cum omni æstu ac siti, serena nullis conquievit, urina, secus ac per totum morbi decursum, ex bruno-rubicundo colore flavescens sedimentum dimisit, appetens cum viribus rediit & flavus in facie & corporis superficie color successively disparuit. Denuo vero, ne ex ciborum inglutie recidiva gigneretur, crebriorem pilularum balsamicarum & salis digestivæ arcano duplicato, sale digestivo & sale tartari usum, cum abstinentia, serio iunxi, & sic ager, vitata simul omni refrigeratione corporis, ætate commotione, quæ facile recidivam creare possunt, maxime sinegignit primarium viarum evacuationis, quæ demum septimo à febre die molenda, ad perfectam rediit sanitatem.

Epi<sup>er</sup>is<sup>is</sup>.

I. Hoc in agro omnia primum in motu spastico excessivo fuerunt confusa, acris etiam subtilis materia potius in visio fuit, quam crassioris & rudioris humoris moles, testantibus id origine febres ab ira, symptomatibus, ut nulli serena, & interit, ex spastico ductum biliorum. Perperam igitur a medico datum emeticum & electuarium calefaciens, quibus motus spastici cum ineffino ausili & pathemata exacerbata. Ex usu potius fuissent motus complicantes & acrimoniam diluentia ac temperantia, cum iis, quæ per cutis pores subtiles fordes eliminant. Quod demum cum succellu decocto diluere & humefacere, pulveribus absorbentibus nitrois & temperantibus diaphoretico electuario, à nobis confectum.

II. Magna omnino est contrarietas inter subaneam ex spastico interitum, nullam serenam convulsivam, & inter motum febrem intermitentem, qui nostra sententia in spastica quadam universalis vasorum & nervosarum partium systematis stridula consistit. Hinc etiam factum, ut iissem remedia, terna hæc mala & symptomata omnia simul & simul funditus fuerint sublata.

## OBSERVATIO IX.

Miles quidam rebus, postquam in coena ad fatietatem usque ingressisset & noctu aere nebuloso excubias egisset, præcedente horrore, nausea & conatu ad vomitum corripitur, subsequente æstu & anxietate. Rediunt hæc pathemata tertio die acerbiora, ideoque ad chirurgum properat, qui de vacuo primum dat emeticum, septem ante paroxysmum horis, quo stentus punitum cum bile evomit. Febrili thetibus ante paroxysmum horis, idem morbi arsef piperis albi grana XV. stercoris muris grana X. & lapidum cancorum drachmam dimidiam in aliquot cochlearibus spiritus vini portigit, & paret, ut desuper biberetur cerevisia probe calefacta. Miles lecto inclusus sudat inde forter, paroxysmus fugatur, & repente aliquoties hoc remedio, cura feliciter absolvitur. Accidit vero haud ita multo post, ut juvenis cholericus, in iram prout & liberaliter vini potui indulgens, tertianæ amphicretetur. In consilium vocatur idem chirurgus, ut idem remedium exhiberet, sed tam simili effectu, ut continua inde fere

Torsionem  
non illam  
de regis  
domus.



fiens febris, refus augeretur, arger deliraret & de  
excoquis ardis, quasi carbonis ignis, fensu, in  
serculo cordis, conqueretur. Parata igitur  
emulso ex aqua florum sambuci, nilis, papaveris  
rheodae, feminibus quatuor frigida & papave-  
ris alti, quae tam sola, quam cum pulverbis ab-  
sorbenibus & diaphoretis, nitrofa, sumas, ac  
demum adjunctis usus elevari jam descepi,  
quem exceptis liberalis alvi fluxus, tam salubri  
evenit, ut febris discederet, symptomata quiesceret  
& arger lenitate reciperet.

**Epicurus.**

Luculentum hoc exemplum est, non omnia omnibus prodesse. Nam li teriana in corpus robustum, minus agile ac fenibile incidit, idque in faburram in venericulo & transfigurationem impeditur; emetica quidem, & potius calidiora ante paroxysmum, eximie sunt utilitatis. Sed ubi corpus activum, & moras magis, quam qualitas & quantitas humorum peccat, contraria plane medendi methodo & ledantia adhibenda medicamenta. Ex in ejusmodi quidem cholerice indolis ad iram pronis subiectis, singulari plane est ex China paratorum effectus, eo quod summa cum euphoria crebras & biliosas alvi dejectiones prorsus solent.

### OBSERVATIO X.

Exercises  
on word  
and influ-  
ence.

*Sexagenarius robustus & plenus, sanguineophaegmaticus, calculi renalis doloribus ab aliquo antius subinde obnoxius, flatibus praeterea & ruellibus diversis, nuncificabatur anno abhinc tertiam rursus epidemiam. Post tertium paroxysmum, molestarum periculis, à medico vi febrein abigeret, poscit. Paret hic, & electuario, ex roburaperi, cortice chinæ & syrupo acetosissis citri, post sex dies, febrein ex vomitu, vi videbatur, profligare. Sed sequitur postea inflatio ventriculi cum ruellibus & borborygmis ventris, praesertim post praeium & alimenta gravis maeroris. His iactura ager meo ex consilio usus est mane pilulis balsamicis & vespere pulvere salino aperitivo, ex arcano duplicato, sale Sedilicis & cancerum lapideibus, per sex dies, & postea ante prandium effensia carminativa Wedem, cum aquali parte spiritus nitri dulcia remixta, felici cum successu. Quum vero elapsis vix quatuordecim diebus medicamentis rejiceret, eandem à flatibus & ruellibus expersit illi incommoda, & eaque propter ad priora medicamina confusa succedere ex voto effecta.*

*Epicrisis.*

Quando tertia corpūs impurū, succis reple-  
tū & chronicis passionibus pati affectū pro-  
prehendit, in medicinā cedū, morū inefficē & pro-  
gressivū auctiori obstruktionē referendū, viciis  
humores attenuandū & sordes subtilēs diffundē.  
Quando vero cū nimis specificis compellitur,  
noxia materia remanet & deorior redditā, in  
dispositio pati corpore, flautulenti creat malum  
exacerbat. Et licet opposita his pathematibus  
praefidia leniter educendū vinolūm materiam ac-  
tionem ventriculī & intestinorū roborandū,  
eegre proficiunt; experiet tamen scribo: non  
facile ejusmodi pathemata cessare, nisi aquae mi-  
nerales, praesertim Carolinae thermae, in auxilium  
vocentur, ac vere, vel zelate debito cū re-  
gimine usuperent.

### OBSERVATIO XL

Division  
in four parts

Superiori vere, quo tertianæ erant admodum  
frequentes, vocabar ad septuagenarium vegetum

ad huc & strictioris corporis habitus, qui eodem die: umbra morbo, & adhuc illis pilis pulveribus digestis fuitis, elixiris amaris, pilulis emac pochyrellis, decimum quartum jam paroxysmum erat pallus. Percontatus de omnibus, vires quidem prostratas, stomachum mire languentem & falsidientem & urinam litem fedimentum esse, comperto, habuit tamen corpora expensatis & pulsum in paroxysmo plenum adhuc & sortem offendens, electuarium offerre non dubitavi. Summam illud bihorio quovis ad drachmas duas, bibendo postea aliquot cochlearia vini, auspicum cum & felle, ita, ut subsecutus illico paroxysmus mitior longe esset, nec nausea, nec capitis dolore, neque anxietate, ut antea, supparetur, secundum vero penitus emanaret, urina crassa mingeretur, vires redirent & aeger optime convalesceret. Ne autem recidiva accideret, ut eodem electuario, parcius tamen, adhuc uretetur, clapsa septem diebus, bis pilulis balsamicis cum sale aperitivo diglueret, rugliven ciborum & seria negotia vitaret, tepidissime calidum potum assumeret & corpus ab omni restituratione sollicito defenderet. serpio traxerco.

*Epilepsia*.

Chius cortex non tam nocens est, ut vulgo credatur, sed ipis enim sribus cum fracta datur. Neque etiam sine exceptione illa practica est regula: quod nunquam fit offendens, atnequam iurta componat cocta. Ego enim multiplex comperit habeo experientia, nunquam ipsum nocuisse, si primae viæ prius probe expurgatae, si corpus non impurus succis scatur, viscera sanguine integra, et nullus inflammationis interitus meus. Multo magis innocens huius corticis & filularis effectus, in agra activè indolis, fibrosi & amplioribus vasis inflatibus. Longe praesidio etiam expertus sum ipsius efficaciam in corpore quodammodo jam per febrem debilitato fibrarumque tono remissiori, ac si vires adhuc vegetae & motuum viguer, nisi forsan expectationem interdicere circumfluat.

## OBSERVATIO XII.

Rari sunt in thermis Carolinis diu febricitantes. Simul ac enim febris imposit, intercalari diu largiter ingerunt aquas thermales, quae primas vias effluant, depleant, sudorem etiam & urinam liberaliter effluent. Si postquam paroxysmum febris non discedit, corticem Peruvianum diu vacuo adhibent, vel in electuaria forma, vel decocto, hunc in modum: recipe corticis cinnae unciam, radicis gentianae rubrae unciam semis, herbae cardui benedicti manipulum, centaurei minoris transverum, vini Gallici menfuram; coque leni calore, cola & adde fyrupi menthae unciam, M. de quo tribus quilibvis horis extra paroxysmum duas uncias bibunt, forbillando mane in lecto infusum theiforme & sudorem effluendo. Sic fecerunt ut plurimum ex toto febre percurant. Mihi autem hoc dedit, ut eadem methodo subinde userer, & furrogata Carolinis Sedlicensis aqua, purgationem ventris molirer, & posteam decoctum illud praeberem, auspicio pariter successu in tertia & quarta, praeteritum attiva ac venali.

*Epieris*.

Compendiosa & facilis est hæc intermitentes curandi methodus, solummodo non modo in Carlinis, sed & in aliis locis, ubi acidulæ purgantes salinis. Nec male medentes eidem viæ infundunt & primas vias crudis & biliosis sordibus obfusus salibus deplent. Sulfa enim reliqua ex regno vegetabili purgantia securitate & promissa efficacia longe

*Trichostema*  
*viridifolium*  
in Carolina  
N.C.

longe superant. Tanto vero magis proficua sunt, quando in sufficienti quantitate humidi soluta assumuntur. Hinc si copia non est aquae ejusmodi medicatae, ego ad imitationem ipsius aquam paravi laxantem, adspiciens uni aquae mensuræ olei tartari per de liquorem unciam dimidiam & in lagenâ angustâ orificiî instillans eo ulque spiritum vitrioli, donec nulla amplius eveniat ebullitio. Vel dissolvo in mensurâ aquae unciam semis salis polychrestî, ex sulphure & nitro calcinati confecti. Usurpato aliquoties liquore hoc salino, descendendo tandem perquam secure ad specifica roborantia, quæ inter primas tenent, cortex chinæ, calcarilla, tamaricî & omnia amara & ex mare rite parata.

## OBSERVATIO XIII.

Totum  
in puer  
per febrem  
tertiam  
fingit.

Puer facie florens, indole vividus, complexionē sanguineus, à biennio aliquoties hæmorrhoidarius, cum abdomine tumido, ceterum valens, post æquinoctium autumnale, tertiam, quo ex diænetico errore nescio, incurrit, eademque ob paroxysmū vehementem, stomachum penitus languentem somnūque turbatum, graviter decubuit, urina simul clara & sine sedimento comparere. Excepti hanc medicis aperientibus, crudos succos corrigentibus tumulifugis febrifugis. Sed quum decem paroxysmos passus esset æger, parentes percarum natum viæ discrimen subire metuentes, inconsulto medico ab empirico quodam potius quam medico opem quaesiverunt, qui electuarium, cujus basis tormentillæ radix, promptè portoriz, ac ut tribus singulis horis, intercalari die, dosis castaneæ magnitudine deglutiretur, præcepit. Minor inde facta febris, sed continuato aliquamdiu adhuc pharmaco, paroxysmi tempore, tremor ac frigus totum concussit corpus, cum collisione dentium & laborum, sequens mox convulsio epileptica universalis, per viginti horas, frustra data omnibus antiepilepticis, persistens, ægro sub ipsâ extincto.

## Epiptisi.

Ego quidem perulensis confirmatum habeo exempli, hæmorrhoides in infantibus ac pueris jam prodentes, accedentibus pubertatis, vel juvenutis annis, raro alium quam sinistram ac ut plurimum sanctum ferri eventum. Ipsam hoc enim ataxiam motus circulatorii in visceribus abdominis prodit, ex qua facile labem & vitium contrahere possunt. Neque ac propter dubium est quin hoc in puero, infirmi ventris viscera, hepar, lien, vel pancreas, fuerint sarta & obstructa. Motus autem febrilis præsidio potius fuissent, imprimis quum intermittentes per annum sæpe infantes detineant, modo medicatio rite insinuantur, nec tamen adeo sint detrimenti, ut potius corpus firmet & longævum efficiant. Perperam igitur adstringentibus suturet hi motus sedati & causa febris alio visceribus impacta, spasmi quoque tam ex hereditate à matre hysterica, quam ex ipsâ febre jam præsentis, & ex alvi structura, ac limpida urina cognoscendi satis, ita aduclit, ut in convulsivos plane degeneravit funestus. Memoratu etiam dignum videtur, quod hic puer, multos annos in solita vocatitate laboravit.

Hæc prædicto-clinica de tertiana observationes hic adduxisse sufficiat, plures passim reliquis meis scriptis inserui, & quidem uberius enarratas ac evolutas, *Medicina consultatoria*, ex qua hæc in rem confecti poterunt ea, quæ Tom. II. Sect. IV. cal. cxxxvii. ulque ad cxxx. attuli.

## CAPUT II.

## De Febre Quartana.

## §. I.

Tertianam, & gravitatem, & contumaciam, ex intermittebant longe adhuc superat ea, quæ quarto quoque die, intercalariis integris binis, coercipit, eamque ob causam vocatur quartana.

## §. II.

Scilicet, post meridiem ut plurimum, hora quarta, aut quinta, quandoque etiam citius, quandoque serius, cum notabili corporis languore, pandiculatione, capitis, dorfi, lumborum ac tibiarum consensivo dolore, accedit. Pedes hinc cum manibus refrigerant, corpus universum pallescit, facies & ungues livescunt, supervenit horror de rigor, huic febri familiaris, lingua & labia tremunt, spiritus difficulter trahitur, præcordia anguntur, corpus inquietudine jectum & pulsus arteriarum contractus ac durus, quandoque etiam inæqualis plane percipitur. Durant hæc omnia per duas plerumque, aut tres horas, & interea alvus in plurimis stringitur, in nonnullis ad descendendum tendendum stimulus, in quibusdam, postillimum febribus, consensus ad vomendum, vomitus & alvi feces. Multis etiam, imprimis etate gravioribus, caput mirum turbatur & mens sibi non consistat, aliena multa loquantur. Succedit lenio postea gravior calor, non adeo urens, sed ariditate quammaxime molestus, evanescit rigor, arteriarum ictus ad æqualitatem redeunt, ceterosque ac majores micant, capitis tamen obtusa dolor perlat, cum vertiginosa affectione, & cuius demum pauca sitim humiditatis perfunditur, donec elapsa quatuor vel sex horis, & ætus, & pathemata hæc dissoluta. Cessante sic febris impetu, duobus qui vacui sequuntur diebus, æger quidem constanter fere lectum relinquit, relinquit tamen sensus quidam dolor in artubus ac pedibus, ipsa ossa quasi tundens atque profundo pondere obereant, osteocopus graeco nomine dictus, caput quoque in quamvis animis grave est & animum lassidum tenet, urina, quæ in paroxysmo tenuis reddita de aquosa, nunc crassa & cum sedimento fædente.

## §. III.

Hæc quæ sub paroxysmi impetu subinde obveniunt pathemata, uberius utique testantur, gravissime nervosarum partium systema in universo corpore pati & spasticis constrictionibus agitari. Eamque ob causam immediata & proxima hujus febris causa constituenda omnino in universali & vehementi spastica nervosarum partium structura, quæ ex spinali medulla postillimum procedens, non modo tunicas valorum, sed & totum nervorum ac fibrarum systema, præter naturam afficitur, motus solidorum & fluidorum inde graviter turbentur.

## §. IV.

Materialem vero causam, quæ nervosas partes in tam exorbitantes motus abripit, veteres quidem humorem melancholicum extra vasa putrescentem esse voluerunt; sed sicuti in omni febre, sic etiam in quartana, subest materia active indolis & caustica acrimonia imbuta, internas sensu exquisito polientes partes ad spasticas crispaturas sollicitans. Quia tamen ex pancreatæ ei nuptæ est materia, quæ ad acido-viscidam indolem accedit,

diuturniores dat inducias, nec tam cito colligitur, nec ad membranas spinalia medullæ ex prima regione tam cito appellitur. Quando vero sufficienti quantitate collecta in primarum viarum laticulo, massam sanguinis succellere subit, & cito interposito tempore, ad spinæ dorsii membranas delata, febriles colicem fuscitat moras, quos præcedenti capite de tertiana enumeravimus.

## §. V.

Jam si porro hujus matris febrilis natales rimamur, hæc utique primario accendendæ ex tardo admodum sanguinis, per viscera abdominis depuratoria & secretoria, hepæ præsertim, lienem & pancreas, progressu, horumque tandem succedente infarctu & obstructione. Hoc enim facto, humores fermentales, gastrici, lymphatici, salivales, à temperata, subtili, spiritiosa indole deficiunt, ac fixam & acidam induunt, ad intimam ciborum dissolutionem & chyli extractionem minus sint idonei, sed crudum acidum & viscidum ingens flux provenit. Quibus ipsa mora peiorem indolem contrahentibus, & ab accidentibus aliis externis causa acrimoniam induentibus, ipsa demum excluditur febris.

## §. VI.

Videlicet languidiorem sanguinis per abdominis vasa cursum in causa esse, ex eo patet, quod huic febrī quam maxime opposita sint corpora constituta & provectioris ætatis, melancholici temperamenti, & quæ, vitiâ fœdientia nimia, intermissa sanguinis missione, victu duro insalubri, nimioque acidorum & spirituosorum usu, vel etiam solentium craticularum sanguinis evacuationum suppressione, nec non animi affectuum intemperantia, succorum incurrunt & abundantiam, & spissitudinem ac imputantem. Causam vero simul etiam fuisse matris indolem nemo negabit, qui novit, quantam post exclusas sub æstate fervente acres sordes plerumque autumno prodire, per scabiem quandoque & purpuram solvi, ipsam repulsa impetere, variolis eruptivis discedere, ex tertiana gigni, in tertianam quoque transire, & eodem modo ac tertianam in locis paludosis, aere acrimie recrementorum copia repleto, frequentem admodum esse ac epidemiam.

## §. VII.

Sic quidem generata febris quartana varium subinde exhibet genium. Quandoque scilicet simplex est, quandoque duplex. Simplex, ea, ut jam delineavimus, incedit facie. Duplex vero tum dicitur, quando intra quadriduum bini succedentes accedunt paroxysmi, ita quidem, ut uterque peculiarem suam ferret typum, & singulare accessio- nis tempus, alternatim semper præcedenti insul- tu respondens, tertio duntaxat die à febre penitus vacuo. Id quod sæpius evenit, quando simplex quartana perversa medicatione excipitur, aut in vitz, vel victus regimine, committitur error.

## §. VIII.

Legitima dein observatur esse, vel notha. Illa exactus, quam ullum aliud febrium genus recur- sus terminum servat, tempore scilicet pomeridia- no. In hac contra certum non est terminus tempus, plerumque tamen ante meridiem, æstus quoque impetior, ipsoque frigore gravior urget.

## §. IX.

Non nunquam porro quarto quidem quovis die, prævia ut plurimum particulationibus & horripila- tione, repetit, statum tamen terminum non adeo exquisitè servat, nec deservescere impetu penitus intermissis, sed diebus in simplici intercalariis, mi- nus tantum, quartæ febrilis, assigni; calor naturali

intensior adhuc adest, pulsus magis æstus, appe- titus languet, vires prostratae sunt, os siccum, caput semulens, somnus inquietus, & urina rubican- da, crassior, cum sedimento rubeo mingitur, eam- que ob causam à medicis quartana appellatur con- tinua.

## §. X.

Ut plurimum popularis habet circuitus & epi- demia est, tum maxime, quando æstus præcælit præter consuetudinem calida & sicca, vaque prop- ter acris & multa biliosa recementa in corpore genita. Id quod anno c1o lxxvi. *Semertus de fe- br. lib. II. cap. 20.* nec non anno c1o lxxvii. *Bartholinus cent. I. hist. anat. 95.* cognovisse, me- morant, & nosmetipsi de annis c1o lxxlxxxiv. c1o lxxcix. xxvi. & xxviii. multiplici experi- entia edocti testamur. Ex quibus ob æstum nimium ponis frigidus sæpe accessus ingeritur, & noctu si- gnis accedit, perspiratio sordium acrimie impen- ditur, & humores cum sanguine spissi evadunt.

## §. XI.

Noonnullas regiones & tractus endemia lues in- festat: nimirum in Westphalia, Pomerania locif- que, quæ ad boream vergunt, & incolæ aliut, victu duriori, crassiori & crudiori utentes, nullus fere elabitur ætatis, quo non multi quartana prehendantur ac diu admodum eadem detineantur. Idem evenit in locis paludosis, flagnorum & lacuum pravis exhalationibus infectis, in quibus vere, tertianæ, autumno quartanæ, largo proveni- tu pullulare & crebro recurrere solent.

## §. XII.

Varium etiam quantæ exhibere solent ge- nium, pro diversitate corporum, quæ corrumpit. Nimirum si incidunt in corpus, quod, ob vitam si- dentariam victumque crassum & durum, copio- sum & crassum sanguinem in venis alit, vel quod hypochondria male constituta habet, aut diuturni animi morosi indolentia graves & consu- maces esse fuscant, nec periculo vacant, easque propter in agrotante æquilibrium victus ac vivendi moderamen, in moderate autem magnum in edu- bendis remediis poscunt iudicium. Quia cacochy- mica dispositio de purpure sorsim sanguis simul subest, hæbitantibus longe acerbioribus incedunt, major virium est prostratio, vigilia, mentis aliena- tio, præcordiorum anxietas ac purpura demum erumpit, quæ, levi ex causa retrocedente, febriles passionis increscit, graviusque affligunt.

## §. XIII.

In subiecto, viribus per senium, valetudinem, pravam vitæ rationem, aut animi pathemata ex- hausto, facile in continuum transit, quæ ex langu- re virium post paroxysmum, pulsus frequenti, leno calore & appetentia prostrata, cognoscitur, ægrum- que in haud leve discrimen adducit. Quando post juvenili- tatem ardens fervorem, corpus juvenile & agile invadit, proximus longius perducit, æstus urens magis in liberalem solvinur sudorem, his quoque & stomachi languor impendit urgent. In- fantes & pueri, quia ægre medicamenta sumunt, nec diænetici præceptis obtemperant, noctu, remo- vendo stragula, corpus refrigerant, & præterea ha- bitum corporis laxum, ad sufflaminandum perspi- rationis succellum, nec non venericalem, ad colligendam crudatam labantur apem, obdormi- ent, diutius hac cum febre constanter, crebrioris in recidivas incidunt, aut aliis postea morbis patant.

## §. XIV.

Interim quartana hæc febris placida admo- dum est atque secunda, nec facile jugulare solet. Sin secus evenit, corpus aut senile fuit, & viribus jam exhaustum, aut tenerum nimis, epileptica insul-

*Adm-  
dum.*

*Insolent  
humoris  
per viscera  
progressu.*

*Et ante  
matris.*

*Quartana  
simplex est  
vel duplex.*

*Legitima  
vel notha.*

*Quartana.*

*Epidemia.*

*Endemia.*

*Varia in  
pomerania  
et hyp-  
ochondria  
etc.*

*cacochy-  
mica*

*Infantis  
juvenilis.*

*post juvenili-*

*infantis  
etc.*

*varia no-  
tha*

*insul-*



insultibus obnoxium, aut ipsa febris, intercurrentibus animi pathematibus, tam fuscitate quam exacerbata sunt, aut etiam, vel medentis, vel agrotantis accessit delictum, quo in quotidianam, aut longum alium furem morbum fuit transmutata.

## §. XV.

Gravitate tamen & connata securitatem decursum compensat. Diu enim trahi, ac sepius, ceu verum medicorum scandalum, omnia eludere solet remedia. Evenit hoc maxime in ea, quæ assumpto oboritur, per hyemem persistens: raro admodum prius discedit, quam solstitii vernalis tempore, quo poris adaperitis fuscitudo aëris serenitatem tenuioribus factis, sponte sere evanescit. Rebella enim maxime est, quando in visceribus, præsertim hepate, liene & pancreate, vitium aliud radices egit, vel tota humorum massa spurca & impura, vel etiam systema nervorum admodum debile ac ad anomalos ejusmodi motus, & concipiendos, & fovendos, disposuit & tanto magis, quando æger voracitate materiam febris colligit semper & auget.

## §. XVI.

Contra si vernali, vel æstivo tempore incidit quartana, facili & expedita ipsius curatio est, quia æris temperies & tenuitas multum medicationi vellicatur. Quæ etiam ex inordinata diæta & crudioribus in prima regione collectis, integris autem visceribus, aut quæ ex valde prohibita transpiratione succrebit, ex facili, vel unico sipe vomitorio, vel diaphoretico, ante accessum dano, discutitur. Et illa pariter, quæ juvenile & viribus polleus corpus detinet, præsertim si bilis plus, quam humor tenax, acidus peccat, ut possimum fixa in epidemicis æstate grassantibus, nisi ægri vel medentis culpa ingravescat, ex facili medicatione admittit.

## §. XVII.

Neque etiam quartana anomala, quæ typum non sivat, incerto tempore redit, aut ex simpliciter in duplicem concedit, adeo est perniciosa, ut eadem vulgo cretente. Ipsum hoc enim indicio est, succos viscosos non tam lentos & visceribus alte impressos, sed ad emotionem adhuc promotos esse, naturam quoque vegetam in amolenda, quæ morbum facit, materia. Ne dicam, paroxysmos rite decurrentes, multum facere ad dissolvendos viscidos & dissolvendos subsistentes humores, adeoque, quo crebrius recurrit, eo citius causa febris eliditur, & natura ministrante, curatio paucis contritus perficitur.

## §. XVIII.

Licet quartana solemnitè nullam criticam ferat excretionem, sit tamen quandoque, ut erumpentibus pulsibus, maculis, ulcusculis & scabie per universum corpus diffusa, nec non prodeunt hemorrhoidum fluxus, scilicet solvantur. Vidi quoque in infansibus tam cum suspicato successu defuisse in variolas: & de gravida compertum habeo, quod quartanam non prius evalecint, quam superato partu, insensè vero eadem affecto.

## XIX.

Quin præsidio quandoque est hæc febris & adversus alios, præsertim chronicos morbos, remedium. Ausus enim ille sub impetu solidiorum & fluidorum morus lentos succos circumagendo attenuat, lumbis suis elidit & ad veteres obstructions, quæ in minimis vasculis, glandulis & nervulis parvis altius considunt, expediendas & excutendas multum coarctat. Hinc præsi jam

medicinis principes, Hippocrates, Aesclepiades, Galenus & Celsus, se quartana remedio uni, affirmarunt. Et certe ad expurganda hypochondriaca pathematata speciosa ipsius est virtus, quam etiam in epilepsia & convulsivis motibus mire deprædicat Hippocrates lib. VI. epid. Ab asthma quoque convulsivo, item calculo, podagra, si scilicet decurrat & prudenter à medico dirigatur, quartanam liberaliter historiam loquuntur. Dumque corpus ab inhiærentibus viscerum vitis liberat, post discessum suum illud miserie finiat, ut non tam facile morbis pareat, aut pristinis attonetur denovo, un experimenta suffragantur ex Platone jam habet Gellius noli. Art. lib. XVII. cap. XII. Et nos plures novimus, qui post quartanam longevitatem nacti fuerunt. Quo magis admiranda hinc DEI providentia est, quæ ipsa etiam morbis plane incomparabiles & medicinalem virtutem tribuit.

## §. XX.

Sed ubi longius quam par est extrahitur morbus, succi concipiunt dydramiam, & si humores tenues ac biliosi sunt, purpura excluditur, vel paribus spumosis, rosicidis, nuntius diffusus, lenitibus reliquis, corrumpuntur & longos morbos involunt. Si etiam perversa medicatione excipitur, in graves & capitales degenerat passiones, cujus generis sunt maxime hydrops, anasarca & ascites, cachexia scorbutica, tumores cedematosi, febris lenta & hectica cognita, asthma siccatum, icterus, tussis ferina, in senibus affectus comatosi & hemiplexia, in junioribus affectio hypochondriaca & in infantibus sevi convulsivi motus, spinam dorsæ, antrochordæ & retrotrici miseranda facie distorquentes. Et in his quidem omnibus conspicuum post mortem prebenditur viscerum vitium, hepatis nempe, lienis, pancreatis, nec non glandularum melancolicarum, obstructio, infusio & corruptio.

## §. XXI.

Qui vero quartana febre interiret, sub frigoris rigore & moente turbata decedunt. Num enim, quales duo exempla vidi, in adultioribus adhuc incrementum spasmus atrocia, ut nullus plane subsequatur æstus, sed symptomata veneni prociua æmula adsint, demumque incertant. Et in infantibus, spasmus stridit in convulsivos plane morus degenerare fuscitudo.

## §. XXII.

Qui demum evadunt, habent utique, ut in vine victualque ratione exactum fervent postea per aliquod tempus moderamen: refractaria enim admodum est hæc febris, pristinaque sedem, data levi occasione, ex facili repetit. Sane qui superata ipsa gula indulgent corpulique extenuatum largo, tanto magis insalubri cibo, facere nituntur, promptissime recidunt, ex congesta denovo crudiorum saburra, incurant. Idem experiantur, qui saluberrimam illam per cuius spiraculam excretionem pensii habere, & corpus aëri frigidi & humidiori incautus committunt, vel frigidum potum ingestunt. Neque minus ex facili iterato prehendit eos, qui affectum intemperantia jactantur, ac inprimis impensiori tristitie diutius indulgent. Et, quod tamen rarius est, repulsa præpostere, quæ ad habitum corporis cum salute acta fuerat, & per scabiem, pustulas, ulcera & purpuram expulsa, materia, illico imperit denovo, qui sedans fuerat, inde febris impens.

METHODUS MEDENDI GENERALIS  
CUM INDICATIONIBUS  
CURATORIIS.

## §. I.

Indicatio-  
nes quatuor.

Quo pacto intermittens febris sit accenda, superiori capite sub methodo praeservatoria tam fule expolui, ut supervacaneum ducam illud hoc loco iterum tradere. Indicationes autem curatoriae causis quantitas oppositae, huc redeunt. I. Ut cruditas viscidae, acidae, biliosae ex prima viis, cum chylo & lymphâ successively ad sanguinem abeunt ac in nervorum partium systemate febrilis motus sollicitantes, & corrigantur, & per congrua emunctoria evacuentur. II. Ut sanguinis per abdominis viscera, praesertim ad quae vena portae excurrit, progressus liber praesentur; congestio vero, infarctus & obstructio expeditur, vel minimum major impediatur. III. Ut spastica vehemens in genere nervoso contrahitio, seu acerbiorum symptomatum causa, leniatur. Et IV. ut dejectum viscerum, stomachi vel volarumque partium robur refutetur, sique tum ulterior accessio, tum recidiva, praefundatur.

## §. II.

Primo per-  
fectenda  
temporan-  
tibus, in-  
dicationibus  
de ne-  
cessitate.

Prima igitur indicationi exsequenda servantur ea remedia omnia, quae acidum obrundendi, lentos succos incidendi, acres concuprandi, & primam maxime regionem expurgandi facultate pollent. Splendens autem hac nervo alcalina pharmaca, ut sunt salia plantarum per incinerationem parata, sal possimum albynthi & cardui benedicti. Commendanda etiam salia neutra, maxime sal ammoniacum dehydratum, terra solata tartari, sal digestivum Sydenhami. Quibus ad biliosam acrimoniam insurgendam, addenda absorbentia senescentia, cancrorum lapides, conchae, vel cornu cervi sine igne paratum. Et si praeterea educendi scopus, salia sicciora medicamentorum, Epsomum, Epsomense, Scilicet, aucta dosi, aut ipsa etiam aqua Sedulicris, per alvum crassiores, tartarea vero, per urinarias vias subtiliores salino-sulphureas sordes, efficaciter evolvunt. Habet etiam purgantem facultatem in quartanis magnesia alba, quae acidum primarium viarum imbibendo, transit in sal amarum, sal cathartico Epsomense simile.

## §. III.

Secunda  
indicatione.

Ad obtinendum secundae indicationis scopum, egregie faciunt amara, quae balsamico suo fixiori sulphure bilis balsillum refinant, acidos simul porticosque humores obrundunt, & lenem quandam spiritusalem siccis conciliant. Talia sunt extracta amara, fumarica, absynthii, cardui benedicti, gentianae rubrae, trifolii fibrini, centaury minoris, essentia, vel extractum rhabarbati, nec non pulvis balsamicus, secundum exemplar Brecbri confectus, ex aloë bene depurata, extractis amaris & gummatibus resinosis balsamicis temperatis, quae praeter facultatem alvum laxantem, etiam attentantem lenem & spissos succos obtinent, praesertim si earum usus supra laudatis salibus interponatur. Pertinet huc quoque conveniens cum debito regime theriacum & acicularum usus. Sin vero inveterata nimis obstructio viscerum, praesertim pancreatici, quod in quartana rebeli non inforta est, lenioribus expugnari nequit, in usum vocanda penetrantiora magisque activa mineralia potius pharmaca, mercurius quippe dulcis, vel nostra methodo diaphoreticus solaris, nec non antiquarium Riveri, quod ex

Et minime  
solum.

mercurio, animonio & auro, desuper abstracta aliquoties aqua regia & postea spiritu vini accenso, paratur. Ex animoniacis, regulus animoniaci medicinalis, panacea Glauberiana & Condingiana, item sulphur nostrum animonii correctum, sine praecipitatione cum acido confectum.

## §. IV.

Spasmas generis nervosi strictiones remittunt I. linimenta anisopalmidica & nervina, spinali medullae cum frictione cathda admota, ex auxugia humana, oleo spicae, lavendulae, rurar, salviae, balsamo Peruviano; II. clysters ex herbis nervinis, carminativis & anisopalmidica, addita sufficienti quantitate oleorum demulcentium, parati; III. balnea aquae dulcis, vetricibus imprimis ante paroxysmi accessum usitata; IV. epithemata & linimenta ex spirituosis & aromaticis parata, sub horore & rigore regionis epigastricae appodata.

## §. V.

Ultima demum indicationi appropinque satisfaciunt omnia amara, quae simul balsamica quadam adstrictiva virtute pollent. Nobilis hac virtute sunt chinæ & chaccarillae cortices, nec non cortex capparum, item tamarisci, cinnaomoni, ratura fantali rubri & essentiae ex amaris plantis extractae, quae cum liquore marshi scutate, omnibus fere palmarum praesunt. Instar omnium vero erit electuarium nostrum amfibile, cujus descriptionem superiori jam capite suppeditavimus.

## §. VI.

Peculiaris etiam virtus adversus quartanam habent emplastra carpi mariani applicata, quae inter famigeratissimum est a *Sorobetere* dictum. Concinnari autem possunt ex his, quae tum aromatico balsamico, quam irritante principio, aromatum & stimulum fibræ addunt, ut marianum alius partibus nervosis impaetam haerentem excutiant, & promissa die vacuo sanguis circumagatur.

## §. VII.

Praeter ea vero quae haecum adduxi quartanae praesidia, non possum, quin bina subjungam adhuc remedia, quae miram efficaciam mihi olim in Westphalia praesulerunt, propter quam etiam eadem jam dissertationi de *felici quartana curatione*, inferui. Primum est infusum vinosum, omnibus curatoriis indicationibus satisfaciens, de quo marcinotempore quotidie liberalis haustus funderetur. Recipe fibrarum hellebori nigri, polypodii quermi, foliorum fenae sine stipitibus singulorum unciam, herbae absynthii, centaury minoris, cardui benedicti, trifolii fibrini, ana manipulum dimidium, rasurae ligni colubini, corticis chinæ, aurantiorum recentium ana drachmas tres, limaturae maris unciam semis, tartari tartarum tantundem. Conc. cont. inrorentur drachmis duabus spiritus salis ammoniaci uniovis, miscantur & duabus vini mensuris infundantur.

## §. VIII.

Alterum hic est pulvis: Recipe corticis chinæ drachmas tres, reguli animonii medicinalis drachmas duas, mercurii dulcis, (qui non terendus cum pulvere propter salia, sed cuspidate tantum cultelli miscendus) croci maris tenuissimi, arcani duplicati, singulorum drachmam, olei menthae guttas quatuor. M. f. pulvis, cujus drachma dimidia, aut una, cum rob sambuci & julepo rosarum in electuario formam redacta, mane & vespere potius assumi. Et certe egregius usus est hic pulvis in quartana, quae alta in viscerum penetralibus egrae radices, requirit tamen corpus paulo robustius, cum exacto in

Tertia de  
minimo.

Clyster  
bus, bal-  
neis.

Epithemata  
sunt.

Quarta a  
maria ad-  
scriptum.

Epithemata  
sunt, ad-  
scriptum.

Praesidia  
quatuor  
subiungam  
adhuc remedia  
quae miram  
efficaciam mihi  
olim in  
Westphalia  
praesulerunt,  
propter quam  
etiam eadem  
jam dissertationi  
de felici quartana  
curatione,  
inferui.

Et potius  
resolvitur  
aut resolu-  
tione.

in dieta & vitæ ratione regimine. Licet etiam moleſtam quandoque lenem moverit ſalvatio- nem; ex voto tamen ceſſit, febricitans rebellis fuit expugnata. Cæterum plura de ſpeciali huius febris medendi methodo, infra obſervatione X. nec non capite IV. de febribus epidemicis, aſſectemus.

## OBSERVATIONES ET CAUTELÆ CLINICÆ.

## §. I.

Quartana  
autem  
morbus.

Quartana, ex morbis fere conuulſiſſimus, ægri patientiam & medici expectationem poſcit: in primis ea, quæ corpori melancholicæ coſtitutionis, ſentibus, hypochondriacis & ubi languidior ſanguis per venas melancolicas progreſſus, viſcera inſarſa & ænigmati aduſa, accidit. Non itaque impetuoſe in his aggreſſenda, aut violentis pharmacia urgenda curatio. Si ſecus fit, plus detrimenti, quam emolumenti ſperandum.

## §. II.

Interdum  
autem  
pneumonia.

In principio quidem morbi, natura ſi robuſta, validiora reſolvendi & colligandi æque evacuan- di virtute pollentia locum inveniunt. Ubi vero morbus inveteravit, corpus tenerum & exquiliſe ſentienti, meliusque acris & biliſe recrementa præſto ſunt, mirum inde exacerbatur febris, & haud raro ex ſimplici in duplicem, aut quotidianam plane tranſit. Temperata potius, plus diætica, quam pharmaceutica, cum uis quæ lenimen- to ſunt generi nervoſo, inſeſis ſpasmus jam aſſectio, in uſum vocanda.

## §. III.

Et quan-  
doque  
ſanguis.

Neque enim adeo refractaria eſt quartana om- nis, ut non ſæpius leniſſimis cedat. Ego certe plu- res novi, qui ſolo uſu clixiri temperati baſilicici, quod cum aquo lixivio ex amaris extractis & rhubarbaro, adjecto vino Hungarico, paratum, ex eadem felicitate valeſcerent. Alii ſolo oleo tartari per deliquium, frequenter cum potu aſſumto & hauſto ante paroxyſmum vino veteri Rhenano, cum, vel ſine amara, ſubſequenti poſtea vehementiori corporis motu, ab eadem ſunt liberati. Nonnulli balneo cum aqua dulcis uſu quododam, inſtituta ſimal ante acceſſionem corporis ad ſudorem uſ- que exercitatione, curati ſunt.

## §. IV.

Quoties  
ſub tali  
febre  
ſanguis.

Semper tamen longe facilius æque felicius quartana curatio ſuccedit, ſi cælum eidem veſi- catur, & aer purior, ſubtilior & rarefactus eſt, ut tempore verno, æſtivoque ſereno. Tum quippe ventris viſcerum obſtructiones promouæ expe- diuntur, knoſque ſuccorum liquantur, & perſpira- tionis æquabilis atque conſtanti, acris per apertos cutis poros ſordes diſſillantur. Quin novi quodam, qui non prius convaleſcerent, quam mutato cælo & in loco ſalubriorem ceſſu, vel alio vitæ vicſitudo genere inſtituta.

## §. V.

Ymo  
autem  
pneumonia.

Poſſimum in quartana febre, ſicut omnibus longie morbis, ut ponis mutetur ex uſu eſt, & decoctum ex radice ſarſaparillæ, cichorei, herba car- dii benedicti, paſſulis minoribus & ſemine fœni- culi, cum loco cereviſæ frigidum, quam loco in- fuſi theæ calidum bibatur, declinante paroxyſmo. Conductibiles quoque ſunt pro ponis temperatæ aciculæ, uti Selterane, quippe quæ cum dimidia, aut tertia vini parte potæ, in diſſuſa cralliſſa & evahendis per urinarum ductus impuriſſa ſuccia, ef- fectum præſtant ſaluberrimum.

## §. VI.

Studioſe etiam providendum, ut per cutis po- ros acres ſubtiles ſordes perſeque eliminentur. Per- ſciendum hoc tam ante, quam poſt paroxyſmum, & obſtinendum, non per potentia ſudorifica, ſed ea, quæ ſolidorum torum intendendo, progreſſum ſanguinis accellerant ſicque ſudorem eliciunt. Singu- laris hunc in finem virtus eſt validior corporis motus, per equitationem, ſaltationem, aut ambu- lationem, aliquot ante paroxyſmum horis inſtitutus, quo ego quartanam multoties diſcuſſam eſſe novi. Prius enim jam Celſi lib. III. c. 15. hoc eſt præceptum: *quo die quis febrim expectat, ante ſurgere & exercitacionem tempore febris in- curret. Sic enim ſepe illa diſſinitur*. Mira etiam hac in re virtus mixturæ innumera experientia comprobatur huius: recipe aquæ cardui bene dicti uncias quatuor, theriacaliſſimam ſemina, ſolis car- dii benedicti drachmam, animonii diaphoretici drachmam ſemis, ſpiritus vicioli gumæ virginæ drachmas duas, ſyrupi cardui benedicti drachmas duas. M. de qua, modo prius probe proſpectum fuerit primis viſis repurgandis, tribus, vel quatuor horis ante paroxyſmum, dimidia, & deſervitioſus hoc, reliqua dimidia portio ſumenda.

## §. VII.

Declinante quoque febre quam deſerviente æſtu ſponte corporis inadeſcit, cavendum, ne ſudor externa refrigeratione, vel pota frigido intercipi- tur. Si ſecus fit, febris non modo diuturnior red- ditur, ſed & facile ſuccedunt contracturæ, nec non tumores pedum cedematofi. Conſultum po- tius, temperato externo calore & diſſuſe cali- do potu, ipſum ſudore promovere.

## §. VIII.

Sanguis per venam ſectam niſſo, auferen- dis quartanæ cauſis directe quidem non reſpon- det; nihil tamen ſecus, ubi ſuſpicio eſt, febrim ab impedito ſanguinis per abdominis viſcera pro- greſſu ſuſcitari, ut in iis qui pathematiſſime hypo- chondriaco-hyſterici obnoxi, fluxum hæmorrhoidalem ante experti, aut molimina ad hunc perſentiſcunt, utiliter uoque vena in pede perun- ditur, adeo ut unica venæ ſectio quartanam con- ſumacem penitus diſcuſſam eſſe, obſervaverim. Quam etiam gravidæ tantum non omnes ſine plethoricæ venæ ſectioem, ſi quartana corripiun- tur, utiliter non modo ſerunt, ſed & poſcunt, ne intendo per ſpasmus febriles ſanguinis motu, uteris ad præmaturam exclusionem ſollicitetur. Conſideranda igitur morbi tempora, ipſa corpora, vires & fluidorum ac ſolidorum diſpoſitio, ne perjeram inſtituta ſanguinis ſubtractione, ſanatio difficilior fiat & ſpasmus febrilis acceſſionis tempore increſ- cant, uo pluribus in diſſertatione, obſervationes clinica circa curationem quartanæ, inſcripta, monui. Notabile autem eſt, quod ſanguis è quartana- riorum vena emiſſus conſpicuum exhibeat vinum ac flavoſcente lenta pinna in ſuperficie obductus compareat, cuſjmodi cruſſam albam pinguiſſam in venis etiam quartana deſunctorum ſe inve- niſſe teſtatur Schenker.

## §. IX.

Vomitoriorum uſus in quartana pariet cum ſi opor- teat, diſtinctione admiſtendus. Quando enim crudo- rum ac viſcidiorum ſuccorum colluvie primis, ex nimia ingluvie, eſt in viâ, ac ad vomendum proclivitas; expedit omnino, ut breviffima via per emeticum erubereur, anſequam ſanguinem ſub- e & ſyſtema nervoſum afficiat. Conſulius ta- men eſt, illud non adhibere, niſi videretur, ſi videretur.

ventriculus non adeo tener, nec genus nervosum nimis feniens & debile, ac pulmones nulla labe infecti. Præferenda etiam tuora & appropriata ex illis palmam fert radix specuaculæ, quæ præter vomitum movens, aromaticam & ballamam habet facultatem. Ex inter hæc antimonialibus anteposenda veneris, vitriolum maxime cyprum, vel album, eo quod tam biliosus & glandulosus ductus simul confringendo, ulteriori affluxui materię febrilis aditus præcludunt, qualem etiam fibras adducendo, & stimulo, ut firmius impaeta nervos paribus materia excutiantur, faciunt. Utraque vero sociata, in temperamentum quasi rediguntur, ut medicina emerget, tum ad stomachum deplendum, tum febrem expugnandam, apprimè utilis.

## §. X.

Optime  
sunt china  
amara.

Chinæ cortex, cum ratione usurpatus, spectatæ adversus quartanæ est utilitatis: tenendum tamen, non prius ad ipsius usum esse descendendum, quam purgantis probe primis viis, demum plethora visceribusque integris atque aperitis. Tutior etiam est in quartana biliosa æstiva, quam quæ autumnio vergente grassatur, & viscerum vino succicque tenacibus fovetur. Tum præstat ipsum in decocto ex vino porrigere, adjectis amaris, aperientibus & diaphoreticis, uni sunt summities centaurii minoris, herba caudis benedicti, radix gentianæ rubræ, pimpinellæ & sal tartari. Expedi quoque interdum in hac febre virtutem ipsius adjecto maris croco subtilissimo & sale volatili urinofo interdere. Interim si debito tempore, debita dosi & quantitate exhibebitur, & cum diaphoreticis & resolventibus rite permiscebitur, nocet non nunquam. De quo pluribus evolendum compendio dissertationem, de recto cortice chinæ usui in febris.

## §. XI.

Nec non  
spasmodici.

Ad minuendos præterea, vel sistendos plane paroxysmos, in quartana, præsertim autumnali & rebellis, nec non quæ segniores naturas infestat & sopore stupatur, admodum efficacia reperi epinematæ, ex acrioribus, stimulantibus leniterque vesicantibus compositæ & manuum carpi applicata. Plebæ quidem alio hunc in finem unanimes, sed ingratas nimis est inde fœtor, ideoque optime ejusmodi epicurpi concinnantur ex terebinthina, fuligine, sale ammoniaco, araneis confusis, pipere atque theriaca.

## §. XII.

Minerali-  
bus aquæ  
genuis  
amari-  
tis & quædam.

Minerales aquæ, acidulæ præsertim ac thermæ, meo quidem judicio, tam ad præservationem, quam curationem intermedium faciunt. Sed ante paroxysmum & in ipso plane ab usibus abstinendum, & videndum, ut ante accessum febris, aqua per emunctoria congrua jam sit evecta, ne motus febrilis inde exacerbetur. Loco ponas tamen temperatæ, ut superius meminimus, semper possint assumi.

## §. XIII.

Artes  
sunt  
aperta.

Si alvus in hac febre pertinacius clausa atque contricta, expedit eandem potius clysteribus, quam internis pharmacis folliculare. Optima horum enematum ingredientia sunt, quæ præter vim emollientem, pargoricam & ipsos sedantes obtinent, ut summities mellefoliæ, flores chamomillæ vulgaris, sambuci, tilis, semen cumini, brodiaum carui viridius, vitellus ovi, cum pauxillo salis gemmæ. Opportune etiam quandoque ipsæm specificam quædam antifebrilis, amara, nervina & roborans commiscetur. Inter Gallos enim ab aliquot jam annis mos increbuit, intermitentes cu-

randi per decoctum chinæ chinæ, crebris per anum injectum. Idem tamen etiam cum alia succedit antifebrilibus, ut cardus benedictus, centaureo majori, radice gentianæ, nec non herba majoranæ, rosmarini, abrotani & salviæ. Ex ceteris apprimè hæc methodus ex usu est in infansibus, & qui ventriculum minus firmum & facile nauseantem obtinent, hac tantum servata cautione, ut alvus prius emolliente & salino solvantur clystere, quam nervinus & roborans injectur.

## §. XIV.

Capitis dolores sævi, qui hæc febris in profectionis præsertim ætatis personis, junguntur, ægre levantur. Potissimum lenimen sperandum ab eis, quæ alvum liberorem reddunt, nec non à pedulvis, quæ sanguinis impetum a capite ad inferiora trahunt. Inter externa vero æctum rosaceum, nem rutaceum, cum sale & natio mixtum, pari inditum & applicatum, optimum affert solatium.

## §. XV.

Quo dèum pasto, ne quartana, uti frequenter fieri affolet, recurrat, sit præcavendum, equepiam sane Celsi est consilium, lib. III. cap. XVI. sic habens: si febris quævis, diu mentuisse ejus diei convenit, eoque viare frigus, calorem, crudelitatem, lassitudinem. Facile enim revertetur, nisi à sano aliquando timeretur. Hinc, paroxysmi in primis die, vitare oportet veros boeales, æther compreffum frigidum-humidum, qualis esse solet in humilioribus, paludosis & subterraneis locis, & perspirationis succellus custodiendus. Victus etiam exquisita habenda est ratio, ne nimium ingratum, tanto minus ex alimentis difficilis solationis. Animus quoque in tranquillitate servandus, & providendum, ne ira & terrore commoveatur, quo febrem quartanam febri etiam complures inducunt novimus.

## §. XVI.

Tum stomacho subveniendum, & elixiriis stomachicis, ex amaris & aromaticis confectis, digestio secundanda, crebro quidem ac diu, sed parca iisdem utendo, ne debile jam corpus præter naturam exæstuet. In primis curandum, ut per alvi fecessum, denuo succrescentes crudi succi, blandè subducantur, easque ob causam crebris utendum pilulis ballamicis, vel nobis cinnabarum, nem de ammoniaco Quercetani, quibus, si per chinchinam febris suppressa, salis digestivi usui jungendus. Ex his prædictis non modo pessime recidivas, sed & aliæ læpius deiores passiones, lentæ præsertim febres, opportune præcuduntur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Generosa femina linguea, macilenta, quinto mense gravida, Septembri, postquam in nocturno, frigido, nebuloso aere iter fecisset, incidit in quartanam, cui præter sueta symptomata, vehementis cephalalgia, summæ præcordiorum anxietates, vomendi conatus & inquietudo, juncta. Medicus amaram essentiam cum alexipharmaca, in paroxysmo & extra eum, quotidie ad guttas minimum sexaginta, porrexit, eo cum effectu, ut binis sequentes paroxysmi longe gravius impetrent, & superius dictis pathematibus intensius affluis, ventris tormina ac lombi dolores accedent, & abortus plane esset metus. Meum hinc rogatum consilium & quantum: an venie dicti, quam reformidare primus medicus, locus? Ego vero expensis circumstantiis, eandem oppido necessariam judicavi. Administrata igitur fuit leque in post febrem die, & sanguis impensè ex-

Quibus  
vires  
capit  
de  
ter.

Revidet  
arrend  
dantia.

Ex phar-  
maco-  
rati-  
ca.

Quædam  
in græd  
vires.

exsistit. Tum mixtura calefacienti nimis substitui pulveres temperantes nirosi, cum emulsione anacardica. Inde sequens paroxysmus minor factus, de usupatis per aliquot adhuc dies infidem, denum eluctuario nostro, parce, sed iterato exhibito, penitus abiecta fuit febris, & matre, & facta salvia.

## Epirisii.

Sicui tempestiva sanguinis missio gravis, quæ ordinario plethorice, ad præcavendum abortum pernecessaria; ita multo magis ex usu est, quando motu febrili calido, vel medicamento exaltante, sanguis in vehementem orgasmum, sive motum inextinguibilem expansum, conjicitur. Felicitur igitur in hac febre non ponit non succedere febris curatio, postquam sanguis substractus, calida rejecta & furogata, quæ astum sanguinis restinguunt. Cornicem autem chinæ gravidis etiam non nocere, sed circumspicte datam insigniter prodesse, tum hoc, tum aliis multis in comperto est exemplis.

## OBSERVATIO II.

Quartana  
in catarrhe  
pica in su-  
perioribus  
extremis  
membris.

Quinquagenarius obesus, vini ac cerevisiæ potator, hinc cachecticus, autumnum quartana corripiebatur epidemica eademque per mensem detinebatur, pedibus simul tumidis, alvo adstricta, cum sopore ac torpore in paroxysmo. Frustra danis multis, chinæ cortex tandem in usum vocatus in decocto. Quo per hebdomadem usupato, febris si- luit, sed tumor dexteri pedis cum dolore obortus, & enatum, in initio superficialium, postea profundius ulcus, supra malleolum. Discussus tamen li- gamentis & externis confringentibus aequalis tumor, ulcus quoque consolidatum. Brevis autem post rediit quartana & adhibitis incautum omnibus, per semel ite frustum perstitit, ægro interim diutius in- curio & hic in paroxysmo copiose ingurgitante. Invenit hinc venter, urina parce stillavit, spiritus angustus factus, serotum quoque cum pedibus tu- mescentibus, superiora autem tabida, sequens hy- drops albens, quo æger exstinctus.

## Epirisii.

Perperam tumor pedis vi repressus & ulcus sic- carum, quum quartana haud raro has terminetur, infidem repulsi, & hanc primum, & repe- rant. E re potius fuisset, cachexiam & viscerum labem oppugnare, & internis magis, quam ex- ternis morbo occurrere. Sic omnino tectiva de- clinari & æger servari potuisset.

## OBSERVATIO III.

Quartana  
in tertiana  
cum febre  
tertiana.

Juvenis literatus, computationibus in seram noc- tem subinde indulgens, autumnum pluvioso sub ip- sere incurrit tertianam primum. Cujus æstus, quum primis citius in taceolis discillis & julpis copiosis exstingueret, succellit quartana, cum ex- quisito consensu artuum dolore, capitisque ac pe- dum quasi rigore, alvo simul clausa & urina cum ardore stillante. Diu hæc febris & medicos & me- dicamenta elusit. Tandem danus hic pulvis: Re- cipe corallorum, salis absynthii, mercurii dulcis ana drachmam, olei caryophyllorum guttas sex, laudani opiatæ grana quatuor. Sumus is quotidie bis, eodemque sursu trahum consummo, salivatio oborta, post quam febris discessit. Sed periculi non experta erat salivæ fluxus, quum per quartodecim integros dies, quædie sæpe ad mensuras duas, succederet, æger neque somnum capere, nec soli- di quicquam assumere posset, manus & pedes fri- *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

gerent, faucium & gingivarum caro mirum tume- ret, frigidissimus exspiraret halitus, corpusque de- bile & marcidum redderetur. Hinc pedes immissi ter quotidie pediluvio, ex vino, aqua & herbis aro- maticis. Alvus subducta clystere ex floribus cha- momillæ, herba mellissæ, origani, salviæ, oleo cha- momillæ cocto, cum sale communi interius laxante ex manna, casta, rhabarbato & foliis fenæ. Ponit datum decoctum ex farsiparilla, china radi- ce, ligno juniperino & mastiche, cum regimine su- dorifico. Fauces elote decocto salviæ, menthae crispæ, florum rosarum rubrarum, balsamiorum, sambuci & radice plantaginis, ex vino, adjecta postea essentia mastiche & myrrha. Et circa somni tempus oblatas pulvis bezoardicus cum theria- ca celesti & oleo ligni sassafras. His intra men- sem sublata omnia, & æger ad sanitatem traductus.

## Epirisii.

I. Abusus acidorum & pomorum citriorum tertianam in quartanam commutavit utique. Fi- xiores enim de lentum reddidit febris materiam, simulque primas vias acidorum & poncorum succorum copia opplevit. Et hinc etiam ratio sub- sequentium incommodorum petenda.

II. Ex vero scribit *Willisus de febr. quartana* promotos esse ad salivationem, ex levi etiam mercurialium dosi, & quartanam etiam sæpe salivatione solvi. Utrumque confirmatur hoc casu. Ratio vero cur tam facili sit in quartana, ac uni ego observavi in tertiana etiam, salivatio, hæc mihi videtur; quod, qui eadem decumbunt, pri- mam regionem, salis, acidis partim, partim bali- sine acibus succis, gerunt obestum, & quorum sal- sedine mercurialium via mire intenditur. Neque tamen retinendum, enormis in nostro ægro salivationis causam postissimum fuisse, quod mercurius dulcis cum corallis in calcem ultis & sale absyn- thii intensus tritus fuerit atque commixtus. Inter omnis enim generis salia, fixa postissimum alcali- na, cum mercurialibus pessime miscetur, & va- lidiori tritu, draslicum, humores salivales & hy- mphaticos fortiter commoventem facultatem acqui- runt. Memini etiam paratum à medico in com- muni quartana decoctum, ex cortice chinæ, sale tartari, terra foliata tartari, mercurio dulci & aqua communi, vix coëribilem concitasse salivationem. Idem contigisse novi in quartana ab oblato mer- curio dulci cum specifico *Myrsinæ*. Hinc auctor sum, ut, qui tam un velin mercurialibus, eadem nunquam tirando exactius miteat cum sal- iva, vel salia prorsus omittat.

## OBSERVATIO IV.

Robustus & plethoricus vir, vix sedentariæ cum crassiori victu addictus, animi affectibus in- dulgens & ab anno hæmorrhoidiarius, Octobri mense, sine præcedente externa causa, inhioretse- re corpit, lassitudine corporis & consensu artuum dolore affligi, pituitum viridem copiosum evo- mere, cum insigni præcordiorum angore, sub- sequens calor universi corporis, cum cepha- lalgia, cæci arida & urina naturali. Quas die hæc recurrebant, ideoque medicus quartanam esse judicavit & elixirum amarum cum spiritus salis ammoniaci, nec non infusum herbarum thee, ante paroxysmum, largiter ingerere passit. Sed ingra- vescente inde morbo, ad specifica magis descen- dit, & chinam chinæ, tam intermissionis, quam paroxysmi tempore, liberali manu porrexit. Qu- licet etiam pectus inde longe gravius opprimeretur & vires contraxerent, eodem tamen insitit, eo cum effectu, ut alvus peritæus oblipare-

Quartana  
china cor-  
ripit & con-  
cipit & san-  
at.

tur, vortius in paroxysmo cum misifica anxietate erumperet, hocque non succedente, lipothymia plane ingrueret, ac febris in continuam videtur mutata. Accius igitur alius medicus, qui venae sectionem indolens, paroxysmum effecit illico minorem. Intercalaribus postea diebus infusum leniter evacuant, ex foliis fenae, radicis cichorii, herba taraxaci, passulis, tartaro tartarico, & syrupo rosarum solutivo, ex vino, per quatuor vacuos à febre dies sumendum fuit. Praecipit etiam ut chylis emolliente alvina regio expurgaretur ac ipso in paroxysmo dorsi spina & pedes linimento nervino inungerentur. His deservibus magis aëbus febris, dolor ostocopus sublaris, urina reddita largior & sudor liberalius prodire coepit. Transactis autem sic quatuor septimanis, pulverem supra descriptum ex maris limatura, cortice chinæ, mercurio dulci &c. duodecim doibus obtulit, expirante sensim febre & agro, consummo hoc pulvere, ad perfectam sanitatem reducere.

#### Episcris.

Docet hæc historia, perniciosum esse specificorum usum ante correctionem & evacuationem humorum nocentium, præstabilem vicissim leniter evacuationum, nec non pulveris ex aperientibus metallicis cum chinchina, facultatem. Et certe tutissimus cortex hic est, si cum laxantibus & diaphoreticis propinquet. Neque enim alia ipsius ratio ac opii, cujus saporis virtus adjectis purgantibus, sudoriferis, vel etiam diureticis & analepticis, ita circumcurat, ut in immodico quasi temperamemum redigatur. Hinc serio auctor sum, ut febri-fugum hoc, præsertim in corporibus vicerum obstructione & infarctu laborantibus, nunquam solum, sed aperientibus præmissis, vel iis nupam, exhibeatur.

#### OBSERVATIO V.

Quarantia  
per quatuor  
dies.

Quam anno MDCCCX. ob siccum & calidum per integros fere quinque menses regnantem aërem, hic grassarentur febres variæ generis, quarantia etiam correpta fuit juvenula sanguinea mollioris & laxioris carnis. Post quantum paroxysmum chirurgus per scictam in brachio venam largitur sanguinem subtraxit, & die post pilula dedit valide purgantes, quibus intra nycthemeron vigefies decetum. Perfruit hic alvi fluxus per aliquot dies cum torminibus, licet non tam numerosis sedibus, ac demum sanguis plane cum muco secit. Febris autem inde minor facta & postea plane discussa. Cruentum etiam alvi profluvium, ponibus demulcentibus ex floribus chamomilla, sambuci cum lacte, item pulvere antidysenterico *Klapperbein*, ex bolo Armena & cortice chaccarillæ composito, feliciter subleat.

#### Episcris.

Frequentes hoc anno erant & dysenteriae, & variæ generis febres, ex una eademque causa, impetus nempe, excrementis, acibus, biliosis sordibus in corpore genitis, perspiratione suppressa recentis, aque in prima via & duodeno potissimum collectis, quæ postea transmissæ ad sanguinem vel per intestina, vel per habitum corporis motu febrili, cricite quasi expulsi fuerunt. Secta igitur in febrientem hac venæ, perspiratio sic imminuta, per drasticum purgana autem impetus humorum ad inessina pronans, factaque ibi majori actis biliosis materiarum excretionem, febris ipsius, ab hac subitanea soluta, cessavit.

Nam sub eadem epidemica febrium affectione observavimus dysenteriam præpollere colibatum, febres curari admodum difficiles induisse.

#### OBSERVATIO VI.

Sub principio autumnæ, quæ frequens erat quarantia, invadit etiam solibus putremantibus plebeium juvenem, post copiose ingestum pocum corporisque refrigerationem statim ab ira. Superato quinto paroxysmo, tria tartari emetici & quindecim tartari viriolati grana, sex ante accessum horis data, quibus cum magna præcordiorum anxietate pinosum liquorem cum bile evomit. Ex eo in quondam, quæ typum non servabat, conversa est febris. Oblati igitur pulveres alboscentes, salini, nitrosi & cinnabari: inde fibræ brevior & minor, alvus laxa & sudor declinante impetu largus. Elapsis aliquot hebdomadibus, debito tempore ac doli usurpante elevarium febri-fugum & febris succellive abacta. Sed quam liberatus obvia quævis ingereret, corpus à frigore non defenderet, redit setris, quæ tamen post aliquot paroxysmos, balsamo viæ ad XXX. guttas, in duabus aque menthe uncis, tam ante, quam post paroxysmum, summo, iterum discussa. Breves autem de hæc erant indicia. Reconvalescens quippe appetit liberalius indulta, nec à frigore sub cavit, idcirco in eundem recidit morbum. Dedit hinc cordilium, ut grana XV. piperis albi leniter conculsi, cum aliquot cochlearibus spiritus vini, quatuor ante paroxysmum horis ingereret & in lecto siliaret. Quo demum quater usurpato, factum, ut febris penitus discederet.

#### Episcris.

I. Febris, præsertim quarantæ, in nullis frequentius recidit, quam in plebeis. Hi enim neque diastocis legibus obtemperare, neque ex præscripto medici vivere suecunt. Unde plerumque tam ob colibatum perspirationem, quam ingestes multos & graves cibos, promte iterum formæ colligunt febres. Ne igitur in morbum erumpat, vel emetici superius, vel salini detersivi & balsamici laxantibus inferius, educendus, vel etiam medicamento digere stomachico præstendus, cujus generis maxime est piper, in plebeis summopere proficuum.

II. Sudor ante paroxysmum convenienti remedio atque regimine proclitus, nequaquam nocet, sed ad febrem vincendam ejusdem insulsum arcendum, quam maxime salutaris, secus ac communis medicorum fert sententia. Ego certe multis confirmatum habeo exemplis, sudore ante paroxysmum per accommodata medicamenta provocato, modo prima regio à fermento febrili prius exquasite depleta fuerit, cuius inhorrescentiam & spasmus, sine quo nullus sublequi potest æstus, fuisse prohibita, ipsamque febrem fugatam. Decumans etiam error est, febrilem materiam demum paroxysmo finito expelli sudore. Tantum enim abest, ut febrem sudoribus post paroxysmum, vel intercalari die largis, cum si lute terminatam viderim facile unquam, ut potius, ipsi hi largi sudores debilitatem parium & ætiam cuius indicantur, corpus ad novum paroxysmum disponerent.

#### OBSERVATIO VII.

Puer decennis, facie livida & pallidissima, abdomine turgido, appetens tamen colibatum, ex-

Quarantia  
in quatuor  
diebus  
per quatuor  
dies.

refrigeratione sub aura vespertina contraneget quartanam. Opponebatur amara in essentiam redacta. Sed aucta inde appetentia, corporisque nocturna denudatione accedente, in quoddam post decem paroxysmos transiit febris. Hinc datur alteris diebus pulvis nostrae in vehiculo liquatur, & cerevisiae potandae mensura indies bibina cochlearia liquoris ex salis tartari, nitri, salis ammoniaci, arcani duplicati ana drachmis duabus, in aquae fontanae libra liquefactis de decem extracti croci granis adjectis. Haec intra trium hebdomadarum decursum febris discussa, abdomen denumuit atque ex facie livescens color deterfus. Sed post quatuor hebdomades rediit febris quotidie, quae quidem isdem brevi profusa, post duas autem menses denovo repetit, isdemque iterum fuit abscissa. Quia autem animadverti, causam tam crebrae recidivae esse neglectum post febrem remedium usum de diateta insalubrem, serio diatribis, acidis, lacticiis, calco, fructibus horae interdixi, ac praecipi, ut ternis minimum diebus aliquandiu pilulis de liquore superius dicto insisteretur. Sic denum fieri expugnata, puer ex voto convaleuit.

## Epiſtifi.

Aegre ex quartana levatur pueri; crebras experiantur, etiam post longum tempus, recidivas, vel alios longos ex ventriculi imbecillitate morbos, vel etiam catarrhales deflexiones lentae febriculae incurrunt. Interest igitur, ut tempestive statim in principio imminencia mala periculantur. Ego quidem ut plurimum vacuandis medicationem cum successu exorsus sum. Ad alvum purgandum frequens mihi fuit pulvis Cornachini, ex cremoris tartari drachma, antimonii diaphoretici granis XII. & diagrydii sulphurati granis sex, cui interdum nitri paulullum addidi. Hunc in tres doses divisum, ter, sex horis ante accessiones potexi. Si vero nausea & conatus vomendi adfuit simul, dimidium tantum tartari emetici granum uni dosi admiscui. Sic expurgata foetum collavie, infusum roborans, de vacuo omni biberio ad cochlear unum, dedi sic paratum: recipe corticis chinae unciam semis, characillae terrae foliae tartari, salis tartari ana drachmam, infunde uncias octo aquae cardui benedicti, colaturae adde julepi rosarum unciam semis. M. Si his febris non discessit, indicium fuit infarctus viscerum, aut obstructionis glandularum in abdomine. Ad hanc submovendam ultrapavi liquorem salinum supra descriptum, parca, sed repetita dosi, simulque pro potu praebui decoctum diluente aperiens. Praeparatis autem hac ratione primis viis de visceribus referatis, non dubitavi, praeteritum minore & breviori jam facto paroxysmo, febrilem compescere spasum. In quo quidem conficiendo, tam in puerili, quam juvenili aetate, nullissimum inveni methodum *Hellerae*, per clysterem ex decocto corticis chinae, bis, vel ter, intercalatis diebus injectum, praemisso tamen, ad educandas prius fordes, clystere emolliente. Sic percurata fuit febris denum, neque unquam rediit, si modo convalescens sibi a refrigeratione, inflantibus & alvum condilapantibus caverunt.

## OBSERVATIO VIII.

Senex generosus octogenarius, per omnem vitam rarus morbis afflictus, vespere, post im-

prore & frigore corripiebatur, quod sequebatur calor, ut noctem duceret insomnem. Redibat haec quarto die graviora, capitis dolore, animum languore & praecordiorum anxietate slipata. Interim vacuis diebus si satis bene habebat aeger, somnus & cibum capiebat. Post septimum paroxysmum consultabatur chirurgus, qui bis ante paroxysmum perorgebat emeticum, intermedio tempore pulveribus acerbis salinis, cum singibere & radice ari, febrem oppugnabat & poni suadebat decoctum lignorum temperatum. Invalecebant hinc paroxysmi, inquerendo, sensum torpor ac mentis plane emonio accedebant, die vacuo etiam persistebat capitis dolor, virium & artuum languor, cum calore praeternaturali, & appetentia ciborum plane interdicebat. Vocabar nunc ego ad aegrum per binos jam menses febre decumbentem, nil vero ob plenariam de alimentorum & medicamentorum nausam efficere poteram. Interim quia alvus adstricta de infansu ventriculi cardinalis angebat, suadebam ut clyster inficeretur emollienti, cum cuminiavis & stimulo salino, quo levamen & somnus procuraret. Carpis etiam emplastrum ad imitationem Serobelbergeriani imponi jubebam, quo minor scibat accessio. Incertum nil nisi eluxu temperatum balsamicum dabam, imprimis quam a salinis deterfivis majores semper praecordiorum anxietates oboriri viderem. Sed deficienter, ob nausam ciborum, febrisque, quae in continuum quasi concedebat, diuturnitatem, alimonia vires demum penitus exhaustae & mors sequebatur, ita quidem, ut bini penultimi paroxysmi, intensio ac diuturno horrore, rigore, anxietate, anhelosa spiratione, mentis emotione corporis iactatione, per quatuor vel quinque horas, cum pulsu admodum contracto & debili, insisterent, succedente postea calore & pulsu in celeritorem mutato, ultimus autem eadem quidem impetere vebementia, sed nullus plane sequeretur aestus, & aeger in ipso rigore atque frigore inieret.

## Epiſtifi.

Quartana febris, *Hippocratis & Celsi* effatio, per se quidem secuta est, & neminem facile jagulat, immo, si rite decurrit, ad longevitatem ducit. Sed visceribus inflammatis, aut labe affectis, recte monente *Galenus in lib. III. epid.* enecat quam plurimos, sive ob aequam inter cutem, sive omnimodam cibi abstinentiam. In pessimis enim est plenaria ejusmodi ciborum averfio, & ego quidem purefens tum quoddam viscus esse observavi. Dumque nihil alimenti affumitur, corpori viribilibus luberalitur pabulum, ut illud emacietur & haec elanguescant penitus. Tanto magis id accidit senibus & febre jam diu attritis. Deici senibus longe ejusmodi febres, ex animi affectu ortae, admodum licet infestae, & licet vires primum non adeo languide, cautiissime tamen tractandae, quam commissos in diateta, aut medicatione, vel levis erroris, decrepiti graviter, haud raro capere plane, luant. Qui vero intermittebant decedunt, sub vebementia febrilium spasmodum, qui fluida ad caput & interna vitalia organa urgent, ibique fucos penitus consistere faciunt, pereunt; id quod non modo in quartana, sed & quotidianis, si continuas faciat, animadvertitur.

## OBSERVATIO IX.

Juvenis, literarum perquam sub vita sedentatia studiosus, Septembri mense, aere pluvioso

ipſa du-  
plex, de  
mox tri-  
plex cum  
tremore pe-  
dum, &  
craſſa.

veſpertina, iter ſuſcipiebat, in diverſorio bene  
prandebat, vinumque auſterum, non adeo bo-  
næ notæ largiter bibebat. Veſperi domum re-  
diens, paroxyſmo afficiebatur febrili, cum artuum  
languore, qui quarto die gravior & cum majori  
præcordiorum anxietate redibat. Sumebat hinc  
ex conſilio medici pulverem digeſtivum ſalinum,  
& in paroxyſmo, temperantem nitroſum. Alvo  
inde ſexies ſine torminibus ſoluta, febris deſer-  
veſcebat & levior reddebatur. Quam vero quinto  
poſt die, veſperi tempeſtate frigido humida  
medicum relatus ſucceſſum ipſe adiret, dormum  
reverſus, ex improviſo novum febrilem experie-  
batur inſultum, priori longe acerbiorum. Redi-  
bat idem poſtſero die, tertius erat vacuus, quar-  
tus paroxyſmus primo, quintus ſecundo reſpon-  
dentem, inſerebat, ut ſic quartana eſſet duplex.  
Alvus præterea erat ſtriſta, venter ſcus cardial-  
gia premebatur, pedes tumeſcentes ad genus uſque  
tonique corporis & faciei aſpectus erat turgidus.  
Exhibebantur ipſi liquor ſalinus, alcalinus,  
nitroſus, in paroxyſmo & extra eum & die inter-  
calari pilule balſamicæ. Quibus alvus bis ſo-  
luta & in ſimplicem rursus mutata febris. Inſi-  
tebatur iſdem eadem ratione remediis, & ſub-  
ſequebatur copioſus alvi fluxus, cum exquisitis  
circa umbilicum torminibus, & tam acris nocu-  
æque ac interdiu ſecedebant, ut anus ſere ero-  
deretur. Durabat hæc diſſinthra per aliquot dies,  
febrilem mitiore inſultum ſubiſcit, ſed tumor  
pedum cum gravitate & languore lumborum in-  
creſcebat potius. Poſt uſum mixturæ ex tinctura  
animonii tartariſata, eſſentia chazarille &  
ſpiritu cornu cervi ſuccinato, adhuc quidem fe-  
bris miſceſcebat, ſed languor corporis, cum inap-  
petentia, luſo aſpectu & pedum tumore, me-  
tum inſcutiebant haud leviſſe. Datum igitur extra  
paroxyſmum electuario ex tob ſambuci &  
juniperi, cortice chinæ & caſcarille, extracto  
cenaſarii minoris, ceuſſa animonii, ſale cardui  
benedicti, cum ſpiritu ſalis ammoniaci, quo  
æger illico ſenſit virium incrementum, ſtomach-  
us melius appetit, obſtus & gravativus ar-  
tuum dolore diſceſſit, febris, poſt unum adhuc  
miniſſimum paroxyſmum, penitus ceſſavit, tu-  
mor quoque pedum ſenſim ſubſedit & elapſo à  
primo inſultu menſe, integra reddita fuit ſanitas.  
Ad quam conſervandam, præter exquisitum vi-  
tæ ac diætæ rationem, pilularum balſamicarum  
& elixirii ſtomachici uſus commendatus, & ſex  
jum elapſiſ ſeptimanis, nihil plane viſum eſt in-  
commodi.

#### Epiſtola.

Plura ex hac obſervatione in uſum decerpenda.  
Eluſcunt inde procacitæ cauſæ, quibus conſpirantibus, intermittens febris excludi  
poſſit, aëris nempe conditio, ſub qua tertianæ  
& quartanæ jam erant frequentes, imbecillitas ex  
fluſidorum imperantia & vita ſedentaria ven-  
triculus, perſpiratione ab aëre veſpertino, frigido  
humido intercepta & ſtomachus cibi ac potus mi-  
nus ſalubris copia reſeratus. Alvo dein, & nati-  
væ, & medicamentorum ope, ſoluta, paroxyſ-  
mus tractus, conceſſione autem in aurum veſperi-  
tinum frigido-humidum reſiſt mox, eo quod re-  
cremента halituoſa & ſulphureæ indolis, per poros  
elabi ſolita, retroacta & ad primas vias cræ  
imbecilles partes delata, febrilem rursus conſti-  
tuerunt ſententiam. Quod autem ſimplex quartana  
in duplicem conceſſit, id men quidem ſenten-  
tia, factum à nimis copioſa ſemina ſuccorum vi-  
oſiorum, in venterculo, propter ipſius imbecilli-

tatem conſluentium. A quibus tamen natura ſuo  
robore, arte adiuta, per crebrioris ſedes ſe exo-  
neravit, junctis ſimul ventris torminibus. Porro  
notebile & hoc, quod ſuccedente copioſo alvi ſe-  
ceſſu, tumor tamen enatus fuerit, imo increverit,  
luculeſſimo indicio, copioſa aſſidue cruditates  
magnæque viſcerum ac partium extenſarum æoni-  
am. Hinc ſummo electuario inſigniter robo-  
rante, reddinoque per illud venterculo & primis  
viis robore, vires ſenſibiliter cum appetitu reſti-  
tute, febris fugata, tumor ſucceſſive ſubſedit,  
& ſanitas perfecte revocata. Ut adeo pateat, tu-  
morem pedum, ſub ipſa febre oboriente, non  
ſic eſſe permiſcendum, ac eum, qui poſt fe-  
brem, præſertim male curatum, ſuccedit. Spec-  
ificorum etiam anæſtheſium & roborantium,  
que inter primas uique tenent chinæ & cha-  
zarille cortex, ulum, ſciticus longe ſuccede-  
re, ſi corporis partes ipſæque venterculus æoni-  
a potius, quam ſtriſtura aſſeſſa, & humorum  
potius copia, quam virulente indolis coagula mo-  
lis materia, in vicio eſt.

#### OBSERVATIO X.

Plures hæcenus ſpeciales, de ſclici, æque ac  
inſclici quartanæ curatione, enarravi prædictos  
caſus. Jam non abs re erit, brevibus adſpicere,  
qua ego in ſananda hac febre ut plurimum uſus  
ſim methodo. Nimirum primum fuit, ut ad cou-  
temperandos acidos ſaliſos, & liquandos viſcidos  
ſuccos, nec non obſtructiones reſerandas, æt vacuo  
die, & una vel altera ante paroxyſmum ho-  
ra, cum hauſtu cereviſiæ tenuis, præberem coch-  
lear liquoris ſalini, ex ſale tartari, ammoniaci,  
nitro, tartaro vitriolato, five æreano duplicato &  
cortice chazarille ſingulorum uncia ſemis, ſoluta  
in libris duabus aquæ cardui benedicti, five cha-  
momillæ vulgaris, adjecta demum drachma di-  
midia extracti croci. Superato tertio paroxyſmo,  
elixirio uſus ſum anæſtheſi, ex radice pimpinel-  
læ alvæ, contrayervæ, vinetoxici, ligno coha-  
brino, cortice chazarille ana uncia ſemis, ex-  
tracto cardui benedicti, ſcedii, ſalis tartari ana  
drachmis duabus, extractis cum ſpiritu etherica-  
lis & liquoris anodynii mineralis ana uncia, ſpi-  
ritus vini tartariſati octo, aquæ ſtorum ſambuci  
quatuor uncias; dando illud poſt paroxyſmum  
ter quotidie, ad quinquaginta, vel ſexaginta gut-  
tas, cum potu calido, ad ſudorem placide elicien-  
dum: diſceſſit hinc ſæpe febris. Quando vero  
perſiſt, inſultum laxas ſuperius deſcripſum,  
diebus intercalariis mane exhibui, & veſperi  
modo dictum liquorem ſalinum. Poſt aliquot  
autem dies electuario febrem fugam, ex rob  
ſambuci, juniperi ana uncia, cortice chinæ, cha-  
zarille ana uncia ſemis, extracti cenaſarii minoris,  
ſalis ammoniaci, animonii diaphoretici ana  
drachena, jalepi roſarum uncia una cum dimi-  
dia, exhibui tempore à paroxyſmo vacuo, bi-  
horio quovis, magnitudine nucis moſchate. Si  
etiam interea alvus offici obſta, clyſtere domeſ-  
tico eam ducere juſſi, vel elixirium, ex maſſæ  
pilularum balſamicarum uncia ſemis, ſoluta in  
uncias quatuor aquæ ſumariæ, cum uncia olei  
tartari per deliquium, ad centum guttas potendi.  
Diſcuſſa ſic febre, ad recidivam declinandam,  
occluſio ſemel deglutitæ pilule balſamicæ, vel  
à robuſtionibus efficiendis, ex gummi ammo-  
niaci, extracti hellebori nigri, croci, mercurii  
dulcis, cinabaris ana drachena, trochiſcorum  
albandal drachena dimidia, triginta granorum

Alvus  
mitior  
tremore  
quartana.



pondere sumat. Uliarpanam præterea quondie elixir stomachale & injunctum exactum in vita victuque moderamen: quibus nunquam fere febribus idcirco; si vero forsan id factum, veste opus fuit. Ideoque aggressus eam sum emetico, ex radice hypocistidis, violæ cyprio & croco, ac subjugendo statim electuarii ulum, penitus expugnavi. Qua etiam ratione, me multoties quartanam epidemicam & ex ingluvie ortam, in plebeis potissimum, prima in herba jugulasse, testor.

*Epicrisis.*

Methodo hac frequenter summo cum fructu quidem usus sum, nullo minus illud adjuvandum in gratiam eorum, qui praxin cum judicio & sufficiente ratione exercere nituntur, putavi, ut non talem methodum in ullo morbo universalem medendi dari autem, quæ perpetua sit, & in omnibus casibus & circumstantiis promissæ applicari possit. Illud enim satis serio inculcare soleo meis auditoribus, nec remedia adversus morbum, certæ semper efficacis, nec unam eandemque medendi dari methodum, sed individua-lem & specialissimam, ex sollicita historis morbi & maxime corporis ægotantis & morbosæ causæ exploratione, prævia sufficienti meditatione & deliberatione, inveniendum esse, quæ in eo consistat, ut non modo remedia, quibus utendum sit, cognoscantur, sed & quo ordine, qua dosi, quo tempore, & quamdiu cum iis continuandum, exquisita ratione & experientia, qua optime vires & remedium virtutes perspicientes & addiscendæ, judicentur. Memorabilis præter allatus casus, existat *Tom. II. Consult. medic. Sec. IV. Observatione CLXXX.*

CAPUT III.

De Febre Quotidiana.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

*Quotidia-  
na quæ  
diurna.*

ET quartana, & tertiana, ex intermittenti-  
bus rarior est quotidiana, quæ scilicet singu-  
lis diebus accedit & solvitur, subsequente postea  
aliquot horarum intermissione.

§. II.

*Exiguus  
vires &  
flava.*

Accessio hujus febris primo mane, hora cir-  
citer quarta, aut quinta, evenit cum frigore &  
horrore, sine rigore tamen. Sub hoc cardialgi-  
ca præstis est nausea & veritus insulsi, in non-  
nullis capitis dolor, in aliis animi defectio, in  
plurimis vomitus, vel alvi scæcessus, vel etiam  
utrumque. Excipit postea calor magis lenis,  
quam mordax, cum sio minus intercal. Pulsus  
inordinatus antea & debilis, increbescit, non  
adeo durus tamen est, sed mollior: neque urina  
flammea, sed potius cruda ex citrino turbida;  
multis etiam insuperabilis fere in somnum pro-  
clivitas. Paucis demum prodit sudor: & elap-  
sis decem, vel ultra horis, discedit paroxysmus,  
corpus hebes & grave relinquens, ita postero  
die hora reversurus.

§. III.

*Quotidia-  
na quæ  
diurna.*

Sic quidem incedit & decurrit febris exqui-  
sita quotidiana intermittens. Quæ vero typum  
hunc non servat, sed vel meridie, vel circa ves-

peram, vel etiam vago invadit tempore, notha  
appellatur, enterica, aut anomala.

§. IV.

Irregularis hæc quotidiana, haud raro obser-  
vatur epidemica: sum nempe, quando irregula-  
ris ac inordinata diuturna temporum anni fuit  
confinatio. Ego quidem, post continuum inven-  
tum æstatis anni MDCCXXVII. & XXVIII.  
calorem, oborbas vidi, pro diversâ corporum  
constitutione, tam diarrhoeas & dysenterias,  
quam variis generis intermittentes febres, & in-  
ter has potissimum quotidianas.

§. V.

Intermittens autem est, de qua agimus quo-  
tidiana, ideoque non permittenda cum quo-  
tidiana continua. Quæ quidem pariter prima lu-  
ce cum frigore accedit, sed calor & languor,  
cum pulsus celeri ac debili, inappetentia & in-  
terdum colligativus sudor, per totum reliquum  
tempus durat. Et si longior, ut plurimum fan-  
tasia, ægris, fractus penitus viribus, sub ipso fri-  
gore preteritibus.

§. VI.

Neque etiam confundenda cum catarrhali.  
Hæc quippe benigna, vespere cum leniori refri-  
geratione accedit, mane deservescit & catarrho-  
sis defluxionibus suis est conspicua. Ex maligna  
extrepentia insignis virium prostratione, & agryp-  
nia facile innoscit, oæque penitus intermittit,  
sed raram remittit.

§. VII.

Differt quoque ab aliis intermittenti-  
bus. Quotidia-  
na enim ex tertiana simplici fit duplex, stru-  
tus etiam diebus impetis paroxysmus, sed insul-  
sus tempora alternatim sibi respondent; aliæ  
sunt causæ, aliæ medicatio.

§. VIII.

Si ex quartana insulsi quotidiana, triplex  
dicitur quartana & paroxysmus non quotidie ex-  
dem hora venit, sed quarto quovis die, quoad  
accessionis terminum, consistat; diversâ etiam,  
ob diversis causis, inveniunda medendi ratio.

§. IX.

A lenta demum febre distinguitur, quod illa  
post pulsum & circa noctem sine horrore obre-  
pat, cum calore in volis manuum planitiesque pe-  
dum, oætu etiam magis afflicta calore stipata,  
mane vero tepescat, nec tamen penitus inter-  
mittat.

§. X.

Jam sicuti omnis febris proxime nervosi ge-  
neris est affectio; ita formalem pariter quotidia-  
næ rationem ipsa nervosorum partium &  
systema valorem agitatione absolvi, indubium  
plane. Hic autem præternaturalis febris motus,  
per materiam, à naturali & blanda humorum  
vitalium indole plane alienam, ad sanguinem de-  
laxam, nec tamen cum ipso miscibilem, indu-  
citur.

§. XI.

Nimirum primæ sic dictæ viæ, ventriculus, & vobis  
duodenum & pæcor jejuni valvulæ porio, sunt  
illud latibulum, in quo vitiosa materia fermenti  
insilar hofistatur. Inde per vasa lactea ad sangui-  
nem & succos transmittitur, & cum his ad leni-  
tientes internas partes delata, easdem exagitat  
& ad extraordinarium motum stimulat. Et cer-  
te in quotidiana etiam febre, primam maxime  
regionem, variis generis vitiosorum, corrupto-  
rum, viciorum, acido-biliosorum succorum sa-  
burra, scætere, plura sunt quæ uberius evincunt.  
Etiam junguntur ipsi ordinario fere ructus,  
nausea,

nausea, cum conatu vomendi, inappetentia, cardialgica inflatio, præcordiorum angustia & pectoris oppressio, interdum tensus, pungivus ac mortificans dolor, ad dorsum excurrent. Fœdus dein ut plurimum de ingratis sapor in ore percipitur, quandoque amaricans, aliquando subdulcis nauseosus, non nunquam nidorosis plane. Ipsa demum febris naturæ beneficio per crebriores dejectiones alvi sponte haud raro solvitur, in arctiosia autem medicatione, per superius & inferius os evacuantia, cum stonachia, utramque faciunt paginam.

## §. XII.

*Inter  
primo vir.*

Quia tamen longior ut plurimum hæc est febris & ad plures sæpe menses trahitur, pasta utique suspicio est, labem in imi ventris penetralibus fuisse firmius radicatam. Organa quippe secretoria, glandule & glandulosæ intestinorum tunica, remissa nimis sunt atque laxata, ideoque loco subillis lymphatici salivæ succi, copiosum impurum & serosum plorant. Reliqua quoque sanguinis depurationis dicata viscera, hepar, lien & pancreas, ob defectum robur & languidiorem per ipsa sanguinis progressum, succum lymphaticum & biliosum minus purum in digestionis officium mimmunt. Hinc alimentorum solutio & chyli elaboratio turbatur, multaque serosæ & corruptæ cruditates prima in regione & gignuntur, & cumulantur, quæ ipsa mora detrituræ indolis factæ, & ad sanguinem delatæ, febrem, ut diximus faciunt motum.

## §. XIII.

*Quæ  
quædam in  
fuit.*

Quod autem crebris, quam in aliis intermittens, fibræ insultus in quotidiana impetatur, ob eminentiorem primarum viarum imbecillitatem fieri arbitror. Hæc enim quam maxime cruditarum proveniunt faver, & facit, ut prompte eadem istuc confluant, cito ibi colligantur, breviori etiam tempore sanguinis maffam fubeant & ad nervosâ spinalis medullæ membranas deferantur.

## §. XIV.

*Quæ  
intermittens  
et subje-*

Hinc igitur porro est, quod omnia quæ viscerum flacciditati inducendæ & crudorum ac impurorum succorum proveniunt favent, ad hanc febrem sternant viam. Insidiantur potissimum hominibus segnioribus, otiosis, inordinata & cruda dieta utensibus, crapulæ ex cœcivis, nec non moriori ac curâ nimium indulgentibus, isem qui debilem ob prægressus morbos, vel sanguinem effusum, nati sunt ventriculum. Frequentius etiam infestat hyberno, autumnali nubilo cœlo, senes magis & pueros, feminas plus quam viros, pinosos, phlegmaticos & sanguineos, præ biliosos & melancholicos. Ex aliis quoque intermittens præter ipsius generis: tum scilicet, quando ager incongrua vorat, vel crebris animo moventur, quando purgantibus & emeticis validioribus stonachi robur avertitur, anodyna, calida & spirituosâ usurpantur, aut peniti habita primarum viarum repurgatione, adstringentia & specifica præposuere adhibentur.

## §. XV.

*Exposita  
longe, ut  
ga non.*

Ceterum quotidiana exquisita, ex viscerum atonia oriunda, longius ut plurimum trahitur, multamque negotii medico facit. Quæ vero vaga, popularis habet circumia & succorum tantum vitio debetur, facilis sanationem recipit.

## §. XVI.

*Quædam  
preposita  
magis an-*

Mirus enim periculosa est, quæ plenariam paroxysmi habet utermissionem. Sed quæ ad continuæ indolem inclinat, & ubi soluta febre,

languor tamen virium, cum pulsum debilitare & frequentia persiluit, corpusque sudore diffudit, ita, si ad aliquot menses productur, vires emervat, ut æger haud raro succumbat.

## §. XVII.

*Ex inter-*  
*mittens*  
*bus parox-*  
*ysmi.*

Quæ etiam ex intermittens, præsertim quartana, succrescit, rebellis & periculi plena est, præco jam *Celsi lib. III. c. XV.* testimonio: *quartana, iniquentis, neminem jugulat, sed si ea falsa quoddam, in malis æger est.* Magnum enim viscerum vitium subesse indicat & continuæ plerumque est propinqua.

## §. XVIII.

*Si contin-*  
*uus adju-*  
*mentum.*

Quando incipiente accessione bilioli & pinulosi vomitus, vel secessus, eveniunt, bonum, nisi forsitan ex febris diuturnitate vires jam nimium fuerint exhaustæ. Sudor quoque declinante paroxysmo placide erumpens, & urina post febrem copiosior cum sedimento sedecens, vehementer insultus minuunt, febrique felicem solutionem nunciant.

## §. XIX.

*Si nulla  
males.*

Contra ea, ubi excreto nulla, febris etiam per longum nimis tempus detinet, viscera demum labem contrahunt & cachexia, febres lente & hecticæ, tabes, in dispositionem phthasæ, succedunt.

## §. XX.

*Ex perox-*  
*ysmi*  
*remittens*  
*males.*

Idem perquam facile evenit, quando adstringentia & specifica febrifuga præposuere adhibentur. Ex his calidioribus sudoriferis & essentis alexipharmacis spirituosius acris ex prima regione recrementa in sanguinem aguntur, expeditus in continuam, cum ludæe perpetuo & virium potius, est transina.

## §. XXI.

*Maies*  
*figura.*

Qui autem hac febre demum decedunt, in his frigus longe est intensius ac magis diuturnum, cum rigore, virium prostratione & mensis quoque turbatione. Hoc plerumque bis adhuc excipit calor, sub tertio autem insultu, pulsum ichus debiles manent & inæquales, ipsamque frigus in rigorem transit emortualem.

## INDICATIONES CURATORIÆ

cum

## METHODO MEDENDI GENERALL

## §. I.

Quum itaque causæ quoddamque intermittens, cruditarum serolo viscidarum prima in regione liburra, viscerum & glandularum flacciditate & impedito sanguinis per imum ventrem progressu continetur; omnis omnino medicatio merito eo dirigenda: ut I. impuri illi & pravi succi è primis viis, preparati prius, per congrua emunctoria proscribantur; II. viscera à tono dejecta roborentur & sic cruditarum ulterior proveniunt arceatur; & III. liber sanguinis per viscera abdominis & intestinorum caulem, tanquam digestioem & chyli elaborationis officinam, circulato restituantur.

## §. II.

*Propius*  
*solus*  
*maies.*

Primum ut ex voto perficiantur, laudata est virtus incidentium & abstergentium, & quidem salum neutrius generis, inter quæ primas tenent sal ammoniacum depuratum, digestivum *Sylvestri*, ex capite mortuo spiritus salis ammoniaci urinosi, tartarus vitriolatus, arcæum duplicatum, sal Elishamense, Sedlicense, nitrum ammoniacum.

*Et acris  
aromaticæ.*

tum. Dein commendanda etiam, quæ sale acris aromatis pollem, ut radix ari, calama aromatica, pimpinella alba, colli veri, zedoaria, canella alba, zingiber, piper album. Quæ in pulverem redacta, salibus dictis mixta, & adjecta una vel altera gumula olivi carminativi, egregiam suggerunt medicinam antispasmodicam.

### §. III.

*Pilule  
balsamicæ  
cum sale  
olei.*

Ad primæ æque ac secundæ indicationis scopum obtinendum, exarbandas nempe leniter per alvum foras, roborandum simul tonum ventriculi & intestinorum, eorumque turbatum morum restituendum, saluberrima laudem merito ferunt, pilule balsamicæ Boecherianæ, Stehliæ & nostræ, massa etiam pilularum alophanginarum, de succino *Cratois*, item *Solemandri*, prædictis si una cum ipsa salibus offerantur.

### §. IV.

*Amaræ &  
roburantes.*

Potissimum vero ad reddendum visceribus abdominalibus robur ac impediendum impurorum succorum in digestionis officinam affluxum, ex usu sunt elixiria amara cum martialibus mixta, uti quidem est meum temperatum balsamicum, sine spiritu vini paratum, cum liquore alcalino. Vel essentia chaccarillæ cum essentia genianæ mixta. Vel etiam elixiria stomachica, uti notitum, vel *Mischkæ*, additis aliquot guttis tincturæ martialis, ex floribus salis ammoniaci martialibus, cum spiritu corticum aurantium rectificatis factæ.

### §. V.

*Therma  
stomachica  
& acida.  
le.*

Et hæc quidem etiam promovenit egregie sanguinis per abdominis vasa ipsamque digestionis officinam progressus. Interim si refractaria admodum febris repetit, & ab inordinata diæta sustentatur, omnia saluberrima antecellunt medicata æque, thermæ potissimum atque acidula, uti Carolinæ & Egræne tepesfactæ, quæ debito cum regimine, inermixtis amaris, balsamicis & anticholericis, usurpæ, viscidæ sordes diluant, per alvum de urinum cum scrofa evehunt, infarctus expellunt, liberumque sanguinem reddunt commatum.

### §. VI.

*Methodus  
medendi.*

Specialis autem medendi cum hisce prædictis methodus, pro temperamentorum, ætatum, anni temporum ratione, corporum constitutione, dispositione primarum viarum, sexu, morbiq; causâ instituida, & singulari bis, rem dosis remediis, quam sumendi ratio accommodanda. In genere tamen tenendum: horis à paroxysmo vacuit pulveres salinos cum incidentibus esse exhibendos, trino vel quarto die ventrem solvendum pilulis, ita tamen, ut operatio earum accedente paroxysmo, jam sit abolita, declinante paroxysmo eruptionem sudorem quiete & calido ponat esse promovendum, ac demum subjugenda roborantia, amara, martialia & antifebrilia. De quo tamen plura in causulis de morborum enarrationibus.

## OBSERVATIONES ET CAUTELÆ CLINICÆ.

### §. I.

*Abstinere  
aure infusa  
medendi.*

Quotidianæ inermittentes circumspicte sunt tractandæ, ne in alios longos & ancipites morbos transirent. Inprimis asperantur adstringentia & suppurantia, præcipitania terra larga, item omnia purgantia drastica & sudorifera, nec non validiora emetica.

### §. II.

Multam tam ad quotidianæ curationem, quam recursum ipsius ardentem facit, vitare animi commotiones, mororem inprimis ac diuturnam sollicitudinem, cum insalubri cibo, ac vini potu, nec non refrigeratione, præsertim abdominalis.

### §. III.

Quum natura ipsa hanc febrem critico alvi fluxu sæpe solvere soleat; ipsius ductum insilendum, ipsaque juvanda ab artifice. Unde ægri non ad tegmen sudoriferum, aut pharmacis ad sudorem cogendi, sed potius ac amittendum, ut materia vinosa ipsaque primæ viæ ad alvi fluxum salutarem præparentur ac disponantur. Quod quidem egregie perficitur, quando aliquot ante paroxysmum horis, lenè laxata, pulvis cornachinus, vel pilule balsamicæ, cum sale præbentur.

### §. IV.

Quia porro vomitus huic morbo jungitur, cum bonis aggrorum rebus succedens; & re est, ut idem debito tempore & convenienti medicina secundet. Hinc expedit interdum omnino stomachi subversionem per emetica ante paroxysmum data provocare. Ego quidem memini, me aliquoties in febre exquirente quotidiana, quæ hora quinta matutina invadere solebat, portexisse circa noctis tempus, prius quam cruditer esset digestionis officina ad sanguinem delatæ, lenè vomitorium, ex radicis peccuanthæ granis XV. cum dimidia parte pulveris cornachini. Prostratus inde felici cum successu fuit vomitus, nonnunquam alvi fluxus, & febris minimum minor facta, alius postea facile expugnanda.

### §. V.

Si etiam quotidiana febris, diu persistit per mensem, vel longius, ac in lentam sermè degenerat videntur, commodè offerri potest granum unum tartari emetici soluti. Quo biliosum stagnantem succum, cum levamine, incredibili fere copia, fuisse exurbaum, novi.

### §. VI.

Quando dolor ventriculi pressorius, vel inflatio & ciborum fastidium pungitur, regioni epigastricæ sacculi ex herba menthæ, absinthii, rorismarini, floribus spicæ, chamomillæ Romanæ, caryophyllis & nucis moschata, vel sicci, vel ex vino cocti, applicandi. Qui, ubi finita etiam febre imponuntur, perspirationem & sudorem efficaciter eliciendo, egregie prosunt.

### §. VII.

Frigus, quam nimis acce partes externas exaginat, cum saeculi modo dicti, cum etiam spirina vini puræ, cum oleo menthæ in duplicato linteo stomachali regioni cum fructu apponuntur.

### §. VIII.

Cum febris fugis cause in hac febre mercandæ. In quotidiana tamen epidemica & erraticâ, præter superius dicta, specifica etiam antifebrina, ipsam quoque electuarium, cuius basis chinæ & chaccarillæ cortex, tuto adhibetur. Provocata inde, observatorum etiam fide, alvi sæpe laxitas & copiose summa cum euphoria sedes. Chaccarillæ autem cortex in hac febre merito præferendus chininæ, quia magis roborans & adstringens est.

### §. IX.

Sanguinis missionem raro admittit quotidiana; jam enim præsto est inprimis ventriculi imbecillitas & plerumque cachectici quippiam complicatur. Quod si auctim emens plethora, præsertim à mensium, vel hæmorrhoidum suppressione,

*Pilule &  
sine vino  
habenda.*

*Acris ex  
crois pro  
movenda.*

*Formis  
horum  
die.*

*Formis in  
crois.*

*Externa  
ventriculi.*

*Si spiga  
sine appo  
nenda.*

*Febris fugis  
cum ad  
stringentibus  
& suppurantibus.*

*Neque non  
transfusa.*

sione, urina præterea tincta & æger vini potui assuetus; in principio solum vena secanda, ne febris inde ingravescat, ac uti observata medicorum testatur, lenta, hæctica, apostematice febris, subsequantur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

Quædam  
est rebelle  
Carolina  
epilepsia

Illustissima persona, triginta annorum, inordinatum diu sectata fuerat vitæ genus, multa incongrua edulia ingererat, fructus horum, lacticius, acetaria, varique conchyliorum genera, vina etiam potentia & aquas sic dictas vitæ liberaliter potarat, prandium ad vespem, & cenam ad medium usque noctem produxerat & præterea corpus frigido aëri autumnæ crebrius exposuerat. Incidebat hinc, prægresso frigore, in febrem, quæ matre quotidie accedebat, cum præcordiorum anxietate, cardialgia, capitis dolore, artuum lassitudine & vomitu pituitoso affligebat, ad tertiam vel quartam pomeridianam durabat, somnum turbabat, & post aliquot infusus, largo spissabatur sudore. Appetitus tamen non adeo erat defectus, sed æger in cena subinde cibos fumebat, inprimis intrinsecum vino. Insistebat hæc febris per quatuor & quod excedit hebdomades, corpusque admodum hebes & languidum reddebat, licet interim variis remediis, purgantibus cum emeticis, salinis pulveribus, etiam cum floribus salis ammoniaci martialibus oppugnaretur, donec infuso corticis chinæ cum corus absinthii, ex vino, abigeretur. Sed quem appetitus redeunt indulgeret æger multaque minus salubris assumeret, elapsa vix hebdomade, febris, majori cum symptomatum vehementia rediit. Opponebatur eadem & evacuanda, & antifebrilis, febribus discedebat, brevi autem post eandem ob causam repperbat, idque minimum sexies factum, ut senectere interea efflueret spiritum, quo corpus ob nocturnos sudores rapidum factum ac vires minime exhaustæ. Alii igitur accersiti medici, qui de thermis Carolinis, sub extractione dietæ de regime usupandis, consilium dederunt. Allata etiam in lagenis vitreis magnis impensis thermalis aqua, & reposita ante paroxysmum, mane aque ac vesperti, pota. Sed quam intermedium tempus brevis ellet, quam ut aqua ante accessionem corpore posset evelli, gravior primum inde fiebat paroxysmus. Ideo febribus morus specificis prius compositi fuerunt de postea per binos menses Carolinæ singulis diebus manitio tempore usupata, interpositis simul medicamentis amaris stomachicis & palialis balsamicis. Quibus demum effectum, ut febris consumax expugnaretur, nec unquam rediret.

#### Epietis.

Voracitas & inordinata dieta rebellem facit intermittentem omnem, tanto magis quotidianam, quæ, quæ imbecillitate stomachi & crudum copia oriunda, novum inde semper nanciscitur fomitem. Dein quam longa febris sedem possimum habeat in visceribus intus ventris, a crasso sanguine furis, quæ tracta diutius febre, magis magnifico robore exuatur, in illustissimo etiam hoc ægro viscera debilia fuisse aque operta, certum, unde crebriorum recidivarum origo. Nilil igitur salubius fuit deceni thermarum usu, quæ parum subito aperitivo, partim sereno multum principio roborante instructæ, cru-

dos saccos efficaciter evebant, infarctus expediunt & sic lentam febrem, nec non cachexiam, quam optime præcitant. Sunt tamen thermæ aque ac acidulæ cum cautione in intermittibus in usum vocandæ, & providendum, ne paroxysmus in earum operationem incidat, emuntoria claudat, & aquis remittentis, anoretis cum gravibus symptomatibus inferat. Hinc tutius, isdem, composita febre, ad recidivam accendendam uti possimus, & cum, adjunctis medicamentis stomachicis & balsamicis, opem ferunt certe laudatissimam.

### OBSERVATIO II.

Generosa erat femina, triginta circiter annorum, sanguinea, vegeta & tenera, quæ quarto mense gravida abortum cum enormi hæmorrhagia & post hunc mensum suppressionem experta, pallida hinc facta fuerat aque cachectica, cum alvo adstricta & appetitu defecto. Hæc postquam oibæ in cena comedisset & vesperti sole occiduo in horro drambulasset, nocte infestante febre corripiebatur, cum anxietate, nausea & ingente artuum languore. Remittente febre dabatur ipsi quidem elixirium stomachale, sed noctu eodem tempore iterum redibat febris paullo gravior. Porrigebatur ob suspicionem cruditatum vomitorium, quæ tartari violatæ granis XII. & radicis hypecacuanthæ granis XXV. quo crassam viridiam coloris pinuam evomebat. Nihil minus salis repperbat tempore febris, majori adhuc compressorio in epigastrio sensu vomendi quæ conatu, quæ silentio etiam febre persistebat. Aperiebatur quidem vesperti alvo stricta chylifere emolliente; febris tamen & ventriculi spasmus per aliquot dies insistebat & facies icterica plane comparebat. Exhibebatur ipsi mixtura ex aque cardui benedicti uncis tribus, theriacalis, cinnamonati ana uncia semis, salis cardui benedicti, animonii diaphoretici ana scrupulis duobus, spiritus vitrioli guttis XX. syrupi papaveris rhæodæ drachmis duabus, cujus dimidiam partem vesperti sex ante paroxysmum horis, sumit, impositio simul ventriculo sacculo, ex speciebus stomachicis & curminativis in vino coctis, quo sudor ante invasionem largus & febris minor. Insuper sequenti paroxysmo, alteram reliquam mixturæ sumit partem, quæ emanat proflus & spasmi quoque cardialgicus laxatus. Quam vero ægra coconvalescens appetitum indulgeret, fructibusque horatis ac marinis piscibus vesceretur, quinto post die iterum in febrem incidit, majori fere anxietate, vomendi conatu animique quadam deflectione stuporæ & vesperti accedentem. Solvebatur hinc alvus, mixtura & extrema adhibebantur, sed incassum fere. Persistebat enim potius fervor & languor cum magna debilitate, etiam superato paroxysmo, ut merus esset continuus. Incipiebatur rursus chylifer & vomitorium supra dictum porrigebatur, sequente & vomini, & alvi feculi. Minuebant inde symptomata cum febre, & pulvere ex corticis chaccarillæ, tartari violatæ & salis ammoniaci anatica portione confecto & per septem dies, quatuor quibusvis horis, ad drachmam dimidiam usupant, discussa demum omnia, ventriculo & corpori robur redditum, mensum quoque fluxus in ordinem redactus.

#### Epietis.

Caveant sibi omnes, qui ex sanguinis immodica profusione languent, à prava dieta & corporis

Quædam  
est rebelle  
Carolina  
epilepsia

poris refrigeratione. Tum enim, ob imminutum corporis ipsiusque ventriculi robur, perspirationem quoque imminutam, prompta febrium gestis. Deinceps in quotidiana, cupa causa ingens cruditanum in stomacho & primis viis sabura, magis quam ulla alia intermitte, conducibile est, ventriculum, praemisso blando emetico, levis emetico depleat. Tum spastica ventriculi stricture nihil promittit laxas, quam placidum elicere sudorem, quam in rem spirituosa regionis epigastricae calide applicata egregie conferunt. Tandem expurgata prima regione, chaccarillae cortex cum salibus, non modo ad febrem fugandam, sed & digestionis successum fulciendum, utiliter adhibetur.

## OBSERVATIO III.

*Quotidiana ex tertiana etc. Quarta febris.*

Senex, sexagenario maior, macilennus, sanguineo-melancholicus, continuis laboribus per multos annos sub vita sedentaria discit, superiori anno, quo solennes erant intermitte, corripiebatur tertiana, postea quam peregre profectus, liberali convivio exceptus & noctu sub coelo valde humido & pluvioso frigido redux factus erat. Placide hac admodum decurrebat, & adhibita prius pulveribus silino-digestiva, post quantum paroxysmum electuarium expedite discitebatur. Nolebat tamen postea vigor & appetitus resiste, sed à summo cibo pressioris semper in epigastro urgebat dolor, nec somnus adeo erat quonus. Dabatur quidem, ad digestionem secundandam, quotidie bis, ad drachmam semis, pulvis ex radice ari, pimpinella alba, gentiana rubra, semine cymini & macis. Sed praeter opinionem quotidiana post aliquot dies accedebat febris vesperi. Promissum statim habebat medicus electuarium ex rob juniperi, cortice chaccarillae & syrupo acoetatis citri, idque omni bithorio deglutire jubebat. Sumto hoc, repetebat quidem paroxysmus, sed subito & post eum copiose prodibant dejectiones, vel decem numero, ut ager firmiter crederet, validum se accepisse purgans. Continuabatur igitur parviori dosi electuarii usus tam salubri effectu, ut febris discederet & ager penitus convalesceret.

*Epietisi.*

Enata procul dubio hac ex tertiana quotidiana fuit, quod fuit illa, prima non sufficienter expurgata regio. Unde reliquae materiae febrilis, accepto per malam digestionem incremento, induruerunt quotidianam. Plane peculiaris etiam heic fuit corticis chaccarillae effectus, canalem intestinorum efficaciter vacuans, febrisque fontem simul & semel tollens. Is tamen non ubique perpetuus, sed peculiaris primarum viarum dispositioni imbutus. Alias inter omnes constat, corticem hunc potius ad compescendas nimias dejectiones valere. Ut adeo pareat: unum remedium, pro diversis naturae & corporis habitudine, aliud aequale aliud, & diversum, contrarium plane, existeret posse effectum.

## OBSERVATIO IV.

*Quotidiana ex tertiana etc. Quarta febris.*

Nobilis quaedam tenior & sanguinei corporis foemina quinquagenaria, regnante Sirio & instante mensium fluxu, gravi exagitata fuit ira, cum extremorum tremore. Poterit medicus paulo post purgantes pilulas, quibus tanta hypercathartis succitata, ut intra XXIV. horas plusquam quinquagesies, & postero adhuc die, vige-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

sies fere, deieceret. Fractum inde miscece corporis robur, artus languerunt, ingruit animi, praesertim erecto corpore, ductilio, penitus appetitus, somnus turbatus & pene omnis intercedit. Exactis inter haec aliquot diebus, vesperi accessit anxietas summa, cum levi demaxat horrore & frigore, inquietudo & hyscopica affectio, ut jam animam agere videretur. Subsequenti pulvis ictus celeris, aestus corporis, oris siccitas, & maior corporis per duodecim horas balans, symptomatum autem levamen. Habuit postea tantisper melius: febrilis tamen commotio modo vesperi, modo noctu, jam gravior, jam levior, rediit quotidie, rursi sicca, & ante, & post illam affligente. Aege tulit fere omnia stomachus, anaeprica, salina, balsamica pilulas, elixiria stomachica, alimenta ipsa, & quamvis suspensa manu data, sequuta anxietas, aestus, pressio, stricture & ardor ventriculi, nec non tormina ventris. Sic decubuit per mentem, ac inuena nihil melius ferre potuit, quam emulsionem ex amygdalis dulcibus, semine papaveris albi, aqua florum acacie, liliorum convallium, tiliae & cerasorum nigrorum, quibus tantillum pulveris bezoardici ciniosi subinde inditum. Porri danum praetera decoctum avenaceum, non nunquam in levem emulsionem cum amygdalis redactum, & ad alvum obstruendum solvendum, enema lenientia injectum. Elapsi autem mense, quodammodo commodius exceptit ventriculus medicamentum. Hinc sumis quandoque decem tantum pilulas ex nostris, quibus alvum cum euphorbia laxata. Exhibitum quoque elixirium nostrum balsamicum, parca pariter dosi. Remanserunt nihil minus febiles commotiones, licet minores & sine angore. Ad has igitur componendas oblatus ter quotidie hac pulvis: recipe lapidum cancerorum, antimoni diaphoretici, arcani duplicati, corticis chaccarillae, ana drachmam. M. F. Pulvis, dividatur in decem partes aequales. Ex ad alvum subducendam usurpandam elixirium purgans, ex massa pilularum balsamicarum in tenui lavio soluta. His demum intra quadraginta dies sensim febris subtila, vires cum appetitu & sanitate integrarederunt.

*Epietisi.*

Perniciosum utique fuit molimen, post iram & ingruentem mensium fluxum, purgans dare, quia tum jam in motu est natura, & spastice in nervosis partibus stricture adhaerent. Neque dubium est, quin sub provisa inde vehementiori purgatione & affluxu succorum impurorum ab ambu ad interiora, & erosio, & levis inflammatio intestinis fuerit inducta, quibus effectum, ut nec medicamenta, nec alimenta, sine incommodo, anxietas & aestu suscipere poterit. Febrilis etiam irregularis insultus, quotidie bis interdum accedens, cum rursi, siccitas omnino fuit à levi intestinorum inflammatione, sub qua semper stimulus spasmodicus & viciata occurrat digestio. Hac igitur parviori & morbi causae dispositio, nec correctio, nec evacuatorem, nec roborantem aiam admittit medicinam, quam lenientia & demulcentia. Febri autem, quotidianae typum servanti, accommodatius fuit nihil, quam chaccarillae cortex, eximie roborans, mixtus cum aperientibus salinis, absorbentibus leniterque diaphoreticis. Cuius generis pulveres in quotidiana febre, etiam lenita & quae ex vixio primarum viarum maleque digestorum succorum colluvie oritur, vixit sunt certe laudatissimi.

## OBSERVATIO V.

Quotidie  
in regno  
de

Quadragesima circiter femina, sanguineocholerica laxiorisque corporis constitutionis, quae in iram prona, inordinata dieta cum fructibus horaei usq. & insulsum theae large nimis ingurgitans, stomachi sibi contraxerat languorem, paulo post mensium experiebatur suppressionem. Hos quum proprio artificio pellentibus urgeret, febrem incurrebat quotidianam, ordinariis symptomatibus comitratam, medici tamen ope, exactis tribus mensibus, ab eadem liberabatur. Non autem ita multo post, emanentibus semper mensibus & alvo stricta, in eundem recidit morbum, quem complures in auxilium vocati medici, nec pharmacia, nec aquis medicatis, Egrasque ac Lauchiladiensis, neque etiam lactis asinini usq. depellere poterunt. Perficit potius idem iam a triennio immedicabilis, & quotidie prima luce accedit febricula, quam comitatur sudor colliguanivus pene, ad decimam usque antemeridianam manans, & pomeridie sequitur languor cum dolore lumborum. Praeterea extra paroxysmum corpus totum tactu frigidum, vix vesperti ex cibis quicquam assumere valet, & tum etiam ad incongrua magis fertur appetitus. Pallida quoque facies totiusque corporis habitus tumidus quasi & inflatus. Obambulat tamen & domestica obit negotia.

## Judicium cum consilio.

Quotidianam veram exquisitam, non secus ac quantumam, ex longis esse morbis, & ad unum, immo plures annos, trahi non nunquam, haec docet historia. Causa vero diuturnitatis inordinata omnino vivendi ratio aegrae, quae animi affectibus indulget, pulsat accepta ingerit cuncta & extra paroxysmum in liberum qualemcumque regnantem aëtem concedit. Neque enim omnis diuturnitas intermittens gravem in visceribus supponit labem: sed per ipsum febrilem motum nova semper gignitur vitiosa materia, quae quando intermissionis tempore perspiratione non excluditur & insulubri victu augetur potius, novum semper induci paroxysmum non est mirum. Jam quidem morbus in habitum quasi transisse videtur: vegeta tamen natura & corporis extra paroxysmum motus, in causa fuit, quod deterior hic usque non sequitur morbi alii. Ego quidem, rebus sic comparatis, nec obambulationem in aëre libero frigido interrumpet. Tum ad temperandos & liquandos prae in prima regione succos, salino superius descripto liquore utatur. Blandia porro laxantibus inestromum canalem expurget cumque in finem, bis octiduo, ballamias nostras pilulas deglutat. Stomachi praeterea languorem & digestionis vitium elixirio stomachali, crebrius inter cibos summo, emendet. Ad demum, tam ad promovendam cuticularem excretionem, quam compescendam successive febrilem habitualem commotionem, pulvere ex antimonio diaphoretico, cornu cervi philosophice preparato, tartaro violato & cortice chaccarillae, bis quotidie ad drachmem dimidium, per octo dies utatur. His nisi gravius quid interea acciderit, morbum rebellem, expugnari adhuc posse, speramus.

## CAPUT IV.

## De Febris intermittentibus Epidemicis anomalis mali moris.

## THESES PATHOLOGICAE.

## §. I.

Superioribus annis MDCCXXVI. XXVII. & XXVIII. plane irregulares & insolite erant, temporum ac tempestatum constitutiones, ingentes potissimum siccitates & ardores, complures menses perseverantes. Variis hinc languoribus corpora humana affligebantur, diarrhoeis, dysenteris, intermittens febribus variis, simplicibus & duplicibus, quae nulli temperamento, sexui, aut aetati parcebant. Maxime omnium vero aestate & autumnio regnabant febres, parum intermittentes plane, parum remittentes tantum, anomale & irregulares, vagum & incertum typum habentes, facile inter se mutabiles, ut plurimum infectis & gravibus symptomatibus stipatae, contagio infectae, nonnulloque per multos menses decinentes, quosdam etiam plane & medio tollentes.

## §. II.

Ambigunt quidem adhuc medici, nostri atque ac pristini avi: an intermittentes dentur malignae febres? Re tamen paulo accuratius considerata, non dubitamus affirmare: intermittentes alio tempore esse benigniores, alio utique maligniores, non secus ac alii morbi ac febres epidemicae grassantes. Nam prout variae temporum & tempestatum sunt constitutiones, magis vel minus regulares, boni & mali moris progredi & grassari morbos, iam olim noster prodidit Hippocrates. Experientia quoque stabilis atque confirmata, dari certis temporibus intermittentes, quae indolem malignam, seu virulentam, referunt, cuius indicia & quasi characteres hi sunt: si insolis symptomatibus stipatae & maxime omnium virium junctam habent prostrationem eminentiorem, si epidemicae grassantur & contagio etiam insciantur disposita corpora, sique earum ferocia exanthematibus in summa cute erumpentibus, pustulis, ulcusculis in labiis, naribus, facie, purpura, vel maculis purpureis, vel eodem scabie mitescit. Haec enim omnia exiguae molis, sed valde vehementis & virulente indolis materiam tenuissimam, ventriculo & nervosis maxime partibus inimicam atque infestam, in qua potissimum veneni ratio & natura fundata est, subsistere, & habitas feruas commotiones atque alterationes concitare, luculenter arguunt.

## §. III.

Sic febres, quae superioribus annis nostris locis, immo universae fere Germaniae, fuerunt infectae, anomale valde existimantur. In quibusdam semel uno die, in aliis bis, accessio facta. In nonnullis primis diebus comparuerunt continuae, & tertio vel quarto die in intermittentes concesserunt; in aliis vicissim primis temporibus intermissionem habuerunt, postea vero, pessimo ordine, factae sunt continuae. Aliqui eorum experti sunt per superiora, vel inferiora pituitosa & biliota dejectiones, quidam remittente, vel intermittente paroxysmo, continuo sudarunt, cum ingenti languore. Nonnulli etiam se ipsa in febre,

Ex omni  
Assumens  
functione  
in ista morbi

Maxime  
intermittentes  
signa a  
mali.

Symptoma  
ex epidemicae  
causae &  
historia.

febre, & calore, & alperre simul, conquiescent. Juniores in paroxysmo interdum valde delirant, & simul ac claudunt oculos, infortia agitant, & maleque coherencia sunt loquunt. Seniles cum somnolentia accidunt febres. Omnes vero de anno de contreflorio dolore circa ventericuli regionem, de dolore lumborum, pedum gonitio, capitis etiam, sunt conquiescent, & intermissionis tempore, de dolore ex nucha per totum spine tractum ad scapulas porrecto. Prodeuntibus demum in facie pustulis, aut in ambitu exanthematibus purpureis, si symptomata complacabantur. Et si purpura junctantur febricitantia, diutius durabat febris; si vero superveniebat alba, functum erat ut plurimum.

## §. IV.

Observatum fuit & id maxime Magdeburgi & in Ducatu Brunsvicensi, complures in una domo, non secus ac in variolis, vel morbillis fieri solet, successisse eodem morbo fuisse affectos, & praeteritum post sanguinis missionem, fortiter purgationem, febrem maxime inflante medium fluxu, multi si animi affectu immode rato commoti fuerunt, timore potissimum & tristitia.

## §. V.

Licet vero, pro diversa natura agrotantium, ratione aetatis, temperamenti, naturae magis, vel minus robustae, mitiora, vel severiora fuisse symptomata, & non nulli intra quatuordecim dies, alii intra mensem demum convalescerent, pauci tamen mortui, nisi ingenui errore medici, aut agrotantis admisso.

## PRAESERVATIO ET CURATIO.

## §. I.

Frequentes quam maxime fuerunt hae malignitatis suspitiones febres in locis paludosis, humidis & aequum stagnis irriguis; uti nostris in confinis sunt pagi Ostiae & Dieckau. Frequenter etiam infestantur eos, qui post aetatem intensius fervidam, improba victus ratione usi, vespere, aut nocte, aere humido frigido, corpus refrigerant, & praeterea immixciliores fuerunt naturae. Optimum hinc ad declinandum epidemicae hujus febres incursum fuit consilium: vitare loca humida, uda, multo minus in eis dormire, aëri injuriis sese non exponere, refrigerium omne, etiam per frigidum potum, fugere, ventriculum nec crudis, nec conspiciantibus cibis onerare, animum tranquillum servare, omniaque cum cura tenere, quae acrimoniae contemperandae, foribusque tam per poros, quam alvum leniter educendis, servantur ac laudabiles succos ingenerant. Neque tamen forti utendum purgatione, quae ab ambitu corporis succos trahendo, perspirationem minuit adeoque noxia est, tanto magis quando diarrhoea forsan & dysenteria jam circumvenit.

## §. II.

Quam vero harum febrium mali generis causa, partim in insigni dyscrasia & intemperie sanguinis & humorum, a naturali & blanda temperie deficiente, salino-sulphurea, partim etiam in humore viscoso & virulento aetate indolis, in prima regione potissimum hospitante, universum nervosarum & muscularum partium systema commoverit, consistat; eo unque prudenti consilio medicus curam dirigere debet, ut l. magis alicuius & perversum sanguinis & humorum qualitates emendandis, quae fortioribus evacuationibus utatur; II. ut placide & blandis eva-

krud. Hoffmanni Oper. Tom. II.

cuantibus tam per cutem, quam alvum, praeparatam materiam debito tempore excludat, ac III. ut congruis analepticis imbecillitas succurrat, quae demum symptomata mitegit.

## §. III.

In principio itaque, antequam medicus diglossere poterat genium morbi, pulveres diaphoretici, cum leniter nitrosis exhibiti fuerunt, in aquis diaphoreticis & analepticis hunc in modum: Recipe aquae galegae, cardui benedicti, acaciae, cerastorum nigrorum ana uncias tres, cinnamonum s. v. unciam, spiritus nicti dukis, vel liquoris anodynii mineralis guttas XX. syrapi acetositarum citri, vel papaveris rheodas q. l. Haec tam intra, quam extra paroxysmum oblata, & potui danum decoctum avenaceum, cum succo & corticibus citri, vel citium cum amygdalis in emulsionem redactum.

## §. IV.

Ad alvum solvendum profuerunt oppido chyliflues tantum domesticis, ex decocto avenaceo, nobilis Haber Græce, floribus chamomilla vulgaris, oleo amygdalarum dulcium & sile communium parati. Internus vero ad laxandam alvum, potiones ex uncis duabus vel una mannae, cum drachma una cremoris tartari, in aqua florum acaciae solutis & additis duabus guttis olei de cedro, perquam utiles fuerunt. Quibusdam etiam insulam rhabarbari cum pulvis magis conductibile deprehensum.

## §. V.

Ubi natura torpida ad movendum insalu declinante sudorem, effluvia foetidis probe sanata, non tamen adeo spirituosum, cum ananica potione liquoris anodynii & aliquot guttis spiritus olei de cedro, perquam utiles fuerunt. Quibusdam etiam insulam rhabarbari cum pulvis magis conductibile deprehensum.

## §. VI.

Quibus remediis successe fracta sunt vehementia febris, five porus virulenta ejus causae indoles. Hoc facto, si sine gravioribus symptomatibus intermiserat febris, ad eam sapendam, alia, quae e re erant accommodata & appropriata, cum debito regimine de jura methodo, in usum vocata praestitia.

## §. VII.

Fuerunt tamen, ubi mox in principio confusus medicus, qui expurgato per lenem vomitorium stomacho, & usurpato postea electuario ex cortice chinae, calcarilla, antimonio diaphoretico & alio cum julepo rosarum & syrapi acetositarum citri, facili, & explicita curatio, evaserunt; subjunctis postea, quae ad sanitatem firmam viderentur necessaria.

## CAUTELAE ET OBSERVATIONES CLINICAE.

## §. I.

In omnibus epidemicae grassantibus febribus, imprimis si insueta habeant symptomata, & motus cupisdam malignitatis sit, semper tutius medendi via, praeteritum in principio, per bezoardica fixiora & analeptica temperata, abstinendo à sanguinis missione, emetica, regimine etiam nimis calido, tam quoad lectum, quam quoad conclave, immo potum.

## §. II.

In omnibus ejusmodi morbis praestat abstinere à cibis & potum tenuissimum assumere v. g. decoctum ex radice scorzonerae & cotu cervi ulso paratum, adjecto syrapi acetositarum citri.

D 2

§. III.

Profuerunt  
diaphoretici  
ex flos de  
analeptis.

Mlanda  
santia.

Quando  
fortitudo  
suo na-  
turae.

Fracta  
fuit  
febris.

Quando  
quiescit  
in primis  
pin.

Articulus  
flos de  
scolidus  
veneris  
prostat.

Citius  
potum  
assumere.

Imagis  
in Journal.

Quando  
intermittit.

Quando  
intermittit  
hujus.

Indicatio-  
ni mordo-  
di vici.

## §. III.

*Febris et  
intermittens  
quasi fe-  
brilis.*

Si vomitus & inquietudines cum extremorum frigore urgent, consilium est eas blanda diu horre-  
fi, quam adstringentibus sedare, & utique com-  
modam hac in re præstat operam liquor noster  
anodynus rinctualis, vel cum refracta doli liquo-  
ris beozardici *Beyli*, vel aliquot gumulis olei de-  
stillati macis veri, aut tannulo extracti croci rup-  
tus. Tum etiam, ad spasmum stomachi potissi-  
mum laxandum, utile decoctum avenaceum,  
cum oleo amygdalarum dulcium & croco, libe-  
raliter potare, vel emulsione, ex aquis antispas-  
modicis cum seminibus quatuor frigidis & papa-  
veris albi, uti.

## §. IV.

*Diarrhoea  
post febrem.*

In principio si alvi fluxus sociatur, pulvis rha-  
barbari cum pulvere nitroso absorbente, vel etiam  
dosis pilularum balsamicarum, cum ejusmodi  
pulvere nitroso absorbente, aliquoties data, sum-  
mae sunt efficaciae. Siquè nimis ille urget, pulve-  
ri aliquot grana corticis chacacillæ possunt ad-  
misceri.

## §. V.

*Pulsus va-  
riatus  
intermittens.*

In intermittentibus epidemicæ grassantibus cu-  
randis id in genere notare licet, scilicet purgationes,  
per superiora æque ac inferiora parum proficere,  
ut potius noceant & gravior post eas impetat pa-  
roxysmus: lenes autem evacuationes nunquam  
non proficiunt. Quo alvus enim adstrictior est, eo  
plus incrementum cardiacæ stultitiae & inquietu-  
dines. Monendum tamen, quod in paroxysmo  
difficiliter, vel plane non, chylificæ locum inven-  
tiant, eo quod tanta plerumque fluxum in inte-  
stinis resistentia, ut nihil admittant.

## §. VI.

*Calida im-  
mota.*

Observandum etiam est, acriora & aromatica,  
essentias sudorificas alexipharmacas & calidiores  
omnia, ex simplicibus intermittentibus, duplices,  
vel continuas etiam lethales plane, effecisse, præter-  
ferim in corporibus scorbuticis & ubi materia  
exanthematica purpurea insular fermenti in ha-  
morum & sanguinis sinus delinuit.

## §. VII.

*Febris non  
transiens.*

Sanguinis missio neque præservationi, neque  
curationi harum febrium accommodata. Suffla-  
minat enim subterraneanam cuticularem excrecio-  
nem, foridum succorum hanc auget, virus magis  
exhaurit & in continuas inde transisse intermit-  
tentes prius has febres, fuit animadvertendum.

## §. VIII.

*Quid feb-  
rem  
purpuream  
accendat.*

Si purpura complicatur hæc febribus, cum co-  
pioso & foetido sudore, summo cavendum est stu-  
dio a præcalido regimine & expellentibus. Aequa-  
bilis potius caloris temperies servanda & tempe-  
rata etiam medicamina optima, ne nimis incale-  
cat & dissolvatur sanguis, nec materia expellen-  
da intus maneat, aut retrocedat profus. Hinc  
etiam febres transisse quædam resuscitantur, vel  
minimum minor, insigniter exacerbantur. Idem  
observavimus, si materia erysipelacea, cum magno  
peruræ junctæ, quod intermedium febribus acci-  
dit, ad habitum corporis præsertim pedes propu-  
lit, ad interiora recessit.

## §. IX.

*Febres in  
intermittentibus  
pericula  
vires.*

Mitigata symptomatum atrocitas, in epidemicæ  
hac febre siquè ex ea antea continua facta typica  
intermittens, superatis aliquot hujus paroxys-  
mis, de intermittentiæ leni laxante, vel emenco  
prima corporis regio expurganda, & postea in  
usum vocandus hic pulvis: recipe corticis chaca-  
cillæ, chauræ, niri purificati, antimoni diapho-  
retici lapidum cancrorum, ana drachmam unam,

de quo drachma dimidia, ter, vel quater quotidie,  
vel in aqua diapnoica, uti cardui benedicti, ga-  
legæ, fench, scorzonæ, vel etiam in electuario  
cum syrupo redacta, extra paroxysmum usurpan-  
da. Quo non modo materia febrilis virulenta pri-  
ma in viis optime corrigitur, sed & roboratio  
symplicium canaliculæ virtutem, placide per dia-  
phoretum educitur.

## §. X.

Ceterum epidemicæ hæc febres non una omni-  
bus annis incedunt facie, sed varium pro diver-  
sitate prægressæ tempestatum constitutionis exhi-  
bent genium. Hinc Medicus ad medicationem  
antemo semper accedat cum judicio necesse est.  
Quæ vero ego diversis annis observavi & utilia  
deprehendi, postlim in scriptis meis tradidi. In-  
primis aatem circa hoc argumentum evolvi po-  
terit *diagnosis, observationes practicas circa  
febres intermittentes anno MDCXCIX. graf-  
fanes, sileas, item observationes barometrico-  
meteorologica Sect. ult. de constitutione epidemi-  
ca anno MDCC.*

*Præter  
partem an-  
te dictam.  
Sedens gra-  
tiss.*

## CAPUT V.

## De Febre Semitertiana.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Inter epidemicas, quas jam exposuimus, in-  
termittentes mali moris febres, haud raro oc-  
currit, quæ ex tertiana intermittente & quotidia-  
na continua confusa, earumque ob causam Græco  
nomine *quartana*, & Latino, semitertiana vo-  
catur.

*Semitri-  
tiana quæ  
pulsus fe-  
brilis.*

## §. II.

Accedit hæc plerumque ante meridiem, cum  
frigore & horrore gravi pulsusque contracti. Suc-  
cedit postea cum pulsuum frequentia calor aliquot  
horarum, sudore eruptante tepescit, non tamen  
penitus intermittens. Incenditur potius, post re-  
frigerationem lenem, circa noctem assuit, cum  
pulsuum celeritate, & postero die lenior persi-  
stet, sine siti, donec vespere, præcedente leviori  
horripilatione, denuo ingravescit. Tertio autem  
die horro iterum impet, cum intensiore calo-  
re, eademque, ac primo die, ratione decurrit. Ut  
sic semper quidem assit febris gliscens, vespere  
ipsius exacerbatio & tertio die mane hæc cum  
rigore maxime conspicua. Vires præterea sunt  
dejectæ, appetitus languet, somnus deficit, urinae  
minguntur tenues crude, post tertianæ vero pa-  
roxysmum crasse & tinctæ, expiuntur cum  
nulli pauca cruda, & dorsi, nec non abdominis  
dolor haud raro jungitur, cum hujus immensitas.  
Plurimi accedente tertianæ paroxysmo nau-  
sea premuntur & cardiacia, quidam vomunt  
plane, nonnulli animi defectum patiuntur, alii  
delirant profus.

*Quartana  
incidit.*

## §. III.

Ignota fere nobis hæc est febris & plerum-  
que intermittens malignam esse putant. Sed  
multum ab hac utique discrepat, quam neque  
contagiosa sit, neque exanthematicam superet,  
neque etiam tam enormi virium prostratione, &  
præterea peculiarem tertio quovis die cum horro-  
re habeat conspicuam exacerbationem.

*Præter  
partem ab  
intermittentibus  
vires multæ  
græ.*

## §. IV.



## §. IV.

Tertiana  
antiqua.

Alii eam cum tertiana continua permixta, perperam putant: hæc enim secus ac semitertiana, tertio tantum die, non vero vespere simul ingravescit, neque tota continua est, sed licet primum continuo calore impetatur, tertio tamen ut plurimum die vehementiam ponit, ac in tertianam intermittentem transit.

## §. V.

Diximus  
duplex.

Neque etiam cum tertiana duplici confundenda est semitertiana: licet enim illa quovis etiam die accedat, insulsa tamen alternatim sibi responderet & febris ipsa perfecte intermitteret. In hac autem nulla plane intermissio, sed tantum remissio, vespertina quotidie paroxysmus & tertio semper die duplex.

## §. VI.

Composita  
causa ex  
mefenterio.

Composita igitur ex duplici febre est hemitertiana febris, ideoque duplex omnino erit ipsius focus, causa duplex. Nimirum continue ridus in mefenterio, ex intercepto per ipsius compagem transitu sanguinis ejusdemque hinc in convulsis tunicis nervosis oborta inflammatoria flasi. Ille autem alternis diebus accedens paroxysmus gravior, non secus ac ipsa tertiana, sedem ac causam habet in intestinis, maximeque duodeno. In cupa flexuosa cavo, ex glandulis, hepate & pancreate, lymphatici & biliosi, ob mefenterii vinum pariter viscosi humores, nec non ex stomacho crudi succi, confluxus, minorem conficiunt morbosam, quæ sanguini intus & ad nervosæ spinæ membranas delata, motum inducit præternaturalem febrialem.

## §. VII.

Quilibet  
ex  
causis  
ant.

Intra ea vero, quæ febri huic ignigende apta, communeranda omnia, quæ succos spissos & impuros reddunt, primarique potissimum regionem atque mefenterii vasa torbida opplent. Eveniunt hinc quam maxime illi, qui salubris vite rationis incuriosi, cibos dulces, acidos & fermentescibiles, farinaceos cum butyro, saccharo & ovis fructus, ingerunt, vinum otiosum colunt & nimis sedentarii, parcius iusto bibere solent, vel vina dulcissima amant & animi affectibus, præsertim tristitiæ, indulgent. Ex facili etiam eas incurunt, qui brevi ex morbo convalescant, alvum habent strictam, qui crebrius utuntur purgantibus drastice, quibus etiam hæmorrhoides, vel menfes suppressi. Autumnus, qui scrox febrium perniciosarum, propter varietatem & inæqualitatem perpirationi saluberrimæ valde inimicam, præterea frequentior, quam aliis anni temporibus. Et haud raro accidit illis, qui corpori æstuanti frigidum ingerunt potum, aut sudantes in locum frigidum humidum concedunt.

## §. VIII.

Quilibet  
etiam  
regio  
nervorum  
mefenterii.

In quibusdam quoque regionibus frequenter magis esse observatur. De Italia testatur hoc cum Galenus, Spigelius atque Baglivi. Et certe regnans ibi interdiu æstus acris recrementa gignit multa, frigidior noctu aura horum exclusionem impedit, & frigidum, quem amant vel injecta glacie incolæ purant, potus facit, ut subsistant in mefenterio, ubi minor resistentia & languidior progressus, succi, stasini concipiunt inflammatorium & sic febris continua, intermittens vero à succo corrupto ex mefenterio ad intestina delapsa, gignatur. Idem evenit in Hungaria, ubi eadem cæli conditio & præterea usia vinorum dulcium spirituosorum liberior, hanc febrem frequentissime accendit.

Id. Hoffmanni Oper. Tom. II.

## §. IX.

Quia igitur semitertiana hæc febris, præter communem intermittentem prima in regione mefenterii, fundamentum habet inflammationem & indolem continuam, ut nec symptomatum adfuit magna remissio, nec ad vires reparandas sparius, admodum anceps & intermittens simplici longæ est periculosa.

## §. X.

Præcipis etiam hanc ob causam est decursus, & plerumque nono, aut decimo tertio die finit æstus, vel in salutem, vel transitu in alium morbum facto, vel etiam in mortem.

## §. XI.

Ubi longius extrahitur, aut in suppurationem inflammatio, & morbus in heclicam potissimum, vel lentam febrem concedit, aut si firmior in mefenterio obstruatur, in hydropem, aut, rarius tamen, oppleta nimium sordibus prima regione, in intermittente simplici quandoque, quandoque duplicem.

## §. XII.

Quando vero non modo declinante paroxysmo, sudor erumpit, sed & septimo critico die, aut post eum alvus turbatur & fluxus oboritur vel biliosus ac purulentus, vel etiam cruentus plane, bonum & morbi solutionem nunciat. Vel si etiam dolores in ventre accrescant, certis plerumque horis ingravescentes accidunt, iidem discutiunt morbus, aut subsequente postea diarrhoea saniosa & purulenta, aut sanguine copioso nigro ecedente, solvitur.

## §. XIII.

Contra ea, quando nihil horum evenit, sed potius ardor circa præcordia, tensio & dolor in tota ventriculi regione, vomitus, singultus, inquietudo, iustatio & tremor manuum, æstus, vertigines, malum præbent omen & inflammationem latius ad ipsum quoque ventriculum se posse produnt.

## §. XIV.

Qui semitertiana decedunt, sub accessione gravioris paroxysmi, tertianæ typum servant, succumbunt, inflammationis late diffusa & in putredinem conversa. Quam etiam mortis causam Spigelius & semper invenisse testatur. lib. de semitertiana. cap. XIV. diuersis verbis scribens: quousque necum repero, qua in dissectionibus mortuorum à semitertiana observavi, toties nil aliud potui agnoscere, quam putredines semper in vasis constitisse. Erant enim in dissectionibus cadaveribus inflammationes, ex sanguine bilioso & pi uloso facta, circa jecoris cavam portam; in ventriculo, intestinis, tam crassi, quam tenuibus, mefenterio, omento, lie. & & sapui in una parium commemoratarum, aut pluribus, aliquando etiam in omnibus, quæ celeris moris causa erant, supererant gangrena, vel sibi celo alicui loco, etiam quandoque exigua esset, partium prædilectum.

## CURATIO.

## §. I.

Duplici potissimum fundamento semitertianis medendi methodus nititur. I. ut inflammatoria in mefenterio & intestinalibus tunicis hærens flasi, vite periculum intentans, promte vel discutiatur, vel, ne latius serpat, impediatur. II. ut materia febris, quæ intermitit, corrigatur & placide evacuetur, servando simul motum circorum rationem.

## §. II.

*Inflam-*  
*ma- tis*  
*quibus*  
*difficili-*  
*ter*  
*curatur.*  
Ad primum obtinendum egregie proficiunt pulveres diaphoretici, leniter narcotici, parca, sed crebriores manu dati. Formula esse poterit hæc: Recipe cerussæ, animonii, matris perlarum, lapidum cancorum ana drachmam, solutionis oculorum cancri, niri depurati ana drachmam semis. M. F. pulvis, de quo tribus quibusvis horis quindécim grana propinari possunt cum decocto ex radicis scorzonerae uncia duabus, rasuræ cornu cervi uncia, passularum minorum tantundem, radicis cichorei uncia semis, in quantum aque mensuris per horæ dimidium coctis. Idem præstant mixturæ resolventes & diaphoreticæ, ex aquis diapnoicis & analepticis, liliolum convallium, galegæ, cardui benedicti, scorzonerae, ceraforum nigrorum, cum aceto destillato, lapidum cancorum, animonio diaphoretico, mixtura simplicis & syrupo cardui benedicti, semis singulis horis, ad unum vel alterum cochlear exhibitis.

## §. III.

*alvus &*  
*feces quæ*  
*modò imp-*  
*vetur.*  
His contemperantur etiam & diluantur primæ regionis fordes interminenter facientes, ad quas dein expurgantur omnium opima, soluta manna cum cremore tartari, nec non rhabarbarum cum pulvis & salis polychrestis portione. Quippe quæ sine sanguinis commotione, sine stimulo nervosorum parvum, sine virium dejectione, intestinum canalem & evacuant & ad mesenterii quoque infarctum expediendum multum conferunt. Conducunt tamen etiam pilulæ balsamicæ, ex amaris extractis, gummatibus resinosis balsamicis & aloë rube depurata, cum pulvere præcipitante nitrofo, moderate, sed frequentius usurpantur. Si etiam subtiliores fordes per cutis poros aucta perspiratione evehendæ, essentia cordii, cum equali liquoris anodynini mineralis parte rupta, tucissima pariter & efficacissima.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

*Abstin-*  
*entia ingi-*  
*stenda.*  
Omnis medicatio ita instituenda, ne unquam morui critico salutari obstit, sed eundem potius deficientem juvet & excedentem moderetur.

## §. II.

*Purgan-*  
*tia muci.*  
Hinc purgantia propinare, tanto magis in principio, admodum perniciosum. Exagitant enim inde materia nondum præparata, inflammatio augeatur & morbus ad funestum cinum eventum disponatur.

## §. III.

*Alvus sal-*  
*na danti-*  
*sa.*  
Ipsa salina deterfiva, per se data, in hac febree locum non inveniunt, præsertim in majori dosi, excepto nitro antimoniano, cui recte multum denulit *Boglivus*, cum sale polychrestis. Habent enim viam aperitivam, diureticam leniterque laxantem, & commodissime ad grana XV. in sufficiente quantitate decocti interitum dantur.

## §. IV.

*Alvus cy-*  
*stica di-*  
*stema*  
*quædam*  
Si tamen febris hæc invadit alvo clausa, vel etiam sub ipsa hæc stringitur diutius, clystere tantum, ex pægoricis & emollientibus, seminibusque carminativis cum sapone Veneto, ductenda: quo à copia excrementorum liberetur primæ viæ. Hoc enim si negligitur, per superiora natura viam affectat & vomitum movet, præsertim ubi bile acris biliosi in hepate ductus turgent.

## §. V.

*Declin-*  
*antia*  
*febris in*  
*curatur.*  
Declinante autem jam febre, naturæ dectui, quæ sæpe eandem alvi fluxu solvit, infundenda, & superius dicta laxantia & pilulæ balsamicæ commodissime usurpantur.

## §. VI.

*Emeti-*  
*cæ*  
*causa dan-*  
*da.*  
In emeticis propinandis maxime cautus sit medicus, ne vomitum & singultum pronet, vel stomachum ad inflammationem disponat. Si vero materia per superius os exturbanda ipsique natura eo tendat, ponat aquæ tepidæ cum sale, aut lenissimo stimulo antimoniano, satisfacit.

## §. VII.

*Febris*  
*in*  
*curatur*  
Sanguinis missio non facile locum habet in hac febre, nisi eminens plethora, urgens æstus, in corpore agili adhuc & criticarum hæmorrhagiarum suppressione affecto. Tum unico pernecessaria ad lethalem inflammationem interituum præcavendam. Sed in principio statim adhibenda, & quo citius fulguratur sanguis, eo expeditius succedit sanatio.

## §. VIII.

*Febris*  
*in*  
*curatur*  
Vitanda dein omnia calida, essentia alexipharmacæ & tincturæ bezoardicæ, ipsum quoque regimen æstuosum & ponat copiosius cadidus. Aëstus enim inde magis accenditur, criticus minere morbi per intestina effluxus turbatur, & vires inter largos sudores dissipantur.

## §. IX.

*Alvus*  
*in*  
*curatur*  
Pulveres quoque adstringentes, nimium fici, teraci, testacei omittantur his in febribus, nec non cortex chinæ. Observavit enim jam *Boglivus* præf. pag. 51. iustum vel inflammationes lethales, vel lentas & hæclicas febres fuisse inducitas.

## §. X.

*Termin-*  
*antia*  
*quædam*  
*in*  
*curatur*  
Si etiam dolor in abdomine exquisitus urget, vel crebriores quoque dejectiones adinstent, abstinentur tamen sedantibus. Exterius tantum succurrendum linimentis spiritibus roborantibus, abdomini illitis, & interius diaphoreticis tumulus componendus.

## §. XI.

*Ponit*  
*quædam*  
Ponit ordinario egregie servit decoctum sub curatione commendatum, nec non decoctum avenæ sic parandum: recipe avenæ mundæ locæ libram, radicis cichorei, fursaparillæ, scorzonera ana unciam, florum papaveris thoracis pugillus sex, niri antimoniani unciam semis, adde foborum scabiosæ manipulum dimidium, niri puri drachmas duas, coque in quinque mensuris aquæ communis ad consumptionem tertie partis, dulcificetur syrupo cardui benedicti, vel papaveris extracti, vel etiam acetosatis citri.

## §. XII.

*Chamom-*  
*illa*  
*in*  
*curatur*  
Admodum præterea proficuum hac in febre deprehendi decoctum florum chamomillæ & fursaparillæ millefolii, vel etiam confecta ex ipsis extracta. Spasmos enim, inprimis hystricos, sæpe complicatos tuto leniunt, simulque propter amaritatem, singularem toticam antifebrilem possident virtutem.

## §. XIII.

*Alvus*  
*in*  
*curatur*  
Quum vero vix ulla febris æque facile redeat ac semitertiana, post eam in diæta & viæ regime cum cura vitanda utique omnia, quæ superius in causarum præcautionem numerum retulimus. Temperata tenenda omnia, alvi beneficium clementioribus servandum, crudus proventus stomachicus præciudendus, & quod maximum, perspiratio succedens cuncti modo custodiendus. Recidivæ enim, uti omnium febrilium,

brum, sic etiam hemeritiae, longe deterioris, magisque refractariae sunt indolis, ac primis moribus.

## §. XIV.

Hæc sunt generalia naturæ ductui de ratione initia medendi præcepta, quibus observari, curatio recte adornanda & ex voto etiam perficienda. Individualem autem & specialissimam methodum, medici suggerat iudicium, quo pro diversitate circumstantiarum, ac morbi historia agnoscendarum, ordinem, dosim, tempus & usum remedium, perite disponat ac dirigat. Quamque eandem omnino sint, quæ in medicatione intermittentium continuarum, quotidianæ, tertianæ & quartanæ, præcipi solent ac possunt, eadem in his etiam tenenda serio inculco, & de iis peculiarem tractationem insinuare supervacaneum duco.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Emetico-  
na curatio.

Virgo nobilis viginti annorum, tenerior, vires sedentariæ de deliciis in victu impendius addicta, acetaria, fructus horarum, dulcia & lacticia crebrius assumentia, autumno incipiente, quum jam per aliquot hebdomadas alto laborasset fluore, corpusque motu exaltatum frigidiori nocturno aëri exposuisset, primum expesta est languorem universi corporis, dorsi & capitis dolorem. Mane post successit horror cum a vietate magna, nausea, vomendique de desidendi stimulo, quem excepit æstus, pulsus celeri, exiguo, & cuni arida stiparum. Miescebat tamen cune demum maderescere, sed vesperi iterum, post levem frigoris sensum, ingravescebat. Die post meliuscule habebat & urina secedebat cruda, tenuis, febriculam autem nihilò fecius adesse, calor quem perientiebat interius de os sicum aridum probebat. Post meridiem etiam increbescere febris & altero die mane cum horrore novus accedebat insulsa, eodem modo, ut primus, incedens atque decurrens. Alternatim hæc ad diem usque septimum persistebant, quo in abdomine oriebatur tumura, inflatio ventris de hypochondriorum tensio, & sequebatur plus quam decem dejectiones mucide & morficantes. Fluebat sic alvus ultra decimum quartum diem, agra, inprimis noctu, mirum languebat, exteriora magis frigeant & algebant, interiora vero calebant accedebatque tussis agram violentem excitans, cum somni & appetitus destitutu. Medicus, quod à principio fecerat, insillibat absorberent, refrigerantium nitroforum usu perpetuo; nolebant autem parhemata cedere, sed potius cum venenali inflantione cardiologica augebantur. Postulari igitur meo consilio, dedi mixturam hanc diaphoreticam: recipe aque libellorum convallium, scorzonæ, cerasorum nigrorum ana unciam unam semis, theriacalis cum vino unciam, lapidum cancrorum, animonii diaphoretici, dialcordii Fracastorii ana drachmam semis, mixturæ simplicia gulas XXX. Syrupi cardui benedicti, quantum laus. M. Qua bibitoria quovis ad tria cochlearia daret, dejectiones pauciores factæ & curis calido madore persusa. Insulsum etiam theiforme ex veronica, scabiosa floribus chamomillæ vulgaris & semine anisi ponum, & loco ordinarii potus, decoctum cornu cervi & hordei citratorum. Cum quo subinde assiduum pulvis, ex solo animonio diaphoretico & lapidibus cancrorum, addita solutione oculorum cancri de pauxillo niri. His intra duas hebdoma-

des symptomata, tussis, alvi crebrior dejectio, virium labes, assidua vigilia & interius æstus, sublata. Quum vero minus esset febris lenis, ob gliscientem diuinis internum calorem, periclitum post passum, ad præciscendum hanc datæ pilulæ nostræ balsamicæ, cum pulvere sulino aperiente & elixirum nostrum stomachale, felici pariter cum successu.

## F. tertio.

Febris hæc exacte servavit semitertianæ typum & septimo etiam die saluarem habuit excretionem per alvum. Interim tamen semper etiam in hac febre ratio habenda cuticularis excretionis. Perperam igitur à primo medico crebriori refrigerantium & nitroforum usu putipatio fuit impedita motuque humorum ad urethra conversus, ex quo omnia parhemata. Mixtura autem leniter sudorifera ad superficiem corporis succos egit, hincque egregie profecit.

## OBSERVATIO II.

Generosa forma quadragenaria, tenebra, mobilis valde atque sensibilibus, purpure præterea autumno ab aliquot annis obnoxa, post corporis refrigerationem & animi commotionem, superiori anno, vesperi horripilatione, capitis de dorsi dolore corripiebant, succedente æstu sedecim fere horarum. Vix inde septem aut octo elapsis erat horæ, quum gravis tunc creter horror cum præcordiorum anxietate, vomendi conatu & virium prostratione, qui paroxysmus cum subséquente æstu ad viginti fere horas produrabatur. Superato hoc, melius quidem habebat, dormiebat etiam, sed exactis vix sex horis, denovo extremorum eveniebat refrigeratio, cum anxio æstu magisque debilitate, vehementia tamen symptomatum non tam gravi, nec vomendi conatu. Vocabar in consilium, semitertianam agnoscebam, sed ob notam mihi ægræ dispositionem purpure, hanc simul subesse fluxum conjiciebam, inprimis quam insignis præsto esset pectoris angustia & oppressio. Injunctus igitur primo clyster & post hunc ad expellendum purpuræ materiam, hanc ante paroxysmum de remittente eo, ad aliquot cochlearia portæ anisuram: recipe aque cardui benedicti, galegæ, scorzonæ, florum sambuci ana uncias duas, aceti de stillati unciam, lapidum cancrorum, animonii diaphoretici ana scrupulos duos, cinnabaris scrupulum unum, si ritus niri dulcis, mixturæ simplicia ana gulas XXX. Syrupi cardui benedicti drachmas duas. M. Hinc quidem symptomatum atrociam mitigata, febris tamen persistit adhuc, & vesperi, & altero die, servabat incurfionem, & accedebat præterea abdominis dolor cum alvi adstrictione summaque anxietate. Indicis hoc mihi fuit visciditas & biliositas multas fordes primis hospitari in vis, eoque indultus, quasi, ut remittente paroxysmo, decem ex pilulis nostris balsamicis, cum dosi pulveris absorberent nieri sumeret, & præterea elixirum nostrum viscerali in decocto pro potu crebrius uinceretur. Sequens inde placida alvi solutio, & continuatus iidem remedia per aliquot dies, serenissimæ secesserunt feces pariterque copiosæ. Hoc facto, mixtura superius dicta iterum uti parata, nec non pulveres bezoardici, cum pauxillo pulveris corticis chaceastillæ. Sic demum molestus in universo corpore obortus pruritus, purpura cessavit, urina sedimendum posuit, ac intra tredecim dies febris discessit & postea vires etiam recuperatae.

Semitertianæ cum  
purpure  
fluxu.

## Epidemia.

In omnibus fere morbis epidemicis complicata fuisse solet quædam materia exanthematica, quæ ad habitum corporis, sub macularum, vel aliarum efflorescentiarum forma propulsa, febris, quæ prælo est, insigniter mitigatur; non fallaci testimonio, eandem ante ab acri subtili humore oriam fuisse. In hac vero historia commemorabile, quod materia scorbutica salino-acris in corpore delinquent, non statim à mœnura sudorifera ad cutis extrema fuerit expulsa, sed tum demum, quum natura arte adjuva à sordium fascina peccatam liberasset regionem.

## OBSERVATIO III.

*Genitrix  
in dyfent  
ria fuit  
fca.*

Quum anno 1806ccxxvii. autumno incipiente, circumiter dyfenteria, concessit in villam suam vir quinquagenarius, robustus, pletoricus, cibis duris ac salis cum vini potu affluens. Eo delatus, plurimos ex villicis maligno hoc fluxu decumbere percepit. Hinc terrore percussus est haud levi. Bene tamen præstiti & bilis, in homo etiam post prandium deambulavit, leviter tantum vestitus, licet aër regnaret frigidissimus. Vespere horrore cepit ac frigore, torminibusque ventris affligi cum æstu, qui per totam fere noctem persistit. Mane post misit, qui medicum vocaret, intra vero novum expertus est frigiditatem accessum, cum nausea, anxietate & ventris tensione, subsequente calore. Medicus epidemicam hæm fuisse rana, ad prædicendum ipsius somitem, purgans dedit pharmacum. Quo vel quinquagesies deprecit cum acerbis torminibus æger, alvumque in latriva, torrenti domum alium superstructa deponens, ad ventrem frigis incassum admisit. Accessit hinc magis febris, altemis semper diebus gravior, alvus perpetuo fluxit cruenta, detum cadaverosi fetoris, somnus perit, æger de ardore interno conquisit, corpus pestare de delirare corpi, donec sexto morbi die convulsus periret.

## Epidemia.

Est hæc febris dyfenterica inflammatoria, semiteriana typum habens, inducta à terrore, crudis primarum viarum, refrigeratione & purgante, neomirum, conspirantibus tam multis causis, brevi in funestum morbum fuisse adductum hominem sanum æque robustum. Hæc vero quam maxime proficua fuisset sanguinis missio, quam in dyfenterico morbo mirifice commendat Sydenhamus, Botallus, Amatus Lusitanus, cum aliis. Et hæc sola, adjunctis medicamentis diaphoreticis, leviter nitrosis, inflammationem discuti, sphacelum arceri, & firmum alias virum servari potuisse, ego quædam arboror.

## OBSERVATIO IV.

*Senilis  
na ista  
agris.*

Quadragenarius vir, tenerioris & biliosæ constitutionis multum delectatur dulcibus, & in prandio, loco vini, subinde sumens aquam sic dictam viræ, janoque ante annum ictericus, incidit autumno in semiterianam cum magna debilitate, occipitis dolore, siti, calore, ciborum nausea & crebrioribus ventris torminibus. Sæpe die solvitur alvus & per aliquot dies largitur fluxum, siccique mincebat. Nihil minus medicus ad sistendum fluxum exhibebat pulverem, cum terra catechu, quo confudit. Sed factus æger ictericus, flavescens per totum corpus colore diluto, alvus oblipua, excrementa alba, urina

nigra & oleaginosa. Interim sub ictericia hæc priora symptomata cessarunt omnia, redierunt appetitus cum viribus. Icterus etiam discussus pulvere rhabarbari cum speciebus discitaret & si quore aperitivo, ex sale tartari, terra filiana tartari & urano duplicem, composid. Sicque æger positus convalescit.

## Epidemia.

Orta procul dubio hæc febris à copiosa fordibus biliosis stagnantibus & postea ad inelina delatis, quarum affluxu cum pulvere adstiterent ad incruentum repulso, ictericia supervenit. Adfluxum hinc veritas efflat Hippocr. 1. & 2. 1. icteritiam febri succedentem, cum lipe tollere.

## CAPUT VI.

## De Febre Catarrhali Benigna.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

EX febribus lymphaticis & serosis est excutienda nunc catarrhalis, in qua motu sordium & fluidorum adacto, serum, ob perspirationem interceptam, superfluum & impurum, per glandulosa, faucium præstitum, narium & bronchiorum organa, crine quasi & salutariter ejicitur.

## §. II.

Incipit hæc, vesperi ut plurimum, cum cutis *æris afflu* inchoet ictericia, extremorum, imprimis pedum & plantarum refrigeratione, alvi fœcitate, stimulo ad mixendum, sed parco mictu, capitis debilitate, languore universi corporis & appetitu adactulo, quali spurio, nec non siti, difficili deglutitione, stimulo in larynge, narium, & faucium calore, siquinar stertitatio, pectoris gravitas, & calor circa noctem cum pulsi celeri auctiori, tussis violenta, cum coryza, ardore faucium, somno inquieto, mane sudor, gravitas & corpor totius corporis appetitueque prostrano.

## §. III.

Immediata horum pathematum causa est *sc-cassa im* rum, seu lymphæ, aeris caustica, in rucis glandulosis subsistens, eademque inflammans, cum dolore, tumore & rubore. Contingit hoc in tota narium, palati & faucium regione, tota etiam arteria aspera, cum ramis bronchialibus, cum in mo i fo orophago, ventericulo & intestinis. Has enim simul affectas esse partes, naucedo, tussis, siccitas materis viscide, stertitatio, pectoris gravitas, item nausea, quandoque in vomitum erumpens, ardor in præcordiis, tormina ventris, & subliquens salutaris alvi fluxus, testantur.

## §. IV.

Hanc autem feri subsistentiam inducit potissimum interceptus perspirationis successus. Hinc enim est, quod vere & autumno, æquinoctiis tempore, frequentissimas hæc febres incurras. Tum quippe maxima tempestarum vicissitudo, ex calido in frigidum, siccum in humidum & vice versa, tam varie corporis corticem afficitur succedat ibi evacuatio graviter nausæ.

## §. V.

Eandem ob causam catarrhi frequentissime accidunt iis, qui subito aerem mutant, ex calido loco in frigidum, vel ex frigido in humidum condecunt; qui corpus autumnali, vel nocturno frigido humi-

*sub aëre  
mutantur.*

humido aëri incautus committunt; qui vestitum hybernum vere cito nimis deponunt, vel autumnum serius reuertunt; qui etiam aquinoctio sanguinis missionem passi, vel alias criticam largam hemorrhamiam expecti, improvide in aërem liberum frigidissimum se conferunt.

## §. VI.

Neque alia subeli ratio, quod corpora spongiola, laxa, phlegmatica de sanguine, infantes, pueri ac feminae, longe frequentius febri catarrhali patiantur, quam adulti, viri, strictioris magisque biliosae constitutionis; quod etiam magis eadem afficiantur, qui vigiliis indulgent, crapulam & stantur, vinoque aut vini spiritu corpus exaltantes, humidiori & frigidiori aëri postea illud exponunt.

## §. VII.

In iis quoque, qui post crustam lacteam & lincent capiti, nec non scabiem prepolere siccatam, post incuriosum, aut mala medicatione exceptam coryzam & ruffum, febrem incurunt catarrhalem; nulla utique alia potest fuggeri causa, quam repulsum ex aëribus corporis ad interiora serum acre & rodens, inflammationi inducendae aptum.

## §. VIII.

Non tamen dubitandum, quin quandoque in aëre hostitetur subtilis caustica ejusmodi materia, quae insi irascit hausta, locis, quae pertransit, glandulosi, tunc insinuat, eademque dolore, tumore & rubore afficit & febrem accendit catarrhalem. Prona certe ejusmodi aeris mactricis periculis vere incute, quo liquecente nive & regelata placie, solum aqua mundatur effusa, quae passim flagrans & putrescens, noxia in aërem mittit effluvia multa. Quo etiam fit, ut febres haec tum ut plurimum sint epidemicae & plures uno tempore invadant.

## §. IX.

Quod autem catarrhi & catarrhales febres contrarios etiam sint & alios propinquos atque dispositos contagio afficiant, eam utique fit ob causam, quod lymphae postissimum vino debentur, eodem modo ac novum est, omnes qui contagio propagantur morbi, lymphae corruptionem, vagi resistentiam, vel putredinem, habere causam.

## §. X.

Sic incedit & generatur catarrhalis febris benigna, & haec quae novit, ex facili eandem distinguere poterit ab aliis quoniam accedentibus febrium paroxysmis, lenta, hebetica, quotidiana, tertiana duplici & quatuor triplici.

## §. XI.

Facili etiam ideoque distinctim perspiciet inter illas glandulosarum in faucibus & naribus tunicarum afflictiones, quae ex hae ventrea & scorbutum, & quae ex catarrho eventuant. In illis enim sola erosio & ulceratio, à materia caustica lymphatico-ferosa, sine febre; in hac vero, praeter atrofionem, inflammationem quid subest, ex subiliori sanguinis parte statim concipiente, cum febre.

## §. XII.

Obvia quoque erit differentia, inter catarrhalem, & tam febrem, quae rheumatismo accedit. Quum in illa tunica glandulosa interna afficiantur & excretio sublequatur; in hac autem externa musculorum tunica patiantur & morbus evacuatione critica non solvatur.

## §. XIII.

Paulo difficilior autem benigna discernitur à

maligna, ingrimis ab initio; ob plurima, quae ambae communita habent symptomata. In eo tamen differentia, quod haec, secus ac illa, ingentem & subitum inferat visum prostrationem, cum vigilia perpetua, quam mentis turbatio sequitur, quod contagiosa magis sit & plerumque etiam petechiae & maculae habeat junctas, uti pluribus infra dicetur.

## §. XIV.

Ceterum, quo major sanguinis & feri impu copia, eo graviora adhibere pathemata coque diutius trahitur morbus, uti potissimum obvium est in feeburicis, nec non ubi purpure materia intra delitescit.

## §. XV.

In hypochondriacis, praeter diurnurnassem, ob labefactum ventriculi & intestinorum sonum & proclivitate ad spasticas stricturas & flatulentias, gravia varia jungi solent pathemata, anxietas praecordiorum imprimis, spirandi angustia & inquietudo, cum inflativo & pressorio in hypogastrio dolore.

## §. XVI.

Qui sanguine abundans, intemperanter vivunt, vina non adeo bonae notae largius potant & acidia falsis cibis delectantur, majorem circa vesperam experiantur ardorem & tussim siccam ferientiam, cum somno inquietum.

## §. XVII.

Neque minus feminae, quae terrore, vel alia ex causa mensium suppressione laborant, magnas in hac febre experiantur praecordiorum anxietates, intercurrentibus psychodiamia, uni erit corporis notabilem debilitatem & alternantem frigoris & caloris in cute sensum, quae noctu potissimum ingravescent.

## §. XVIII.

Per se tamen haec febris benigna omnino est, & omni periculo, si dextere in medicatione excipitur, vacat, & intra septem, aut quatuordecim dies, ut plurimum discedit, omni lassitudine subleata. Quin aliae etiam capitis passionibus, cephalalgia imprimis & hemicrania, succedente catarrho & naribus bene flumibus, optime solvantur.

## §. XIX.

Solvitur saepe in principio statim aucta perspiratione per sudorem. In aliis potius aliquot dierum dies, vel copioso iterata materiae viscidæ, vel liberali feri mucosi è naribus stillicidio. In quibusdam etiam per crebras alvi dejectiones & in nullis, quando urina tenuis atque de parca, larga nunc manat & pondere gravis, ut minimum duplo majorem materiae solidae quantitatem continet, ac in naturali statu.

## PRESERVATIO ET CURATIO.

## §. I.

Quod igitur ad accendendam catarrhalem insulturni atinet, vitanda insculturna omnia, quibus indurci eisdem supra dixi, & si adeo, ut vere & autumnum, tempelive sanguis mittatur, modicus cibus sumatur, perspiratio custodiantur & corpus subinde motu exercentur. In iis autem, qui laxioris humidioris naturae ac aetate juvenes sunt, & ob id, notant jam Hippocrate Stet. VI. ap. 2. frequentius exercentur catarrhalibus defluxionibus & rheumaticis afflictibus; ego multoties cum fructu usus sum hac methodo, quae praecipi, ut per quaedragiona dies decoctum ex radice chire, liliaparillae, corioe ligni lassiferae, cum passulis & pauco cinnamomo, biberent, ac interea ex cibus nihil

fumerent præter carnem assatam, cum amygdalis tosta & pane bis cocto, simul etiam aliquoties ad alvum subducendam uterentur prisana mannata, demum finita hac cura, elixir thornachale, ad XXX. guttas, cum aqua & vino, quotidie ante prandium usurpent.

## §. II.

*Indicatio  
medicamentorum*

Medicatio dein catarrhalium febrium, triplicem hunc sibi præfixum habet scopum: I. ut acrimonia illa salina acris lymphæ abundatur ac temperetur; II. ut perspiratio turbata, quæ primaria congelationis ferossæ ad interiora causâ, promoveatur ac in ordinem iterum redigatur; III. ut in fine excretio mucii viscidæ crassæ promoveatur, ejusdemque ulterior generatio impediretur.

## §. III.

*Acridinitas  
quædam  
temporaria*

Acridinem contemperant, præter pulveres sic dictos bezoardicos absorbentes, humectantia omnia & oleosa, insular omnium oleum amygdalarum dulcium, dein sperma ceti, butyrum rubrum, lac, cremor lactis, emulsiones ex amygdalis, vel pincis, cum semine papaveris albi, decoctum avenaceum, raparum, hordes, juscula caponum, gallinarum, cum vitello ovi. Ex dulcibus liquiritia, ejus infusum, essentia & succus Hispanicus, ficus quoque & passulæ. Si subtilis nimis & rodens est acrimonia, leniora anodyna locum habent, inter quæ alius palmam præcipiunt papaveracea, croci, item pilulæ *Wildegenii*, diacodium *Montani*, pilulæ de styrace, quarum compositio & usus antiquissimus patet ex probata est, ut patet ex *Tralliani lib. V. pag. 247.*

## §. IV.

*Perforatio  
pulvis  
veronica*

Ad excretionem, præsertim omnium saluberrimam cuticularem, faciunt infusa calida theformia, ex herba veronice, hyssopi, radice liquiritiæ, floribus sambuci, papaveris rhœadæ & semine fœniculi. Proficui etiam sunt pulveres diaphoretici fixiores, imprimis cum aqua diaphoreticæ & antispasmodicæ luncti. Nihil quoque ad purgationem ferri per cuticulam utilius ipsa exercitatione & motione corporis, quæ ab *Hippocrate lib. de interna. §. IV.* item de vitæ acut. §. 67. mirifice ad sudorem efficiendum, manè post frictionem, commendatur.

## §. V.

*Mucus  
quidam  
eductorius,  
fœniculus*

Educendæ demum, quæ resistit materię leni, ex facium glanduloso peristromate, servantur pectoralia, ficus & passulæ, cum spiritu vini acenis & in syrupum quasi redactæ, balsamum pectorale *Melbomii*, item elixir pectorale, ex gummi ammoniaco, myrrha, radice liquiritiæ, emulsi, croci, benzoe & oleo anisi, cujus resolvens virtus ad intra enclausa tartari, vel spiritui salis ammoniaci vinoso, adhuc potest intendi. Ad fundendam autem flagrantem in narium cavitatibus pituitam, nihil præstantius sale volatili salis ammoniaci sicco, cum aliquot guttulis olei majoranæ puri, non fordidæ nec adulteratæ, essentificatio, crebrius naribus admo.

## §. VI.

*Ammoniacum  
medicamentum*

De applicatione horum remedium id in genere tenendum: quod matutino tempore expediat perspirationem promovere post infusorum ex herbis calidiorum, nec non jusculorum & usu pulverum temperantium bezoardicorum; circa noctem vero anodyna & demulcentia dare. Specialis autem medendi methodus, partim in symptomatum mitigatione, partim etiam in oblatione medicamentorum, ratione dolens & ordinis, consistit, & ad individua corporum dispositionem

est accomodanda, de qua potiora in subjungendis nunc monitis practici trademus.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

Sicuti omnis febrilis æstus, ita etiam catarrhalis, lenissime & placide tractandus est, æger quoque in moderato calore lecti de hypocausti semper servandus. Exulere igitur omnia commoveria calidiora & validiora, una cum regimine æstuoso, eo quod materiam acrem magis exagitant, calorem adaugent & æstusum paribus diathesin conciliant. Vincunt vero vicillim omnia refrigerantia, acida & quæcunque perspirationem turbant. Oportet etiam de theoricacalia causæ in usum vocetur, tanto magis si caput debile & grave, si ætas senilis & alvus adstricta.

*Febris  
catarrhalis  
leniter  
trahenda  
& curanda*

## §. II.

Cibus sit paucus, potus tepidus & salubris, optimus decoctum hordei excoctum cum radura cornu cervi, passulis & radice liquiritiæ, item decoctum avenaceum. Vinum autem, nec non vinum spiritus, propter acidum stimulum & spiritum, qui calorem accendit, nullius in hac febre utilitatis. In declinatione tamen morbi, si excretiones jam adsint, vinum bonæ notæ condusse, paulo largius etiam sumum, observatum est, eo quod circulum sanguinis promoveat, & æqualem servat perspirationem.

*Cibus  
paucus  
potus  
temperatus*

## §. III.

Si æstus est impensor, uti in plethoricis atque cholericis, fervor etiam internarum partium percipitur, niri aliquot grana pulveris bezoardici cum fructu admiscerent, & emulsionem liberalius usurpantur.

*Excessus  
quidam  
perforatus*

## §. IV.

Quando alvus dura nimis & stricta, sub morbo, præter juscula avenacea, mannata, prunata & passulata, nihil convenientius chyliere emolliente. Egregium tamen quoque usum præstant pilulæ aloëthanginæ, vel Beccherianæ, ad X. vel XII. grana, cum granis IV. pilularum de styrace, aut lecti intestinorum sumet, eo quod & alvum aperiant, & violentiam siccam nullum moderantur.

*Alvus  
quidam  
dura  
stricta*

## §. V.

Si etiam declinante febre tussis humida nimis, copiosa & pertinax, ad humorem pinosum derivandum & per alvum evacuandum, egregie proficit decoctum manne largiori dosi, ad uncias duas vel tres, ex aqua veronice. Tum quoque profunt pilulæ balsamicæ *Beckeri*, nec non *Rufi*, ex aloë, myrrha & croco, æquali portione commixtis, paratæ.

*Alvus  
dura  
stricta*

## §. VI.

In principio vero febris catarrhalis alvum stimulantia non conferunt, præsertim paulo acriora, quia humores ferossos acres ad intestina invitant, tormina & alvi fluxus, non sine periculo febris lenæ, concitant. Quin à mercurio dulci cum refina jalappæ sic dato, in virgine plethorica inflammationem ventericuli inducunt fuisse, novi.

*In  
principio  
perforatus  
perforatus*

## §. VII.

Ubi tussis ferina & vehemens, componenda est oleo amygdalarum dulcium recens, cum syrupo capillari Monspeliensi commixto, item hoc electuario: Recipe olei amygdalarum dulcium drachmas tres, spermate ceti drachmam, sacchari candi albi, syrupo violarum ana unciam, croci

*Tussis  
ferina  
vehemens  
componenda*

crupulum, olei anisi, macis, ligni assafras, ana grana sex, M. De quo subinde aliquid deglutendum.

## §. VIII.

Quid  
significet  
in conspectu  
suppressionis.

Quando in feminis menses suppressione affectis superius dicta pathemata ingruunt, alvus congruis clysteribus duenda de diaphoretica propinanda, quae sanguinis motum ad superficiem corporis urgent, tumque pulveribus bezoardicis cum fructu adijci potest, croci granum unum, vel aliquot grana florum sulphuris, abstinendum vero ab omnibus expectorantibus & dulcibus.

## §. IX.

Quid  
significet  
in conspectu  
suppressionis.

Quae hypochondriaci accidunt insolita ex ventriculi potissimum inflatione symptomata, clysteribus emollientibus de carminativis, nec non effluviis carminativis, cum pectoralibus nuptis, quam optime discutiantur.

## §. X.

Quid  
significet  
in conspectu  
suppressionis.

Quando superata febre pulmonum restitit laxitas, ut pulso largior sit secretus, pulveribus bezoardicis addenda aliquot corticis chaccarillae grana, vel balsamum nostrum sit dictum vice, circa noctem ad aliquot guttas sumendum.

## §. XI.

Quid  
significet  
in conspectu  
suppressionis.

Sanguinis missio, debito tempore & regimine instituta, in plethorica quam optime frequentem catarrhorum insulsum arceat. Sed praesente jam catarrhali febre, penitus ab ea abstinendum. Tum enim, experientia teste, discurritatem catarrhi adducit.

## §. XII.

Quid  
significet  
in conspectu  
suppressionis.

In tussi violenta & nimis diu durante, pectoralia dulcia, incaffiantia, in nimia quantitate oblata, ad cachexiam, immo ad phthisicum affectum, disponunt, appetitum & digestionis vim infringendo & pulmonum tonum valde labefaciendo.

## §. XIII.

Quid  
significet  
in conspectu  
suppressionis.

Quamvis juxta Hippocratem lib. VI. epid. Sect. III. his, qui ex capite, gravedine & ruscidine laborant, ubi febre correpta fuerint, minus recedende sunt, vi videlicet morbus cum defluatione recte fuerit solutus; nihilominus tamen ne via sternatur ad alium morbum, pariter ex Hippocratis l. c. consilio, factus, ut convalescentes victus & ventriculi rationem habeant, & praeterea ad perspirationem fervandam, ponam insuli theiormis marte adhuc aliquandiu continuant, ut pluribus supra in praeservatoris monitis dictum est.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Quid  
significet  
in conspectu  
suppressionis.

Vir macilentus, natura sensibilior, à multis annis hypochondriaci pathemata obnoxius, praeter consuetudinem in convivio stomachum non modo variis edulis, sed & liberali vini potu onerarat. Aliquot horis post, noctu, sub aëre vernali humido frigidulo, her secat, ac domum reversus, correptus est horrore, languore totius corporis magnaeque capitis gravitate. Sequitur ingens praecordiorum anxietas, tussis molestissima & praeternaturalis assueti, cum alvo tensa & adstricta. Suasui uxoris bibit decoctum Succolade, quod excepti intensior anxietas, inquietudo, suffocatoria quasi spirandi angustia, nec non inflatus dolor lateris dexteri in regione hypogastri. Vocatus hinc medicus, qui febrem non modo malignam, sed & peripneumoniaci quidlibet

esse judicavit, & tincturam bezoardicam cum spiritu cornu cervi, nec non mixturam ex aqua cardui benedicti, diacordo Fracastorii, lapidibus cancerorum, ammonio diaphoretico & syrupo papaveris thoracis, exhibuit. Sed frustra & perperam: quarto enim die, quum ob alvum nimis strictam, clyster injiceretur, evanuerunt, quae nemum gravis morbi insulserant, symptomata omnia, & tussis tantum, gravitatis capitis dolor, succedo & aëris vesperti urebescens, remanserunt. Ab alio igitur medico commendatum infusum ex veronica, liquiritia & foeniculo, circa noctem dosis pulveris bezoardici cum grano uno extracli croci & papaveris thoracis, altero die vesperti dosis pilularum nostrarum pectoralium, interdum aliquot grana tiri & succini cum emulsionem, & ad expectorationem electuarium ex oleo amygdalarum, spermate ceti, croco & oleo anisi. His procurata secretus & levis sudor & reliqua adhuc symptomata fere omnia discesserunt. Ventriculus autem mansit imbecillis, & cibo summo, gravitatem & pressuram fecit dolorem. Tussis etiam noctu fuit acris cum materie copiosae ejectione, quae interdum etiam vomitum proritavit. Sed quum corpus equitatione exerceret ager, pilulis nostris balsamicis & inner cibos sile volatili oleo uteretur, & loco tenuis aculeis cerevisiae, biberet sanariorem & amariorem, succellive pilulae valedudini ex toto fuit reddita.

## Epidemi.

Fuit haec febris nonnisi catarrhali benigna, tum etiam popularis. Sed quia incidebat in hypochondriacum corpus, comparare insolita pathemata. Stomachus etiam cruditatibus jam peccatus non potuit non agere fere decoctum succolade in copia sumtum, quo tunica villosa & oculus ductum in ipsa obstructis, inflatio inducitur, cui angustia spirandi, praecordiorum anxietas, dolor sinistri lateris tensus & inquietudo tribuenda. Medicus autem male consulit famae, quod praecipue nimis in iudicando fuit & haec sibi imponere passus est. Et quod demum diutius haec febris perlitit, id unique omnibus evenire solet hypochondriaci, in quibus ventriculi robori immixtum convenientibus succurrendum est praeterea praesidia.

## OBSERVATIO II.

Quum anno c10 de cct x. post accerrimum hyemale diuturnum frigus, Martio mense leniori ex austro spirante venio, nives & gelu solverentur, Aprilis & Maio initiant, Berolini, quo tum degerebam, & alibi, quamplurimos corripiebant febres cum horripilatione & aestu, summo languore, tussi ferina, nonnullis quasi suffocatoria, ingens siti & ciborum nausae. Circa noctem invalescebant haec omnia & somnus inde mirum turbabatur in quibusdam extrema mox calebant, mox horrebant. Quidam du decumbebant, praeteritum si, ubi ob praevium humorum diathesin, purpurea scorbutica materia iuncta delinquebat, quae etiam per vices crebris maculis rubris & asperis in extrema cute comparibat, ex levi vero causa iterum evanescere. In nonnullis quarto statim die exanthemata rubra morficantia, uremia, cum magno pruritu, quasi ab urticae inducitur, quae dicuntur die *Negelsucht*, erumpunt & tussis aequae ac caloris migrationem inferebant. Alii, praeteritum foeminae phlegmaticae sanguine provectionis acuta, exquiritos simul rheumaticos dolores patiebantur. Qui vix convalescentes, in

Febri  
catarrhali  
benigna  
epidemi.

publicum prodibant cum nimis, incurrerant ingentem capitis torporem, gravissimum dolorem, vertiginem, gravitatem, *den Stockschuppen*, languorem corporis cum spirandi angustia & difficili negotio iterum ad sanitatem redibant. Ubi etiam vena jam erat in pulmonibus vitium ex haereditate, febre hac discedente, nullis purulentis cum sanguine succedebat, saepe vera plethysis. Qui porro ab imperitis chirurgis & pharmacopis purgantes accipiebant pilulas, doloribus acerbis venter affligebatur, minimeque debilitabatur, animi defectiones pariebantur cum frigido extremorum sudore, & gravius, & longius, decubientes. Qui vero & proba victus & regiminis ratione, & dextra medicatione morbo occurrebant, ac pulveribus imprimis bezoardicis sedulo utebantur, cum uno, vel dimidio grano extracti croci, brevi convalescebant iterum.

#### Epidemicæ.

Epidemicæ haud raro sunt catarrhales febres, tum maxime, quando ex temporarum constitutione in solita ejusdemque subita vicissitudine, ob mutationem ventorum, imprimis quando rigidum boream mox lehiore excipit aura zephyri, subnascuntur. Pejoris etiam tum sunt indolis & ægrius persistantur, qui dyscrasiam sanguinis & humorum, ab aëre intemperie introducta, fovetur. Valde dissimilia quoque, pro dispositione habitus corporis, vicerum, ætatis, temperamento, nec non victus ratione, inferunt symptomata, magis, vel minus benigna. In curacione autem omnia, quæ criticum naturæ motum, seri superflui per glandulosa emunctoria excretioni dicantur, turbant, morbum gra viter exasperant & nationem impediunt, ut potissimum faciunt purgantia cum corpora refrigeratione. Contra ea optimum utique consilium, corpus in perpetua perspiratione servare & usurpare ea, quæ acredinem mulcent, lenius atque contemperant, ex medicamentis æque ac alimentis, & quod maximum est, ab omni cerevisia & vino abstinere & decoctum temperans bibere, sine quo refractarii catarrhi diffucile vel plane non possunt.

#### OBSERVATIO III.

Propositi  
catarrhis  
veneris  
sue suble  
vati.

Macilennus, nervosus & animo mobilis vir, quadraginta annos habens, quam Baccho & Veneri strenue subinde litaret, lauro vivendi genere uteretur, nec unquam tamen sanguinis missionem admitteret, à longo jam tempore, vere & autumnino, crebrius affligebatur catarrhalibus defluxionibus, quæ cum horrore, aestu, extremorum frigore, capitis dorsique dolore, lassitudine totius corporis & inquietudine ipsius invadebant, & accedentibus artuum, coxendicis & nuchæ doloribus, sæpius per aliquot hebdomades detinebant. A me igitur salubre consilium ad arandum tum frequentem catarrhorum incursum roganti, obtinuit hoc : ut I. aliquot ante æquinoctium hebdomadibus, venæ sectionem cum debito regimine institueret; II. ut bis anno lac cum minerali seniori aqua, Sclerana imprimis, ad mensuram potaret, & loco cerevisiæ biberet posinam; III. ut bis hebdomade, pulverem bezoardicum absorbentem, paulo ante quam cubitum iret, assumeret, & mane post in lecto insulsum veronica, cum liquicidia & semine foeniculi, forbillaret, lenem postea expectando sudorem. Quæ omnia, quam per aliquot annos fecisset, liber se degit à molestis catarrhis defluxionibus, & animadverte, eisdem illico insensisse, simul ac

sanguinis missionem temporariam neglexisset.

#### Epidemicæ.

Per immoderatum vini ac veneris usum, adeo utique infirmatur corpora, ut postea levi ex causa ægrent, & potissimum, incideant subita cœli mutatione, vere & autumnino admodum solenni, catarrhos, gravitatem, coryzam & tussim incurrant, cum febricula. Idem quoque macilentis & plethoricis, post corporis refrigerationem contingere, docet experientia. Venæ sectio autem omnium optime ab his molestiis defendit. Si enim sanguine nimis plena sunt vasa, ob difficilem circuitum, non rite depurantur. Hinc serum fit & copiosum, & impurum. Et impedienda postea per cutis poros diffusio, ad interiora, maximeque glandulosa loca, salus agitur humor, catarrhum cum febricula: ferola faciens. Ego certe multiplici confirmatum habeo experientia, catarrhis crebrius obnoxios, ab eorum insulso maturatione sanguinis missione fuisse liberatos. Observavi quoque eos, qui venæ sectionem, certo tempore suam, inermiserunt, affectos fuisse catarrhali febre.

#### OBSERVATIO IV.

Dux quidam militaris quinquagenario major sanguine & succis plenus, ex Italia ad nostras oras accedens, ob insignem aëris, victus, & vinorum mutationem frequentissime affectus fuit acerbis colicis in abdomine doloribus. Bibis hinc, meo ex consilio, præmissa venæ sectione & purgatione alvi per insulsum mannanum, aquam Sedlicensem, per aliquot hebdomades, quo factum, ut per totum autumnum ac hyemem liber à tormentis ageret. Iterandam igitur hanc curam, medio vere, fuasi : sed antequam id faceret, vino se largius implevit & corpus deambulatione per aliquot horas sub frigido cœlo admodum frigidificavit. Inde incidit in febrem, cum coryza, capitis dolore, horrore extremorum, præcordiorum anxietate, aestu, inquietudine, nulli valida, & febre fere continua. Post tres tamen dies remisit febris impetu, sed horror cum subsequente aestu versus noctem accessit adhuc, & quod commemorabile, declinante semper paroxysmo, venter flatibus distendebatur & cruciatus in ipso sæcli, calore vero obortiente mitigati. Interdum etiam in paroxysmo deliravit paulum & facies fuit rubicunda. Mane autem febris semper remisit. Consulens ego quarto morbi die, expensis curatæ cunctis, ex pulsi pleno ac magno judicavi, venam esse secandam : quod & remittente paroxysmo in pede feliciter factum est. Alvi dein aliquoties chylis carminativo & emolliente subducta, & postea cursu, pulveribus diaphoreticis temperantibus, leniter nitrosi, cum emulsione ex decocto cornu cervi, amygdalis & semine papaveris albi, sub moderate calido regimine, intra tres hebdomades ex voto confecta, alvo tamen interea bis decocto mannanis soluta.

#### Epidemicæ.

Venæ sectio in catarrhis affectibus non quidem directe indicatur; interim tamen, si corpus est plethoricum, si sanguis à calidis & præsertim immoderatiore vini usu incaluit, & febris catarrhali subito invadens continua videtur, non nocet, sed prodest, elapsa etiam jam aliquot diebus. Dein hoc in casu commemorabile, quod abdominis dolores, jam per annum silentes, accedente hac febre, fuerint resuscitati, & quidem tempore remissionis, disculsi vero per febris calorem.

Catarrhis  
li febris  
cum colico  
veneris  
sue suble  
vati.



lorem. Quod quidem nullam aliam ob causam factum fuisse arbitror, quam quod salis & acris humor ad intestina delatus eadem moleste affecit, sub aestu vero ad habum corporis propulsus. Multoties quoque me docuit experientia, pathemata hypochondriaca, colica & spasmodica, in iis, qui diu isdem affecti, catarrhis, nulli, coryza & catarrhali febre fuisse revocata. Ex hypochondriacis, eo tempore, quo alii catarrhus vere & autumnio laborant, vehementes tum quasi paroxysmos mali sui experiuntur.

## OBSERVATIO V.

*Febri catarrhali  
ex acri acri  
falsum  
tu sunt  
ita.*

Ver erat, quum virgo nubilis, tenerior, sensibilis texture & spongiosi habitus, horripilatione, cum calore preternaturali, languore universi corporis, nec non praecordiorum anxietate corripere. Insumebatur circa tertium diem colli glandulae, faucisque levi affiebantur inflammatione, aderat simul tussis cum gravedine & raucedine. Vocabatur medicus, qui auri fulminantis, minus puri, grana sex, cum dimidio scrupuli ammonii diaphoretici propinabat. Sumto hoc pulvere, levissima inlequebatur pathemata, animi deliquium, summa anxietas & inquietudo, extremorum refrigeratio & conatus ad vomendum. Opponebantur quidem bezoardica, & fixa, & volatilia, sed inefficacia. Sequantur quatuor dejectiones viridissimae & vomina ejusdem indolis materia rejiciebantur. Anxietates vero inde nihil minuebantur, sed persistebant perpetuae cum animi defectione, ardor etiam & contrictorius dolor in praecordii fixus urgebat, & quovis assumto exacerbebatur, sudor succedebat frigidus, facies Hippocratica & septimo die mors ipsa.

*Epitaph.*

Miranda sane, febris hujus minus periculose primum visse, subita catastrophe, demum funesta. Oritur hinc ingens controversia: utrum per se fuerit maligna? an vero simplex catarrhalis usu pharmaci facta fuerit lethalis? Id minimum verum: medicamina metallica non bene preparata & corrosivo sale adhuc imbuta, quale est aurum fulminans non rite edulcoratum, veneni prorsus induere naturam & funestum edere effectum in personis tenerioribus, & ubi jam ad lenem inflammationem, nervosae partes, & quibus etiam ventriculus, jam sunt dispositae. Aurum enim, ob gravitatem suam firmiter ventriculi tunicis inhaerendo, eam cui insidet partem vehementer extimulat, eandemque spulsa constringit, haud levis ac venena, quae pariter stomacho spasmus inducunt, qui postea per nervorum genus diffunditur totaque oeconomiam motuum pervertit. Id quod tanto magis fit in corpore exquisitius sentiente, ubi jam adest febris, quae nihil nisi universalis fibrarum spastica est contractio. Deinde id pariter certum: materiam causticam lymphaticam foris secerndam, fori ejusmodi stimulo retrahi ad ipsam ventriculum & solum ad inducendam ipsi inflammationem esse sufficientem. Ne dicam, primam corporis regionem succis corrosivis acidis biliosis fuisse oblectam, teste ipso colore eorum, quae fecerunt. Hos autem solos corrosivitate sua propria, multo magis corrosivo adhuc pharmaco adjuvato, inflammationem parere posse, nemo negabit. Cautissime igitur mercandum cum medicamentis quodammodo corrosivis ex mineralium familia, ubi stomachus ad inflammationem dispositus, *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

& saburra erodente acido - biliosorum humorum scatur. Tum etiam medicamentum ab aliis sine damno sumum, veneni naturam unque possit induere.

## OBSERVATIO VI.

Literatus & vine sedentarius additus vir, quidam jam annis vere & autumnio capitis defluxionibus, coryza, gravedini, tussi cum incalescentia quadam febrili fuerat obnoxius. Is initante Octobri, quum poma cydonia cocta crebro & largiter edisset, & alvum inde obtinisset solito strictiorem, postea etiam per aliquot horas liberiori frigido aeri sese exposuisset, sequenti mor die, circa vesporem, horripilatione, intercurrente aestu corripitur. Mane sentiam tractiorum admodum dolorificum percipit in humeris & nucha, nec non acutum in anteriori capitis parte, maximeque fronte, dolore, naribus quidem calentibus, sed arida & sicca. Datis medicamentis diaphoreticis, leniter nervosis, cinnabarinis, mindebat symptomata pedetentim cum aestu, dolor autem in fronte persistebat supra oculos omnemque seire adimebat somnum. Datum hinc consilium, ut crebrius naribus admoveat fil volatile Anglicanum siccum, quod ex sale ammoniaco & sale tartari paratur, oleo cephalico, uti est lavendulae & majoranae pum, essentialium, non omittis infusus theiformibus, ex herbis cephalicis & diaphoreticis leniter moveantibus. Inde minora fuerat tormenta & prae opinione & naribus fluxit liquor flavescens viscidus ad aliquot drachmas, idque aliquoties de die, quo facto, post biduum omnis evanuit dolor, & ager perfecte convalescit.

*Epitaph.*

Haec origo catarrhalis rheumaticae febris cum gravi capitis dolore deducenda ab alivo obstructa & perspiratione prohibita, in corpore, ubi caput debile & ad defluxiones catarrhales jam tum fuit proclive. Locus autem doloris in fronte supra oculos fuit in sinibus ossis frontis, qui innervata nervosa & punitaria sunt vestigia. Huc si cum impetu ruit sanguis, à nimio ipsius affluxu & flagratione oritur dolor, serumque acre transillat, hocque effluente, dolor discedit. Ut adeo verum sit passum Hippocratis effatum: *Jeû. VI. aph. X. cui caput graviter dolet, pus, aqua, vel sanguis à naribus profusus, is à dolore liberatur.*

## CAPUT VII.

## De Febre Variolosa.

## THESES PATHOLOGICAE.

## §. I.

**V**ariolosa febris est acuta, exanthematica, variola contagiosa, in qua motu quodam critico, quid materia valde tenuis, caustica, corrupta, inflammans & exulcerans, ad summam cutem propellitur, cum gravibus saepe symptomatibus stipata.

## §. II.

Febrem hanc imminentem indicant lassitudo corporis, virium languor, somnus inquietus, ciborum fastidium, cum conatu vomendi, capitis dolor, pavor in somno, alvus clausa, stimulus ad nullum & horripilatione intercurrentia. Haec per plures

*Catarrhi  
cum co-  
phorale  
aerum  
flava ju-  
ta.*

*Jeû. VI.  
aph. X.*

plures saepe dies jam praesto sunt, & postea succedit aëlis per totum corpus, cum pulsuum celeritate, siti, augere capitis, humorum & spinæ dorsi dolor. Infantes potissimum, saepe ex improviso, epilepsia & rigor ac tremor artuum invadit. Aetate junioribus delirium familiare: corpus est inquietum & jactatur. Intra tertium & quartum diem conspiciuntur in facie & collo vestigia macularum rubrarum, quæ pedetentim outero plures efflorescunt, post faciem & colum, pectus, brachia, ac demum etiam abdomen, dorsum cum femoribus pedibusque occupantes. Durat hæc erupcio ad duos usque dies successe, ac interea decrevit febris cum symptomatibus, ut pulsus cum calore sexto die fere sit naturalis. Elapso autem quinto incipit fieri suppuratio, eodem modo ut erupcio gradatim à superioribus ad inferiora transiens, quæ ubi in vigore consistit, maximeque in facie manifesteque succedit, ob ingentem ardorem & dolorem cutique tensionem fere intolerabilem, accenditur nova symptomata secundaria febris, cum siti, vigilia & præcordiorum anxietate. Quæ symptomata, ubi corpus impurum, pustulae confluentes & virulenti genii, delirio & convulsioibus accedentibus, nono, vel undecimo die necant. Si vero pauciores & benigniores, parhamata remittunt & si exsiccato, donec undecimo & ultra decedant & æger ad sanitatem redeat.

## §. III.

*Præmonitiones*

Corripitur hac febre tantum non omnes homines, cujuscunque sexus, ætatis, temperamenti, quoniam nationis sint; ideoque in proclivi unique iudicare, causam ipsius esse universalem omnibusque communem. Unde vero origo hujus omnibus adeo infestæ materie rependa & ubi ipsius sedes, non aequè expeditum. Venere quidem naturales ipsius à sanguinis mensuris, sub ingravitatione retenti, immunditiæ fecui communicata, duxerunt. Et vero unique similitudinem, primordia hujus virulentæ humoris, non ex aëre, victu, aut aliis externis causis, sed ex utem esse materio. Id enim experientia frequenter constat, infantes à matre minus sana & impuris succis fecante progenitos, variolis mali moris & quandoque exalabibus corripri, mali fieri sub gestatione vegeta, ob succos pravos in senam transientes. Vicissim etiam in comperio, gravidas, si proba victus ratione & affectuum moderatione, escochymia, & plethoræ convenienti sanguinis missione, saluberrimæ quoque per alvum & cutem excretioni prospiciant, infantes in lucem edere, qui variolis correpti, non adeo periculose decumbunt, sed paucas ipsas & benigniores indolis, nascuntur.

## §. IV.

*Autem causæ non intransmissæ*

Sed nequam hujus maligni humoris sedes in ipsa sanguinis & humorum massa videtur ponenda. Etenim quamvis per alios morbos exanthematicos, morbillos, purpuram, scabiem, apopletham, tinea capitis, febres quoque, tota succorum massa exagitata fuerit, dissoluta omniaque ipsi involuta cernicata, variolarum tamen materia manet & nihilo secus corpus adorat. Nunc ad veritatem unique proximè accedere videtur, ex succo quidem chyloso lymphatico impuro & corrupto materiam, citri primum subilem hinc & virulentam humorem, sed viscositate quadam involutum, simulque tubulis quibusdams impactum, delinere tandem, donec in motum fermentativum sui multiplicativum ab

aliis causis deducatur, facies infusetur & critica quasi desumatione in corpore exurbarur. Nec officit, quod post longum intermedium tempus in noxam erumpat. Diu enim malignus quidam humor, in tabulosa partium, immo ipsius cutis substantia, tanquam in latibuli sine noxa hæret, & postea demum in motum excitatus, universum systema nervosarum & fibrosarum partium possit afficere totamque motuum economiam pervenire potest. Testatur hoc cancer in glandularum substantia per longum tempus occultatus, testatur venenum canis rabidi, item miasma venereum, quod per lac nutricia infanti communicatum, post aliquot demum saepe annos reviviscit, vel in adults per gonorrhœam virulentam suppressam ad interiora pulsum, post longum haud raro annos prodiit, & virulentiam suam exserit.

## §. V.

Latibulum autem virulentum huic, quæ variolas facit, succo, præbent, mea quidem sententia, medullæ spinalis tubuli quidam obstructi. Probabilis minimum quæ id evincunt hæc sunt rationes. Spinalis quippe medulla cum capite omnium primo in utero formatur, & majus præ aliis partibus cito augmentum acquirit, quod aliter fieri nequit, quam per liquidum, quod per ejus minimos canaliculos fertur. Quod si stagnans obstructus quodam, ex diuturna mora, ut omnis humor occultus, valde altitatem & perniciosam indolem contrahit. Talis humor compellibus postea liberatus & sui juris factus, non aliam sepe ac veneni naturam & vim prodiit, humores fermentando, eorum texturam & crasim immutando, solidas vero partes vehementer stimulando, atrodendo & vellicando. Quod vero ex imis medullæ, maximeque illius portiones, quæ in inferiori regione spinae, materia, quæ variolas efficit, prodeat, hæc confirmare videtur ratio, quod nullus fere morbus tam subito totum systema nervorum & nervosarum partium adorat, quam hic ipse. Testatur id febris acuta celeriter invadens, ipsius nempè totius vasculosi & nervosi systematis, quam ego unique à membranæ spinalis medullæ deduco. Testatur idem dolor capitis, dorsi & humerorum, individuis fere comæ. Testatur epilepsia, convulsiones, tremores artuum, deliria, quæ mox statim in principio, secus ac in ulla alia febre, adsunt. Testatur præcordiorum anxietates, item nausea, vomitus, cardialgia, quæ à spasmis substantiæ nervosæ ventriculi & orificiorum ipsius proveniunt: testatur alvus stricta & clausa, quæ semper fere primis diebus est. Testatur demum inquietudo cum vigilia, quæ non nisi molesta generis nervosi affectu & commotio est.

## §. VI.

Sed minimus hanc paullo subtiliorem de prima origine & sede causæ variolarum theoriam, quia directe non pertinet ad artem usum & therapiam, quæ magis in eo versatur, ut naturam, genium, facultatem & potentiam operandi virulentæ istius materie probe indagetur. Indoles igitur hujus videtur mihi duplex, una acris & inflammatoria, unde dolor, ardor, rubor, tumor, erosio & exulceratio, altera causifica & putrefaciens, quæ motu subtiliori intestino, crasim & unionem partium mixtum confinentium destruit atque corrumpit, & hac proprie ad ipsam malignitatem, magis spectat, atque quam maxime sese in variolis malignis prodit.

## §. VII.

Optime vero variolæ distingui possunt in benignas, malignas, & quæ sunt inter has mediæ naturæ. Benignæ his cognoscuntur indicia: si non adeo copiosæ sunt numero; si debito tempore de ordine prorumpunt, suppurantur & exsiccantur; si non nimis profundæ; si bono pure referant, sufficienter elevatæ & circulum habent rubicundum; si facta eruptione in superioribus partibus, febris & symptomata notabiliter remittunt & omnia tranquille & placide fiunt. Hæ omni vacante periculo, immo sponte & solius sæpe naturæ beneficio curantur. Tales autem plerumque sunt, quæ temperate vere oriuntur, in corporibus non adeo impuris, nec sero & sanguine repleta, etiam in pueris. Nam acris & caustica materia qualitas non modo mediante succo rufido in corpore corrigitur, & ad expulsiorem in cute præparatur, sed & affluxu ejusmodi succi, in ipso suppuratorio actu plane mitis & blanda efficitur.

## §. VIII.

Vicissim malignam & causticam in variolâ subesse virus, inde concludendum: si vel nimis cito, vel nimis tardo prodeat; si manent de pressæ & suppuratiorem remaneant; si plurimæ livescant & quædam nigri coloris, vel limbum nigrum habent; si pulsus celer, etiam post eruptionem sufficientem, cum inquietudine persistit; si recti animo facile linguantur; si pustulæ sunt sanguinolentæ, vel diarrhæa cruenta, aut mictus cruentus supervenit. Lethalis hæc sunt indicia, & ex viginti vix unus evadit, qui ejusmodi symptomatibus afficitur. In corporibus demoritur hac specie variolarum sanguis fluidus est totus, nec in serum, nec in coagulum fecedit, quod aliquoties observavi, manifeste indicio, putrefactione: immo ejus crasin plane effe colloquatur, & vinculum feri & sanguinis destructum; & hæc est causa ipsius mictionis, nec non dejectionis cruentæ, & quod variolæ sanguinem fundant. Equidem variolæ sunt indolis, quando pectechiæ sese mitterent, vel etiam pustulæ parvæ miltariæ asperæ, quæ de intima corruptione sanguinis & lymphæ testantur. In quibusdam porro tardius maligna & putrefactiva variolâ humoris indoles sefe ostendit, dum post exsiccationem febris manet lenta, & in externis partibus, præsertim articulis, in brachiis, manibus, pedibus, tumores oriuntur, & ex his fiunt fœda exedentia, fistulosa & ossibus cariem inducentia ulcera, quæ difficillime sanationem recipiunt, & procedente tempore, lentam inferunt mortem. Interim tamen in genere tenendum, quod malignitas hæc gradu, jam majori, jam minori, dilatat.

## §. IX.

Virulentæ ejusmodi variolæ sunt plerumque epidemica & nascuntur à statu anni temporum plane irregulari, anomalo, diurno, præsertim sub cælo diffuso nebuloso, pluvioso humido, ventis destituito, hujus magni post diluviones & inundationes aquarum, quando diutius eadem supra terram stagnant, & aer ob id, & infectiorum, & exhalationum putridarum copia repleta est, tumque ut plurimum simul grassantur, ipsique etiam variolis complicantur pectechiales & alia delenteria indolis non experta febre. Deinceps aut variolæ in corpora unguæ & cacochymica incidunt, & ubi prius viæ magna impurorum succorum colluvie læset, plus incrementi caput malignitas. Observamus porro maligna five contagiosa tum tempore majorum viru-

*Eid. Hofmanni Oper. Tom. 11.*

lentiam habere, quam aliter. Accidit hoc non semper ob manifestam quandam sensibus obviam causam, sed dubio procul ex pernicioso varii generis exhalationibus, quæ ex animalibus & vegetabilibus surgentes, cum aliis particulis fuliginosis sefe mitterent, ut ipsa unione specificam quandam delenteriam virtutem nanciscantur, non secus ac videmus in chymica, quod sola commixtione rerum, quæ per se non sunt venenæ, venenum enascatur.

## §. X.

Tertium genus est variolarum, quas non mediæ naturæ dicimus, quia non sunt nec adeo malignæ, nec adeo benignæ, sed medio modo se habent, ideoque prædenter medicum & idoneam medicinam possunt. Tales sunt, quæ non sparsim, sed confertim, imprimis in facie & manibus, comparent, & confluentes sunt; item quæ interiora, nares, fauces, interdum etiam oropharyngum occupant, ut acri non bene deglutire possint. Antecept etiam facit judicium, quando in suppuratiõe acris denuo oritur febris, cum æstu, calore & ardore manuum; si caput nimium intumescit & largus salivæ fluxus est, si urinae porro tenues, copiosæ minguntur & corporis largis sudoribus diffundit. Neque minus ubi novæ semper exsiccata jam subnascentur papulæ minores, & suppurantur atque exsiccantur nimis protrahitur; ubi cutis tendit & pustulæ profundius fident, areas juveniles, vel viriles, tempus autumnale & hyemale, ætas etiam nimis fervida & sicca præcessit, & præterea non adeo proba victus ratio à decumbente observatur: hæc sapientia omnino, nisi sollicite præcaveatur, alios relinquunt morbos. Epidemica etiam ut plurimum grassantur, quoniam benigniores magis sunt sporadice.

## §. XI.

In suspectis quoque ignis est, quando statim inter initia & ante eruptionem, acuti & pertinaces dolores in spina, brachiis, pedibus, lumbis, non excedente assurgunt; si cito nimis, primo illico, vel secundo die, variolarum vestigia in cute comparent, tanto magis quam exanthemata aspera, acicularum capita æquanda, interspersa; si statim non servantur, mox disparent, non redeunt, si facies non intumescit die tertio vel quarto, vel mox decumescit inoritur; si in juvenibus ante eruptionem grave delirium, nec non difficilis deglutitio, si in suppuratiõe sopor, & post hanc alienatio mentis & incongruus sermo; si etiam nimium salivæ stillicidium.

## §. XII.

Alii autem fluxus, sicut copiosus, non adeo periculum dant: eundem enim per totius morbi durationem sine ullo periculo succedisse vidi, tantum abest, ut eruptionem impediant. Arque hæc in rem commemorari dignum, quod scribit *Ammius Lysanius Cris. III. pag. 234. pervenire hæc afflat ad manus nostras plus minus CL. pueri, variolis & morbillis affecti, i quibus omnes evacuati evaserunt, alii vero, quibus parum ex culpa evacuationis facta non fuit, citam cum morte commorantur. numerus tres; alii vero, quatuor in ulcera difficillima & mala morigerata pervenerunt, quæ cum apertis communicationibus habent & facile in gangranam obeunt. Iis similis superfluit puer, qui ulcus & necrosim & malignum, cubitum dextri brachii occupans, multis foraminibus perforatum habet. Scilicet sicuti in febribus malignis pectechialibus, alvi profluvium morbi facit solutionem; sic etiam in mali generis variolis idem*

*E 2 eveniat*

*Triplex  
variola.  
nam generis  
benigna.*

*Maligna.*

*Et bene  
accidit  
morbi non  
sæpe.*

*Suspensa  
quæ signat*

*Triplex  
variola.*

*Triplex  
variola  
nam non  
alio prole  
maligna.*

evenire experientia docet, quæ etiam *Ballentii in epid. & ephemerid.* sententia.

## §. XIII.

Quæ variolæ moriuntur, criticis ut plurimum diebus, nono, undecimo, vel decimo quarto decedunt, & quidem maxime convulsionibus, quas exquisitissimus ardor, dolor ac tensio in brachiis, manibus & facie, præsertim si profundius sedere pulsus, exciunt. Quidam catarrho extinguntur suffocantur. In nonnullis, imprimis si malignitas subest, quando in sua erecto, vel extra lectum sunt, animi obrepit deliquium, macule cum pustula disparent, & convulsione superveniente, intra aliquot horarum spaium mores excipit. Vidi etiam variolæ jam exsiccatis, juvenes quosdam subito insulso apoplectico esse extinctos, posteaquam in ipso morbo capitis gravitate, vigilia & per intervalla mentis emotione laborassent. Novi quosdam infantes unius aut duorum annorum, quæ absolute exsiccatione in vado prostratis esse videntur, macula erysipelacea livido-nigricante maligna, quæ totam frontem furam, vel pedis regionem occupavit, ex improviso suisse affectos & subito mortuos, manifeste scibacilliosis & magnæ corruptionis in sanguine indicio.

## §. XIV.

De his autem, quæ variolarum morbum superant, multiplex confirmatio habeo experientia, quod pueri, qui ante illum vaeulæ minus firma usi, variis oculorum & aurium destitutibus, sine capitis, doloribus aruum, imbecillitate pelum, rachitide & tibe, nec non adultiores mensium retentione laborant, postea integram sanitatem, corporis robur & nutritionem leniorem acceperunt. Vicissim vero novi etiam alios, qui antea sani & valentes, in variola vero perversa medicatione excepti, vel commissa in diæta eremibus, valetudinari postea sunt facti, phthisin, febrem leman, talem & asthma incurrisse, visus viti, ophthalmias, epiphoras, maculas & albugines contraxisse, aut ulceribus foedibus in facie & aruum juncturis suisse affectos.

## §. XV.

Ceterum ultimo adhuc loco probe tenendum: quod mancia variolarum semper sit indolis firmamentaræ & sui multiplicativæ. Unde vix ullus alius morbus, excepta forsitan pestilentia, adeo contagiosus, ac variolarum. Quo etiam fundamento nititur, cum fructu ab Anglis potissimum instituta variolarum infusio, quæ purulenta ex varioloso decumbente humore in fauciatam sanæ variolæ nondum experti hominis cutem immisso, protinus idem hic morbus, cum febre omnibusque quibus stipatur symptomatibus, suscitatur atque inducitur.

## CURATIO.

## §. I.

Natura, per quam parium soluturæ & fluidarum corporis ad motus vitales se & excreturæ dispositionem, intelligimus, tam exactum in hoc morbo, si morans, quam in nullo alio servat ordinem & tempus, & hæud raro sponte, citra artificiosam medicamentum, eundem percurat, quando videlicet crasis sanguinis & humorum viscerumque conditio, ita comparata, ut correctio materis caulicæ & expulsiō ejusdem non obstat. Hæ naturæ viis merito insitendum me-

dico, nec aliud agendum, quam ut eadem in opere correctio, expulsiō & suppurationis congruis auxiliis subveniat. Ignitur in insinuenda medicatio, ut I. materia acris, viriola, caustica contemperetur & ex veterum loquendi more coquantur, simulque effluens in valorum & nervosarum parium systemate primis diebus motus ad moderatam traducantur; II. ut eruptio secundetur & languens circa eruptionis tempus motus erigatur, quo omnis ad corporis habitum pellatur materia, accedens autem in suppuratione secundaria febris moderata ferveat & gravior ardeat pathemata; III. ac demum declinationis & exsiccationis tempore sanguinis & humorum massa sub morbo dyscrasia & impuritate affecta, repurgetur, sicque oriundi ex reliquis morbi tempore prædicantur.

## §. II.

Accedinem materiam mulcent, simulque nimiam sanguinis exsiccationem, ipsam excretionem impediens, blande componunt pulveres temperantes, leniter diaphoretici, cupis generis hic est: recipe cornu cervi philosophice præparatum, usli, animum diaphoretici, laquidum cancrum, matris perlarum ana drachmam, cinabaris sine paratæ drachmam semis, nitri puri scrupulum. M. f. pulvis, de quo pro diversitate ætatis dandum, de dosi summa est dimidia drachma. Propinquare commodissima in vehiculo ex aqua scorzonæ, nucleorum cerasorum, florum sambuci, acacie, herbe cardii benedicti & scabioze. Dein eundem in finem utilis decocta humectantia & temperantia, avenaceum tenue, cum amygdalis in emulsionem redactum, serum lactis dulce, nostra methodo paratum, aqua hœdei cum scabioze decocta. Item emulsiō ex decocto scorzonæ & cornu cervi, amygdalis feminibusque quatuor frigidis cum saccharo. Cui ad motum vehementiam moderandum, commode adiciuntur syrupus papaveris albi.

## §. III.

Quando natura lenior in expulsiōe sub eruptionis tempore, danda hæc emulsiō: recipe minimis napi, cardii Mariz, aquilegiæ ana drachmam, aque florum sambuci, galegæ, cardii benedicti ana unciam f. l. a. emulsiō, adde animonii diaphoretici drachmam semis, sacchari persici quantum satis est. M. Efficaciter etiam expellit liquor bezoardicus ad mentem Bussii paratus, cum tripla portione liquoris nostri anodynii mineralis nuptus. Item elixirium alexipharmicum, sine spirituoso menstruo sic confectum: recipe radicis dictamnii, angelicæ, viscerotici, contrayervæ ana unciam semis, herbe scorpii, cardii benedicti ana manipulum, fiat extractio in aqua scorpii libra medica & liquoris anodynii mineralis uncias tribus, additis prius salis tartari, croci & myrrhe ana drachmis duabus; de quo viginti minimum & ad summum quinquaginta guttæ præbendur.

## §. IV.

Eadem profertur quando suppuratio lenta nimis, & pustule elevari remant. Tum quoque utilis hæc mixtura: recipe myrrhe electæ drachmam dimidiam, croci salis tartari ana scrupulum, aque scorzonæ uncias duas, coquantur, colemur & usui fervetur. De hac dimidium, vel unam cochlear in emulsiōe, ex aquis anæstheticis & diazotici cum feminibus quatuor frigidis, præsertim circa noctes, portendunt.

## §. V.

Sub exsiccatione demum præparanda sunt remedia.

Quando de quatuor moris rotas.

Post variolam alii sunt.

aliis variolæ.

Post variolam.

Indicatio- nes curatio- nis morbi- dae variolæ.

Quid sit exsiccatio ante eruptionem.

In eruptione.

De suppuratione.

De exsiccatione.

media, quæ putredini resistunt, item quæ fordes relictas, vel sub morbo genitas, per congruam emunctoria evolvunt. Utiles tum pulvis ex lapidibus cancrorum, antimonio diaphoretico, paucillo myrrhæ, succini, & croci. Proficuum quoque infusum theiforme ex herba scordii, summisibus millefolii & semine feniculi, cui si pectus simul affictum, veronica cum liquiritia addenda. Potissimum hoc tempore interponenda blanda laxantia, balsamica simul indola, uti sunt infusum omniuni pilule Becherianæ, vel ad eandem exemplar paratæ.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

*Quibus febrem & erysipelas præcedit.*  
**E**Venit haud raro, ut in principio, præsertim infansibus, accidant crebræ & anxie vomitiones. Ad has compendendas & spasium ventriculi laxandum, egregie proficit liquor noster anodynus mineralis, vel solus, vel cum aliquot guttis spiritus bezoardici Bussiani remixtus. Idem hic noster liquor eximii usus, si convulsio epileptica, in lactantibus maxime & difficulter dentientibus periculi non expers, urget nimis. Conducit etiam pulvis Marchionis, cum cinnabari & pulvere lumbicorum terrestrium. Et alvus clystere molliente solvenda, qua clausa in principio, epilepticum malum augescit.

## §. II.

*Alvus non movetur.*  
 Quando æstus acutus, nitri dosis in pulveribus augenda & rursus citius præbenda unctiona rosarum, quatuor florum cordialium, cum phlegmate virioli parata, cui multum *Waldsbundius* asque *Delius* tribuerunt. Nec male, quam in corporibus juvenilibus sanguineis, maximeque ubi variolæ mali moris ad putredinem prorsus grassantur, ratione & experientia teste apprimè proficit; licet non omnem malignitatem exnuat, neque universale adversus copiosas variolas sit præservativum.

## §. III.

*Saliva non movetur.*  
 Frequens juvenis imprimis ætati symptoma est salivæ fluxus, qui suppuracionis tempore ut plurimum effusioe accedens, non modo hanc, sed & somnum, non sine periculo, impedit. Moderandus igitur, tam per alvi apericionem medicanae clystere emolliente, quam diaphoreticum bezoardicum medicamentum, cui aliquot grana florum sulphuris addenda & bibendum delapsus infusum theiforme ex benonica, veronica & floribus chamomillæ officinalis, quo aucta sic perspiratione, à salivæ fontibus divertantur humores.

## §. IV.

*Alvus & alia sunt non movetur.*  
 Obident pustule variolarum semper fere interiora faucium laryngem & pharyngem, ibique ardorem, dolorem & difficilem deglutionem, quandoque etiam aphasiam, excitare solent. Molesto huic accidenti succurrendum gargarismate demulcente, ex decocto bardci & rob diarmoris, adjecto paucillo lapidis prunellæ, quo serpius us eluendum. Utile quoque decoctum acetaceum, cum butyro infusio, syrupo violarum vel granatorum, & nitri tantillo. Et ad mulcendum ardorem, pustule & aphthæ subinde tangendæ, & illinendæ mucilaginis seminis cydoniorum, cum aqua rosarum facta.

## §. V.

*Orbitæ non movetur.*  
 Oculos quoque nonnumquam occupant pustule & suppurantes vitium eisdem inducunt. Hinc sub *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

erupcione statim ab eis defendendi, quod optime fit lineo duplicato, cui spiritus rosarum in quo camphora cum croco macerata, infunditur, quod tamen ante applicationem in loco calido tamper siccandum, quo potior spiritus portis avolet. Mihi frequens, aquam rosarum & florum sambuci, adjectis aliquot liquoris nostri anodynæ mineralis guttis & momento camphoræ adhibere, eademque palpebras itungere. Quod si vero à pustulis pellicula relictæ, cito eadem post declinationem absumenda hoc liquore: recipe aquæ rosarum unciam, reginæ Hungariæ drachmas duas, virioli cyprini grana quatuor, sacchari saturni grana duodecim. M. quo frequentius cum subtili penna tangenda est excreta. Idem hic liquor, omissis tamen virioli, egregie virtutis in oculorum acri, calida & ardente deflusione, cum robore, quæ variolis crebro succedit.

## §. VI.

*Quibus febrem præcedit.*  
 Pulsum vehementia & robur, faciei rubor, capitis lumborumque gravitas ac dolor, venarum turgescencia, ætas juvenilis, ingenii activitas, diæta vinosa, sanguinis missio sueta & evacuatio critica suppressa, sanguinis suberactionem in variola, primo vel secundo statim die, indicant. Sic evanescent mox pectoris anxietas & oppressiones, macule conferunt in cures cessant, nec adeo gravis post eruptionem metuenda pathematia. Sæpius enim observavi, nimiam sanguinis redundantiam sufficientem materiam variolose ad concitum corporis propulsivum impedire, & efficere, ut discretæ tantum prodeant pustule, inus autem relictæ marcescunt, circa declinationem varia symptomata ipsa indicant, convulsiva, deliria, catarrhos suffocativos, quia apoplexiam, inducat. Contra ea, ubi pulsum durities, humilitas & exsitas, vasa minus surgunt, vires languent, temperamentum phlegmaticum, ætas infansilis & puerilis, corpus obesum, vitium in principio adeli, rufus & alvi fluxus, laborans etiam alias sub sanguinis missione facile animo inlequitur, vena non perpendenda, ne nimia sanguinis copia suberacta, materia inus detineatur, & erupcio ad plures dies, non sine periculo, protrahatur.

## §. VII.

*Emetici in principio.*  
 Haud levis inter medicos est controversia: utrum emetica in principio variolarum profint, nec ne? Nos ita censemus. Quam variolæ accedunt, ad præventionem expedit utique dare ea, quæ fordes copiosas & crudos succos non modo ex primis viis, sed & biliosos & vitiosos humores ex hepate eliminant, quibus retentis, iustus metus est, ne graviorem reddant morbum: Primo etiam invasione die locum adhuc habere possunt, quando surgere primam regionem viscerum liquorum collapsæ adiungit indicia, ex ægri potissimum vocatiæ incongruorum liquororum & solidorum, nausæ, oris amaritæ & rufitibus, desumenda. Tum omnino lenes emeticum, tartarus emeticus, silius prius, ad unum vel duo grana in adolescentibus in aqua mentha, vel cinnamomi, aditis aliquot mixturæ simplicis guttulis, cum fructu datur, evanescentibus postea, quæ eruptionem impediunt, anxietatibus, ut pustule intra tertium & quartum diem promptè erumpant. Si alvum simul expurgandi intentio, tartarus emeticus cum infuso mannae dandus, in infantibus ad quartam vel dimidiam partem, aut pondus unius grani. Propterea autem tale remedium alterius diebus

portigete, empiricum est consilium.

## §. VIII.

*Alvus an  
se erupit  
sive non  
solentur.*

De purgatione per alvum hac monenda: Ante morbi insulsum omnino sunt utilia laxantia, non vero fortiora purgantia; neque etiam mercurius dulcis, praesertim in infantibus & pueris tenerioribus. Opimum decoctum tamarindorum cum rhabarbato, vel manna: & si suspicio, crassa infusio scybalis duris esse facta, praemittendum chyli emollientia & stimulantia. Sub totius etiam morbi decursu nunquam permittendum, ut alvina fecessio nimis diu, ad octo vel decem dies restaret. Si fecus sit, inde potissimum in infantibus, vel suffocativi accidunt catarrhi, vel purpura variolosa, aut erumpentes comieatur, aut suppurationis illud, non sine insigni virium laesura & symptomatum vehementia, excipit. Neque hanc ob causam eviemus & per totum saepe morbi decursum duram cum bonis agrorum rebus alvi fluxus est compescendus. Erupcionis autem tempore, etiam si, ut ordinario fieri solet, alvus sit siccora, ab omnibus eam moventibus abstinendum, ipsis etiam enematis, quae tum retineri, retere angustias parere maximas & demum post aliquot dies reddi, novi.

## §. IX.

*De suppu-  
ratione an  
et quibus  
decenda.*

Ati suppurationis tempore in febre secundaria proficua sint alvum ducencia, inter medicos Anglos fide discrepant. Frendus peculiari scripto adstruixit varias observationibus utilitatem, ita tamen, ut non nisi decoctum mannae admittat. Nos etiam hanc methodum non improbamus, si adsint, quae purgationem indicant, alvus nempe per totum morbi decursum sicca fuit & contracta, copiosa in suppuratione salivaria, & peccata copia humorum obfessum, ut anxia inde & difficilis sit respiratio. Sed ego semper laxantibus praefere soles clysters, emollientes alvinae duras feces & educentes. Qui, si non sufficiunt, laxantia mannae praefertim in infantibus, quibus prima regio & praecordia crassius viscidis humoribus obfessa, commodam omnino locum operant. Quin novi, me infantibus laesentibus, unius anni, vel ante erupcionem, vel in suppuratione, quam ob difficultatem & angustiam spirandi suffocationis metu esse, cum praesentaneo levamine porrexisse lente emeticum, ex sexta, vel quarta parte grani tartari emetici, soluti in aqua veronicae, addito paulillo syrupi violarum. Ceterum, quam utilis manna in principio & incrementum variolarum, tam perniciofa esse aliquoties observavi, post declinationem, morbo solito. Ingentes nam enim creant fluitantias, pressus lentis viscidis fucis obruant, amoretelque efficiunt, quandoque etiam, ut ulcerationes sequantur in ipsa cute, faciunt.

## §. X.

*Alvula  
calida em-  
it.*

Anae pustularum erupcionem, & sub ipsa etiam, improbanda porro merito omnia calidiora expellente, tum quae vulgo dantur semina nascitur & aqueaeque cum stercoris, succus ruminum stercoris ovili & equini, quatuor etiam cinchura benzodrac alexipharmata, nec non spiritus cornu cervi, cum artusoso, quoad lectum & concubae, regimine. Inde etiam sanguinis de humorum massa riuum exagitantur, citius, anxietas, convulsiones, spasmus, quin delirium, si adeat, exacerbantur. Inde etiam mater variolae magis inducitur acrimonia atque subtilitas, ut ex benignis facile fiant malignae. Ex tantum abest, ut his aequalibus & constanti erupcio procuretur,

ut potius cito nimis minus preparata feras agatur materia, stationem non servatura, sed cum majori damno mox iterum ad interiora reverfura. Quin potus tantum calidos, infusa theifomia & decoctum fabarum coffee, liberalius usupata, experientia edocet, rejicimus. Nium enim sanguinis massam dissolvit & materiam roscidam nutrientem cum viribus inter largos sudores dissipant. Temperant igitur fit regimine, remedia temperata. Semper tamen distinguenda naturae, quae si segriores, expulsiorem juventia, parvis sed vicibus data, profura utique, & circa sextum etiam & septimum diem, erupcionem regimine tantisper calidiori secundare licet.

## §. XI.

*Alvus an  
ritari sui  
debetur.*

Pariter in variolis oppido nocivum decumbere in loco humiliori, ubi plures eodem morbo detenti. Nam ibi aer, qui pabulum vitae, impuris ac foetida exhalationibus est refferus, quae respiracione attractae, organa subeunt vitalia & internam humorum corruptionem adaugent. Hac etiam subest, cura regimine calido, ratio, quod ex plebeis plurimi, avariola, licet bonae alias sine indolis, occumbant. Hinc praefat, ut sepius cum fructu suasi, aeternam gravem, conecito prius probe agro, ex apertis fenestris emittere, purioremque immittere. Neque minus ad corrigendum, inquinatum aetern, expedit collo appendere camphorae frustulum, vel si caput odorem ferre nequit, in remotiori conclavis loco illud reponere.

## §. XII.

*Libenda  
de vitiis  
mannae.*

An corpore sudore perfuso lineamenta, indusia & lectum mutare liceat, non levis ad curacionem momenti est quaestio. Ego, ut largissimos sudores in variolis nunquam sine periculo esse, si diu perseverant, observavi: ita longe majus imminere discrimen, expertus scribo, ex mutacione lineamentorum, quae humidum & frigidum aetern adhuc foveat. Cavendum itaque, ne facile ager in alvum lectum transporetur, nisi prius diu in hypocaufto calefacto steterit. Neque lineamenta & indusia mutanda, nisi prius calore prius probe ficata, vel ab alio gestata. Si hoc negligitur, in exquisitis sentientibus ejusmodi corporibus, qualia sunt, quae effusus sudant, cutis quam facile frigescent, maculae & pustulae disparent & cum vice discrimine recedant.

## §. XIII.

*Recedunt  
quibus non  
possident.*

Quandocunque pustulae, vel ob deficientem naturae robur, vel ob terrorem, refrigeracionem, aut frum extra lectum diuturniorem erectum, subito concidunt, ager in vite discrimine versatur certo, & nisi prudens medicus illico analeptico & expellente remedio succurrat, mota in propinqua. Ego cum fructu tum dedi liquorem cornu cervi faccinatum, cum liquore arodynno minerali, in aqua cinnamomi sine vino de cardui benedicti, foetillare iussi poculum infusi theae, idque aliquoties iterare & praecordia pedibusque calida applicare formata.

## §. XIV.

*Alvula  
per alvum,  
an erup-  
cionem  
pustularum  
citius  
quod possi-  
bit.*

Mictus sanguinis, alvus cruenta, haemorrhagia narium & sanguinolentum ex pustulis serum manans, magnam sanguinis & humorum acrimoniam & coisiquacionem indicant, ac pessimum, plerumque lethale, praebent omen. Hac ubi praesto sunt, acida, refrigerantia & acrimoniam demulcentia, ut lac eburyanum & serum lactis, plus opus praestat, quam caetera omnia exquisitissimi artificii remedia.

## §. XV.

## §. XV.

Periculosum symptoma est, si graviora variolae nanciscuntur, & circa eruptionis tempus, vel etiam in suppuratione, abortus accidit: sanguis enim cum impetu utero effertur. Majus adhuc periculum ipsiusque moris iustus metus, si senu non cito exsternatur: vehementius enim sanguinis fit profluvium, sub quo animi accedit deliquium, expulsiōni materiae adversum. Si etiam sanguis parcius emanat, ejus motus ad caput convertitur, subsequente inflammatione & delirio. Neque periculo vacat, quando mentis primis diebus, vel in suppuratione erumpunt copiosiores, id quod tam plerumque ob causam accidit, quod sanguinis missio neglecta.

## §. XVI.

Observavimus, si aëtas nimis sicca & diu arida, variolae maxime esse inflammatorias & alvi fluxu quam facile slipari; qui tamen nullo modo sistendus, sed tantum demulcentibus & terreis diaphoreticis excipendus. Vitanda tum quoque omnia calida expellens, cum regimine aëtuoso, vitanda vero etiam refrigerantia & corporis refrigeratio. Neque alvi profluvium nocet, quando petechiae, pariter ob valde irregularem temporum anni constitutionem complicantur, ut potius remedium sit & malignos humores optime expurget, itaque providum ac peritum desideret medicum.

## §. XVII.

Quum variolae benignae, non facile quipsiam, nisi ex medici, aut proprio delicto, pereat, sed confusioque, praeteritum si mali moris fuerint; ex centum autem vix unus sit, qui variolae non experitur: ego certe ut fuisse hae arceamur, non certius novi consilium, ac eo tempore, quo male indolis variolae grassantur, exquisitam victus & vitae rationem servare, succos corporis convenientibus evacuantibus & decoctis pro potu temperantibus & mundificantibus à sordibus liberare, & ad futurum forsitan morbi insulsum praeparare. Eundem in finem commendabile novum illud invenum infusionis, seu inoculationis variolarum, quod ex oriente in Europam translatum, numerosis admodum exemplis ab Anglis postmodum medicis cum successu celebratum, ac tamen lege, ut pus variolosum ex papulis maturis & benignis promatur, corpusque ante operationem probe prius praeparatur.

## §. XVIII.

De vesicatorum peculiari in hoc morbo efficacia, quam nostro hoc aëvo, Angli imprimis medici, mirifice collaudant, pro certo ego quidem affirmare possum nihil. Rarius enim eadem adhibui, nisi ubi pueri, vel adolescentes, in ingentem suporem ac torporem inciderant, aut finito morbo, vitium oculi contraxerant, rubore ac defluxione affecti.

## §. XIX.

Quum variolae praeteritum confluentes & profundiores faciem rugis, foveis & cicatricibus mirum deformare soleant; puellae imprimis pulchritudini studentes erant ut hoc averterat rogant. Multi quidem ut faciem à variolis defendant, primis statim diebus ex invento Sydenhami suadente, ut pedes frequenter pediluvio immittantur, & sic materia ex superioribus ad inferiores partes trahatur. Sed ego ne quod dissimilem, nunquam periculum fieri, nec ea propter certum quod de experimento hoc affirmare possum. Interim non penitus rejiciendum censo, sed frequentibus & circumspiciendis id commendo

observationibus. Longe minus eis assensum praebere possum, qui papulas in facie pinguis & oleosa, inungere jubent. His enim pori oblinuntur, diffatio impediuntur, profundiores redduntur abscessus & veligia cicatricum longe magis conspicua. Optimum potius consilium, quando praeter superius dicta integra sanguinem depurantia, exterius, antequam penitus arescant papulae, linimentum applicari ex humana xungia, spermae ceti, cera alba, pauxillo balsami de Copaiva & camphorae. Favet etiam nicotini ac ruborem tollit aqua Borum sabarum, rosarum, radicis figilli Salomonis, tribus paribus remissa cum una parte aquae sic dictae sclopetariae.

## §. XX.

Accidit haud raro, ut exsiccatas jam, quae primum efflorescerat pustulis, ultimis diebus novae & minores compareant aliae. Hae nequaquam negligendae & refrigeratione aut improba victus ratione excipiendae. Si enim recedunt, praeter spem fieri possunt funestae. Hinc curandum, ut sub moderata & aequabili perspiratione hae pariter & maturecant, & arescant.

## §. XXI.

Superatis tandem variolis, providendum est, ne alii peioris indolis, supra jam nominati morbi, succrescant. Hunc in finem imprimis necessarium, ut prima regio à sordibus, tam in morbo, quam post eum ob languidam digestionem contractis, non semel, sed aliquoties repurgetur, & quidem per laxantia balsamica, acori & corruptioni resistentia, inter quae eminent rhubarbarina, pilulae Astringentes, K&L, & quae in curatione commendavimus Becherianae, quae commodissime prius in aqua destillata, ut menthae, solutae, propinquantur. Dein convalescentem non nimis cito in publicum prodeant, sed aliquandiu adhuc victu aërem liberum, tanto magis humidum & frigidum. Servent potius constantem perspirationis successum, eundemque secundent, tam per pota mane infusa theiformia ac herba veronica, scordi, semine fenniculi & anisi, quam etiam pulveres leniter diaphoreticos; per aliquod postea tempus alternis diebus vesperti usque. Fugiant frigidum potum cum gravis materiae & insalubribus alimentis cunctis, & ad perfectam sanguinis depurationem, abstineant à cerevisia & bibant aliquandiu decoctum temperatum ex radice scorzonerae, cichorei, fursiparillae & semine fenniculi. Neque omittant inter cibos uti iis, quae languentem stomachi digestionem, ad novos bonos succos ingenerandos necessarium, fulciant ac firmant.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

## Variola epidemica anni MDCXCVIII.

INsolita plane per aliquot ex postremis superioris saeculi annos fuerat tempestivum consilium. Aestas imprimis, propter crebriores boreales ventos, humida ac frigidior, autumnus fere nautarum gesserat, ut raro etiam fructus & uvae recte ponerentur maturificet. Autumnus effusus pluvius & subinde nivibus, cum prunis ac nebulis incedens, tempus sordidum, aërem densum, coelum obscurum & modice frigidum attulerat. Ex hyeme regnarat mirum mutabilis, squalida, sine constanti & acriori gelu. Accelerat praeterea vere anni 1701 ceteris, maxima in tractu nostro ex tunc tri-

bus inundatio, & ob stagnantes passim alveis elapsa aqua, aërem insigniter vitiat. Ut sic perfecta esset ubique ad epidemicum morbum dispositio.

*Varia  
proles  
ex his  
morbis.*

Interbat igitur hoc anno mense Septembri maxima cum vehementia variolarum morbus, & infantes, pueri, adules, uniusque sexus, gravidæ item, puerperæ atque nuptæ, inquilini ac hospites, adorabantur, ut non facile immunia mæneret unus, qui non prius morbo hoc defunctus, & variolorum numerus fere ad bis millefimum, in nostra hac urbe ascenderet. Non nulla sine, plurimis ex contagio accidit. Ex illis fuerunt potissimum improbo vieli, intemperantiæ & comorantibus dediti, iracundiæ commoti, terrore ex aspectu agrotantium maxime aut mortuorum percussi, timenes & horrentes morbum, nec non qui circumstantibus jam variolis, præsertim in domo, quæ ipsos tenebat, purgantibus illarum incursum æreæ fulceperunt. Contagium vero penetrans maxime & efficax fuit, quod ex fasie jam suppurantium pulularum venit, idque non tantum in eadem domo commorantes infecit, sed in alias sedes, quin remotiores etiam loca translatus, perniciosam suam vim in dispositis corporibus extenuit, infestum potissimum personis constitutionis sanguineæ, phlegmaticæ, pituitosæ, spongiosæ & mollioris corporis habitus.

*Symptoma  
fecerunt  
duri &  
emphreum  
denotant.*

Sic autem incipit & sic decurrit epidemica hæc variolarum lues. Antequam in conspectum prodiret exanthema, omnes fere conquiesciunt, de dolore dorsi, capitis, lassitudine corporis, calore præternaturali, intercurrente horripilatione, cum pulsu frequenti, appetitus prostratione & somno inquieto. In nonnullis infantibus, rarius in adultis, incipit enormibus vomitionibus, quæ per aliquot interdiu persistunt diu. Qui non vomuerunt, continuum tamen persenserunt conatum vomendi, nauseam & anxietatem præcordiorum, morbo graviores, modo minores. In adultis quibusdam & infantibus alvus fluxa, eruptionis tempore iterum consistens; in aliis primum adstricta, & tertio, vel quarto die demum aliquoties sine damno fluxus. Frequens etiam multus mingendi stimulus, paucioribus urina, sine damno tamen, per aliquot dies suppressa. Tenebris & lacrimis inter continuos ejulatus, pavorebus in somno, alvi adstrictione, vel profluvio, corporis calore & circa finem tertii diei levioribus quandoque epilepticis insultibus fuerunt affecti. Stetisti solentis fuit somnolentia, pruritus corporis, ardens & pruriginosus palpebrarum dolor, lachrymatio & stertoratio. Multis compunctioris in dorso & pectore sensus. Pucri circa tertium diem nares sæpe sanguinem stillant. Ex his etiam primis diebus magnam ascaridum copiam excreverunt nonnulli sine, nonnulli cum periculo. Adulti mirum fuerunt impatientes, subinde aliena multa loqui deierant plane; quod tamen sufficienti narum stillicidio mitigatum, insufficienti vero adjuvatum.

*Ad signum.*

Hæc pathemata præcesserunt ut plurimum benignas, ubi vero per vias indolis liberant, alia adhuc fuerunt præsto. In infantibus clamores intensissimi, nulla requies, tremores, extremorum mox frigus, mox intensus calor, cum infuso languore, in passibus fuerunt. In adultis dolor artuum inmanis, nec non lumborum, nephriticum & ischiaticum mentiens, gravis præcordiorum angor, delirium cum diarrhoea, punctioris exquisitus in pectore, vel hypochondrio sensus, tremores, horrores, membrorum incurvatio &

contractura. Varium autem à primo statim insultu notabilis prostratio, vertigo, vigilia assidua, sub erecto sine lipothymia, pulsus debilis & frequens, effusus sudor, copiosa urina, salvatio & insolita mori & nartibus eruptio, malignam plane prodiderunt indolem, licet interdum nec dolor, nec calor notabilis, nec anxietas, nec situs adessent.

Intra tertiam & quartam diem in benignis contigit eruptio. Nox antecedens plerumque gravis exilit & inquietas, anxietas, tremoribus, phantasiis, hæmorrhagiis, quin nonnumquam epilepticis commotionibus, quidam etiam bis vel ter depererunt. Tum comparuerunt primum macule rubræ, magnitudine differentes, quandoque exiles & successive incrementas, quandoque late, in distinctas postea pustulas coeunes. Factum id primum in superioribus, postea manibus pedibusque copiosissime, tum cruribus pectore ac dorso parcius & in abdomine parcellime. Cum ita in facie effluerent simul in faucem & laryngis internis, labiis & lingua, tumque obortus dolores, ardor, pruritus ac tensio harum partium. In ipsis quidem oculorum tunica vidimus nullas, sed in superciliis & palpebrarum interna æque ac externa facie collectim confidentes. Unde acerbus oculorum dolor, pruritus & ardor, & sexto die, accedente faciei tumescencia, coram oculo ad suppuracionem usque duravit. Interim prout fatis successit eruptio, & ubi pauciores quæto, ubi copiosiores, sexto die, penitus fuit absoluta, symptomata vehementiam posuerunt, pulsus antea concitatus, nunc tranquillus, æqualis & fere naturalis, somnus placidus, mens sibi constans & pectus ab angore liberum reditum.

*Signum*

*Ad male  
eruptum.*

Malum autem fuit, quando proinus secundo, vel in principio tertii diei, variolarum apparuerunt in facie vesicula, vel his interjectis pustule varas referentes, vel etiam exanthema miliare, rubrum aut album; & vicissim quando septimo demum vel octavo die, novæ eruperunt ob matris copiam & naturæ imbecillitatem variolæ. Male etiam fuerunt, quæ non rubicundæ, sed lividæ, pallidæ, aut fuscæ, fissiles item, duræ & aridæ, cum sovea in medio. Pessimæ, quæ facta eruptione, symptomatum non attulerunt levamen. Scri præterea copiosa effusio, siue per sudorem, siue per urinam, in adultis per alvum, siue salvationem, cum morbo incipiens & sub eruptionis æque ac suppuracionis tempore durans, ut plurimum observata fuisse. Micham tamen cruentum, frequens alia malignarum symptoma, non annotavimus, sanguinem autem ex sinistro oculo, mirum statim tumescere, in puero quinto die mortuo, manasse, novimus. Quibus prævia horripilatione, sub erecto corporis situ, vel ob animi commotionem, disparuerunt variolæ, ingens accidit anxietas corporis debitas & haud leve vite periculum. Qui mortui, quinto, sexto, vel septimo die obierunt, vel delirio cum convulsione, vel sopore cum convulsione, aut terano, posteaquam prævio notabili horrore, evanuisse cuncta ferme exanthemata.

Sexto die in benignæ indolis variolis inchoavit suppuratio, ac uti eruptio, gradatim à superioribus ad inferiora procedit, nono die ut plurimum, in copiosioribus undecimo, quin decimo demum septimo die, desinit. Elevatæ tum sunt sensim pustule, molles, albæ, rotundæ globosæ comparuerunt, limbum rubicundum & pus bonum ex albo flavescens contraxerunt, cuncta inter-

*suppuratio  
citius fuit  
cessit in  
langore.*



jecta sensa, facies & manus, rarius pedes, immu-  
nuerunt, & vultus quidem adeo, ut palpebrae  
clauderentur. Successit ardor, rubor, dolor &  
tensio in facie pontissimae & manibus, accensa  
denovo febris cum pulsus celeritate, inquietudine &  
peccordiorum anxietate, in quibusdam, licet in-  
noxie, extremorum tremore. Fuerunt sympto-  
mata haec jam minora, jam vehementiora, pro  
maiori, vel minori, popularum in partibus praer-  
ferent extremis copia. Leniora etiam eadem ob-  
servata, in infantibus, feminis, sanguineis, san-  
guineo-phlegmaticis, sero abundantibus & laxiori  
cuius habui praedis. Graviora vicissim in adul-  
tis, cute stricte, sensa ac dura, & ubi pustulae  
profundiores. Non nunquam in adultis complica-  
ta frequens salivae ejectio, in infantibus diarrhoea,  
ut quotidie aer vel quater deiecerent, interdum  
cinerei coloris, interdum purulenta plane, sine  
damno tamen. In vigore suppurationis, in iis  
maxime, quibus alvus per aliquot dies clausa,  
prodierunt aphthae, cum ardore & dolore inflan-  
matorio & viscosorum humorum in os confluxu,  
externis ut plurimum tempelive discussis.

Ex mali-  
na indicio.

Contra ea mali omnis fuit, quando pustulae  
non elevatae, nec sanie repletae, sed depresso ma-  
nerunt, vacuae, inflat cortica pili, item si lividae,  
cinerea & viridescentes aut in medio foveola in-  
gricane conficiunt. Quod postremum quidem  
non semper lethale indicium fuisse notavimus,  
alii benignis symptomatibus concurrentibus;  
minimum tamen alibi coloris papulae profun-  
dus subiectam cutem erodunt. Periculosum  
dein animadvertimus, si in facie, vel manibus,  
tumor exiguus, aut plane nullus, materiam subto  
iterum disparens; quando saliva non bene fluxit,  
sed viscosa fuit & circa decimum, vel undeci-  
mum diem pectus cum suffocationis metu op-  
pressis; neque minus in accipiti versari, quibus  
saliva a primo morbi insula eo usque copiose  
effluxit, quibus hoc rarius id factum, diarrhoea  
accidit, cruentus vomitus, aut alvi feces. Ma-  
ximum periculum imminuit a graviori inflamma-  
tione, acerbiori doloreifico, tensione, pulsu cito,  
intensa inquiete & anxietate sopita; tanto  
certius, quando frigore & horrore interpollata,  
agri de interno ardore & siti & externo frigore  
conquassati, inflammata haec ut plurimum mortis  
fuit causa. Febrim enim accendi maxime astuo-  
sam, delirium fecit, vigiliam perpetuam, inquie-  
tudinem maximam & corporis in lecto iactatio-  
nem, quae demum excipit horror notabilis, pu-  
stulas albas rediens ac demum convulsio lethife-  
ra. Factum id maxime in adultis, die nono, un-  
decimo, aut decimo quarto. Infantes autem ple-  
rumque perierunt suffocatione, procul dubio,  
quod fauces interius copiosis pustulis oblesae &  
varioliis humoris acrimonia ipsos nervos pneu-  
monicos tunicaeque nervae in spasmodicam exi-  
tiam adduxit contractionem.

Irregularis  
in suppu-  
ratione.

Ex irregularibus observatis fuit, quod sanguis  
ex papulis suppuratione illulare visus in buis infan-  
tibus, uno trismo, altero octo annorum, illo eva-  
dente, hoc decimo sexto die mortuo, posteaquam  
die quinto cuius utriusque manus & die nono cru-  
rum, colorem ex albo brunum contraxisset, in  
luculentum sanguinis subtilem in sphaeculum  
proxi indicium. Duo etiam alii observati, qui non  
debata perfuncti suppuratione, sed ingentem co-  
piam furunculorum ardorem loco huius in uni-  
verso corpore nacti, simul pallidum efflorescentibus  
maculis larvis, rubicundis, atrescibus.

Defensa.

Qui suppurationem superarunt, in iis si cie-

mentes pustulae, nono, si copiosiores, undeci-  
mo, si copiosissimae, decimo quarto die, detu-  
muerunt iterum partes, ardor immixtus, pul-  
sus sedatior, formus quietus, pustulae sane tur-  
gidae factae, manuerunt, & vel sponte desin-  
centes, vel perforatae, pus fuderunt cœlum. Id  
eadem ratione ac in eruptione & suppuratione,  
factum primum in facie, postea in manibus ac  
tandem in pedibus. In dorso autem & pectore  
molliores semper manserunt, nec tanta copia pu-  
ris repletae sunt, nec crustas crassas conceperunt,  
forsan, quod ob poros magis ibi apertos & ca-  
lorem, materia non tam glutinosa & arida fieri  
potuerit. Manuae pustulae dein sunt corrugatae,  
foffulam in medio nacte, exaruerunt demum &  
deciderunt, non sine ardore & pruritu relicto.  
Quod, quo citius confectum, eo minus subiecta  
cutis exela est & foveae deformata, quo tardius,  
compactis in unum crustis, exars ariditas, subita  
sanem puritatem habentibus, eo magis rari &  
cicatrices deformantes superfuert. Convi-  
dit maxime in iis, quae tempore suppurationis in ex-  
siccatione cinerea & viridescens apparuerunt,  
nec non ex agrosis his, qui scilicet in tempestivo  
minutis manuae lacerarunt, earumque debitam ex-  
siccationem sic impederunt.

similis  
autem.

Ex postremo  
indicio.

Aboluta exsiccatione, orti in quibusdam fun-  
tunculi & abscessus minui, omnem corporis am-  
bitum cum dolore, ardore & febris calore obli-  
dentes. Aliis accidit temporaria manuum pedum-  
que imbecillitas, vel contractura, balneis & li-  
nimentis spirituosus prome in plurimis quidem  
abacta, in nonnullis tamen cacochymicis & ma-  
turam opem negligensibus, transiit in ulcera  
circa articulos epiphyseas aggerime sanabilia,  
quae incongruis remediis in pessimas & tibialis  
filulas degenerarunt. In serosis & catanholis  
succedentes tumores glandularum, imprimis col-  
li, insignes, duri & rementes, emplastris tamen  
emollientibus & discutientibus feliciter ceciderunt.  
Infantibus praeterit in pedibus, post vari-  
olae frequens fuit malum epiphora, sive conti-  
nuum lacrymarum stillicidium, cum dolore,  
rubore & luminis intolerantia. Cui, nisi cito oc-  
cursum, nebulis redidit oculi & tenues in cor-  
nea enatae tunicae, visum quodammodo immi-  
nuerunt. Qui nimis cibis, gravis materiae, af-  
fuerunt, vel carnes avidius comederunt, aut  
praemature lecto surgentes, corporis experti sunt  
refrigerium, incurserunt de novo analeses, vo-  
mitus, immo diarrhoeas, magna quidem cum  
debilitate, sed sine periculo.

Jam in debellanda epidemica haec lucina sum  
versatus: incursum quidem ipsius arcere ab iis,  
qui nondum experti, per remedia fuit irritum,  
optimum fuga tantum contagii. Id tamen ob-  
servavi, vix temperantiam, victum lauda-  
bilem, naturae cuiusque accommodatum, abstinentiam a liquoribus spirituosus & calidis  
inertibus & animi tranquillum, tantum  
esset, ut pauca, benignae de periculi ut plu-  
rimum expertes variolae in cutem exierint. Tan-  
to certius, quando frequens usus pulvis abster-  
gentis, praecipitantis, nitroli, adjunctus. Il quo-  
que qui primam regionem aliquoties a fordibus  
repurgavit, minus copiosis minori periculo fuit  
nacti. Sed clementibus, thalibetis, tamar-  
indinis, mannae & tartari, non vero aloe-  
ticis, colocynthiacis, acerbis & resinosis, id  
fuit periculosum, optime aene morbum, prius-  
quam sanguis a miasmate infectus, licet id si-  
ne damno etiam factum noverim, quod praesto

Postea  
autem non  
periculi  
fuit minoris  
reddi.

jam

jam essent symptomatum nonnulla. Vomitiis autem uti, interdixerunt ut plurimum circumstantia, licet alio tempore eadem alexipharmacis nupta apprime proficua deprehenderim. Neque universalis fuit illa variolarum copiam accendi methodus, quam post Sydenhamum, *Waldsiedorius* alique celebres in Halia medici dilaudantur, per crebriorem spirituum mineralium acidorum bene preparatorum, ante infectionem, vel etiam primis morbi diebus, usum, sub temperato tantum regimine. Non enim potuit hoc remedium, omni etiam diligenti adhibuit, extinguere malignitatem in nonnullorum sanguine, nec variolas numerosas declinare. Quin observavi, complures ex illustribus, aliquot antivariculi liquoris absumpsisse ante & post invasionem uncias, nihilo tamen secius copiosis confectis fuisse pustulis, vehementissimis symptomatibus stipatis. In quibus id præterea singulare fuit; quod papule succedentes magnam exseruere corrosivitatem, profundius insigendo & depauperando subiectam carnem, insigunt cum dolore, ardore & inquietudine.

Quid fac-  
tum ante  
eruptionem.

Qui igitur morbo affecti, his æquabile caloris temperamentum commendavi, de usu, ut quando vires ferrent, lectum vitarent, aut minimum culcitris ex corio, minus calentibus, uterentur. Ab omnibus etiam calidis, expellensibus, sic dictis alexipharmacis & bezoardicis, volatilibus, ipsa bezoardica ninctura, abstini, præsertim in juvenis & florida ætate, in sanguineis atque plethoricis. Laudatissimus inventus spiritus niri probe dulcificatus, (cujus loco jam inventum à me liquorem anodynum minetalem, majori adhauc cum fructu, usurpare soleo) cum ariatica portione si rapi papaveris erratici mixta, additis aliquot mixturæ simplicis guttis. Frequens etiam fuit usus pulveris temperantis, ex matre perlarum, animonio diaphoretico, cornu cervi sine igne parato, cum tantillo niri puri. Et vehiculum præbuit aqua scordii, scabiosæ, florum elæ, sambuci, papaveris rhæodæ & cerasorum nigrorum. Eadem quoque usurpata ubi malignitatem prodiderunt symptomata, & præterea pulveri pro una dosi adjectum vel dimidium granum theriacæ coctilis, vel momentum camphoræ, cujus præstabilem virescentem cum niro in malignis variolis semper deprehendi.

sub rup-  
tionem.

Ingræsse eruptione, præscripta ut plurimum emulso, ex aqua florum sambuci, acaciæ, fœniculi, scabiosæ, scordii, cerasorum nigrorum, feminibus naps, aquilegæ, cardui marie, cum matre perlarum & jalapo rosaceo. Tum etiam corpus curamus à frigore accessu defendere jussu, & calore, præsertim die quinto & circa noctem, tantisper intendere, ita tamen ut subiecti semper habeatur ratio, nec non diversæ ætatis, temperiei, copię vel motus sanguinis. Docuit enim experientia, deficienti calore externo sufficiente, eruptionem, in infansibus potissimum de phlegmatica, minus expeditè succedisse, pustulas jam protrusas iterum collabi lenique refluere corpore, relicta quadam præcordiorum anxietate. Hinc quando in eorum jam plenius insilient variolæ, ad expellendas reliquias, essentia scordii probe saturata, vel liquor bezoardico Bulliano, cum liquore anodyno minerali remisto, cum fructu sum usus, tanto magis in malignis.

Totopora-  
tione

Exulcerationis tempore, si ob naturæ segnitiam pustulæ manserunt depressæ & elevatiorem remaneant, præstans fuit facultas myrrhæ, ali-

quot granis, cum paucillo croci & pulvere bezoardico oblata. Sed non nisi in principio: in statu enim suppurationis inflammatoria febris à myrrhæ increvit. Neque unquam usurpata hæc, ubi suppuratio sponte recte succellit. Urgente in exulcerationis vigore assu & ardore, emulsionem insili, substituo in locum feminis naps, semine papaveris albi, & in locum julepi rosarum, syrupo papaveris.

Absoluta suppuratione, succedentibus jam in facie & manibus pustulis & febre deservente, proficuum observavi pulverem ex lapidibus caustorum, animonio diaphoretico, myrrhæ electæ & croco, qui exsiccationem & consolidationem, balsamica & temperante sua virtute egregie promovit. Per tonum præterea morbi decursum, loco cerevisiæ decoctum ex cornu cervi rasato, radice scorzonæ, bordeo mundo, semine fœniculi & scibus, repsectum bibere jussi, cum emolumento; sed insula calida herbarum, veronice, scabiosæ, herbie thee, eruptionis & suppurationis tempore, liberaliter pota, minus proficua deprehendi.

Ex symptomatibus varium hæmorrhagia caute fuit excipienda: si enim principio statim repressa, sanguis cum impetu ad caput latus, phreniticum, vertiginem, deliria aliisque horrenda symptomata insulat. Si nimium excretum, deficit vires ad expellendam extorsum variolarum materiam. Optimum igitur sub profluvio pedes à refrigeratione defendere, herbis usurpare dialcordium *Fracastorii* cum niro, & extus, si effusus excretio, naribus attrahere de collo aque temporibus tepide apponere, acetum rosaceum cum camphora.

Symptomata  
moderata,  
hæmorrhagia  
etc.

Ad desitum in eruptionis puncto nimis atrox, nec emissis jam in eorum variolis cessans, componendum, ne in phrenicem mutetur, expensæ virtutis fuit, spiritus vini camphoratus, cum oleo ligni Rhodii, tati naribus haustus, cum tepide iterato fronti & temporibus admodum. Adversus præcordiorum anxietates, tremitores, inquietudines, pavores in somno, convulsiones, hæmorrhages & variolarum retrocessionem, probati usus hoc: recipe essentia castorei paululum inspillare drachmam unam, camphoræ granula tria, extracti croci granum unum. Quo præsentissimum a grys levamen allatum.

Desit  
a eruptione

Diarrhœas visum periculosum fuit; si tamen vehementia & sitire defectus uris, pulvere bezoardico cum chaccarillæ cortice, id præstium. Nec prætereunda niri in compefenda his alvi fluxibus facultas, experientia, contra vulgarem sententiam, multoties confirmata.

Diarrhœa.

Faucium, laryngis & œsophagi ardorem ac dolorem ab insidentibus pustulis, lenire & ab ulteriori insellu defendere possi decocto florum sambuci, liquiritiæ, fœniculi, nec non solo lacte calido, cum scibus & croco decocto. Si angina subsistat inflammatio, juvit aqua florum sambuci, cum rob diamorœ, niro & croco, Aphthæ & labia dolentia innuncta mucilagine feminis cydoniorum. Eadem mucilago cum aqua florum sambuci & rosarum extracta, adjecto croci & camphoræ momento, murice profuit in pruritu, ardore & rubore oculorum, nec non ad eva, si clausi, aperientes. Nares obstruere lino olei amygdalarum dulcium, vel lini, adaptare.

Faucium,  
laryngis &  
œsophagi  
ardorem

Crustæ papularum duræ emollitæ & crinis sub-  
tus ab acri humoris essentia consolidata linimento  
ex ninctura tartari, essentia myrrhæ, oleo amygdalarum dulcium & camphora. Ad delendas,  
decidias

Crustæ  
decidias

decussis crustis, cicatrices, conducibile fuit unguentum ex axungia humana, spermate ceti, saccharo futuri, magisterio bifimili & oleo tartari per deliquium. Resistenzia demum ulcera unguento de cerussa camphorata uniter tractata.

Ceterum sanguinis missio, neque ad praeparationem, neque ad curationem, utilis observata. Ab opiatas & soporiferis interitus abstini, aliorum medicatione edoctus, inde in variolis copiosis majores obortas anxietates, & anse exquisitum suppurationis tempus, periculosum soporem cum tremore & membrorum succussione fuisse suscitatum. Papaveracea autem lenissima, semen papaveris albi in emulsione, aqua papaveris rhodaeis ejusdemque syrupus, unusque fuerunt saluberrima.

Atque haec est illa methodus & haec sunt remedia, quibus ego usus sum in magno agrotationum, centum minimum & quinquaginta numero, & quibus aliquot illustrissima mulique generosa siue genii, hac in academia tum commorantes. Felix etiam fuit per DEI gratiam succellisse maxima paravasit & vigesima vix mortua, & ex his maxime, qui malignis affecti. Servavi postea eandem semper medendi rationem, & triginta qui inde elapsi sunt annorum experientia confirmatum habeo, vix ulla alia in variolarum morbo proficua esse atque accommodata.

## OBSERVATIO II.

Generosus adolescens, exquisitus sensus, activus indolis & maculans, superiori anno variolae affectus est, quae sine vehementia symptomatum, placide sanis & ordinate in conspectum venerunt. Quum vero circa sextum diem ad suppurationem accederent, promer opinionem miris afflicti est praecordiorum anxietatibus, conquassus sanis de dolore abdominis, inquietus fuit, somnum capere non potuit & descendendi stimulus ipsum diutius quavis hora & lecto furgere coegit, sed sine successu. Liber autem hac ultra diem & noctem urgebat, nullus tamen nec intensior, nec pulsus celerior factus. Ego accessus in consilium, inquisivi, num sub morbo jam dejecterit? respondum tuli: nec in morbo, nec, quantum quidem recordari posset, triduo ante ipsum id esse factum. Illico igitur injicere iussi chylarem emollientem, oleosum, cum modico salsa, statum vero & excrementorum renisus non totum, sed tertium vix parvam admixta; ad fellam tamen expertus est insinatum, ibique perfonis inharens officio ani sterus durum & grandis mole, licet egerendi irrita esset conatus. Hinc iterato enema insundere iussi, & interius dare non dubitavi pilulam marginatam, cum cremore tartari & oleo amygdalarum dulcium. Soluta inde alvus & per aliquot sedes incredibilis fere scybalorum induratum copia egressa, eger etiam a prioribus symptomatibus liberatus, somnum recepit, variolae rite suppurationem subierunt, & cura reliqua ex voto succellit.

## Epicrisis.

Quale sit alvi beneficium, in omni morbo quaerendum: si enim quis in morbum, maximeque in variolas & morbillos, in quibus ordinario primis diebus alvus adstricta, incidit, & intestina jam tum stercoreum copia facta, magna non possunt non insequi pathemata, quorum causam medicus vix perspicere valet. Hinc in quocunque morbo ab initio statim proficiendum, ut alvus ab excrementis sit depleta, sive id commo-

dissime fiat per enema, sive per laxans internum.

## OBSERVATIO III.

A matre hysterica, inordinate vivente, sub graviditate autem optime semper valente, procreati erant tres infantes. Hos anno cldcccxxix, corripuit variolarum morbus publice grassans. Alii licet non adeo mali esset in aliis mortis, in his tamen infolita habuit pathemata. In uno quippe, puero quinquenti, erupio, licet febris cum confectis symptomatibus adesset, per octiduum duravit & suppurationi etiam longius quam fieri solevit, protracta fuit. In altero, puero quatuor annorum, secundo statim die prodierunt, interpersis maculis asperioribus quasi purpurae, albus & pulsus per totum morbum fuit idem praeternaturalis, postula manerunt fissiles, pus non conceperunt & plurimae punctula nigro fuerunt confusae. Et in tertio, puella septenni, variolae confertim occuparunt facies & gurgur, ut vix solidi vel fluidi quippiam deglutire, quin spiritum trahere posset. Nullum minus usu convenientium & nullifimorum remedium, temporis beneficio, discessit hic morbus. Sed quam appertus rediens, plus ingereret, quam debile corpus ferre posset, nec rigidum & venosum auram viarent, factum est, ut in tribus his infantibus passim orirentur dolores & tumores in articularibus, punctura praeterea cubiti, in digitis manuum, plantis pedum, ipso etiam in collo, cum febre lenta. Medicus & chirurgus omnem quidem consuluerunt operam; nullo tamen secus nata inde ulcera firmita, carum exedentia & ossa cum nigrore corruptentia, accessit tabes & virium maxima prostratio, ut etiam pueri bene sub initio tertii mensis satis cederent. Puella autem, non adeo malignis ulceribus affecta, servata: ego quippe in consilium vocatus, pro potu sussi emulsionem ex decocto hordei, feminibus cucurbitae & melonum cum saccharo. Summus cum hac pulvis noster benzoicus, crebrior, sed parciore dosi, adjectis quondam aliquot fedus reguli avinionis medicinalis, quondam nitri. Ad alvum laxandam datus syrupus rosarum solutivus cum extracto rhabarbari & mercurio ducti, omniaque haec per aliquot hebdomades continuata interieci. Exteriori vero ulceribus putridis injectum balsamum nostrum vulnificum, cuius principale ingredienti balsamus sulphuris antimoniacus, cum oleo terribindina paratus, idque possimum, remixtum cum essentia myrrhor, succini & balsamo Peruviano, miram praestitit opem in ulcere quatuor foraminibus in oleo crano hians. Tumoribus quoque indolentibus ac duris, quibus pedes passim obfessi, impositum emplastrum *Vigoris* de raris, aucta mercurii portione & admixtis floribus sulphuris. Quibus demum intra aliquot menses ex moris faucibus erepta fuit puella.

## Epicrisis.

I. Feminae valcudinariae, si uterum gerentes minus agrotant, infantes edere solent infirmos & postillimum in variolis & morbillos graviter decubentes, & credibile, in embryonem impuros matris succos deluxisse.

II. Variolarum morbus in se satis mitis est, si benignus in corpore ostendit succos, carumque materia non adeo est virulenta; contra ea, quando in corpus incidit impurum & fermentum a prima nativitate contractum malignum, pessimi

Varicella  
mali pro il  
ex vicia  
mauril  
juvat.

Observatio  
de vena  
siliis  
opiatas &  
papaveracea.

Camphora.

Paraphrasa  
in vicia  
de vena  
siliis  
opiatas &  
papaveracea.

fimi genii emergunt variolæ, licet tum in aliis admodum sint benignæ.

III. Ubi exanthemata variolosa malignæ ex symptomatibus cognoscenda sunt indolis, namquam ita fidendum, etiam si jam aruerint, & lapsæ sint pustulæ. Ita enim sanguinis & humorum massam inquinare solent, ut accedente improba victus ratione, perfortatione intercepta & neglecta repetita primæ regionis & ipsius sanguinis purgatione, postea insequantur gravissimi & letales morbi, apoplethica, abscessus in internis partibus, in mesenterio maxime & pulmonibus, cum febre lenta & hectica, in externis vero pessima & fœda ulcera cancrofa, exedemia.

IV. Quæ autem tum variolas excipere solent mala, non aliter oppugnanda, ac morbi, qui extremæ humorum corruptioni debentur. Unde memini, à peritis medicis & chirurgis ejusmodi maligna ulcera inunctione leviori cum hydrargyro, nec mercurio dulci cum laxante dato, nec non decoctis temperatis, cum animonio crudo, fuisse percurata, modo febribus abfuit.

## OBSERVATIO IV.

*Varicellæ,  
sive aliæ  
mollioræ  
& variolæ  
in uno  
sanguine.*

Juvenis literarum studiosus, victus & vivendi rationis incuriosus, scabie humida & pustulosa per aliquot menses laboravit, liberatus decoctis & linimento, quod pro basi habebat flores sulphuris. Non ita multo post correptus est morbum, tum epidemicis, quos pariter evasit. Sed post binas hebdomadas effloruerunt sensim in universo corpore furunculi copiosi, quorum nonnulli insigni inflammatione stipati, in profundum ægre sanabiles abscessus abierunt, donec decoctis mundificantibus, laxantibus appropriatis, maxime mercurialibus, & lenioribus diaphoreticis, sanarentur tandem. Elapsi inde circiter mense, densio in variolarum incidit morbum, gravibus symptomatibus incedentem. Erant enim maxima ex parte confluentes, septimo vix die, licet febris adesset, comparsuerunt, ægre quoque subierunt suppurationem, depressæ potius manserunt, nec post eruptionem pullum frequentia ex toto remissæ. Egregium tamen levamen æger obtinuit solatione myrrhæ & croci in dilutione liquore salis tartari, à cujus usu ad sensum succellit suppuratio & variolæ cum symptomatibus ad legitimum decursum tractatæ. Continuanus igitur longius hujus remedii usus, siccatis etiam jam & decidensibus pustulis, & notabile fuit, sub ipsa suppuratione alvum quotidie sponte vel sepius fluxisse, ætuncque febrilem, qui tum alias auctior, fuisse mitigatum. Quo etiam factum, ut juvenis hic integram penitus recuperaret sanitatem.

*Epiçris.*

I. Variolarum & morbillorum materia, sive, ut ita loqui liceat, fermentum, neutiquam in massa sanguinis & humorum delinquit, neque etiam à sola impuritate, sive cacochymia humorum venit. Alias enim repurgatis in hoc juvene per scabiem & furunculos sanguine & fœcis, non amplius possidisset habere locum. Hinc potius credibile, materialium horum exanthematum causam infixam esse firmius rubulis parvis cupulatis stabilis, ibique, haud secus ac cancri & canis rabidi virus, tam diu occuli, donec à contagio, vel specifico quodam liquido, vel aere in actum deducatur & hæc juris fiat.

II. Alvi fluxus, non, ut vulgari est sententia, in hoc morbo adeo est perminuendus, nec

suppurationem semper impedit, nec materiam ad interiora vocat, sed in variolis etiam mali moris, sæpe, expurgando excrementis succos, in saluam cedat, haud secus ac febres malignas diarrhœa haud raro solvi novimus.

III. Solutio myrrhæ, cum croco, in liquore alcalino minus spirituosus, egregie omnino ad sanguinis depurationem, sulphur blandum & balsamicum vappidis humoribus reddendum, & ad præcidendos multos, qui variolas excipere solent, graves affectus.

## OBSERVATIO V.

Binæ puellæ gemellæ quatuor annorum, quarum una habitior, grandior, animo lenis & torpida, altera macilentior, flansura minor, animo autem magis sentiens & vegeta, uno tempore eundem variolarum morbum incurrerunt, sed in alterutra diverso modo & eventu succedentem. In utraque erant confluentes, sed in obfiori illa tardo admodum, die septimo, prodierunt, pus conserere noluerunt, in facie & manibus fuerunt sanguinolentæ & apertæ serum plorarunt sanguineum, ægram interim miræ discruciarunt anxietates, cum febre & siti continua somnique defectu, donec undecimo die exspirarent. Altera vero omnia habuit mitiora, tertio die venerunt papule, nono aruerunt, deciderunt & ipsa mox convalescit.

*Epiçris.*

Infantes hæc eodem succo matris nutritæ, eodem victu & regimine usæ, eidem morbo implicite, eodem contagio infectæ, eadem methodo iisistentem medicamentis tractatæ sunt, plane dissimili tamen successu & eventu. Patet igitur, sanitatem corporis, animi viriumque integritatem, morborum originem, decursum & finem, non tam à causis externis, cibo, potu, aëre, regimine, quin medicamentis, dependere, quam potius à peculiari & specifica partium solidarum structura, proportionè & dispositione, & hanc ob id omnino magis à medico esse considerandam, quam solam conditionem fluidorum horumque naturam.

## OBSERVATIO VI.

Juvenis succulenta & sanguinea, generosus, cujus familie variolarum morbus maxime fatalis, degerat tui & autumnali tempore, venationi, & mane, & in seram usque noctem, plus iusto sub coelo pluvioso ac nebuloso indulserat, & postea huc delatus, crapula ex vino & esu otreatum corpus debilitatæ & stomacho vix fecerat. Altero die post incidit in variolarum popularum eo tempore morbum. Invasit quippe eundem primum horror & vehemens anxius æstus, insequente nocte admodum iniqua. Die post impatiens fuit, conquelescit de exquisito spūse & capitis dolore, delira & absorta multa pronuntia & alvus fuit adstricta. Injectis hinc ad avocandos à capite humores clyster, quo alvus respondit. Data quoque æstus refræmantia, acicula, nitrosa, pulveres precipitantes & absorbentes. Inde mitigatum delirium, & intra tertium & quartum diem eruperunt in facie maculæ exiles, aciculæ capitis magnitudine, simulque pustulæ asperæ miliares albae & rubrae. Quinto die manus & pectus occupant pustulæ, tam numerose, ut vix spatium inter ipsas esse relictum. Hoc facto, remiserunt quidem sympto-

*Varicellæ  
sive aliæ  
mollioræ  
& variolæ  
in uno  
sanguine.*

*Varicellæ  
sive aliæ  
mollioræ  
& variolæ  
in uno  
sanguine.*

notata cum aestu, pustulae autem aegre maturaverunt, facies julto minus inmutavit, pulsus semper mansit frequens, & septimo die tam exquiritus ardor & dolor tensivus in manibus obortus, ut plane esset intolerabilis; lectum & locum mutare voluit aeger, frigidaque ad manuum incendium resingendum contrahere; somnus aderat nullus, spiratio vero anxiosa & difficilis & pectus obfessum humorum copia, suffocationem minantem. Applicata enema, exhibitis emulsionibus cum pulveribus bezoardicis ac temperantibus, sed omnia incausam, eodem potius die accidit extremorum refrigeratio, subsequente convulsione & brevi post ipsa morte.

Epi<sup>er</sup>is<sup>is</sup>.

Haec adeo infrequens est, variolae certis facibus magis esse infestas aequae funestas, cujus tamen causa minus cognita. Id vero in comperimus, multum ad pessimam variolarum naturam conferre corporis refrigerationem, ingluviem incongruorum & ebrietatem. Quae si praecesserunt & paulo post morbus impetit, expedit omnino, antequam tota oeconomia morum narbetur, colluvies ex primis viis idonea laxante vel emetico exturbare. Primae enim regionis fordes mirifice impediunt marenae variolae salutarem exitum, immo vim motui augere. Et si tunc natura alvi movet fluxum, egregie pro sanitate est. Ut plurimum vero variolosi moriuntur convulsione, quae suscitatur ab intolerabili aestu ac dolore in suppuratione pustularum, in primis si cuti profundius insident, corpus juvenile est ac tenerioris texture.

## OBSERVATIO VII.

Varicella in  
lactante  
cum dentitione  
fuerat.

Subito corripiebatur infans lactans unius anni motibus epilepticis, qui singulis horis quadrabantur impetentes, per XXIV. horas insistentes. Pronaequebant inde dentes canini & aculeos visus & tactus fessebant, die post comparebant etiam variolae, non ut ordinario solet, sed primum in manibus & pedore, & postea in facie. Nutrici magis quam tenello dabatur medicamenta. Huic quidem praeceit pulverem Marchionis, cum specifico cephalico *Mischelii*, fere nihil, & illi pulvis bezoardicus noster cum praecipitante remixtus, elixir pectorale crocatum & liquis ex myrrha, croco & salis tartari solutione. Quibus & dentitio & variolae successerunt feliciter.

Epi<sup>er</sup>is<sup>is</sup>.

Non mirum eruptione, & dentium, in primis caninorum, & variolarum, tam atroces praecessisse insultus epilepticos. Quod autem variolae serius in facie effluerint, id procul dubio tribuendum spasticis tractionibus & strictionibus ex dentitione in hac regione vigentibus, poris inde nimium coarctatis, materiam impuram non admittentibus. In lactantibus tenellis variolis affectis, medicamenta magis nutricia sunt praebenda talia, quae acrimoniam imbibendo, succum chylosum & nutricium dulcem ac roscidum reddunt, quod materia caustica, quam optime cicuratur ac temperatur.

## OBSERVATIO VIII.

Varicella  
in lactante  
fuerat.

Adolescens generosus incidit in variolas, non quidem confluentes, nec nimis copiosas, nec inf<sup>er</sup>id, *Hofmanni Oper.* Tom. II.

tensa febre, nec aliis gravibus symptomatibus stip<sup>er</sup>paras; pulsus tamen absoluta etiam ferme eruptione debilis & frequens mansit, somnolentia adfuit fere continua, aeger semper & à foras magis languis, pustulae elevatae quidem, sed pellucido humore plenas, in medio complanatae & nonnullae punctulo nigro insignitae. Nonno die, aeger è lecto, ab assistentibus succendo, levatus, sedit in conclavi calido & stragulis tectus impositus est, sed per quadrantem vix horae erectus sedens, rogavit, ut in lectum ipsum cito transferretur propter obrepentem animi dejectionem. Factum id. Conciderunt tamen subito papulae, pedes frigefacti, pectus oppressum, spiritus interclusus & subsequens motus convulsivi, quibus post aliquot horas aeger extinctus.

Epi<sup>er</sup>is<sup>is</sup>.

Malignitatis characteres habuerunt haec variolae à principio statim, pulsus, somnolentiam cum virum lapsu, pustulas pellucidas, in medio depressas & nigricantes. Sub eodem morbi facie & virum sanguore, semper admodum perniciosum, aegrum paulo diutius in erecto situ servare. Languidior enim cordis pulsus non sufficit ad trahendum perpendiculari via versus caput sanguinem, unde animi fit deliquium, sub quo motus sanguinis elanguescit, ad interiora convertitur, cor obruitur, extrema frigent, cutis contrahitur, materia virulenta ad interiora & nervosae partes repellitur, in capite sanguis stagnat & convulsionem denum facit lethalem.

## OBSERVATIO IX.

Generosa virgo, quatuordecim annorum, grassantibus variolis de ingenti capitis & humerorum dolore conquerebatur, cum aestu praeternaturali, sive & corporis lassitudine, cutis mox horrebat, mox calebat. Medicus vocatus, variolarum morbum subesse concipiens, mixturam ex spiritibus niri dulcis & tincturae bezoardicae ana drachma & scrupulis duobus syru<sup>er</sup>pi papaveris rhoeados, singulis horis, ad quadraginta guttas porrigebat, sed aegra post hujus usum alimenta omnia vomitu rejiciebat, & inquietudo cum anxietate & virum prostratione admodum urgebat. Dabatur igitur haec mixtura: recipe aquae florum sambuci, acaciae, cornu cervi cistidae ana unciam unam semis, theriacis aliis drachmam semis, lapidis bezoardici orientalis scrupulum, spiritus salis ammoniaci guttas X. croci grana tria. Quae binis vicibus assumpta, aegra stragulis obtegatur & in hypocausto calido ad sudorem coquebatur. Sedabatur vomitus & intra secundum & tertium diem cum aestu intensissimo prodibat maculae. Sed quum ob calorem ardentem strata removerentur, mox corripiebatur horrore, & maculae illico disperebant, insuperante summa inquietudine, anxietate & vomendi stimulo. Eveniebat haec vicissitudo aliquoties quotidie, ut bis vel ter aucto calore comparerent, & dimittendo disperebant iterum. Medicus certior factus praecessisse materiam diariam & ingluviem fructuum horariorum dulcium, lacticinorum, casei & acetosiorum, ventriculum & primum intestinum multa obfissum esse faburta ratus est, ideoque, quam praeter ea alvus per quatuor dies fuisset strictior, hanc in usum vocavit potionem: recipe mannae electae drachmas sex, tartari emetici granum, aequae cardui benedicti uncias duas, mixturam simplicis guttas decem. M. D. Assumpta haec, plus quam decem sequenti vomitus, p<sup>er</sup>isua vilidior & subvixit, nec non aliquot

aliquot secessus. Postea data essentia theriacalis, cum aqua liliorum convallium, paulisper spiritibus, quæ vomitus, & alvi fluxus sedatus, anxietates omnes remittunt, & diffusio per universum corpus calore æquali, copiosissime cum impetu quasi in facie, manibus, pectore & pedibus erumpunt variolæ, stationem hærentes & supurationem quam optime subeunt, sine sævis symptomatibus. In primis plantæ pedum variolis fuerunt resente, sub cute ibi crassiori delincentibus & sub exulceratione graves fusciantibus doloribus, qui tamen spiritu vini camphorato cum oleo amygdalarum dulcium delinunt, secedente in exsiccatione cute totius plantæ.

#### Epicrisis.

Nihil certe peius est, ac si variolarum morbus invadat corpus, in quo ventriculus & primæ viæ crudiorum colluvie obfistit. Inde enim augentur anxietates, spasmi invalescunt, & ad extremam cutem diffusæ, horripilationem ibi faciunt epulæ constrictionem. Inanis hinc labor est, tuta expulsionem internis & calore extremo ungere, quin notius ante delinam eruptionis tempus, eo quod vi pulvis variolæ admodum sunt instabiles & cum pathematum exacerbatione iterum recedunt. Utile potius ventriculorum convenienti laxante & emetico a sabbura depellere, quod etiam ipsa natura per nauseam & vomendi desiderium innuit. Patet igitur, emetica, ante eruptionem data, non tam facile nocere, sed potius levata ab onere natura, eandem promovere. Sed imperitus non facile imitetur hæc facta cum fructu. Semper enim distinguendum est inter vomitum & coactum vomendi, qui ab illius visioforum humorum prima in regione, & inter illum, qui ab acrimonia subtili caustica nervosis tunicis inhaerente oboritur. In illo utilisissima vomitoria, in hoc nocentissima.

#### OBSERVATIO X.

Hæc est  
causa regi-  
mini &  
medica-  
mentorum  
de variolis

Puer quadriennis, grassantibus in parentum domo variolis, iidem, quibus invadere solent, afflicti pathematibus. Mater hinc ipsam includit hypocaufto & lecto calido pedibusque lagenam aquæ ferventem plenam admoveat. Medicus senex consilium omnia habet rata, & præterea ob pavores & ad promovendam eruptionem spiritum cornu cervi cum essentia calidiori potrigit. Sed secundo die insultus accedunt epileptici, cum anxia & quasi suffocatoria respiratio, somno terroribus pleno maximeque inquietudine. Me igitur advocat, qui adveniētia fenestras provide aperit & stragula nimia removere jubeo, & loco spiritus cornu cervi, spiritum nostri dulcem, cum syrupo papaveris rheodod, item pulverem Marchionis, cum nitro & cinnabari exduo. Inde post paucum tempus symptomatum vehementia mitigata, penitusque remissis, macule placide & copiose prodierunt, totiusque morbi curatio ex voto successit.

#### Epicrisis.

Pessimus, vulgi in primis, mos est, variolosos calidissimo regimine excipere, & pessimum consilium expellens & sanguinem exagitantia offerre. Perirent enim hæc ratione plures, vel minimum in gravia adducuntur pathematibus. Memorabilia de eodem hoc cornu cervi spiritu est casus in *Almanach Medicina critica*, de tribus

libris, à paulo liberaliori ejusdem dosi, eneclia. Hinc laude merito dignus *Sydenham*, qui primus fere hunc errorem detexit, & contrariam plane suavit methodum, temperantia nempe, morum sanguinis nimium sedantia, anodyna & acidula temperata, cum moderato regimine.

#### OBSERVATIO XI.

Diu admodum tertiana laborarat puella quindecim annorum, qua demum discedente, variolæ publice circumcunctis successerunt, ut illa in has tamen non mutata videretur. Prodebant interim sciciter & sanabamur. Sed exsiccatis iidem, remanebat macula rubicunda acerbè dolens in labio inferiori, quæ aucto paulatim rubore, cum acuti ardore in tumorem plane elevabatur. Imposito à balneatore cataplasmatæ ex albumine ovi & bolo Armena, nigra cum vicina carne comparebat, sine omni sensu. Syphacelum igitur adesse rana, applicabat decoctum sic dictum nigrum, ex herbis amaricantibus, foliis quercus, cum aceto & vitriolo, sed malum longe magis invalefcebat, & brevi adeo putrida increfcebatur corruptio, ut labia cum gingivis penitus abluerentur ipsique dentes nigrore infecerentur. Admovebantur quidem alia putredini efficaciter resistentia, una cum internis alexipharmacis, sed frustra plase, agra ob id, contumax post aliquot hebdomadas viribus, multissime perenne.

#### Epicrisis.

Causa horrendæ catastrophæ vix alia, quam quod variolæ incidissent in corpus, in quo per diurnam febrem & calorem vires consumptæ, & benigni ac temperati succi dyscrasiam viciandam, impuram excrementis contraxerunt. Quam enim ipsæ variolæ jam ejus sint indolis, ut rufidos corporis succos consumant, & putres ulcerationes ob id sæpe relinquunt; mirum non est, cancriformi corruptionem in tam imbecilli & impuro corpore fuisse subortam. Dilectæ autem hinc medicinarum facientes, variolas in foedibus & infirmis corporibus circumspicere esse tractandas, & superatis iidem, eo quam maxime evitandum, quod dyscrasiam humorum per laxantia, diaphoretica, decocta & insula, tollatur penitus. Plures hæc de re legantur observationes in Consil. medicis *Tom. II. sed. IV. CXCVII.*

### CAPUT VIII.

#### De Febre Morbillofa.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

**M**orbillofa febris est catarrhalis exanthematica, ut plurimum epidemica, qua mox vitali cordis & arteriarum aucto, materia acris, caustica, inflammans, ex interioribus, nervosis maxime partibus, sub forma macularum rubrarum ad cutem pellitur.

##### §. II.

In scholia & scriptis medicorum plerumque quidem morbilli simul cum variolis pertractantur: nec negandum, multum utriusque esse affinitatis. Utraque enim febris exanthematica, contagiosa & epidemica, omnibus fere hominibus per-

Contrafe  
corrodit in  
labio post  
variolas  
subulit.

Morbillofa  
febris de  
sericina

Hæc diag-  
nisi &  
differencia  
a variolis.

perpetuanda; utraque certis temporibus magis, vel minus benigna, & fequitur quam maxime arthromyofitæ flatum, corporis difpofitionem ac temperamentum. Sed mihi placuit morbillorum morbum feorfim perquirere, quam insignis tam quoad causam & genum, quam diagnofin & prognofin, unice intercedat differentia. In morbillis quippe macria non tam pernicialis, non tam caulica, nec exulcerans ut in variolis, febris etiam totulque morbus ob id longe mitior, nec tam multos jugulat. Ante eruptionem morbillorum affunt quidem pariter inquietudines, pavores in fomno, cordis palpitaciones, facta efflorefcentia ceffantes, fed materia magis infesta eft pulmonibus, ideoque id fingulare habent, quod indivulfus comes fit, nullis violenta, ferina, qua infantes fepe per quatuordecim & longius ams die excruciantur. Præcedit etiam ut plurimum terofi humoris per nares & oculos cum flematione & palpebrarum tumefcentia fecelfio. Ex hæmorrhagiæ quoque tam nariam, quam in foeminis per utrum, cruentus quin vomitus, morbillis longe magis folentes, quam variolis. Præterea non modo mitius, fed & cius decurrit morbillorum morbus & fepe primo die, ut plurimum tamen poft tertium diem, prodeunt macule, per varia corporum fuccorumque difpofitione diverfe, in aliis latiores & ampliores, in aliis minores, in quibufdam inftar mortis pulicum, modo rubicundi & purpurei, modo pallidioris & magis plumbei afpectus. Macule hæ non elevantur in pufulas, ut variolæ, fed lenticulari aquali eminentia plantam cutis fuperficiem excedunt, facies & cutis in extremis minus intumefcit, & brevi tempore, quinto interdum vel fepto die, ruborem lentim exant, & fub auctiori perfpiratione iterum evanefcunt. Quotique nulla eveniat fuppuratio, neque dolor & ardor perfentitur, fed infignis declinante morbo prius in genis, labiis & toto corpore, ægros ad fcalptum excitans. Neque etiam fœda relinquunt verfigia, neque ulcera in auriculis & paribus externis, fed fuperfunt communiter fquamulæ fuffuraceæ, fuccellive decedentes.

## §. III.

Hæc qui novit, morbillos ex facili ab aliis cutaneis efflorefcentiis difcernere poterit. Periculis enim infignitudine & elevatione tanquæ notabilioris fuperant, longe minoribus etiam fymptomatibus fignatur & malignitatis ut plurimum funt expertes. In purpura alba, fœcus ac in morbillis, ex maculis pufulæ exigue pellucidæ furgunt; in rubra eminentie miliaries funt, duræ & afperæ. Rubellæ & roffalæ ad eryfipelaceam magis indolem accedunt, febreem habent irregularem & præterea in illis exanthematice maculæ minoris amplitudinis, ac morbilli, in his vero majoris, ut in fana univerfum corpus quali eryfipelate affectum, videantur. Et fcorbuticæ maculæ latiores funt ac morbillorum, coloris obfcure rubicundi, ut plurimum fine febre.

## §. IV.

Unde vero hujus omnibus communis morbi origo, hæud fœcus ac de variolarum caufa admodum eft obfcure. Si tamen probabili ratione concludendum, veri omnino fimile eft, materiam morbillorum effe ex recrementis primi fucci nutriti in utero, vel materiei lactis extra uterum, glandulis quibufdam forfan firmius impactis & ex longiori mora corrofiva plane indol-

Frid. Hofmanni Oper. Tom. II.

le imbutis. Sed bona fide hæc ignorare poffunt medicos, etiam rationales, dummodo perniciofalem indolem ex effeclibus & quo pacto his obviam eundem, fiant.

## §. V.

Interim morbilli per fe minus periculi habent, *Quæ male* & fœpius, poffiffimum in plebeis, fine molli ope, debito tantum regime, norum diffident. Interdum tamen, ob præcedentem ætiam, intalubrem, dumtaxat temporum conftitutionem, malignam habent, epidemici imprints, indolem. Vel accidentales etiam poffunt accedere caufæ, ægros in dietam adducentes. Malignitatem autem prædit viam impendit proftitatio, extremorum frigus, inquietudo fumma, vomitus, deglutitio difficilis mentisque alienatio. Malum dein, quando aliæ maculæ, virulentie non expertæ, ut petechiæ, purpura, vel etiam pufulæ forbuicæ, complicantur, vel in fite cum vice dactrimine fuperveniunt. Tuffis porto continua, cum alvi profluvio & inquietudine magna, infaufum præfigere folent evenum. Neque boni omnis funt fudores largi, præfertim in provelutionibus, qui ob malum dietam & fpirituoforum potum, calidam aliam & imputum fanguinem; ex facili enim admiſſo levi frigore, maculæ, fuſtello perquam erevæ, recedunt. Finio etiam morbo, fi tulficula cum raucedine perfiftit, niſi cito idoneis fuccurrant remediis, in pthifin, & hecliam fit tranſitus.

## §. VI.

Qui autem morbillis occurrunt, maxime ex infantibus, nono plerumque die fuſlocantur, evidenti indicio, nervofæ & glanduloſæ pulmonum bronchia, ob copioſam inflammantem materiam, fpaſmis & ſtagnatione humorum fuſſe afficta & ex nimio feri affluſu demum fuſſocationem induclam. In quibufdam fuperato morbo remanet alvi fluxus ad aliquæ hebdomades durans, talem cum morte demum inducens. In nonnullis etiam, præterea plebeis, febris fuccedit lenta, cum atrophia & abdominali tumore, fuſtello, ubi poſt mortem ut plurimum glandulæ meſentericæ magnæ & pulmones latentes vomicæ obſelli, deprehenduntur.

## CURATIO.

Medicatio morbillorum, iſſdem quam variolarum perficienda, acrimonia nimirum temperantibus, diluentibus & demulcentibus, cum iis, que ſub moderato leſti & hypocali calore, materiam hoſtilem actam ad corporis extima agunt. Proſunt igitur pulveres abſorbentes & diaſtoretici fixiores; leniter cinnabarini, item emulſiones & decocta. Quæ, quam præcedenti capite jam ſint uberius dicta, ſpecialia autem in cautelis dicenda, plura de iis hic aliter ſupervacaneum.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

Si ſuſpicio eſt in infantibus primam corporis regionem copioſa & crudis fuccis repleta, expedit in primo inſultu leni emetico, uti ex diſſido tartari emetici grano, cum ſyrupo de cichoreo cum ſubarbaro, eandem deſcribere. Quando etiam lumbrici laborant, & meatus eſt,

F 2

Alisq[ue] exanthematibus.

Non origo unde?

Quæ male

Medicatio

sub int[er]na  
non qua  
facienda

incursum epidemicam jam grassantis morbi, & re est, ut in infirmorum canalis prius à verminosa progenie liberetur, quod commodissime perficitur pulvis *Russ*, cum mercurio dulci & semine fantonici. Quod si negligitur, difficulter morbus superatur. In profectionis autem ætatis personis, si sanguis redundat, ut primis statim diebus subtrahatur necesse est. Declinatur sic non modo hæmorrhagie ominosæ, sed vidi etiam, hoc facto, remissile illico anxietates cum inquietudine & per universum corporis ambitum exanthematæ produci.

## §. II.

*Calida & frigida morbi.* Sicuti impensus calefactentia, cum nimio externo calore, materiam desiccantem ac subtiliorem reddendo, æstus cum anxietate augendo de vires dissipando, nocet; ita vicissim nitrosa & nimium refrigerantia, in ætate maxime infantili, oppido damnoisa. Retardant enim eruptionem, & resecta materia, ad sphacelum se disposita.

## §. III.

*Hydrobr.* Quando morbilli accidunt feminis, quæ spasmus hypochondriaco-hysterici obnoxie, vel mensium instat fluxus, haud raro animi deliquia, spirandi angustia, cum guttibus constrictione & ingenti præcordiorum anxietate, juncti solent, quibus materie in eam exinus præcluditur. Ignis tum nequitiam pellentibus calidioribus eruptio urgenda, sed potius adhibenda ea, quæ spasmos leniunt, enemata ex paracoricis & carminativis parata, interdum venæ sectio, nec non paxillulum calidioris & niri pulveribus bezoardicis admixtum: sic brevi post in conspectum veniunt maculæ.

## §. IV.

*Thilo.* Molestissimum in morbillis symptoma est tussis ferina, ad quam complacendum nihil utilius oleo amygdalarum dulcium, recenter ex non rancidis expresso, cum syrupo capillari remisso & in decocto avenaceo ad dimidium cochlear crebrius porrecto. Conducit etiam pulveribus absorbentibus & diaphoreticis admiscere dimidium granum extracti croci, & uti infuso theiformi, ex herba veronica, radice liquiritiæ, floribus papaveris rhœodæ & semine fœniculi.

## §. V.

*Diarrhoea.* Diarrhoea si concurrat, provide eadem tractanda, nec facile compescenda. Solvit enim sæpe morbum & multæ ac copiosæ sordes à corpore per ipsam secedunt. Ex rursimilis tum ad eluendam ex inextinguibili acrimonia, clysteres ex puris demulcentibus parati. Si vero finito morbo pertinacius insistit diarrhoea, commode pulveribus bezoardicis admiscenda aliquot chaccarillæ corticis grana, vel etiam tuncillum theriacæ celestis.

## §. VI.

*Quæritur anandum hæmorrhagica.* Quam sanguinis profusiones nimis mali sint omnino & plerumque malignitatis indices, eadem cum bonis ægrotum rebus moderari non minime res est prudentie. Exulent omnia positive adstringentia, item eminentius opiata & anodyna. Ego quidem sæpius cum fructu usus sum hac mixtura: recipe aquæ florum acaciæ, sambucis, lilie una uncias duas, theriacalis drachmas tres, antimonii diaphoretici, diacordii Fracastorii ana drachmam semis, spiritus virosi guttas XX. syrapi papaveris rhœodæ drachmas duas. M. Li- quor quoque noster anodynus mineralis cum pulvere præcipitante nitroso sumus, exoptatam sapienter præstat operem. Per amuletum vero fluxum

hunc compescere velle, noxium potius, quam salutare deprehendi. Infusa enim propria virtute nihil operantur, sed tantum impetum animi impressione, quæ tamen in periculosis ejusmodi affectionibus omni studio evitanda.

## §. VII.

*Malignia.* Ubi malignioris sunt indolis, appime ex usu est pulvis noster bezoardicus, cujus basis bezoardicum minerale, qui non modo sudorem & eruptionem blande elicit, sed simul etiam humores corruptos imbibendo, sedem movent, cum eujus horis. Præstabilem etiam sæpe deprehendi virtutem sulphuris antimonialis, nostra peculiari methodo præparari & ad dimidium, vel quartam granum partem oblati.

## §. VIII.

*Si febris.* Si sudore corpus nimium diffusi, ut lineamenta ex toto madescant, provide eadem sunt mutanda, prius probe exsiccanda & leniter calefacienda, ne ab eorum frigore materia exanthematice cum periculo certissimo recedat. Idem in mutatione lecti vitandum. Maximopere erigendum cavendum est, ne quis subito ex calido in frigidum concedat. Mortem enim inde intra aliquot horarum spatium vidi.

## §. IX.

*Post morbum facienda.* Quam plures, qui finita febre & discussis jam maculis præmature liberiori aëri se committunt & salubrem victus viæque rationem spernunt, ob retentas sic & adactas impuras morbi reliquias, in peiores morbos incident, asthma, vel suducativum catarrhum, phthisim & tuberc, quin ut observavi in conerachuram, serio monendi sunt convalescentes, ut per aliquot adhuc hebdomadas perspirationem folliculi custodiant & cum in finem utantur infusa theiformibus, leniter diaphoreticis & sanguinem mundificatibus, interposito nonnunquam, ad sordes per alvum evehendæ, balsamicarum pilularum usa. Victum vero habeant tenuem & aliquandiu à cerevisiæ potu abstineant bibantque decoctum temperans & diluens, ex radice scorzonæ, linsaparillæ, cichorei, liquiritiæ, hordeo mundo, cortice ligni lassiflæs, vel semine fœniculi. Quod faciat in omnibus fere morbis, hic etiam in febribus exanthematicis, utile est & maxime salutare.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Post morbum facienda.* Conquererebatur generosa puella, duodecim annorum, de lassitudine, inappetentia, languore virium & doloribus lancinansibus in cruribus & brachiis, præterea lividum & plumbeum faciei offerebat aspectum. Obstiduo post corripiebatur horripilatione, subsequente æstu & gravi dolore capitis lumborumque. Tercio die post in conspectum veniebant maculæ morbillorum, cum epidemiorum, tussis simul affligebat molestissima, & propter capitis oculorumque dolorem continuum, nec somnum capere, nec lucis ferre poterat aspectum. Quarto die sensim iterum evanescerant maculæ ex troici fere corporis ambitu, sed dolor capitis & oculorum remanebat & præterea alvus à primo morbi infusa erat ficcior, ut non nisi clystere folliculari responderet. Quam sic jam declinare videretur morbus, præter spem de novo accidebat summa præcordiorum anxietas, cum æstu totius corporis, fini, virium prostratione & difficili respiratione, prodibat postea purpura rubra, intermixta alba, sive miliaris, & dolor in oculis & capite supra frontem pertinaciter insitebat. Pugnabatur quidem contra hæc tam gravia mala, quæ acridinem



dinem humorum cum fplafmis mulcere & eruptionem placide promovere poterant. Senfim quoque remittente capitis dolore, puella convalefcebat; fed fupervento morbo vix etat imminuta, & fenfim incrementum fumens, intra menfem in varam guttam ferenam tranfit, ita, ut nihil plane vifu dignofcere poffet; licet oculi integri, & pupilla tantum duplo naturali amplior, comparerent. Multa & probata adverfus hoc oculorum vitium adhibebantur remedia, fed fruflra. Erumpentibus autem decimo quarto anno primum menfibus, fplendorem aliqualem receperunt oculi rufus. Hinc in confilium vocatus, fuafi, ut temperatis balnatiis menfium negotium fecundaretur, veficatorium miefus aliquandiu gelfaretur, oculi crebrius quotidie pinguetudine viperina recentis iungerentur & cum cibo nonnumquam aliquot guttas balnati noflri vix affumerentur. Quibus non quidem in totum, fed tamen in tantum refectus vifus, ut fub certo oculi fitu objecta, & quidem tantum dimidiata facie, confpicere poffet, ceterum optime valeret, ingreffa haud ita pridem matrimonium.

## Epietifis.

Semper fufpectum in variolis & morbillis, quando aegri diu ante eruptionem male habent & de doloribus artuum, vel certam partem perennitatis infelicitatibus conqueuntur. Hic fuccellit morbillis evanefcentibus purpura, tam rubra, quam alba. Aut igitur duplex fpecificae indolis materia impura inus delinuit, quae non fimul crinico moru, fed definita & fuccellivo fuit expulfa. Aut purpurea materia forfan per iftum febrem in morbillis languinis motum de novo fuit progenita. Dein nunquam etiam non fufpectum, fi gravis capitis & oculorum dolor, alias facta eruptione cellans, per totum morbum durat: grave enim ut plurimum capitis vitium relinquere folet; in hac guttam ferenam. Quae quidem infanabile femper fere vitium, in infantibus tamen & tenerioris texturae puellis, accedente menfibus purgatione, & immutata per hanc totius corporis, quoad folida & fluida, natura, difcutitur iterum, praeteritum fi natura fanationem moliens arte juvetur.

## OBSERVATIO II.

Juvenis cholericæ & ficcae conftitutionis, qui per aliquot annos in academia plus Veneri & Baccho, quam Mufis litatis, commovebatur aliquando vehementi ira, die poft afficiebatur aftru infigni cum languore artuum & dorsi dolore, noctem tranfigebat infomnem & nulli exercebatur valida, quae ferina plane fiebat, & comites habebat anxietates & cardialgias. Datis ardorem nimium temperantibus, poft tertium diem comparebant maculae numerosiffime intra XXIV. horarum fpatium univerfum corporis ambitum occupantes. Mirum autem inquietus erat aeger & impatientis, corpus jactitabat, tantum temperantem etiam lecti calorem refpuebat, & admiffa fubinde aera frigidiore, ut maculae omnes brevi iterum evanefcerent, faciebat. Oborietantur hinc anxietates cum magna inquietudine & fiti inexhauffa, ut intra diem & noctem quatuor minimum pilulae & emulſionis amygdalae epocaret menſuras. Porrigebatur quidem ad revocandam extrus materiam lenis diaphoreticum, fed propter aegri impatientiam & reſtigationem nihil proficiebat, fitis potius reddebatur

Frid. Hofmanni Oper. Tom. II.

intenfior, ut vix poffet exingui, & aeger vel feptem menſuras liquidorum abſumeret. Inde incidebat in alvi fluxum & vel decies intra diem deſiciebat, urina etiam effuſe fluebat, aegro tamen de interno ardore, ſi & anxietate conqueſcentes largiffimeque potum ingurgitaret. Fluebat ſic alvus per quaque dies, calida poſtea cum medicamentis ſpernebatur, neque maculae amplius comparebant. Nihilominus ſymptomata ſenſim mitiora fiebant, aeger melius habebat, & praeter ſpem intra XIV. dies convaleſcebat.

## Epietifis.

Singularis plane hic eſt caſus largi alvi fluxus, quo morbillorum morbus & quidem retrocedentium, ſoluus. Jam quidem nullum eſt dubium, quin materia morbillorum ſit cauſtica & inflammatoriae indolis, quae exitu praefluo inus reſerta, vel expulſa retroceſſit, firmiſſimae nervoſis partibus impaſta eſt, graves, immo exitiales, efflicere poſſit affectiones. In noſtro aegro inſeſſit unique ori, faucibus, ventriculi & inſtellarum tunicis, ac ſitim & ardorem cum leniori inflammatione ibi concitavit. Liquidum vero & quidem accommodatum copioſo potu, cauſtica materia, tam intra tunicas haerens, quam in ſuccis hoſpitans, mitigata aque correctâ fuit, & peroratus alvi fluxus, quo impuri ex univerſo corpore ſucci ore confluxerunt & evacuantur ſunt. Ego quippe crebrius obſervavi, in variolis & morbillis, ob impuros & redundantes corporis ſuccos, malum genium exhibentibus, ſponte obortum alvi profluviu, non modo ſine periculo, ſed & admodum ſalutare fuiſſe. Neque etiam facile in periculi plenius morbis deſpicere debet medicus, licet aegri magnam potus copiam appetant, modo per alvum, urinam & ſudorem iterum emittantur. Phores enim ſine, quam cum liquidorum appetentia, occurrunt.

## OBSERVATIO III.

Infans decennis, feliciter, ut videbatur, ſuperat morbillos, ſed tamen ea reſiſtitat alvi laxitas, ut quavis altiffima caſſiſſime per inferiora tranſirent, aderantque praeterea tormina ventris cum dolore pedum, qui tactu ſemper erant frigidi. Ad compediendum hunc fluxum, medicus manus peritus porrexit pulverem ex radice tormentillae, terra de catechu & unicornu ſoliſſi, cum paucillo laudani opati. Inde enim alvus quidem conſtitit, ſed acerbiffimus dolor occupavit ubiſum ſiniftrum in malleolo, quem mox tumor excipit durus & reſiſtus, qui tandem ſuppuratus & apertus ſanguinem cum copioſo ichore fudit. Succellit poſtea ſerpens ulcus, totum ferme pedem depalcens, cui febris cum tuſſi & difficili refpiratione ſupervenit, quumque ob nimium pectoris inſarctum infans non libere ſpirare poſſet, ſuſſocativo demum catatho fuit exſtinctus.

## Epietifis.

Saepe notavi, in infantibus alvum per totum variolarum & morbillorum morbum, & etiam poſt eum, ſine periculo fluxiſſe. Neque alia utilia deprehendi, quam diaphoretica fixa, ut cornu cervi philoſophice praeparatum, uſum, antimonium diaphoreticum, lapides cancorum, ſuccinum praeparatum, quibus pauculum corticis chaccarillae addidimus. In uſum quoque vocavi ſudala ex carminibus cum oliſſis

confusis, item cornu cervi parata, adjecta semper olei amygdalarum dulcium recentissimi portione quadam. Neque minus clysteres emollientes, ex decocto raparum exsiccatarum una cum buryro infusio, admodum fuerunt proficui, qui omnium optime acedinem humorum, colicam membranis possimum in ejusmodi diarrhoeis insidentem, contemperant ac mulcent. Contra ea periculofum omnino, alvi hunc fluxum adstrictivis sifternis sistere. Sic enim materia acris caustica, tenuis remanens & succis reddita, ad alia sepius loca relegatur, ubi postea atrocitas citius mala.

## OBSERVATIO IV.

*Emetici  
in morbis  
de prof-  
tuum.*

Lactans infans unius anni incidit in calorem praeternaturalem, cum pavore in somno & vomitu. Die secundo eruperunt morbilli numerosi, sed asperi & cutem quasi stringentes. Die quarto accessit summa respirandi difficultas & pectoris angustia cum anxietate, inquietudine, vigilia & pavoribus. Dedi sextam partem grani tartari emetici, cum drachmis duabus aquae florum cilii & quatuor guttis essentiae calloreae. Hinc quinquies deiecit infans viridissimam insular glutinis materiam, eoque facto vigor accessit toti corpori, respiratio facta liberior & morbilli rubore persufi magis. Oblata postea ad calorem temperandum gelatina cornu cervi in tenui decocto hordei, & feliciter evasit tenellus.

## Epicrisis.

Colluvies viscerum humorum in ventriculo, morbillorum processum turbare & gravia symptomata ita adiacere potest utique. Omnia enim quae circa quartum diem, quo alias morbus remittit, hoc in infante praesto fuerunt pathematata, non ex morbillis, sed cruditatibus acido-viscido-biliosis prima in regione stagnantibus atque corruptis, eorum traxerunt. Hinc exterminatis his per lenissimum emeticum, symptomata non modo protinus conquieverunt, sed & ipsa nanata gravi onere levata, eo felicius ipsi potuit succurrere morbo. Quoniam patet, nec quibus de critico die, ejusmodi in calibus leniora & prudenter exhibita evacuancia nocere, inter quae emetica, in infanibus praeterquam lactantibus, merito primas tenent.

## OBSERVATIO V.

*Morbilli  
non ha-  
morbilli  
dehiscunt.*

Puer undecim annorum, rubicundus facie, ingenio alacris, sanguine plenus & constitutionis calidae, correptus est immuni aestu, dorfi capitisque dolore, datis tamen temperantibus nitrois pulveribus, altero die habuit meliusculum. Tertio autem rediit urens aestus & quarto die sequentium narum stillicidium. Hoc quinto remisit, sexto vero effusus reversum. A septimo ad decimum miciora erant symptomata & sanguinis fluxus sibilus, erumpentibus passim morbillorum maculis. Sed breves induciae. Undecimo quippe die, rursus copiosa & naribus facta haemorrhagia & maculae evanuerunt. Duodecimo largius adhuc fluxit sanguis, ita ut vires mirum corruerent & aestus internus invalesceret. Decimo tertio die miciora pathematata iterum, die autem post cum haemorrhagia recruduerunt, donec consumatis profus viribus, decimo quinto die aeger efflaret animum.

## Epicrisis.

In variolis & morbillis deteriora semper notat symptoma est, effusus sanguis, per quatuordecim loca, fluxus. Indicat enim vehementes spasmodicas internarum partium, praesertim viscerum abdominis, strictiones, quibus inequalis redditur sanguinis progressus & ex uno loco in alterum cum impetu urgetur. Per nimiam etiam profusionem virium inducitur jactura, & minimorum ad extrema excurrentium canalium, per quos in cute eruptio fieri debet, exanaratio & subsidentia. Unde materia caustica retenta, novis citius spasmos novaeque haemorrhagias ac demum funestis eventus fit causa. Magnae itaque prudentiae est, haemorrhagias in morbis, quorum materia per cutem excreta, moderari perire, ne deficiat expulsiōis facultas. Ego quidem tum commendare soleo, ut omne frigus & frigidus potus vitetur, & partes extremae, manus & pedes, quae ordinario frigida existunt & contremunt, calore bene foveantur & vel lecto probe obtegantur, vel etiam aquae calido vino mixtae immergantur, quo revulsio sanguinis ad capite fiat, simulque spastica fibrarum contractio laxetur. Deinde eo quam maxime amittendum, quo caustica materia foras mittatur, eumque in finem danda diaphoretica cum temperantibus, cujus generis haec mixtura: recipe aquae cardui benedicti, florum sambuci ana uncias duas, theriacalis unciam semis, dialcordii Fracastorii, antimoni diaphoretici, neri ana drachmam dimidiam, mixturae simplicis guttas XX. syrapi acetosissimi citri drachmas duas. M. D. de qua bina, binis quibusvis horis, cochlearia sumenda, superbibendo semper calidum haustum. Et si praeterea aestus junctus nimius, interponendus est pulvis bezoardicus nitrosus.

## OBSERVATIO VI.

Vir generosus, macilentus & fibrosae corporis structurae, triginta sex annos habens, aulico ministerio fungens, ab aliquot jam annis, vini potui liberaliter indulgens & saepe inter potiores egerat tantum non herodem. Incidit is in morbillorum, aulicis tum familiarem & ab ipso nondum superatum morbum, sub quo ipsum praeter immoderatam aestum & inquietudinem, violenta tussis & summae anxietatis praecordiorum, noctu aequae ac interdum affluerunt, corpore a principio statim sudore diffuente. Medicus aulicus ordinarius in consilium vocatus, quatuor quibusvis horis, triginta guttas essentiae alexipharmacae admodum calidae portexit, & ad suum extinguendum liberalem potum cerevisiae valde spirituosae concessit. Interim expulsi maculis anxietates remiserunt & spiritus liberior megit. Quam acaem induratum sudore totum maledens & frigidum mutatus, a ministro imperio recens minimeque calefactum acciperet, illico omnes omnino quibus corpus confertum obflesum maculae disparuerunt. Inde tanta sequuta inquietudo, anxietas cum virium jactura, ut omnibus morti videretur proximis. Ego tum temporis praesens accersitus exhibui illico pulverem meum bezoardicum cinabarinum cum aqua analeptica, nec non liquorem anodynum mineralem cum electura antimoni temperata & aliquot guttulis spiritus Bulliani; quibus paulo post de sudore maculae redierunt, aeger melius habuit & pulsus aequa, celer & debilis, plenior ac aqua-

lis redditis. Sed febrimo die, quum sudor effusus adhuc maneret & aeger in alium lectum ob madorem se conferret, rursus cuncta evanuerunt exanthemata, extrema frigida facta, accessit anxietas maxima & spiratio difficillima, pulsus etiam contractus & parvus redditus, & brevi post, præcedente rigore & convulsione artuum, est extinctus.

#### Epitaph.

Morbili, non secus ac alii morbi exanthematici, sequuntur maxime constitutionem solidam & fluidarum partium corporis aegrotantis, adeo, ut quo intemperatio hæc, eo pejoris indolis sit ille. Potissimum, de vini potu deditis, crebriori confirmatum habeo experientia, quod raro ex febribus exanthematicis evadant, eo quod febrilis illa intestina partium sanguinis commotio, in plenariam tandem dissolutionem abit, cujus index largitissimus sudor cum insigni virium lapsu. Medicus igitur, calida essentia, quæ æthum magis accendit, nocuit potius, quam profuit. Si quoque dissolutionis talis humorum vitalium est status, levis etiam in rebus externis error, uti refrigeratio, linctaminum mutatio, sinus erectus, immedicabilem possunt inducere noxam. Et quo languidiores sunt in exanthematicis vires, eo plus semper metuenda recessu materiz exanthematicæ, qua vise nihil est infensius.

#### OBSERVATIO VII.

Puelli tres, unus sex, alter quinque & tertius trium annorum, filii viri perillustri Serenissimo Duci in Saxonia inferiori à consiliis, corripiebantur successu morbilli. Commendatione generose formæ in consilium vocabatur novellus Medicinæ Doctör, qui intempestivo nitri amore à præceptoribus imbutus, larga & repetita dosi, præter pulveres refrigerantes nitrolos, exhibebat nihil. Inde retardabatur macularum eruptio, spiratio fiebat angusta & difficilis, tussis continua sine screant, accedebat asthma internum & intra septem dies, tres pueri occubebant, cum ingenti parentum luctu.

#### Epitaph.

Non ex unus, sed plurimum fide dignotum relatione, de tragico hoc casu certior sum factus. Crebrior ac liberalis refrigerantium nitroforum usus unique vitandus est. Nam licet nitrum purum merito principem teneat locum inter ea præfida, quæ æthum extinguunt, & spasticas commotiones compotant, & ego etiam jam ante quadraginta annos eodem frequentius usus fuero, quin forsan primus, testantibus id variis scriptis, cum dissertationibus, tum notis ad *Poetterum*, salutem nitri facultatem perpexerim & exposuerim; nihil tamen fecius usus ipsius, haud secus ac aliorum magnæ virtutis remedium, peritum ac prudenter exigit medicum, & ex ejus abusu, ab his, qui medicinam rationalem nec callent, nec exercent, damna inducunt novi, & plura, & gravia. Certe, in morbis exanthematicis, ubi non nimis urget æstus, in febribus catarrhalibus, item malignis, in quibus humorum potius corruptio, quam exanthematis metuenda, in corporibus maxime humidioribus & infantilibus, omni modo à liberali nitri ulu abstinendum. Ob nimiam enim refrigerationem remanet ignis furas excoquenda infensio indolis ma-

teria, atque ut putredinosa dissolutio humorum corruptio magis augeatur, facit. Et quum materia morbillorum maxime infensio hæc sit indolis, ut firmiter insident nervis pneumonici & tunicis pulmonum nervosis; nullum omnino est dubium, quin in his puellis non emota, ibi impacta hæret & suffocatoria humorum flates sufficit. Cæterum hoc loco monendum duxi, me in infantibus, quando morbilli prodire noluerunt ipsorumque materia alius insident pulmonum bronchiis suffocativum intenuavit catarrhum, insigni cum fructu usum esse vesicatorio, quo sopiti canalium ad expulsiorem necessarij motus, quam optime relinquantur.

#### OBSERVATIO VIII.

Comes illusterrimus, vignei armorum, cholerico-sanguineus, nondum venæ sectionem passus & pathematibus spastico-hypochondriaci, cum stomachi inflatione & crebriori post cibum vomitu, obnoxius, grassantibus epidemice morbillis, languere corpore & conqueri de anxietate præcordiorum, dolore capitis, dorso ac pedum, tussi frigida, interno æstu, intercurrente horripilatione, cure arida & sicca. Tertio die compa-ruerunt in fronte stigmata rubicunda nonnulla, pathematata tamen noluerunt remittere, nec plures etiam postero die efflorescere macule, pulsus interim pleno cum celeritate vibrante. Venæ in pede petula, sanguis cum impetu exiit floridus, variegatum post refrigerationem contrahens cuticulam, & inde illico anxietates & vehementes capitis dolores remiserunt. Quin licet primum stigmata in fronte disparere viderentur & pulsus admodum celer cum duritie micaret, aeger etiam noctem insomnem fere ob æthum & compunctionem in cune sensum daceret; mane tamen in conspectum venerunt in facie & pectore macule morbillorum, pallidiores initio, successive autem magis rubentes & reliquis quoque corporis partibus conferent occupantes. Discessit hoc factio capitis, dorso & pedum dolor, cum pectoris angustia, nulli de interno calore, ac aeger melius habuit, conqueffus tantum de molliore præter ardente & sensuosa cutis. Potissimum vero ipsum excruciauit oculorum ardens dolor cum rubore adnasæ & illacrymatione, ita ut lucem ferre non posset de noctu palpebre conglutina-rentur. Nono die obortus sudor largus, decimo etiam manans & acidum feridum odorem spirans. Undecimo intra nycthemeron sexies de-jecit sine torminibus sponte & macule ruborem sensum exuerunt, decimo tertio die penitus dis-sulæ, subsequente curæ desquamatione & san-natae.

#### Epitaph.

Quum in his, qui spastica hypochondriaci detinentur pathematibus, nunquam nova major succotum impuritas & acrimonia esse solet; huic etiam illusterrimo aegro ejusdem constitutionis ea fere unica exhibita sunt, quæ demulcent ac temperant, pulveres nempe temperantes & diaphoretici, leniter nitroli, emulsiones, exoptato cum successu. Venæ sectionem autem, quum pulsus admodum plenus & valæ turgida essent, eruptio quoque retardaretur, necessarium duxi, crebriori experientia edoctus, sanguine nimium tedundante, difficillime, eodemque subactio, promptissime succedere materiz exanthematicæ expulsi-onem. Insolens vero ille oculorum ardor, ru-

Morbili  
in hypo-  
chondriaci  
stomat.

Morbili  
ex refrigerantium  
nitroforum  
abusu in-  
dolis.

bor & fluxus serofus, tribuendus unique est eorum debilitati in potiora jam ex crebrioribus & diuturnis acutis defluxionibus contractis. In quibusvis enim fere morbis solemne est, ut partes ex prægresso morbo debilitatæ, præ reliquis graviter afficiantur, ob decubium humorum promissi ibi contingentem.

## CAPUT IX.

## De Febre Purpurata rubra &amp; alba miliari.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*Purpura  
distinguitur.*

**F**ebri purpurata est catarrhali ætymologia, exanthematica, quæ motu systematis tam vasculosi, quam nervosi intensiori, materia lymphatica corrupta, specificè indolis, ex interioribus, maxime nervosis partibus, ad summam cutem, seu conveniens emunctorium, sub forma pustularum minimarum miliarium, asperarum, rubrarum vel albarum, salutariter protrahitur.

## §. II.

*Interdum  
acutius  
differt.*

Jam omnis quidem materia exanthematica in eo convenit, quod acrimonia sua nervos male afficiat ac in æstusum intensiorem motum universi generis valorum & sensilium partium excitulet, eoque tandem exterminetur. Attamen sicut acrimonia causifica in vegetabilibus & mineralium venenis peculiarem obinet indolem, & ob id peculiaris cuiusvis speciei propria suscitât pathemata: ita etiam singularis & specificam cuiusvis exanthematicæ materiæ esse naturam, non tam à priori, quam potius à posteriori, effectibus & phenomēis obvis, innoscit. Scilicet in petechiis, variolis, morbillis, febre urticata, scarlatina, rossialis, rubelulis, maculis scorbuticis, scabie, herpese, phlyctenis, epinyctidibus, gutta rosacea, impingine & sudaminibus, subest semper acris quædam materia, quæ modo cum, modo sine febre, per cutis emunctorium proficiscitur, sed unumquodque ex his exanthemata peculiaribus incedit symptomatibus, de quibus singulis suo loco scilicet.

## §. III.

*Quibus  
purpura  
distinguitur.*

Nunc quomodo ab aliis exanthematicis morbis purpuraceus differat, exponendum duntaxat. Hi autem ipsius sunt characteres. Efflorescunt pustule minimæ semē nulli amplitudine æquantes, numerosissimæ, cum conurbatione, aspritudine & ariditate cutis & spargunt factorem peculiarem plane. Nullum aliud exanthema tam instabile, crebro ac celeriter retrocedens, iterumque comparsa, ac purpuraceum: nec ullum etiam, tam crebro intercurrente mox pruritu & punctura, stipatum. Alia exanthemata omnibus æque regionibus incumbunt, & nobiliorem æque ac sequiorem sexum infestant, purpura autem in certis tantum locis familiaris & quasi endemica, ac præterea feminis magis quam viros, maximeque puerperas, corripit. Alia magis epidemica sunt, contagiosa & sequuntur constitutionem aeris, sed purpura magis ex vino viscerum & fœcorum quam aëris aboritur, nec epidemica est, nec adeo contagiosa.

## §. IV.

**I**psa dein purpura inter se differt & definit à medicis in rubram & albam displicitur. Utraque magis, vel minus acuta, benigna, vel maligna. Rubra ob pustulas rubicundas ita dicitur, ac ut plurimum minus periculosa, febris expers & chronica est, ut non modo diutius corpori inhaereat, sed & sæpius statim anni temporibus redeat, de qua inferius figillatim. Interdum tamen etiam febre stipatur & acutè indolis esse observatur. Alba vero magis acuta est, nec facile sine febre occurrit, ideoque plus alit periculi. Hæc etiam non tam facile redit ac rubra, puerperasque magis & feminas juniores, teneriores serofas corripit, quam rubra, quæ adultioribus potius, succa & sanguine fartis ipsique vini familiarior est.

## §. V.

Nonnunquam purpura idiopathica est, nonnunquam symptomatice, & aliis, maxime continuis febribus, ad exitum vergentibus, supervenit. Admodum enim familiare est, quod purpura rubra, vel alba, vel utraque simul, variolis, morbillis, synochis puridis, ardentibus quoque & petechiantibus aliisque epidemicis, in declinatione accedat, novam febrem accendat, & ægram, fractis & priori morbo vitibus, jugulet. Id quod potissimum evenire solet in iis, qui intemperantius vixerunt, largiori & quotidiano potui indulerunt, veneris tamisio exercitio vires consumserunt, & peregrinam faciem induxerunt diathesin; nec non in iis, in quibus sub morbi decursu alvus diutius clausa, aut inconsulta medicatione refrigerata & julapia nimis liberaliter sunt usurpata. Quandoque etiam in acutis febribus, maximeque variolis & morbillis, primis statim diebus, cum cuis aspreddine apparet purpuracei quippiam, rarissime pariter cum solici morbi evenit. Neque minus catarrhalibus febribus, cum tussi & spirandi angustia, subinde in infantibus sese affociat purpura, vomitu, vel etiam alvi fluxu stipata, quam, si inclinat morbus, pedum & quandoque abdominis tumescens, cum, vel sine ariditate superiorum partium, excipit, donec tandem sudoribus, vel spontaneis, vel arte proleptis, ex toto cedat.

## §. VI.

Idiopathica autem purpura his potissimum incedit symptomatibus. Præcedit levis horripilatio, quam subsequitur corporis exaltatio, cum ingenti languore vicinque interdum ad lipothymiam usque dejectione. Præcordia stringuntur, pectus angitur, adhiæta alta suspensa, inquietudines, vigilæ, vel somnus minimus laboriosus & interurbanus. Aëstus compunctiorius in dorso sensus percipitur, alternante frigoris, horroris & caloris intra cutem affectione, in vola manus maxime sensibili. In puerperis lochiorum fluxus retinetur & lac è mammis reforescat ac stillare cessat. His succedit cutis asperitas & instar ætærinæ conurbatione, exurgentibus innumeris pustulis, sive albis, sive rubris, sive utriusque sitit vicem appollitis, nulli semē figura & exiguitate referentibus, quæ primum collum, deinde pectus & dorsum ac postea brachia & manus occupant. His in summa cute efflorescentibus, graviora antea pathemata misceantur, pulsus durior prius, contractior & celerior, mollius, liberius & remissius undulat, animi vigor dejectus redit, arida cuis madeficit, & alvus ante hac compressa tam firmius, ut nec fluitibus transiret pateret, laxatur, & non solum hæc, sed & nonnunquam stercorea,

*Alba est  
vel alba.*

*Idiopathica  
est, vel  
symptomatice  
acuta  
infans.*

*principio*

*non non catarrhalibus  
fere acutis  
dicitur.*

*Idiopathica  
est purpurata  
hyperæmia.*

stercora, sponte protrudis. Postea vesiculae sensim sensimque explicantur ichore foetido plene, urina magis saturata prodit, & sudor singularis huic exanthemati proprii foetoris erumpit, sanguinis per lochia fluxus repetit, & intra septem vel plurimum adhuc diuturnum decursum, cum insigni extensorum pruritu, pustulae disparent, arescunt, squamularum instar decidunt, & aeger sensim vires recipiens, ad pristinam redit sanitatem.

## §. VII.

Materia porro, quae exanthematicum hunc morbum proxime facit, ex pravo & corrupto in corpore est succo; ita tamen, ut, quum duplex sit purpurae genus, duplex hic etiam sit asserendus. Jam unum in macrocosmo, sic etiam in microcosmo, duplex datur liquorum corruptio, una acido-vappida, paullo fixioris indolis, altera sulphurea foetida, indolis magis alcalinae atque volatilis. Illa cadit in succos, qui salino & sulphureo elemento minus instructi sunt, petiissimumque in pellucidum, insipidum illum gelatinosum lymphaticum humorem; haec autem in sanguinem & succos, qui copiosa sulphurea & salina substantia fiarent, inter quos quam maxime connumerandus, ille, qui sanguini admixtus, spissior tamen varisque coloris est atque saporis, serum dictus. Hunc igitur corruptum purpurae rubrae, illum vero albae & miliaris causam esse, censuimus.

## §. VIII.

Lympham enim alba in purpura acore esse infectam, evincunt plura. Nimirum solentis & tantum non essentialis huic exanthemati est nimia feri secessio, per sudores effusus, urinas copiosas tenues, salivationes quandoque, quandoque dejectiones aquosae. Acidi autem is effectus, ut sanguini insinuant, partes eius crassiores in coagulum mittat, serosa secessum facientibus. Deinde omnis generis acida & refrigerantia, ipsum quin nitrum, largius sumpta nocentissima; quae vicissim acidum abundant & sanguini ac lymphae blandam spirantem conciliant, saluberrima. Foeminas porro quae horae fructibus, acetariis, dulcibus, farinaceis, acerbis, sub otiosa & sedentaria vita delectantur, frequens quam maxime in puerperio febris miliaris. Ne dicam, multos illos sanguinis grumos, quos in vasis majoribus & thalamis cordis inventiunt, qui purpura alba defunctos dissecuerunt, luculenter arguere, praesto fuisse acidum coagulans.

## §. IX.

In rubra purpura subelle vicissim serum acre salino-sulphureum, testatur pruritus & ardor cutis, in hac longior impensior, ac in alba. Idem ex eo patet, quod rubrum hoc exanthema, maxime eos invadere solet, qui sanguinis impuri copiam alunt, scorbutica, senibus, foeminis, quae menstrui, & viris, qui haemorrhoidum defectu laborant, diuta salia, vinosa, cerevisia crassioribus & tabaci fumo delectantur, praeterea quoque laxiori corporis habitu praediti, vitam agunt motu expertem. Quod porro sordes acres serosae, per cutis poros eliminandae, aut aura frigidiore, à potu nimis refrigerato, corpori sudanti ingesto, sub repentino terrore, ad interiora repressae, frequentissime talem morbum inducant exanthematicum. Quod etiam medicamenta, quae salium spicula involvunt, item temperantia, rubram purpuram egregie proleant; calefacientia autem & volatilia, nec non effusivum regimen, eodem modo ac in scabie aliisque cutis defor-

dionibus, ex prava, acri & salia humorum diaethesi oriunda, doloris, ardoris & pruritus faciant augmentum.

## §. X.

Omnia igitur, quae succorum & abundantiam & impuritatem ingignant, ad generationem purpurati mali concurrunt remedia. Evenit autem hoc in iis, qui laeto & pollucibili victu, nonnulli leves cibos, farinaceos, placentas, dulcia, fermentescibilia & horum fructus admittentes, item qui potu parco, crasso & aqua quoque impura & squalida utuntur; qui in aere degunt insalubri, minus puro, sed vappido, multique sordida & putridis halibus repleto atque corrupto; quo purpuram subinde generari, maligniorum fieri, epidemiam quandoque, nonnulli etiam locum magis familiarem, atque anni temporibus, Martio imprimis atque Aprilis frequentiorum, experientia docet. Frequens porro purpurae generis in iis, qui alvum gerunt strictiorem, qui perspirationem incuriosius habent; quibus critica supprelle, aut confusae sanguinis evacuationes ostille, quibus vicissim largius sanguis effluat, vel subreclus, cum virium defectu, qui animo crebris iactantur, moriori imprimis ac diuturnae solitudinis indulgent, qui vigiliis & impensioribus meditationibus robur avertunt, qui denum vitam ducunt otiosam morisque expertem. Neque minus praeter alia huic morbo parent, qui laxiorem corporis habitum & temperamentum sic dictum sanguineum, vel phlegmaticum obtinent, aetate magis infantibus, quam adultis, senibus quam floridis, sexu, magis foeminis, quam viris. Ex foeminis, non tam plebeis & minus delicatis, quam potius teneris ac nobilioribus, fluore albo aetate affectis & omnium maxime puerperis.

## §. XI.

His autem quod adeo infecta sit purpura, & quidem alba, plerumque maligna, ob peculiaris quidam sit causa. Velicet foeminarum plurimae redundantibus in corpore alui lymphaticos & aquosos humores, adeoque acide potius patent humorum vappellentiae, quam salino-sulphureae corruptioni, & ob id purpuram potissimum nanciscuntur albam. In gravidarum deinde utero, sanguinis tam progressus, quam regressus, ob nimium eo appulsum & valorem distensionem, valde languidus est ac tardus. Hinc subsistente ibi diutius sanguine, lymphaticus humor in vasa ipsi vehendo dicta, magna copia secedit. In quorum diverticulis quasi incarcerationis harena, longiori mora vappellit, corrumptur & acorem contrahit, avolantibus quae rationem conservant spirantibus & subilionibus particulis. Quodcumque igitur enixio foret, uterum concidit iterum, neque squalidus lymphaticus humor cum sanguine foetulo loco lochia sufficienter expurgant, accedente ordinario tercio puerperii die, motu febrili, Germanis *das Misch Fieber*, in vasa majora se reprimunt ipsique cordi infundunt, ex quo maligui instar fermenti per corpus diffunditur totaque sanguinis & lymphae massam inquinans, vires deicit, vigorem animi perfundat, anxietates, pectoris compressiones, suspensio, cordis tremores cum spiritus difficultate facit, sudores colliquativos mucidos, corruptum acorem redolentes, non nunquam plane frigidos, sulcat, formam arceat, donec vel brevi post, die tertio aut quarto à puerperio, interdum septimo, quandoque etiam decimo quarto demum

Purpura acris  
in corpore  
fucata.

In alba  
lymphae  
aciditatem  
pura.

In rubra  
serum acre  
salino-sulphureum.

Causa pro  
generata  
et subita  
ita.

Quae purpura  
infecta  
purpura alba  
in maxime  
et maligna  
est.

die, in conspectum prodeat album hoc exanthema.

## §. XII.

Sed quum enumerare hactenus purpuræ causæ, prælo fuerint jam prædicti omnes; disquirendum merito: cur ante aliquot demum lustra prodierit & subinde latius sæpæ? Jam vero ex his, quæ succis vitalibus materiam, temperiem & interperiem largiuntur, nihil novimus immutatum, præter frequentissimum factum potum calidorum, herbe tibi imprimis de sabarum coffeæ, usum. Experientia enim docuit, non plebeios de inopes, qui victu simplici & potu suto utuntur, sed honoratiores, opulentos, qui laute vivunt & potum calidum in deliciis habent, purpuram potissimum infestari, & in locis ubi mos invaluit liberalius ejusmodi potum subministrandi, purpuram etiam plus regnare & propagari, quam in aliis: in hunc igitur culpam esse rejiciendam admodum credidit. Non jam dicam, fabas collæ exoticas, peregrini quippiam nobis mixtioni sanguinis minus congruum custodiæ, sub aduisione aliquid sulphuris empyreumatici nervosis partibus minus amici suscipere, ac præterea saccharum cum decocto hoc assumunt copiosius fermentescere & cruditates mucosas, acidas, augere. Id potius minimum pro certo habendum, calidum potum fordes intestinorum & lala scorbutica acris perurinum evehenda in sanguinem agere & una cum hoc ad cutis emanatorium pellice, ubi non ut sudoris materia promte diffusi possunt, sed obarscunt maculæque sive pustules protrudunt; imprimis quum post ejusmodi calidum potum perpiratione non secundatur, si d. concessione in frigidam auram sufflaminatur. Ut adeo nequam mirandum sit, quod sub inconsueto alias, jam vero communi abusu frequentissime & statim post cibum assumti potus calidi, ipsa naturalis mixtio & crasis partium sanguinem constituentium multum immutetur & nova plane ac alia ingignatur, quæ in utero cum sanguine materno in foetum transfusa, ipsius purpuræ morbi semina, & ad illam dispositio jam latius propagantur; uti quidem pluribus docui in dissertatione de purpuræ genuina origine, indole & curatione.

## §. XIII.

Ceterum purpuram albam periculosiorem esse rubra jam diximus. Prognosis vero de successu & eventu hujus morbi ex dispositione corporis laborantis potissimum desumenda. Aegrius quippe sanescit magisque anceps est omnis purpura, quæ cadit in corpus imparis facis factum. Hinc viri quibus hamorrhoides & semina, quibus menses resistent, parcius fluunt, aut plane ob ætatis rationem emanant, nec non quibus lochia suppressa, gravius semper & diutius hoc morbo decumbunt. Hinc gravidæ, quæ alvi adstrictioris & sub sedentario vite genere, neque medio gestationis tempore, neque ultimis mensibus sanguinem redundantem nutrant, in puerperio majorem purpuræ experientiam vehetentiam. Dein majus etiam semper discrimen in imbecillitate, sive matura, sive ex morbo, sive alia ex causa affectis, omnium vero maxime in iis, qui per crebriores animi commotiones, diuturnam imprimis molestiam, genus nervorum reddiderunt debile & ad spasmos anomalos motus concipientes proclive. Neque minus plus metuenda, quæ sub aeris constitutione insalubri, febres malignas, pectichiales passim ingignente, impetit.

## §. XIV.

Inter suspecta vero in purpura signa connume-

randa hæc. Quando exanthematibus sufficienter expulsi, pullus præter naturam durus & auctus manet, somnus nullus, inquietudo magna de spiritibus difficilis. Quando statim sub initium & per totum morbi decursum sudores effusius manant, urinae pallide copiosæ redduntur, vel continuas ad mingendum stimulus, vel etiam urina crassa asæa & tincta, subito limpida, tenuis & pallida prodit, nec non quando alvus cum terminibus fluxa nimis, imprimis in puerperis. Mali præfagii est, si pustule purpuraceæ modo comparent, modo evanescent & sympnoriata vehementia semper eadem infestant. Pectus adhuc, si materia relapsa interioribus firmius inhaereat omnique expulsiōni obstitit, hincque pectoris cum suspensio oppressio intenditur, fauces stringuntur, virium prostratio increfcat & præcordiorum anxietas cum inquietudine augetur. Funesta demum indicia, quum hærentes intus delecteria materia, interiora ardent & extrema frigent ac rigent simulque copioso frigido sudore perfunduntur; aut vicissim quando extrema ardeant & in abdomine frigoris sensus percipitur notabilis. Hæc enim ubi prælo sunt, æger ut plurimum lipothymia occumbit lethali, ob inflammationem & sphacelationem, quæ ventriculum, intestina, cerebrum, vel in puerperis ipsum uterum, afficit.

## PRÆSERVATIO ET CURATIO.

## §. I.

Nullus quidem morbus tam ægre penitus extirpatur ac purpura, quæ plerumque relinquitur fermentum ipsam denovo inducens: sed hoc imprimis propærium chronicæ illi purpuræ, quæ quo pacto sit arcenda, inferius dicetur. Jam de febre mihari. Quæ cum potissimum seminis, & quidem puerperis, sit solennis, qua ratione hæc ab ipsius incuria defendenda, tradendum. Sub gravitate igitur exacta victus ratio servanda, corpus motu moderate exercendum, ventri ad refrigerationem defendendum, sanguinis copia venæ sectione ter, vel quater, in superioribus infusa, minuenda & alvina excretio subinde secundanda per mannata, rhabarbarina & tartarea. Inflante dein parvo, non per præmanurum tñum vires convellende, nec pellentes humores exagrandi; post partum vero necessarium, quo impurus sanguis expurgetur utero & succi a cacochymia contracta liberentur. Sedao hinc secundo die impetu, omnis generis excretiones modeste promovenda & alternis diebus pilule balsamicæ corroborantes, vel solæ, vel, si citius adhuc pulsus, cum pulvere temperante natrolo, deglutienda. Tum quoque conducit cum falcis tenuioribus dare ea, quæ ipsam leniunt, sanguinem grumosum dissolvunt simulque perpirationem servant, sperma scilicet ceti, oleum amygdalarum dulcium, infusum theiforme ex floribus sambuci, chamomillæ & fumizantibus millefolii, pulveres diaphoreticos, nec non mixturam ex aqua analgetica & diaphoretica, cum aceto destillato, lapidibus cancerorum & syrupo acerositate citri.

## §. II.

Ipsa vero purpuræ curatio ad tria hæc redit momenta: I. ut vitiosa, quæ subest, acris, nervosis partibus infesta materia corrigatur ac temperetur; II. ut spasticæ fibrarum nequærum inde productæ stricturæ laxentur; & III. præparata materia placide per cutis emanatorium evacuetur, nec retrocedat. Ego quidem hæc medendi indi-

signa prælo.

Curandis indicandis.

indicationes perfecti hñre ex multis probatissima auxilia. Ad arcedinem diluendum & nervos male affectos partes mulcendas, apprimere unila decocta humectantia, ex satura cornu cervi, radice scorzonera cum hordio & liquiritia, gelatina cornu cervi, nec non serum lactis, nostra methodo paratum dulce. Idem faciunt & præterea expulsiorem juvant emulsiones, ex aquis diapnoicis & antispasmodicis, cum semine napi, cardui Marie & papaveris albi. Inprimis etiam duplici hoc nomine conducunt pulveres temperati bezoardici, cujus generis est *Ludovici* atque *Severini*, nec non ossifer. Quibus ad æstum temperandum & spasmos componendos subinde succum citri instillare, pulverem præcipitantem nitrosum, vel tarissimum croci, aut castorei, pro circumstantiarum ratione admiscere, vel eorum horum usum interdum liquoris anodynæ mineralis dosi interpolare, sæpe in vehiculo appropriato ex aquis destillatis propinare solum. Ex si purpura erupio jussu impeditur, vel retrocesso metueda, aut jam facta, instat omnium est idem anodynum liquor, remissus cum turis parte spiritibus bezoardici, ad mensuram *Bausti parati* & à me in *Observationibus phlogico-hymicis Lib. II. obs. XXVIII. pag. 378.* descripti.

### CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

#### §. I.

*Trunc in  
regimine.*

Purpura, morbus omnium delicatissimus, nihil plane fert excessivum, in regimine æque ac medicamine. In regimine quidem æger semper in moderato & æquali calore, tam læti, quam hypocausti, detineatur, eo quod nimis æstuosum vires frangi ac primum ardoremque cum anxietatibus augeat, frigida exanthematum eruptionem impedit, subsequente languore & angore, & inæquale expulsiorem retardat, vel minimum instabilem facit purpuram. Vincitur etiam stragulum & indusorum quantum fieri potest mutatio, ac potius jam erita, sicca & fumigata injiciantur.

#### §. II.

*Calida &  
alexipharmaca  
non sunt.*

Quam graviter dein calida & alexipharmaca medicamenta nocent, docuit sine ulteriori experientia, qua constat, ealem cum æstuoso regimine, in causa esse, quod ingruente primum novo hoc morbo, omnes sere perierint, quam jam sub temperata methodo plurimi evadant. Quam liberalior tantum infusorum & decoctorum calidorum potus, sudorem nimium movendo & serum plus jussu exhauriendo, officit. Ubi vero motus est retrocessionis, vel hæc jam facta, tum potus calidus præsentis efficacit, & moderata quoque expellens locum unice invenit.

#### §. III.

*Rem refrigerantia.*

Vicissim refrigerantia & intestinum motum nimis sedantia intus deissent materiam, & anxietates ob id ac languores cum periculo intendunt. Ipsum nitrum circumspicere usurpandum. In alba enim purpura & ubi malignitatis indicia, refrigerationes externæ cum æstu subinde intercurrente, præsto sunt, ab eo plane abstinendum. In rubra vero purpura, sive alba cum rubra conjuncta, ubi internus adest æstus, cum sibi & pulsuum magnitudine, medicamenta diaphoretica lenius nitram omnino accommoda.

#### §. IV.

Cerevisia etiam potum nullus minus fert morbus quam purpura, eo quod multas impuras, crassas & heterogeneas partes in sanguinem & lympham invehit. Hinc ego quidem semper purpura laborantibus auster sum, ut ab omni cerevisiarum genere abstineant & bibant decoctum ex radice scorzonera, farfapavilla & cicchorii, cum radice cornu cervi, hordio mundo & paulillo seminis feniculi, vel alii stillati.

#### §. V.

Alvus in purpura nec nimis laxa, nec nimis stricta esse debet. Si enim diutius retineatur, morbus inde nascitur potius & longius extrahitur, si vero purgantibus, quin laxantibus omni violentia destituta, intempestive docuit, materia per poros eliminanda revocatur & præcordiorum angustias, tormina & ardores in venire, nauseam & stomachi subversionem implicat. Hinc in purpura tam idiopathica, quam que aliis exanthematicis accedit, tanto magis maligna, alvum nec paullo ante, nec paullo post eruptionem irritare licet, sed quando vis morbi deservit & purpura siccificare incipit. Neque tum vix aliud expedit remedium, quam chylor emollicent, injiciendus sub symptomatum remissione, plurimumque matutino tempore major, quam vespertino de nocturno est.

#### §. VI.

Sanguinis missio maxima cum prudentia instituenda; nam in purpura alba & maligna, quam summa virium prostratio, cum largis sudoribus & debilitate ac frequentia pulsus, arguit, plaventa est admittenda: contra in insigniter proclat, quin necessaria est puerperis, quando lochus reteritur, symptomata purpuram comitantia ejus incurium nunciant; cito tamen administranda. Sæpe enim sæpius observavi, summas præcordiorum anxietates, animi defectiones, laboriosam & anxiam spirationem scilicet fuisse sublyta & mox summo cum levamine in universo corpore purpuram propinquasse; id quod pluribus docui & adstruxi in dissertatione *de vera sectione prudenti admittenda* pag. 18. seqq.

#### §. VII.

Quam porro vires plurimumque hoc in morbo admodum sunt prostratæ & ad lipothymiam propensio, summo omnino cavendum est studio, ne æger ex lætu surgat, aut diutius crectus sudeat, quia facile sic obrepit animi defectio, & motus humorum ad interiora conversio, exanthemata cum discrimine disparent. Subinde potius vires refocillandæ per mixturas analepticas, ex aqua mellisæ citrate, vel Turicæ, sutorum convallium, cerasorum nigrorum, florum acacis, rubi idæi, cum spiritu miri dulci, matre perlarum & syrupo acetosissimis citri. Quibus pro circumstantiarum ratione lenia diaphoretica, uti cornu cervi philosophice preparatum & antimonium diaphoreticum; vel etiam si sudores colligantur effusus manant, succus citri & speciei de hyacintho, cum fructu adici possunt.

#### §. VIII.

Vesicatoriorum utilitatem in purpura jam demonstravi *Historem de febre maligna*, ealemque scapulis apponere suadet. Recte omnino. Substant enim humorem serosum impurum & fibras delassatas nervas ad contractionem excitant, ut materiam mortificam fronte excutiant. Hinc sub tarda erupione & motu humorum ad interiora ipsamque caput conversio, sæpius cum fructu præcepti, ut hinc apponatur vesicatorium.

rium, cuiusmodi concinnare soleo ex emplastro de meliolo, pulvere cantharidum, cum pauxillo balsami Peruviani.

### ENARRATIONES MORBORUM.

#### OBSERVATIO I.

*Febris inter-  
mittens de  
purpura*

Fœminam novi viginti aliquot annorum, vegetam & alacrem, sanguineo-cholicam, quæ virgo levi ex causa hysterica experta fuerat pathemata, sub axillis quoque & pedibus largiter sudarat, bene cæterum appetens & corpus domesticæ negotia obeundo probe exercens. Hæc utero preta ex hilaritate præter morem fiebat tristis, sudores faciei siccecebant, à medio gestationis tempore perpetuo largus lactis in mamillis erat proveniens & quinto mense circa hypochondria exquisita oboriebatur torum ardens, quasi ex prunis candentibus. Post partum admodum laboriosum ingenti horrore febrili corripiebatur per totum corpus, quem excipiebat capitis dolor & inquietudo. Quinto die lobia fessebantur & accedebant præcordiorum anxietates, cum horripilatione febrili, intercurrente æstu, ardore in ventre & tandem delirio. Datis diaphoreticis sub temperate calido regimine, in cordis scrobiculo collo & dorso, nec non brachiis, purpura & rubra & alba efflorescebat quidem; sed quum gravi commoveretur iracundia, cuius iterum fiebat arida & siccæ, delirium in furorem plane transibat, hac post partum etiam copiosissimum, retinebatur, in ventre oboriebatur borborygmi, spiritus intractabatur ac demum decedebat.

#### Epicrisis.

I. Adduxit unique hunc morbum sanguinis & feri impuri abundantia, ob viæ genus ex mobilis in fœdamentum mutatum, sudores fucos suppressos & venæ sectionem sub graviditate plane contrariam, contraria. Nunquam etiam boni omnis in gravidis, si de ardore & æstu in interioribus abdominis conquereretur. Signum enim præbet, hinc in partibus congestionis atque infarctus, qui succellive ipsam sanguinem magis corruptum. à quo natura post partum febrili motu se liberare intendit.

II. Nihil certe in morbis acutis deterius gravi animi affectu, imprimis iracundia vehementi. Si enim in sanis corporibus magna horum affectuum nocendi facultas, quidem in ægrotis? Heic quidem inde sanguinis & humorum motus ad caput convulsus, phrenitidem cum morte attulit.

#### OBSERVATIO II.

*Purpura inter-  
mittens de  
purpura*

Tenera, sensibilis & ad iram proclivis fœmina, triginta annorum, sterile per decem annos duxerat matrimonium, sana tamen & vegeta. Quum vero maritus inopinata morte exstinguere tempore menstru fluxus, subitit hic, & misera vota luctui sese dedit, inquieta fuit, nec dormivit, nec appetit. Paulo post horripilationem cum æstu periensit, nec non tremulam manuum & colli agitationem cum cynico spasmo oris, anxietatibus subinde affecta & lipothymia. Datis antispasmodicis & anodysticis, conquieverunt tantisper hæc symptomata; subinde tamen, licet mitius, repetenda, donec die tandem tertio, cum horripilationis & tractionis in cute sensu, in collo, dorso & universo corpore purpura rubra cum alba prodiret, alio per aliquot dies ante & sub

eruptione clausa. Interim spastica priora symptomata remiserunt, somnus vero non rediit, prætereaque perperua ad urinam fuit stimulus, quæ tamen parce stillavit. Sed quum inopinato percelleretur terrore, disparuerunt illico exanthemata omnia, sequuta ingens præcordiorum anxietas, redierunt pathemata hysterica spastico-convulsiva ac mentem plane turbare visa sunt. Hinc sanguis & vena missa floridæ & datus postea liquor anodynus mineralis cum spiritu bezoardico, turnus singulis horis ex infuso theiformi. Inde tertio die post comparuit iterum purpura, stationem tamen non servavit, sed post corporis refrigerationem & injectum chyliferum denovo maxima ex parte recessit. Succedit hoc factis mentis confusio, ut sine causa subinde vel in cachinnis, vel in lacrymas ægra solveretur, multaque abiectione loqueretur. Corpore autem melius habuit, cibos sumit, somno non penitus caruit, & sensim eo pervenit, ut domesticæ iterum obire posset negotia. Elapso inter hæc semestri spatio meo ex consilio usæ est Carolinis thermis, quibus purpura per omnem corporis ambitum exiit, quæ post septimum diem squamarum itatim succedente, mens restituta, corpus & vires ex voto per DEI gratiam confirmata.

#### Epicrisis.

Purpura in sanguine corpore ex sanguine mentis repente suppressio generari potest, ex hac historia patet unique. Excrementaria autem purpuræ materia, ionis remota, nervosa quam maxime infesta est partibus, easdemque spastica & convulsiva plane moribus afficit. Quin diutius delectens in interioribus, ipsam mentem turbare potest, hanc proculdubio ob causam, quia nervosa cerebri membranis firmius infidet easdemque exagitat. Carolinarum igitur præstans maxime est virtus ad depurandos corporis fucos, recrementariam materiam solidis & fluidis partibus intime insinuatam separandam & per cutis poros expellendam.

#### OBSERVATIO III.

Sanguineus ac robustus juvenis corripiebatur horrore, frigore, æstu postea & ingenti præcordiorum anxietate. Secabatur secundo statim die vena, quarto & quinto totum corpus purpura alba confectum occupabat. Æger in conclavi calido decubans, de molesta gravitate & tractione in sinistro latere conquererebatur, ad mingendum quidem stimulabatur, sed paucam reddebat cum stranguria urinam, alvo simul per sex dies clausa. Dabant ipsi loco ponis decoctum ex avena, radice scortoneræ, cum semine papaveris albi & comu cervi usæ, ac præterea quater quotidie doses huius pulveris: Recipe comu cervi sine igne parati, oculorum cancri, animonii diaphoretici ana drachmas duas, cinnabaris animonii drachmam cum dimidia. M. Inde melius habuit, urinam etiam facilius misit & exanthemata uberius prodierunt in universo corpore. Nono die vesperi nares sanguinem stillant & alvus sponse soluta. Nihil minus per totum morbum formosere caruit, hinc data hæc posito: recipe aquæ florum sambuci, acaciæ ana uncias duas, animonii diaphoretici, oculorum cancri, ana drachmam dimidiam, syrupi papaveris albi drachmas duas, mixturæ simplicis drachmam. M. Qua continuato simul pulverum bezoardicorum usæ, undecimo die ex voto convalescit.

*Purpura  
alba inter-  
mittens de  
nata.*

#### Epicrisis.



## Erysipis.

Purpura alba admodum quidem periculosa, si aliis acutis de exanthematicis morbis accedit, si vero idiopathica, cum febre recte prodit & ordinatum servat typum, non adeo est perimenda, modo recte temperato regimine & temperatis diaphoreticis excipiantur. Hic quidem sanguinis copia multum fecit ad generationem morbi, ideoque venae sectio mature administrata commodam locavit operam, quae in cacochymicis & symptomatica purpura, plus ut plurimum damni, quam emolumenti affert.

## OBSERVATIO IV.

*Purpura  
post alii  
lucem  
non fuit  
se fuit.*

Tertio post partum laboriosum die, femina succulenta sanguineo-cholera, vixenti & aliquot annorum, conqueffa est de capiti, dorsi & totius corporis dolore, *ale vixenti die* Hanc febr. vixenti die, quasi cuius doleret, nec non de spastico stupefactivo in manibus sensu & scintilla ignis oculis obvertantibus. Accesserunt dein anxietates praecordiorum, agrypnia, ardor febrilis, virium prostratio, sitis, oculorum rubor & squalor. Datis lenioribus diaphoreticis cum regimine temperate calido, die quarto erupit purpura, quinto & sexto die omnem corporis ambitum occupans, interpersa in pectore, manibus & abdomine rubrae alba: a sexto die alvus fuit adstricta & loquiorum fluxus ad nonum usque subsistit. Hinc ad alvum solvendum & lochia revocanda data dosi pilularum Becherianarum, quae lenem fecit laxationem, & data altera dosi, loquiorum fluxus rediit cum magno febre, sequuti sudores largissimi, acidi & ferentes ad diem aequae undecimum, urina quoque scellit graveolens. His excretionibus solutus morbus, vires successive redierunt cum somno & agra sanitatem recepit.

## Erysipis.

Omissa sub graviditate sanguinis missio in sanguine hoc corpore fieri & sanguinis impuri penitus copiam, ex qua purpura. Quia vero a lochiorum utrinque alvi suppuratione succorum impuritas aucta, optimo utique consilio, pilulae Becherianae oblatae, quippe quae primo statim die in puerperio datae materiam & causam febris ac purpurae tempellive praecindere solent. Ut adeo pateat: temperata laxantia in purpura non penitus esse reformidanda.

## OBSERVATIO V.

*Purpura  
post partum  
vixenti  
fuit.*

Femina tres supra triginta annos nata filiorum edidit sanum ac vegetum, & ipsa quoque per tres hebdomadas optime habuit. Post iracundiam vero & terrorem dextram mammam, sub alvo a triduo adstricta, occupavit erysipelas, quod tamen pulvere ex farina saturatum, cerussa & floribus chamomillae confecto discussum. Tertio die ingens accessit horror ac frigida, subsequente acuti aestu per totam noctem durante alvus dura fuit ac tensa, somnus parvus & nullus. Duravit haec per tres dies, quarto autem erupit purpura, quae postquam per triduum molesto ardore & dolore pungitivo summam cum diuexasset, decidit, aestus cum pulsus celeritate viriumque dejectione remissis & agra tandem & morbum de puerperio feliciter superavit. Nihil autem aliud usurpavit, quam leniora & fixiora  
*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

diaphoretica cum humectantibus, chyleres emollientes ex decocto cremoris avenae cum chamomilla vulgari, addito oleo amygdalarum dulcium & sale communi, & remittente morbo ac febre, subijunctus usus pilularum nostrarum balsamicarum.

## Erysipis.

Puerperae hanc etiam ob causam tam frequenter in exanthematicas, erysipelaceas & purpuratas febres incidunt, quia primas vias a sordibus graviditatis tempore contractis non convenienti pharmaco expurgant. Quando enim prima regio corrupta ac impura materia repleta, vel levius animi affectus, ut ira, terror, vel improvida corporis refrigeratio, illam commovendo & sanguinem invehendo, febrem succitat exanthematicam. In nostra erysipelas primum productum, eodemque repulso, de novo febris accessit, subsequente exanthemate purpureo.

## OBSERVATIO VI.

Femina triginta aliquot annorum, secunda iam plurius liberorum mater, semper sere in puerperio laboravit purpura, feliciter tamen eandem superarat. Quam vero septima vice expectantiae cuius partus ei, omnia ultima venae sectione, obegisset, die quarto post experta est horrorem cum subsequente aestu, lochia parcius iusto fluentia subsistunt plane, anxietates ipsam infestant, somnus deficit, caput doluit & universum corpus languit. Data quidem temperata diaphoretica cum temperantibus & die quarto post spasmum effloruit, imprimis in cordis trochaeo, purpuraceum exanthema, symptomata autem discedere noluerunt, sed potius spasmi in artubus & abdomine accesserunt, purpura dispersa iterum, anxietates fuerunt summae, agra corpus perterrita, delirare coepit & animo subdelinqua, ut omnia iam conclamata esse viderentur. Hinc vena incisa in brachio & quatuor circiter sanguinis unciae subtrahae. Quo facto, prope praecordiorum angor remissis, animi defectio cessavit, agra ad se rediit, corpus totum calore & madore perfusum ac paullo post erupit copiosissima purpura, quae debito regimine & congrua medicatione ex voto perlucuit.

## Erysipis.

Fundam quidem in experientia est, non tentandam esse sanguinis missionem, ubi purpura eruptio inflat, aut modo facta; datur tamen casus, ubi summopere necessarium, ut hoc etiam tempore sanguis maneat. Nonnunquam enim, lochia resistentibus, aut parcius iusto fluentibus, sanguis redundans, ob spasmos in abdomine, cum impetu urgeat & congeritur ad cor ac cerebrum, ibique atrocis & letiferae succitae symptomata, quae perperam vulgo retrocessionis materiae exanthematicae tribuantur. Hinc si per venae sectionem sanguis superfluis subtrahatur, cessant illius pathemata & libere ac aequabili facto circuitu, eruptio expedite succedit summo cum levamine.

## OBSERVATIO VII.

Purpurata febris, novus & incognitus veteribus morbus postquam circa annum A. C. MD. LII. Lipsia primum coepit, succellere adeo vires sumit & longe lateque processit, ut in plurimis  
*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

*Purpura  
post partum  
vixenti  
fuit.*

*pura puerperis.*

Germanie minimum loca, jam notus sit atque solennis. Quo vero penetravit, haud exiguum primum edidit stragem multumque negotii fascellit medicis, priusquam ipsa edocerentur experientia, cujus esset indolis, quae ferret, quae non, in medicatione atque ac regimine. Hinc saepius tam in quam extra Germaniam, medici meum exquiverunt iudicium atque consilium, qualis sit incognitus hic morbus & quo pacto eodem felicitate occurrendum? Quam igitur ad hoc latus quotidie serpat, non infructuosum erit, heic inferre ea, quae, quam anno MDCC XXIII. Francofurti ad Moenum primum compareret ad me a medicis percripta, una cum illis, quae respondi. Ita autem habebat missa mihi relatio hyltorica: *Inseparavi ab aliquo tempore puerperas nostra hac in urbe novum quidam morbum, hunc possimum in modum incedent atque decurrant. Partum enixa, secundo vel tertio puerperis die corripitur horrore cum subsequente calore, conquiescunt de summa pectoris oppressione & crebrioribus suspiriis, lactibus plurimum restantibus. Interjunctis aliquot diebus, erumpunt pustulae millares, imprimis circa cordis regionem conspicuae, excipientes deliria & nervorum subsultus, & plurima ex agris occumbunt, aliae circa quintum, plures nono morbi die. Lacer autem morbo hunc omnibus viribus sit occurrere, efficacissimis alexipharmacis, imperata quies, regimine calido, vesicatoriorum applicatione & cucurbitulis fectis; irrita tamen fuerunt omnia & iritum obitum adaequum: interdum docta plus valet aere malum. Hinc quaeritur: qualis sit hic morbus, & qua methodo quibusque medicamentis sit expugnandus!*

#### JUDICIUM CUM CONSILIO.

Percriptam morbi ignoti historiam curare & perlegi & expendi. Est autem is febris maligna miliaris, quae nobilis in oris, imprimis Milvae tractu, à plurimis annis admodum frequens & puerperis saepius funesta fuit. Anno sexaginta circiter annos nobis pariter incognitus fuit hic morbus, primum Lipsiae observatus, ideoque *1777* febris purpuratae Lipsiensis nomen obtinuit. Jam longius processit ac vires sumit, ut non modo puerperae, sed & viri, imprimis tamen foeminae, eodem crebrius decumbant, modo acutae & brevius, modo longius, per tres, quin sex quandoque menses. Hinc in chronicam & acutam purpuram dissecitur. Illa quidem admodum molesta, sed non periculosa, nec febre stipata; haec autem semper febrem habet comitem, nec periculo caret. Periculum tamen in hac eo magis est, quo magis corpus quod corripit ex praegravata tempellatum diuturna insalubri constitutione, pravo victu & vivendi genere, nec non aliis causis vel debile est, vel impuris fucis repletum. Et chronica illa etiam vehementius & diutius insiluit, pro corporis, in quod cadit, dispositione. Dein purpura, vel rubra est, vel alba. Illa non tam malignae & delecteris indolis, quam haec, quae, si, ut saepius evenit, aliis acutis exanthematicis febribus in fine accedit, mortem ut plurimum inferit.

Causa hujus tam sonici morbi maxima ex parte corruptae, vappescentis & corrosivae lymphae tribuenda videtur. Quando enim lymphae in diverticulis & tubulis glandulosis stagnat & diutius subsistit, corruptur & acrem corrosivam indolem induit. Quae postmodum fucis & san-

guini infusa & cum hoc ad partes nervosas delata, truculenta illa in purpura obvia pathemata inducit, anxietates praecordiorum, cardialgiae, angores, inquietudines, dolores & tristitones in artubus, linguas, respirationem difficilem, oppressiones pectoris, horrores, lipothymias, pruritus aliaque. Omnia tamen haec remittunt symptomata, si beneficio naturae materia acris ad corpora perficimur propellitur. Singulare autem habet hoc exanthema illud, quod admodum sit variabile, mox compareat, mox evanescat, & hinc symptomata jam leniora, jam graviora inferat.

Chronicam purpuram observavi saepius in foeminis, quae aetia florem album experire hunc subito siccarunt; disparent iterum, hoc repetente, purpura. Dein notavi, foeminas, quibus post quinquagesimum annum menses emanantur, purpuram crebrius incurrisse. Frequens quoque idem hic morbus omnibus, qui vitam colunt sedentariam, animi affectibus, ira praesertim ac terrore iactantur, lacticiis, dulcibus & placentis delectantur, nec legitimum experientur alvi beneficium. In acuta febrili, variolis & morbillis si alvus iusto diutius adstricta, vel diarrhoea contingens subito sistitur, purpura subsequi solet, ob retentas acres, falsas, sulphureas fordes. Maxime omnium vero frequens & accepta est hic morbus in puerperis, eo quod hoc gravitate, ob retentos menses, sanguis nimis sit & impurus, tanto certius, si accedit inordinatum vitae genus, vita sedentaria, animi angor & somnus nimis. Impetere solet purpura vel cum, vel paullo post febrem lacteam, quae subsistentem passim corruptam lympham & lantibus excutit & in sanguinem agit. Quod autem purpura jam frequentior sit, quam antea, id perverto possimum abusus ponum calidorum, imprimis decocti Coffee, tribuendum. Quamvis enim potus hic, si alvum simul laxat, non facile nocet; certum tamen, quod, si liberalius sub alvo clausa ingurgiantur, multas recrudescencias ex intestinis in sanguinem pellat fordes, & sudori movendo aptus sit, cujus tamen successus post eundem incuriosus habetur, ut succi hinc non possint non suffocare.

Ad arcendum porro hunc morbum nonnulla antea, non nulla post partum sunt tenenda. Sub graviditate sanguis quantum fieri possit ab impuritate vindicandus. Hunc in finem in sanguine, quae bene comedunt & minus corpus exercent, bis vel tres, quarto, sexto & in medio noni mensis, vera petuenda. Alvus semper in officio retinenda, cujus si obliviscitur, admonenda alimentis, vel pilularum balsamicarum, Becherianarum, Stahlianarum, aut nostrarum usu, nec non potione ex manna cum rhubarbo & cremore tartari. Perspirationis quoque saluberrime successus secundandus per corporis motum, diluena, iuscula, potum tenuem, virando dulcia, acida, fructus horos & omnia quae spiritum & viscidum sanguinem ingignunt. Ventriculus, praesertim in cocta, non nimia ciborum copia oncrandus, somnus longior arcendus & animus in tranquillitate servandus. Ex medicamentis ea prosunt, quae ebullitionem sanguinis componunt, leniterque cuticularem excretionem promovere, diaphoretica nempe fixa cum temperantibus & nitro. Post partum è re est, ut sedata sanguinis exustione & pulsus vehementia, secundo post die, dosi pilularum supra declarum assumantur, non modo intestina,

sed

sed & utrum expurgant, simulque lochialem fluxum promovere, eaque propter altero iterum die eisdem deglutire expedit, inprimis si lochia fluxus tardus nimis, vel insufficientis. Tercio demum die si febris lactea ingruit, necessarium est, quo bis quotidie dimidia drachma pulveris mei bezoardici cum præcipitante remanet, sumatur.

Quando autem purpura adest, in curazione rite admodum, anet omnia in lochia inquirendum, an recte & sufficienter secesserint? Quod si hoc non factum, post pediluvium, vena in pede secanda. Tum vitandus omnis calor, tam in tegimine, quam medicatione; vitanda vero etiam refrigeratio & refrigerantia remedia, ipsoque nitro caute utendum, ac nonnisi ubi sanguis aestus & pulsus celer est. Alvus quoque nec nimis fit adstricta, nec intempestive, vel acrioribus irritetur. Inter medicamenta nulla magis proficua deprehendi, quam pulverem meum bezoardicum, præcipitarem & liquorem anodynum mineralem, una cum pulvere castoreo cinnabarino. Si pectus cum angore opprimatur, soleo liquorem anodynum, tribus partibus, cum una parte spiritus bezoardici Bullii & dimidia parte essentiae castorei miscere, & alternatim propinare hunc pulverem: recipe pulveris Marchionis drachmam, cinnabaris nativæ præparatæ scrupulum, pulveris castorei grana X. M. l. pulvis, dividatur in doses IV. Loco potus ordinarii præbere suadeo decoctum ex rasura cornu cervi, radicis scorzonæ, farfapanillæ, ana uncis binis, decoctis in quantum aquæ mensuris. Infusum theæ autem liberalius bibere non conducibile, sed sufficit aliquot tantum panellas interdum forbillare. Quid si demum alvus nimis sicca, eorum domestico, ex floribus chamomillæ, sale communis & nitro cum decocto avenaceo, subducenda.

Atque hæc sunt medicamenta & hæc est methodus, quibus ego per Dei gratiam multos purpura decumbentes feliciter sanavi. Que rogatus candide hic exponere volui, debui. Hæc d. X. Decembr. Anni 1733 CCXXIII.

Plura exempla legi possunt in *Consult. Medic. Tom. II. Sect. IV. Cap. cxc1-cxcv.*

## CAPUT X.

*De Febris Epidemicis, Exanthematicis, Catarrhalibus sive Petechizantibus.*

### THESES PATHOLOGICÆ.

#### §. I.

*Infusum morbi.* Febris hæc sunt lenis continua, cum virium prostratione, vigilia, inappetentia & quantumque cum eruptione macularum in summa cute junctæ, oritur a feri excrementi copia & intestina dissolutione, non sine contagio & vitæ periculo.

#### §. II.

*Infusum & decem. fœd.* Ab initio statim immutatur faciei aspectus in morbidum, & agrotantibus tribus vel quatuor antequam lecto assignantur diebus, conqueri solent, de spontanea lassitudine, gravativo corporis & artuum dolore, quasi ossa confusa essent & fracta, de virium languore, inappetentia, levi animi defectione, nausea cardiacâ *Uthelsen*, catarr.

pitia dolore & somno inquieto, alvo simul adstricto. Accedit postea vesperti horripilatio & frigus, sequitur aestus, incrementum symptomatica, major virium fit jactura, ut vix imbecilles & teneri erecti manere queant, capitis dolor cum vertigine & inquietudine ingravescit, in quibuscumque dorsum, vel etiam latera exquisite dolent, præcordia anguntur, interna ardent, fauces ardent, pulsus contractus, celer ac debilis est, urina pallida sine sedimento, & spiculis difficillime trahitur. Tum prodeunt in nonnullis quarto, vel circa septimum diem, in dorso potissimum, pectore & brachiis, cum, vel sine levamine, macule, in aliis copiosiores, in aliis pauciores, coloris varii, vel, ut in plerisque, purpurei, vel lividi fusci, vel pallidioris rosei, modo latiores, modo minores, in plurimis instar moris pulicum, à quibus tamen diffinguntur, dum compressæ non relinquunt vestigium in medio rubicundum. Ob quam macularum diversitatem, febres hæc varia fortissime nomina, ut vel purpuræ, vel puncticulares, vel petechiales spurie, audiunt. Sub hoc morbi flama, sive vigore, acerbiora sunt omnia, inquietudo maxima, corporis jactatio ejusque decubitus infestus, mens turbata, sermo delirus, somnus nullus, sudor frigidiaculus, angustia spirandi intensior & pulsus contractus, inæqualis, celer & frequens.

#### §. III.

His si accedunt tendinum subfusio, sinus defectus, hæborygmi in ventre, singulus, faucium ab æstus inflammatione, convulsiones, aut syncope, cum extremorum refrigeratione & sudore largissimo, certa sunt mortis indicia. Quando autem circa dies cricosos, vel in ipsa, septimo, undecimo, vel decimo quarto, liberalia prodit tepidus sudor, per aliquot sæpe dies, licet cum virium languore mariana, vel etiam alvus per aliquot dies fluat, salutis est indicium, tanto certius, quando postea pulsus maturatur, anera contractus, increbrescit, durus mollescit, celeritatem tantisper possit magisque æqualis fit, quando animus fit erectior, sinus & decubitus corporis quietior, audius difficilis, urina turbida & sedimentum ponens, quod quidem circa dies cricosos certum fere fasli eventus indicium. Hoc quippe factu, successive postea somnus, appetitus & vires redeunt, quod tamen non facile ante diem accidit decimum quartum.

#### §. IV.

Veteribus hæc febres quotidianæ continuæ febres, vel etiam recentioribus catarrhales malignæ vocari solent, quia leniter procedunt ab initio & coryza, gravedo, pectoris infarctus, nuxia sæpe primis diebus junguntur & vespere per noctem exacerbationes sunt. Formalia autem earum ratio consilii maxime in partium sanguinis, vel potius feri dissolutione, medicantæ motu febrili, cuius beneficio impuræ, corruptæ, heterogeneæ partes, si robur adhuc inest nature, nec adeo corruptæ solidorum & fluidorum dispositio, evolvuntur, earumque subtilior seriosa pars per largum sudorem, crassior & mucosa per ares, fauces & bronchia, biliosa mucida per alvi feculentum, & purida salino-sulphurea, sub forma macularum, per tubulosam & filicolum cutis substantiam, postea salutariter propellitur. Exanthematicam enim materiam non causam, sed potius effectum, neque etiam perpetuum hujus febris esse, ex eo patet, quod morbus non sola efflorescentia exanthematica felicitè de perfecite solvi solet, sed plures, eadem copiose

licet facta, pessime habeant, alii sine ea evadant & decedant quoque, nunquam vero firma salutis spes sit, nisi solennis evacuatio, vel per alvum, vel sudorem, diebus convenientibus criticis fiat. Quod autem dissolutio humorum fiat, intolerabilis & extraordinarius plane fœtor sordium, quæ per alvum, sudorem & urinam copiosissime secedunt, planum facit testatumque.

## §. V.

Materialis igitur harum febrium causa, utique ingens & insolita plane humorum excrementorum salino-sulphureorum & mucidorum corruptibilium impuritas, quæ unionem & mixturem sanguinis ingressa, eundem in intestinum dissolutivum motum deducit. Sed unde hæc primum habeat ortum, disquirendum merito. Nam licet semper, etiam secundum naturam, vitalibus succis infit impurum, per varii generis emunctoria excrendum jugiter: illa tamen impuritas, quæ hunc sicut morbum, longe magis à succorum indole aliena est, quam ordinaria, & præterea ita comparata, ut sese invicem cum lymphâ & sanguine uniat, eorumque crasin & mixturem ingrediatur. Interim sicuti omnis morboſa impuritas, five cacochymia, ab ingessis intemperatis & incongruis excretionibusque, præsertim per alvum & cutim, suppessis, originem ducit; ita enim hæc corruptiva impuritas, febrium catarrhalium mali moris & exanthematicarum causa, pariter ab ingessis, maxime potu, incongruis sanialque excretionibus, præsertim cuculari, suppessis, obocitur.

## §. VI.

Epidemias autem plerumque esse has febres, experientia docet, ac à præternaturali extraordinaria temporum anni tempeſtaturumque constitutione oboriri, tali, qua multa in corpore gignuntur secretamenta, eorumque per cutis poros secessione impedita, accumulantur. Quin aëris constitutionem sequuntur hæc febres epidemicæ, ac inde magis, vel minus deterioris sunt generis. Inprimis per multiplicem constat observationem, diu perſeverantem aëris australis humiditatis, calidi, nebulosi & ventis destituti, præsertim vere & autumnio, statum, accidentibus postea frigidioribus septentrionalibus ventis, febres mali moris putidas, exanthematicas afferre. Neque minus constat, quod si æſtas diutius sicior, autumnio, spirante vento boreali, prodeant affatim febres epidemicæ, acutæ, intermittentes, exanthematicæ, petechiales, purpuræ & dyſentericæ, uti quidem annis cl. lxxcix, clolccc, xv, xxi. & xxix. factum fuisse novimus. Denique id etiam per experientiam certum, quod tempeſtatum subitæ ac vehementes vere & æſtate, ex frigido in calidum, siccum in humidum & vice versa, vicissitudines, quam maxime generent febres mali moris, quemadmodum eversit elapſo insaluberrimo anno, quo ea propter ubique sere plures mortuos, quam natos fuisse, percipimus. Et certe, nihil ad ingenerandos perniciosos morbos aptius, quam si tempeſtatum ferventem, excipit valde frigida, eo quod nimis calor motu intestino accendit sanguinem, multaque excrementa salino-sulphurea excludit, frigida autem, poros cutis stringendo, iustus decinet eadem, gravissimum postea damnum certo inductum. Hinc etiam est, quod in locis, ubi interdiu æſtus, noctu frigus regnat, Aſia inprimis atque Pau-

monia, ob varium hunc & insalubrem aëris statum, famibares sunt acque endemicæ exanthematicæ & petechiales malignæ febres. Inde quoque in proclivi iudicare, cur in Italia, maximeque Romæ, adeo periculofum sit, post diuturnum calorem, corpus vespertino frigido humido aëri exponere.

## §. VII.

Neque tamen omnes tales febres petechizantes sunt epidemicæ, id est, ex communi vitio aëris veniunt, sed quandoque etiam sine hoc oriuntur, in corporibus præsertim impuris, incongruis & pravis alimentis saginatis, nimique & crebriori refrigeratione affectis. Inde enim fit, quod febres hæc hyeme potissimum grassentur, & eos quam maxime corripiant, qui pravo victu ac regimine uti, ac præterea corpus intensius refrigerant. Vidimus id ipsa hæc hyeme, quæ ex civibus nostris multi, intemperantius in baccho ac venere indulgentes & traha diutius sub coloro rigido vechi, incidissent in has febres & voluptatis dederunt penas. Neque etiam ea propter effluvia ex iis, qui his exanthematicis febribus graviter decumbunt, aut mortui sunt, omnes inficunt promiscue, sed eos tantum, quæ dispositionem ad huiusmodi morbum, summam nempe succorum impuritatem gerunt, cæteris, qui ab hac immunis, à contagio etiam liberi.

## §. VIII.

Ceterum quia sanguinis impuritas non in omnibus unius ejusdemque indolis; hinc varii generis subinde his in febribus prodeunt exanthematica varique accidunt symptomata, magis vel minus periculosa. Etenim si delectria potius subest impuritas, ad purulentam dissolutionem humorum tendens, graviora sunt omnia & petechiæ magis emergunt vere acque lethales, fulci, vel nigri coloris, de quibus infra. Quando vero non adeo corruptive indolis, sed minoris salino-sulphureæ, symptomata non tam atrocia, sed ordinatè magis morbus decurrit, maculeque magis sunt purpureæ & rosei coloris, ac sebes ob id purpureæ, vel petechiales spuria, five petechizans, audit. Ubi serum salum acre, recenſet à perspiratione prohibita subnanum, sese adjungit, coryza, stertutatio, nussis serina, cum defluxione salis ad fauces & epiglottidem, complicantur, eamque ob causam febres catarrhalis malignæ nomine insigniunt. Quandoque etiam ob copiam partium salino-sulphurearum acrium sub ipſo motu febrili dissolutorio evolutarum, maculis petechialibus seſe associat talique antecedit, vel lequuntur purpuraceum exanthema miliare, idque tam rubrum, ex pruritu, ardore, cutis asperitudine & fœtore specifico acido cognoscendum, quam, quod pejus adhuc, album, cujus pustule miliares nonnunquam in vesiculas amplores, sero acerrimo nurgidas, explicantur. Id quod vero, si declinant morbo, undecimo, vel decimo quarto die, vel serius adhuc, cum magna anxietate, inquietudine, spirandi angustia, animi deliquio & extremorum frigore, accedit, arget ut plurimum, ob vires jam nimium fractas, succumbit.

## §. IX.

Qui naturæ & corporis robustioris, plebei & vitæ rusticæ addicti, solo sepe convenienti externo regimine, sine singulari artificio, patienter expectando tempus, melius & felicius evadunt, quam qui naturæ sunt imbecillioris, animi menſuolosi, vel innotore, curæ aut intemperantia

tia potus & ingluvie, defidia quoque, aut nimia mentis fagacitas, corpus reddiderunt morbidum & imbecille. Mali porro omnis effluve excretiones ab initio statim & extra dies criticos, per sudorem, alvum & urinam quoque. Qui autem occurrunt, inflammatione meningum, five phrenitide, vel faucium & oesophagi, ex aphidis, vel ipsius stomachi, pereunt. Sanguis qui his in febribus extrahitur, conspicuum monstrat vitium, & vel valde fluidus & ferolus, rubicundus, vel etiam nimis crassus & nigericans, comparat.

## CURATIO.

## §. I.

Curatio ni-  
sive ac-  
sive refo-  
na.

Felix harum febrium exanthematicarum eventus atque curatio, non tam in arte medici, quantumvis periti atque sagacis posita, sed potius à corporis naturæ bonitate ac vigore & convenienti regimine pender. Hinc si enarris faccorum impuritas, vires imbecilles, corpus laxum, spongiosum & minus perspirabile, nec scilicetissima remedia, nec optima medendi methadus, quicquam proficiunt. Contra ea quando non tota sanguinis & humorum massa adeo inquinata est, quando vigor adhuc motuum vitalium, animus etiam erectus, corpus nervosum, gracile & poris apertis, felicitur, vel levi artificio, vel sponne plane, succedunt omnia. In his enim dissolutionis, exanthematicis, acutis & periculosis febribus quam maxime valet practica ille Hippocrates veterumque canon: naturam esse optimam morborum medicatricem, per se doctam, quæ congrua servet & incongrua rejiciat.

## §. II.

Indicatio-  
ne curati-  
ria.

Igitur id tantum in medicatione tenendum medicum prudenti, ne motus & excretiones, quæ etiam sine artificio in salutem vergunt, turbet & pervertat, sed placide agat, ab omnibus tam fortiter commovenibus & evacuantibus, quam sedantibus & silentibus, abstinere, & naturæ opus perire juvet. Proinde hos unice in fines medendi methodus dirigenda: I) ut plenaria dissolutio sanguinis & humorum moderate compescatur & impediantur: II) ut acrimonia fuliginosa sulphurea humorum diluatur ac temperetur succicque simul ferventur fluxiles; III) ut excretiones per alvum, cutim, urinam quoque & spatium, modeste promoveantur; ac IV) ut vires fractæ foveantur ac restituantur.

## §. III.

Utiq-  
ne ac-  
sive refo-  
na.

Ad impediendam putridam humorum resolutionem, spectant viriis temperata acidula, quippe quæ putredinofum malfina, ad naturam salis alcalini sulphurei accedens, curant eademque efficaciter resiliunt. Hac virtute splendent ex vegetabilibus acetum vini simplex & destillatum, succus citri, limonum, aurantiorum, barbarum, granatorum, ribis & confecti ex iisdem syrapi, nec non succus acetosæ & acetosellæ cum destillatis ex ipsis aquis. Ex mineralibus chylus aurimonii sulphuratus, spiritus virioli vulgaris & sic dictus philosophicus, spiritus salis, citri & maxime omnium sic dicti dulcificati, quos inter ceu specificum eminet spiritus salis dulcis probe elaboratus, ex oleo virioli, cum sale communi & spiritu vini, per cucurbitam destillatus.

Erid. Heficami Oper. Tom. II.

## §. IV.

Temperan-  
tia.

Dein tam ad dissolutionem corruptivam intercipiendam, quam acrimoniam acidam obtundendam, conducunt blanda diaphoretica & terrea fixiora alcalina, bolus nimirum Armena, terra sigillata, unicornu fossile, lapides & chelæ cancrorum, mactis perlarum, cornu cervi philosophice preparatum, nec non ex compositis, pulvis bezoardicus venetis, Lindberci, nosler, Anglicanus, lapis bezoardicus & lapis de Gna. Quæ porro humectant & acrimoniam diluunt, sunt maxime pro potu usurpanda, decoctum scilicet hordei, cum scorzonera & radura cornu cervi, nec non succo vel syrupo acetosellæ citri, aqua ipsa pura, vel Wildenburghis, cum saccharo, cornu cervi ulso & succo citri, prûana decocta cum cerasis ficcis confusa, item pulchella tenuia gallinarum, cum succo limonum, vel aurantiorum, decoctum avenaceum tenue, vulgo Habergrünze, nec non cerevisiæ levis duritica.

Humiditas  
fœnalis.

## §. V.

Inter ea quæ excretiones secundant, & quidem per cutem, præter jam dicta bezoardica terrea, aqua icabiole, galegæ, cardii benedicti, scoridi, florum sambuci, item mixtura simplex, acetum folis rute, cardii benedicti, scoridi & galegæ infusum, nec non essentia bezoardica, ex radice vincetoxici, angelicæ, pimpinellæ, dictamnii, valerianæ, cortice cascarillæ, herba cardii benedicti & scoridi, cum moderate spiritibus mentruis, vel melius adhuc, spiritu salis dulci, nostra methodo confecta. Alvum vero excretionem juvant tunissime clysters emollientes domesticis, ex decocto avenaceo, oleo amygdalarum dulcium, floribus chamomillæ vulgaris, sambuci, si rupe violarum, sale communi, nivo, Eundem etiam in finem utile decoctum mannaum, circumspicte & tempore debito datum, ex mannæ uncis duabus, cremoris tartari drachma, in aqua scorzonere decoctis, addito syrupo violarum & oleo de cedro. Ex ista demum, quæ vires custodiunt atque reficiunt, præter modicum vini cum aliis diluentibus ulum, laudem meretur aquæ rosarum, liliorum convallium, florum tilie, rubi idæi, fragorum, mellis citræ, cinnamomi, cydoniæ, gelatina etiam cornu cervi, cum succo limonum, pomorum Chinesium & saccharo.

Secundum  
de cui m-  
sive refo-  
na.

Utiq-  
ne ac-  
sive refo-  
na.

Utiq-  
ne ac-  
sive refo-  
na.

## §. VI.

Potissimum vero polycruestia & expertæ à nobis per multos annos virtutis tria hæc commendamus medicamenta: Recipe antimonii diaphoretici, cornu cervi sine igne parati, lapidum cancrorum, mactis perlarum ana drachmam, niri depurati drachmam dimidiam. M. f. p. Hæc pulvis à scrupulo uno, ad drachmam dimidiam, pro dosi sumendum, quandoque solus, quandoque cum drachma succi citri, ex decocto, vel prûana, quandoque etiam in hac mixtura: recipe aquæ cardii benedicti, florum sambuci, liliorum convallium, cerasorum nigrorum ana uncias duas, rosarum, cinnamomi sine vino, ana unciam dimidiam, spiritus niri dulcis guttas XXX. syrapi acetosellæ citri unciam semis. Alterum unilimum remedium mixtura hæc: recipe aquæ galegæ, cardii benedicti, cerasorum nigrorum, florum acacie, ana uncias duas, aceti destillati unciam, lapidum cancrorum, antimonii diaphoretici ana drachmam cum dimidia, cinnabari scrupulum, mixturæ simplicis, spiritus niri, vel salis, dulcis, ana guttas XXX. syrapi acetosellæ citri drachmas sex. M. D. S.

Secundum  
de cui m-  
sive refo-  
na.

G 3 Moxur

Mixtur, *deven evohl ungerührt alle zuey Stunden ein Löffel voll zu geben.* Sumat. omni bithorio Cochlear unum bene agitata. Tertium est hæc mixtura bezoardica: recipe tinctura bezoardica, superius descriptæ nostræ, vel *Michaelis*, syrupi papaveris rhodæos, liquoris nostri anodynæ drachmas duas. M. de qua quadraginta, vel quinquaginta guttæ pro dosi sumenda.

**CAUTELÆ ET OBSERVATIONES  
CLINICÆ CUM METHODO  
MEDENDI SPECIALI.**

**§. I.**

*Regimen  
sui tempera-  
re oportet.*

**M**aximum periculosus hæc febribus ris emendandi momentum, regimine continetur congruo. In hoc primum est, ut æger semper in æquali & temperato calore deinceps per totum morbi decursum. Sub nimio enim æstu dissolutioris in sanguine motus magis incenditur, alvus fæcatæ, anxietas augetur, impuri & falsi acres humores acutuntur, vires exhaustuntur, sudor fit julo copiosior de cito nimis majorique copia, siue emolumento, ad cutem propelluntur exanthemata. Frigore autem improvide admissio, præsertim ad pedes, perspiratio facile cohibetur, macule & exanthemata retroaguntur, tormina in ventre & diarrhoea cum singultu inducuntur, & criticæ evacuationes turbantur. Et ab inequali regimine ac subita aeris calidi in frigidum, vel contra mutatione, eadem fere, quam ex frigido accidit incommoda. Interim quia aer impurus continuo haultus inspiratione, viribus intensissimus, cavendum, ne æger in humiliori conclavi vappado aere pleno decumbat; sed aer potius morbida exhalationibus fæctus, provide emittendus & purus admitendus.

**§. II.**

*Preparatio  
confutur.*

Dein summo providendum est studio, ut corpus in æquali semper maneatur perspiratione & quo curantem erubrum, in his morbis admodum sensibile, cujus tamen beneficium optime materię peccantis secretio fit atque excreto, in æquali semper servetur tono. Hinc suggerenda omni modo mutationes lintaminum, indusiorum & stragulorum, nec non transitus ex uno lecto in alterum. Ego quidem hanc ob causam interdiciere soleo, ut ægri crebro furgant, quin tempore critico & quo exanthemata præterpente, præsertim si debiles admodum decumbentes, præcipio, ne lectus sternatur, nec, si lintamina nimis madida, nova incipiantur, sed trita antea & exsiccata probe. Est quoque admodum salutare corpus involvere tunicæ talari mantæque quam vocant *einen Schlafrack*, pedesque tibialibus ioduere, sicque in lecto decumbere, quo omnis auriæ frigidiæ accessus arceatur.

**§. III.**

*Stimulus  
vires.*

**T**um vitandus erectus corporis, & capitis, tam in lecto, quam extra cum sinus, tanto magis, ubi pulsus debilis & summa virium prostratio, nec non ubi morbus in vigore. Inde enim ob debilem cordis pulsam non sufficiens sanguinis copia perpendiculari via ad caput pelli potest, lipothymia facile obrepit, insinuat, vel sistitur cordis & sanguinis motus, omnes motus ad interiora vertuntur, fibræ & tubulosa cutis subflæta contrahitur, materia exanthematica, peiora nunc quam antea indolis, retroPELLIUR, & ad nervosæ partes delata, convulsiones, deliria, vel etiam sphacelationes funestas paulo post suscit. Id quod plurimis exemplis habeo consi-

manum & uberius meo ex consilio excussum est in dissertatione de *sua erella in morbis periculosis nexis.*

**§. IV.**

*Animus  
sui tempera-  
re oportet.*

Porro animus tranquillus & erectus servandus, omneque occasiones præcidiendæ, quæ ad metum, pusillanimitatem, iram, vel terrorem ægrum permovere aptæ. Mens potius solatio & salutis spe erigenda, quam morbi periculi denunciatione deprimenda. Ego certe novi febribus ejusmodi decumbentes, qui forsitan non fuissent mortui, nisi à theologis & medicis intempestiva morbi prædictione & inculcatione, horror & metus ipsis fuisset incussus ingens, omnibus postea illico in pejor mutatis.

**§. V.**

*Alimentum  
suum tempera-  
re oportet.*

Præterea neque in principio, neque in declinatione, multo minus in statu morbi, laborantes onerare decet alimentis, quæ ex carnibus, ovæ & pinguibus parata, aut sunt illa jussula sic dicta confortantia, *die Kraft Bröden*. Non enim non in manifestum damnum cedere possunt, quia præterea jam virium defectu & humorum impuritate, vires magis aggravant, cruditates generant, matricamque & fomitem morbi augeant. Memori potius mente tenenda verissimus ille prædictus Hippocrati canon: *corpora impura quo plus nutritur, eo magis læsantur*. Mibi quatuor plurima nota sunt exempla eorum, quibus remittente morbi & symptomatum atrocità, præpostera liberalitate cibi alibiles congesti, cum præterea damno, subsecutæ morbi anxietate præcordiorum, inquietudine, virium debilitate, quin ipsa morte.

**§. VI.**

*Pharmaca  
velide no-  
ant.*

In medicamentorum autem usu, seu perpetuum axioma tenendum: nunquam validiora commoveria & volatilia, emetica, purgantia, diuretica, nec non sudorifica nimis spiritiosa & expellentia, esse propinanda. Nihil enim vi & impetu hoc in morbo agendum, in quo naturæ quam maxime viget opus, cui omne nimium inimicissimum, temperata vero & moderata amicissima.

**§. VII.**

*Medica-  
menta  
sua  
tempera-  
re oportet.*

Deinceps quam hæc febres habeant certos suos typos, suas periodos, certis temporibus exacerbationes & remissiones; multum omnino refert, ut medicus hæc tempora & medendi opportunitatem observet. Quod si non facit, plus damni, quam emolumenti affert. Res enim in medendo maximè est momentum, ut quæ fiat, quæ tempore exacerbationis, antea, & post hæc, sub declinatione & remissione, danda. Paucis igitur in genere notari velim: quod sub æstu & symptomatum intensione, humectantia, diluentia, pulveres absorbentes nirosi, superius descripti, nec non acidula, cum valde moderato externo regimine propinare expedit. Finito vero paroxysmo, quando cutis laxa, mollior & ad excretiones disposita, analeptica, excitantia, vel, si opus bezoardica, perspirationem moventia, nec non insuflum theiforme ex veronica, scordio & liquoris, exhibere decet. Et quum alvi fluxus sæpius solvi solet morbus, is unique nunquam silendus, præsertim circa tempora critica, nec adstringentibus, nec sedativis, nec opiat, sed si natura ad hanc excretionem inclinat, nec tamen nix succedit, secundanda potius eadem rursus per laxam mantentur, supra descriptum & tamarindina.

**§. VIII.**

Quia etiam corpora ægrotantium non sunt unius

*Corpora  
tempora  
unius*

et ubi ejusdemque indolis ac temperamenti, sed in quibusdam motus vegetiores & intensiores, humores quoque calidiores & agiliores, in aliis vicissim motus languidiores & tardiores, ac humores lentiores magisque viscidii; curatæ unque hæc à prudenti medico discernenda cum humorum quantitate, & motus ubique ad temperantiam, convenientem proportionem & æquilibrium reducendi. Hinc ubi nimius æstus internus & externus, oris siccitas cum fin & inde vigilæ nimis perinscendendæ; ibi nitosa & potius diluentes, crebrius, sed moderate, offerre expedit. Contra ea, quando in temperamento segni, phlegmatico, meliculis, mris admodum calor, sitis nulla, pulsus debilis & languidus, cum virium prostratione, somnolentia mentisque torpore, à refrigerantibus abstinendum, & analeptici potius ac bezoardici essentis, crebrius inde, sed parcius datis, pugnandum. Quam impuritas sulphurea & acetosa in humoribus peccat, & exanthemata magis ad rubræ purpuræ naturam accedunt, pulveres bezoardici fiores, item diluentia, demulcentia, emulsiones & liquor noster anodynus mineralis omnibus fere palmam præcipiunt. Et in vappetione sive corruptione lymphæ acetosa, accedente ea propter alba purpura, præter fixa diaphoretica, liquor bezoardicus *Bugli*, cum liquore anodyno, proficius.

## § IX.

Quamvis autem in periculosis hæc febribus, non adeo scrupulosa symptomatum ratio sit habenda, sed potius affectus primarii, cujus hæc effectus & producta; quandoque tamen necessarium est, ut imminenti eadem arceatur, vel periculum quod præsentia minatur, avertatur. Ex his sunt cephalalgia atque deliria, ad quæ declinanda optimum unique est domesticum remedium, pullos, columbarum, vel gallinarum receter diliciss, capiti raso applicare, vel epithema ex pane, cum sale, nitro, camphora, oleo ligni Rhodii & nucleis cerasorum vel pericorum, fronti atque temporibus circumponere. In animi deliquis, vomitu, singula, syncope, cardialgia & summis angustis, emplastrum ex theiaca, oleo nucisæ expresso, camphora, balsamo Peruviano, croco, oleo de cedro & pauillio spiritus vini, præcordiorum regioni applicandum. In faucium ardore & siccitate, gelatina cornu cervi, cum succo limonum & saccharo cantho, syrupus diamoroni, nec non oris collutio cum decocto ficuum, syrupo diamoroni & nitro, ope ferunt egregium. Urgente sopore, fricetur furæ & plantæ cum aceto rutæ, vel vesicatorium nostrum temperatum, magnitudine dimidiû thaleri, furis apponatur. Et si purpura retrocedens anxietates facit & inquietudines, liquor bezoardicus *Bugli*, vel liquor cornu cervi succinatus, cum spiritu niri dulci, vel liquore anodyno minerali, ex usu est. In tussi oleum amygdalarum dulcium & croci extractum.

## § X.

Inter excretiones quæ mentum incutiunt, est sanguinis per nares stillicidium. Prodit hoc sanguis ad caput jam infirmum congestionem, ex ipsius inferiorum. Hinc si proportionatus & moderatus est fluxus, cum sanguinis in corpore abundantia, non adeo nocet, sed potius graves capitis affectus avertit, id quod tamen rarius evenit. Quando vero paucæ tantum sanguinis guttæ stillant, nullum inde levamen, sed

potius præstigiū delirii & inflammationis faciunt. Et ubi effusus manat, vires prostrantur, excretionis cutaneæ ad interiora restringuntur, & exanthemata, quæ adsunt, non sine discrimine disparent. Ad avertendum igitur sanguinis ad caput confluxum, pedes semper in moderatam calorem & madorem fervandi, onusque frigus arcendum. Hunc etiam in finem conducibile vesicatorium, nostra ex inventione temperatum, nec nimis dolens, furis apponere, alvumque servare aperam, vel per temperatam nirosam, moderatæ & crebro data, vel clystere, vel infuso mannato. Et eadem quoque juvant, si hæmorrhagiæ nimis. Ubi vero parcius justo nares stillant, sanguis tamen, testibus oculis rubicus visus, turvis & arteriis temporalibus valde pulsantibus, ad caput impetuosis confluit, præter jam dicta revellentia, derivantia & cucurbitulae nuchæ admodum, stillicidium proritare expedit, vel per intrusum naribus stramineum culum, vel scarificatorio instrumentum. Ubi nimis alvi fluxus, pulveribus bezoardicis aliquot tantum grana corticis chaccatillæ admiscenda, eximius tamen potius, quam internis excreto moderanda & abdomen balsamo stomachali ex oleo nucisæ expresso, menthae & balsamo de Peru inungendum. In sudore effusiori fragulorum calor quam maxime evitandus, & abstinendum à potu infusurum theiformem, ac usurpandæ species de hyacintho cum nitro. Et si vomitus & singultus urgente, præter commendandum externum linimentum, liquore anodyno cum liquore bezoardico, nihil efficacius.

## § XI.

Vene sectio in exanthematicis hæc febribus cum summa circumspectione administranda. Magis enim ad præservandum facit, quam ad curandam. Hinc in gravidis & firmis, quæ nimis sanguinis per uterum profluvius obnoxio, quam tempus verum de hyeme præcedit nimis rigida, non sine fructu sanguis mietur, id quod etiam tenendum de eis, qui purpuræ scorbuticæ patient, & morbi hujus insulsum metuant. Vicissim, ubi jam virium enormis lapsus, morbus ex cacochymia ortus jam præfatus est, catarrho affectiones complicantur, febresque ob ætrem vappidum nebulosum malignæ de purpura grassantur, plane à sanguinis missione abstinendum. De primam regionem vacuandis monendum: quod si morbus invadat corpus, cujus ventriculus, copia alimentorum, præsertim incongruorum, receter sacculus, turatus emeticus, in infuso mannato ad unum, vel duo grana datus, eximie fit proficius. Nam licet ejusmodi pharmacum vacua si malignitatem non directè resistat, quia tamen materiam & fomitem morbi subrahatur, multum omnino facit ad curationem ipsam. Sed si quid movendum, heic maxime, sapienti *Hypocritæ* effuso, movendum in principio. Vesicatoris multum in his febribus tribuunt plures. Ego vero ita censeo: habent locum si metus retrocessionis exanthematum, si natura corporis tarda in excretionem, sopor & torpor adest. Tunc novi, à vesicatoris brachii, vel facis appositis, mox totum corpus purpura rubra vel alba fuisse conspersum. Sed nostrum temperatum hic etiam commendamus vesicatorium.

*Nota felle  
veride &  
scitior  
nam deliria  
si aut  
si veranda*

*Excretio  
in modo  
randa.*

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Febris Maligna Petechialis Anno dlo lxxxctix.  
Hale Epidemica.*

*Confusio  
aeris pra-  
eterni in-  
ferioris.*

Varium admodum, maxima tamen ex parte  
nubilum & pluviosum coelum, autumnum anni  
superioris saeculi xctix. regnarat, hyems quoque  
præter morem rapida & laetitia, autumnum fere  
similis fuerat, & ver subsequens anni xctix. pa-  
rimo julto calidiorum & humidiorum habuerat  
aeris statum, venis semper fere ex aucto spi-  
rantibus. Haec autem praeternaturalis diuturna &  
insalubris temporum anni confusio pessime mor-  
talium affectis corpora. Inde quoque fibrae mori-  
ces nimium laxae, succorum spirituscentia de-  
pressa, vitalis humorum progressus multum re-  
tardatus, se & excretionem, possimumque om-  
nium saluberrima perspiratio, turbata, omnibus  
succis insipuitas ad corruptionem prona inducta,  
corporibusque magna ad morbum dispositio inge-  
nita. Exceperunt igitur varii morbi, parum pu-  
erili & maligni, parum a feri redundantia & in  
locis glandulosis flati pendentes. Inter eos, qui  
populares habuerunt circums fuerunt variae &  
febres malignae petechiales. Nimirum circa  
aequinoctium autumnale anni xctix. cepit va-  
riolarum morbus, & per sex fere menses tanta  
institit vehementia, ut vix ullus, qui ipsum non-  
dum expertus, maneret immunis, uti quidem  
superius capite VII. pag. 162. seqq. enumeravi-  
mus. Circa aequinoctium autem vernale anni  
xctix. gravior adhuc proditit lues, adultis præci-  
pue infesta, & stragem edidit haud levem, fe-  
bris nempe maligna, petechiis varisque exan-  
thematis commixta, cujus genium, ingressum  
atque decursum, ex propria attenta observatio-  
ne jam sulius paulo delineabimus.

*Quæ in-  
valens  
morbus &  
quibus co-  
pialis.*

Scilicet invasit hic morbus ratione ætatis, ma-  
ximè juvenes & viros; senilis, puerili ætati &  
senibus peregrit: ratione sexus majorem edidit  
stragem in maribus, quam foemina. Dein in-  
festavit potissimum persanis constitutionis sangui-  
neæ, item sanguineo-phlegmaticæ, nec non san-  
guine abundantes, obesos, habitus corporis la-  
xioris, spangiosioris & venis plurimis, angustis  
tamen & exilibus distinctis. Graciliores autem,  
cholericæ & illi, quibus fibrae magis strictæ &  
venæ amplæ, non tam frequenter eodem affecti.  
Insensibilissimus, immo lethalis fuit is, qui ex ni-  
mia intemperantia, præsertim vini generosi abu-  
su, nimia voracitate & crebrioribus animi com-  
motionibus, sanguinis impuritate & cacochy-  
miam sibi contraxerunt, vel ex morbis prægres-  
sis, aut aliis causis corpus obtinuerunt jam im-  
becille. Sine contagio ipsum hunc morbum fuisse  
subvanum & intus progengeratum, frequenter do-  
cuit experientia. Contagii autem vis non in om-  
nes promiscue se exstruit, sed maxime in vici-  
nos atque dispositos, ita ut plures in lectis in  
adibus simul ægrotarent. Rarissimi facturi ex pe-  
regre accedentibus, qui lue infecti.

*Sympto-  
ma effre-  
dum.*

Omnis autem, quotquot corripuit hic mor-  
bus, hæc affectus pathematicus, ex quibus, cu  
pathognomonicis signis, cognoscendus fuit. In-  
signis & tuba statim inter initia & per totum  
decursum morbi durans, adfuit virium pectura  
atque prostratio, & tanta lassitudo & gravitas  
detinuit membra, ut ægri præ debilitate nec cor-

pus movere, nec erecta statura incessere ponere-  
runt, sed illico vertigo, vel leve animi deliquium,  
non sine insigni viæ discrimine, accesserit. Pul-  
sus dein arteriarum deprehensus debilis, parvus,  
frequens tamen, interdum majori, interdum mi-  
nori celeritate & inaequalitate tricans. Calor  
porro ut plurimum visus remissior & minor, si-  
tis quoque non adeo magna & urina sanorum si-  
milis, sed vigilia, aut in aliis somnolentia,  
persistit continua.

Pro temperamentosorum tamen ætatumque di-  
versitate, nec non rerum exterarum accessione,  
discrepatum symptomatica. In sanguineis confusus  
& inconsistens suis decursus, docti quædam dolor  
major, anxietas præcordiorum gravior, cepha-  
lalgia acutior, cum faciei & oculorum rubore,  
vigilia & delirio, macule etiam rubræ affluunt  
in iis fuerunt conspiciæ. Qui sanguinem mobi-  
liorem & biliosum habuerunt, sub strictiori cor-  
poris habitu, majorem experti sunt ardorem ex-  
ternum, vigiliam cum æstu, corporis iactatione  
& inquietudine; accessit etiam in his loquacitas,  
facium inflammatio, delirium, oculis simul pro-  
tuberantibus, ferocibus atque splendentibus. Qui  
laxiorem & obesum corporis gesserunt habitum,  
cum sanguine copioso, sero viscido scæntie, non  
adeo mortali calore, nec siti, nec inquietudine  
affecti sunt, sed somnolenti, debilissimi & mor-  
tose taciturni jacuerunt. Somnus vero ut plu-  
rimum fuit turbulentus, varisque æbriosis inso-  
niis interurbans, à quo male habuerunt, & ex-  
pergesti levius ut plurimum desierunt. In me-  
lancholicis similia sunt observata.

Quoad excretionem etiam diversa annotata  
phenomena. In normalis per totum morbum  
diarrhoea moderata neque insalutari spumosa &  
variegati coloris fecerunt. Plurimis accidit id  
circa dies criticos, septimum, nonum, undeci-  
mum, vel decimum quartum, cum copioso fu-  
dore, ac crinica equam maxime salutaris fuit ex-  
cretio. Quin, non tantum hoc tempore, sed &  
æstio, quo similes continuæ puride febres grassa-  
nt, notavi, semper magis se re ægrotum fuisse,  
quando alvus lubrica & fluxa, quam si obstruc-  
ta. Tum enim maxime anxietates, cephalalgie,  
inflammationi facium afflicti, vel purpura al-  
ba, cum viæ discrimine successerunt.

Sudorum ratio non fuit ubique eadem: con-  
tinuus quippe & per totum morbum manans,  
morbi malignitatem, naturæ imbecillitatem in-  
felicitatemque significavit eventum; lenis autem  
sudor & modor continuus boni omnis præbuit  
signum. Quando etiam ægri nono, vel undeci-  
mo die copiosius sudare coeperunt, præcedente,  
vel etiam erumpente simul alvi fluxu, sympto-  
mata multum remiserunt, animi rediit vigor at-  
que constantia, nec non pulsuum æquales ictus,  
cum optata spe sanitatis. Nec quiquam fere mor-  
bum hunc evasis periculosisimum, quam dia-  
rrhoea, vel sudore, vel utroque simul. Interdum  
tamen effluvis & longius manavit sudor, ad heb-  
domadam fere, ac vires exhausti hæc mor-  
bi metum incussit.

Narium hæmorrhagia largior ex voto non  
cessit, præsertim crebrius repetens; vidimus ta-  
men & in principio copiosam, cum diarrhoea  
simul erumpentem, sine viæ periculo. Mensium  
quoque fluxus liberalis admodum tertio, vel  
quarto morbi die, innoxius tamen, prodit. San-  
guinis vero per anæ venas stillicidium, quantum  
quidem novi, visum est in nemine.

Unus ut plurimum fuerunt sanorum similes, *Chorea*  
inter-

*Quod  
superius  
anno dlo  
verba.*

*non  
non  
excretionem  
& quibus  
diarrhoea.*

*Sedens*

*Hæmo-  
rhagiae.*



interdum tenues & turbide ac pallide, sine sedimento, quod circa decimum quartum, immo vigesimum diem, cum aliis fustis præsignis signis, comparuit. A non nullis tamen urina statim post emissionem turbide reddidit, non sine fœtore. In quibusdam tertio statim morbi die efflue fecit, succedente gravativo simul capitis dolore, torpore mentisque stupore ac turbatione, quæ accedente die sepius copioso sudore, scilicet evanuerunt & acri servati. Quidam vicissim, maximeque ii, qui diarrhoeam, vel vomitum frequentem experti, per aliquot dies parvisse urinam, limpidam instar aque, reddiderunt.

Famium.

Vomitum cum singulu per totum fere morbi cursum observavimus lethalem. Conatus autem ad vomendum fuit frequentior, præsertim post assumpta medicamenta, vel quando acri ante morbi insuleum gravi terrore perculli, aut in principio emeticum assumerent validius. In non nullis peculiare hoc functi omnis symptomata vitium, quod liquidum assument & in stomachum delatum, accedente leviori corporis commotione, vel erectione tantum, iterum in os cum murmure ac borborygmo ascenderit, ac limpidus humor, duo fere cochlearia complens, eructatus. Vidi imprimis hoc cum singulu per aliquot dies in viro honorato, in quo insinua post mortem sectione, hepatis in concava parte plene puritudo, nigrum, instar picis, nec non in diaphragmate, duodeno & parte pylori, sphacelo comparuit corruptio.

Exanthema.

Exanthematibus quidam plane caruerunt, quidam confertim obfessi. Hæc in non nullis antequam læto affigerentur, quam adhuc non nisi de languore consequerentur, inter initia statim comparuerunt, minus fausto eventu. In aliis circa diem septimum, vel nonum in conspectum prodierunt, bono cum omine. Occupant autem ut plurimum collum, dorsum, femora, parcius abdomen pedes & manus, rarius etiam faciem, in uno tamen circa frontem, tempora & mentum rubicunda admodum conspicue fuerunt macule petechiales. Meliores fuerunt parvæ & rubræ, peiores magnæ, livide & ad viridem, vel violaceum colorem accedentes. Præterea in iis, quibus alvus tensa erat & dura cutique sicca & arida, nono imprimis, vel decimo morbi die, quam petechiæ disparere inceperunt, maximis cum anxietatibus, extremorum refrigeratione summaque virium & animi defensione, successit exanthema pessimi moris militare, purpura nempe alba, multoque tam antequam prodiret atrocissimis symptomatibus, quam etiam postquam prodidisset, ob vires penitus jam fractas, interfecit.

Singularia.

Rarius morbum evaserunt, continui morbi formidine detenti, nec non qui medicamenta respuerunt, qui obfessi fuerunt, & copiosum ac impurum aluerunt in venis sanguinem. Functi omnis fuerunt sudores frigidi, cum pulsu frequenti, debilissimo & inermemente, respiratione intermissa & accisa, delirio, convulsivis motibus, seu tendinum in maximum carpi contractione. Delirium nunciavit oculi fœces, cum rubedine & lachrymatione, sinus defectus, inquietudo & iactatio corporis, pulsus celer & faciei inflatio. Pessima quoque macularum retrocessio, quæ vel admodum improvide frigore, vel terrore incusso, vel corpore diuina erecto, inducta. Hæc enim facta, mox summa debilitas, corporis refrigeratio, respiratio anhelosa & anxietas precordiorum gravissima, cum viæ discrimine,

subsequuta. In bonis vicissim fuerunt, quietus corporis decubitus, mentis constantia, sitis, somnolentia, macularum die septimo demum, vel nono processus legitimus, alvus liquida, furditas circa diem criticum eveniens & aliquamdiu perdurans, idque maxime in iis, qui habitu fuerunt graciles, tenues, cum fibris strictioribus.

Evanes.

Qui mortui, die ut plurimum undecimo, nonnulli tamen etiam septimo, diem obierunt. Qui autem sanitatem recuperarunt, die undecimo, vel etiam decimo quarto, quin decimo demum octavo, virium restiturationem & symptomatum remissionem fuit experti. Sex tamen plerumque hebdomadam spatio, antequam perfecte sanarentur, opus habuerunt, ac medio quippe tempore febres soluta est, & reliquum, tum ad tollenda superveniens accidentia, quam ad vires reconvalescentiam impensum.

Filiæ &amp; regim.

In regimine commendanda usura aëris sereni, limpidi, puri, temperate calidi; hypocaufta inter nimis calefacta, vel excessivus calor à stragulis, semper fere, vires exhauriendo & excretorios actus turbando, nocuerunt. Cibi, præcipue solidi, admissi nulli, sed in declinatione & post illam, tantum liquidi & facili solutionis assummi. Usus vero ciborum liberalis, etiam nutritivum & iusculorum fide dictorum confortantium, particulis oleosis sibi bibulis fœtorum, præsentissimum attulit damnum, imprimis circa dies criticos, in statu morbi, aut præsentibus evacuationibus criticis, & inde mox major virium jactura cum excretionum turbatione inducta. Quin novi, largientem ciborum solidorum declinantem morbo usum, gravem perperis recidivam. Nihil autem fere magis nocivum fuit, quam sinus erectus. De quo quidem silent prædictorum libri; ego vero non tantum in hoc, sed & aliis malignis & acutis exanthematicis morbus notavi mulieres, quod si agrotantes diutius corpus in erecta servarint statura, sive surgentes, sive in læto sedentes, vehementia morbi manifeste increverit, quin ipsa morbo exuperit. Inde enim illico summa affecti debilitas & animi quasi deliquio, anxietate præcordiorum, extremorum frigore & macule in cute conspicue evanuerunt, cum viæ periculo. Neque hoc, ut vulgo creditur, ob admissum frigus accidit, sed in etiam, qui in calore detenti & ab omni frigoris accessu probe sunt defensi, ob languidiorem sanguinis ex corde perpendiculari viæ ad caput pulsus.

Calida ab alexipharmaco.

Ex medicamentis alexipharmaca, salia volatilia, bezoardica calida & spiritiosa, licet ceu efficacissima vulgo commendarentur, plus damni, quam emolumenti attulerunt, præsertim liberalius & cum calido regimine exhibitis. Dissolutionem enim sanguinis elementorum promoverunt, & ob id majorem petechiarum fecerunt copiam; vel cephalalgias etiam, anxietates, inflammationes, vel etiam sudores copiosos, suscitarent. Quin novimus his ad præsertionem cum regimine assumtis, mox ipso contagio corpus fuisse affectum. Fuit tamen, ubi hæc volatilia alexipharmaca analeptica mixta, moderate & cause usurpata, opem tulerunt egregiam, cum nempe, ubi ex macularum retrocessione, vel corporis, sive ex terrore, sive ex frigoris externi admissione, aut statura erecta, refrigeratione, anxietates & debilitates insensibiliter subsequæ. Suavissimum etiam moderatum horum usum statim in principio, quam circulatio sanguinis adhuc in vigore esset, quo

Magna

magna materis peccantis portio cum fructu dissipata. Sudoriferum tamen non simul injunctum regimen, nec iis uti sumus in plethoricis & cacochymicis. Neque minus eo tempore, quo crisis insitit, vel etiam jam adfuit, bezoardica volatilia in moderata dosi, criticas evacuationes, debilem & languidum motum refuscitando, egregie secundantur. Cauti tamen fuimus & parci, ne nimios sudores efficeremus & ad lentas febres induceremus dispositionem.

De vom.  
fistula.

Sanguinis missio ad arcendum morbi incursum proficua observata, in corporibus plethoricis & quibus sanguinis evacuationes tam spontaneae, quam artificiales consuevit: contra ea, quando jam debilitas & virium prostratio insignita adfuit, minus feliciter cessit venae sectio. Non enim putredinem tollere apta fuit, sed corpora inde magis potius debilitata, ut morbo superando facta imparia.

De vom.  
fistula, co-  
fessionibus  
& quibus.

Vomitoria levis in iis, quibus prima corporis regio viscerum humorum copia obfusa, praeservationis ergo ante insulam morti, opemulerunt exoptatam. Novi etiam ipso in morbi principio eadem profuisse: verum circa morbi progressum ac statum, continuum vomendi desiderium, nauseam, ardorem circa regio sem cordis & anxietatem cardiacam suscitavit, vel potius huius malis praebuerunt causam. Vescatoria ab aliis nobis eximie laudata, in ista morbi, ubi delirium, vel spor & convulsiones agrum affluerant, cervici adnota. Optata omnique sponsonera reiecit, propter pulliam debilem & motus vitales jam languemes, quippe quae vires magis debilitant & excretionem retardando, majorem efficiunt malignitatem & ad mortem aditum parant placidum quidem, sed certum.

Materia  
medica  
modica.

Materia vero eorum, quae a nobis usurpata & salubriter deprehensa, fuit haec: ex aquis; florum sambuci, acaciae, tiliae, ulmariae, tatarum, herbarum scordii, scabiosae, cardui benedicti; ex syrupis: acetositate citri, granatorum, cum julepo rosarum; ex pulveribus: mater perlarum, ammonium diaphoreticum, lapides cancerum, succinum, terra sigillata, cornu cervi ultimum, philosophice preparatum, nitrum purum; ex alexipharmacis: camphora, essentia de extracto scordii, visceris, mixtura simplex, spiritus & tinctura bezoardica; ex acidis: spiritus vitrioli philosophicus & niri dulcis; ex humectantibus: decoctum scorzonerae, radice cornu cervi, item gelatina cornu cervi; ex analepticis: aqua florum aurantiorum, oleum citri recens cum saccharo, confectio alkermet, de hyacintho, balsamus noster vitae externae; ex antispasmodicis: essentia castorei, cinnabaris, spiritus cornu cervi succinatus.

Modicis  
medicis.

Ex his variis generis formulae pro circumstantiarum ratione concinnatae, & methodus usum utendi ita instructa: in principio morbi pulvis bezoardicus, cum niro & paxillulo camphorae semina, iterato aliquoties exhibitus; per morbi deinde progressum & statum, mixtura ex aquis temperata, diaphoretica, analeptica, antispasmodica & pulveribus cardiacis bezoardicis cum succo citri aliquandiu data. Potu inditum nitrum, vel spiritus vitrioli philosophicus, aut chylus ammoniaci sulphuratus, qui alvum fluidum servat. Ex frequentis potus decocti cornu cervi citrati, item radice scorzonerae, calidus & frigidus, admodum proficuum notatus. Circa diem

criticum leniora alexipharmaca & quae sudorem promovere poterant adjecta, quando natura ad sudorem movendum se armavit & non sufficit. Hinc vel mixtura, vel tinctura bezoardica, vel essentia scordii, mixtura indita.

Symptom.  
rem. medi-  
cine.

Haec optima & securissima fuit medendi methodus & plus quam centies probata. Symptomatibus autem hac obviam itum ratione: in initio vomitu, anxietate praecordiorum, enormibus diarrhoeis & ventris torminibus, externe theriacae cum oleo nucis moschatae expresso, camphora, oleo caryophyllorum & balsamo Peruviano mixta, regioni stomachali apposita. In diarrhoea etiam nimis vires exhaustiente usurpatus pulvis bezoardicus nitrosus, cum momento camphorae & theriacae coelestis. In phrenitide & acuto capitis dolore cum fructu externe admoventis spiritum vini camphoratum & salis ammoniaci, cum oleo rosae, lavendulae. Si alvus nimis adstricta, vel vermina in ventre affluerent, expressissimi fuerunt chyliferi lenientes, vel pure oleosi. Ad erigendas vires, spiritus, confortantia, aromatica, externe pulvis & scrobiculo cordis apposita, vel naribus suffusa, opem tulerunt egregiam. Ad fallendam sitim egregium fuit electuarium, ex saccharo Canariensi & spiritus niri dulci.

Prose-  
ra.

Qui demum ab epidemica hac lue sibi menterent, in prudenti medicorum consilio defensi purgationibus lenioribus, pilulis nempe ex extractis balsamicis amaricanibus, rhubarbarinis & aloeticis. Plethorici sanguinis subactio rite administrata. Ad sanguinem vero fluxilem servandum, & dysenteriam cum malignitate arcendam, commendari meruit insulsum viciae & scordii, omnibus individuis accommodum. Accedere praeterea debuit decens vivendi ratio, cibis & potus moderatus, temperantia nec varia; abstinendum ab affectibus animi, vires omni modo custodiendae, corpus a refrigeratione defendendum, & ipse aer humidus & vapida corrigendus accensione lignorum & gummanum resinosorum.

## OBSERVATIO II.

Ego quidem per omnem vitam non facile memini, ullum annum adeo, quoad tempestatum aërique constitutionem, ab ordinario statu declinasse & quasi praeternaturalem fuisse, quam elapsam MDCCXXXVIII. Etenim Martio jam mense caelum regnavit praeter morem calidum, & subsequentibus mensibus calor cum siccitate adauctus, sicque ad medium usque Septembris duravit. Intervenerunt tamen subinde dies & noctes frigidae admodum & rigidae, quibus adeo in contrarium mutatus subito aeris habitus, ut precipitane etiam April noctu in glaciem & gela aquae densarentur. Annumno postea tempestas ingruit ac perficit humida & frigidissima succunda. Sub finem demum, Decembri & Januario sequenti, successit praeter consuetudinem algidissima hyems, ita ut gelu VI. VII. X. XII. & XIII. Januarii die, intensissimum illud post hominum memoriam anni MDCCIX. si non superaret, certo tamen aequaret. Frigidissimum autem hanc tempestatem subito iterum excepit lenissima australis die XIV. aera, quae copiosissimam nivem cum glacie mox liquavit, interspersis subinde pluviis. Mira etiam sub hac coeli vicissitudine observata argenti vivi in barometro, ratione descensus & ascensus, crebra & quotidie fere mutatio, qualem me per eriguit

Constitutio  
aëris &  
meteorum  
epidemica  
anni 1758.

triginta annos vix unquam vidisse recorder, adeo etiam, ut vel una nocte, à vigesimo septimo gradu, ad duodecesimum, quin octavum dilaberetur; luculento indicio, non modo valde subitam ratione caloræ de frigidis in thermometro, sed etiam gravitatis aëris, mutationem ac variationem factam fuisse. Hæc autem insolita & peculiaris aëris antiquæ temporis consuetudo, non ponit non ingentem etiam mutacionem animantium & maxime humanis corporibus inferre functiones tam vitales, quam naturales, potissimumque secretorios & excretorios actus, turbare acque pervertere, & materiam ac dispositionem ad diversæ de infusæ etiam generis morbos ingignere. Hinc igitur factum est, ut non modo in universa Germania, sed & Belgio, Anglia & alibi, tam uberi proveniunt enari fuerint morbi, quam vix alio tempore visum unquam. Decurrente quippe vere, æstate & autumno, febres variae intermittentes, tertianæ simplices, duplices & continuæ, quartanæ simplices & duplices, crebrius recidivantes, valde anomale & irregulares, in quibuldam malignitatis speciem referentes, contagio insidit, sæpe purpuraceo exanthemate sipare, prodierunt assidim.

Variole quoque & morbilli non siluerunt, & quidam præterea diarrhœa & dysenteria affecti. Octobree vero & Novembre appetente defuerunt intermittentes irregulares & successerunt catarrhales, pro diversitate & inspuritate corporum, plus minus benignæ vel malignæ, ac per Decembrem etiam ac Januarium infestantur, facit simul contagiosæ, cum exanthematibus, petechiis spuris ac purpura. In plurimis cum horripilatione, virium prostratione, consilivo ætenu dolore, tremore capitis, junctæ raucedine, gravedine & pectoris infactu, inceperunt, & quotidie circa noctem, quæ ut plurimum infirma fuit, major facta inquietudo cum æstu. In his quæ admodum corporibus, quarto, vel etiam septimo die comparuerunt exanthemata, petechiæ maxime spuris & purpura alba, vel rubra, vel utraque simul, modo cum, modo sine levamine. Optime potius morbus solutus vel sudore largo, vel alvi fluxu, vel copioso siccato. In benignioribus catarrhalibus cum violenta & convulsiva tussi, facium tumore, quandoque exulceratione, pectoris copioso infactu, parotidum, quin erysipelaceo faciei tumore, ego dilucentibus, sanguinis æstus & acrimoniam temperantibus cum fructu sum usus. Evacuacionem alvinam per infusum usitatum manuum movi, quod sine ulla molestia sex, vel septem sedes protulit, humorumque à pectore, faucibus & capite impetum efficaciter derivavit. Et postea pulveribus diaphoreticis cum paucillo extracti croci, nec non infusis theiformibus, cura ex voto absoluta. In his autem febribus, quæ genii minus benigni rite, eadem, quam supra expositum, ratione, medicationem insinuat.

Ex his quibus exanthemata junctæ, memorabilis potissimum petechialis minor, cum purpura alba, cupis hilotiam, imprimis ex observatione numerosissima præi occupati medici, sigillatim percensere, operæ erit pretium. Cœpisse scilicet hæc in plurimis cum horripilatione & subsequente æstu minisque per dies aut tres primos dies assidit, ita ut ægri non penitus læso affigerentur, sed tantum de doloribus testivis in dorso & artubus, capitis tremulencia, virium appetitque prostratione conquererentur. Non nulli conatus vomendi, quidam etiam vomitus

experti, plerique tamen primos hosce dies somnolenti, dormitantes magis, quam vigilantes, transierunt. Accedente autem quarto die, morbi febiles graviores accesserunt & vix sequenti mane tantisper remitte æstus, simulque ipso hoc die in exemplaribus sanguinis per nates erupit stillicidium, ac paulo post sub læni madore proderunt etiam petechiæ. Fuerunt præterea in plerisque quibus alvi circa hoc tempus obtigit lenis profluvium, ad septimum usque diem, quin quandoque undecimum durans, quod morbi vehementiam imminuit magis, quam adauxit. Absoluta macularum eruptione, in junioribus potissimum, minus miculosa & de vita sollicitas, febres postea, sub levi mentisurbatione, placide & tranquille decurrit & circa decimum quartum diem ad faustum exitum pergit, tantum quod in quibuldam nullis & sordidior status per octo, vel plures dies durans, remansit. Quod si autem post exanthematum efflorescentiam febris impetu cum delirio increvit potius, undecimo, vel decimo quarto die certo exspicienda fuit purpura alba. Quæ priusquam comparuit, æstri luctu præcordiorum anxietate, infirmia & stridit cordis collum sunt affecti, ut conquererentur fauces strangulæ, se cistæ esse inclusas, teneti, in alieno conclavi & inter peregrinos ventis, rogantes, vincula ut laxentur, ipsosque suis & quæti redderetur &c. Quod si tamen sub hoc angore & pælium vehementia purpura in conspectum venit, & dilata cum reliquis symptomatibus postea cillantur, & si felicitè evaserunt. Sed quibus circa notum diem tendimus lubulus, morbus tremuli, respiratio anhelosa, involuntaria urina: & alvi excretio accidentur, licet etiam decimum purpura prosequeret, decimo, undecimo, vel decimo tertio die, sub convulsivis motibus obierunt. Necendi hiæc febribus methodus fuit hæc. Adultis & qui venæ scissæ affecti, simul ac conquæri corporum, sanguis ad sex, vel octo uncias liberatus in pede, omnibusque quiet, moderatus calor & abstinentia injuncta. Conclavia semper in æquali tepore servata, nulli, quam possenti, cibis datus, potus vero ex cerevisia tenui tepida & parvis haustibus per libra uniuscuique concessus. In medicatione, rejectis expellentibus & alexipharmacis, ternis singula hostis, exhibitis pulvis temperans, ex absorbentibus, tum simplicibus, quam acido saturatis, cum animonio diaphoretico & nitro, vel loco hujus potio temperata ex aquis destillatis, cum temperantibus & syrupo acetositate citri. Compertis autem exanthematibus, ad impediendam eorum retrocessionem, pulveribus temperantibus, interpositis subinde parvis dosibus, ulia essentia bezoardica, infusum theiforme poni datum & regimen diaphoreticum injunctum. Alvus quidem in paucissimis adstricta, sed ubi fuit, clystere emolliente soluta. Adversus cephalalgias usurpatis spiritus vini camphoratus, vel etiam epithema illud domesticum ex mica panis, bacis juniperi, sale & cumino. Reliquorum symptomatum, ut inappetentiæ, somni defectus & lassitudinis, minus rationem habuimus & præter analeptica temperata, datum præterea nihil. Cæterum felicitè per Dei gratiam, in omnibus fere qui consiliis medicis in dicta & regimine rite obtemperantur, curatio successit; si vero, qui hæc peni habuerunt, maxima quidem etiam ex parte evaserunt, sed in morbos postea incidierunt corruptus, leucæmies.

Idem

*Idem hic morbus, eisdem fere symptomatibus, eodem tempore infestavit milites nostros praedictarios. Scilicet fama percubuerat, potentissimum Porcellum Regem hac venturum, milites lectum.*

Idem hic morbus, eisdem fere symptomatibus, eodem tempore infestavit milites nostros praedictarios. Scilicet fama percubuerat, potentissimum Porcellum Regem hac venturum, milites lectum. Hinc praedicti meditationes instituerunt campenses; quosque per aliquot dies ante diluculum in campum educerent, ut armis sese exercerent. Erat autem October iam adules, coelum frigidiusculum, nebulosum ac subinde pluviosum, milites tamen minus adversis aëris injuriis ob vestitum leviores munici: male inde ipsorum corpora affecta de dispositione ingenta morboſa, inprimis quam non deesse, quā liberali vini adusu potu corpus calefacere perperam fugerent. Ex eo igitur languore ceperunt multi de plures agrotare, alii casaritis, alii rheumatismis, alii diarrhoeis, alii intermittentibus febribus, maximeque quartanis refractariis, affici, donec exente Novembre longae plures adoriens febri continua maligna exanthematica, de succellive vel centum inficiens, ad finem usque Decembris insisteret. Quotquot haec corripuit, omnes primum de infolio corporis artuumque languore conqueſti sunt, cum capitis gravitate, appetitus defectu de nausea. Sequens dein horror corporis, quem excepit calor de pulsuum celeres, debiles tamen ictus. Postea non nullos primum mitius affixit pectoris infarctus, cum tussis de coxyza; alios vicissim mox ita prostravit morbi vehementia, ut lecto affigerentur, de simul ac vel caput tantum erigent, hypodermis afficerentur. Increbuerunt tamen, inprimis accedente quarto die pathemata, somnus defuit, nausea urti, caput de dorsum doluit, pectus oppressum fuit, in non nullis nares sanguinem stillabant, alia vomitus, alia conatus ad hunc acciderit, fuerunt maxime inquieti, delirantur, corpus palpitant, de summo simul angore conqueſti. Exactis inter haec aliquot diebus, circa quintum, ut plurimum tamen septimum diem, prodierunt maculae petechiales, optima roſci de purpurei, pessime lividi de fufci coloris. Exanthema quoque militare, maculis hūc quoadque fuit interpersum rubrum, vel album, morbumque multum exacerbavit. Longe pejus tamen fuit, si post notum, aut undecimum diem hoc accessit, viribus jam nimium attritis; cum de demum vigesimo primo uni id contigisset novimus, lethali evenit. In quibusdam critico septimo die sudor manavit; in plurimis vero circa quintum vel septimum diem alvus fluere cepit, ad notum, vel undecimum usque diem; de hac quidem excretionis critica agris in salutem evenit. Quod si vero sudor statim ab initio fuit effusus, exanthematibus praesentibus nulla remissio, nullum criticis diebus in urina sedimentum, alvus adstrictio, cutis arida, facies nulla, malum praebuerunt omen, invalere haud ita multo post delirio, inquietudine, accedentibus cum singulu convolutionibus ac tandem morte. In medicatione harum febrium regimen inane modicatum, potus tepidus sufficiens, ex decocto possimum hordei, cibis interdictis, rejecta calida de alexipharmaca, vomitoria de purgantia, omnia quoque venae sectio, quae in huius primum infestione cellerat. Dati tantum pulveres temperantes nitrosi ac diaphoretici, modo cum, modo sine succo citri, item potiones ex aqua anaesthetica ac diaphoretica cum animoso diaphoretico, matre perlarum, cannabini de aceto. Alvis obstruata emollientibus clysteribus relaxata, naves illas

calore de pulverum diaphoreticorum usu ad moderamen traducta, de de reliqua eadem fere ratione, ac supra dictum, symptomatibus ceteris obviam itum. Felicitate curae cessit curatio, ita ut ex omnibus vix ultra decem morui, de ha quidem vel nono statim die, vel undecimo accedente purpura. Cauti fere omnes fuerant decimo quarto die sensim vires cum fomus de appetitu receperunt ac succellive cum sanitate in gratiam redierunt. In quibusdam tamen per aliquod adhuc tempus restitit praeter languorem tussicula, in aliis etiam passim in carnosia externa paribus effluerunt furunculi admodum moleſti, conguis praedictis demum etiam sanati.

Id igitur ex epidemica huius febri historia nosara dignum: quod a sola paulo intensiori refrigeratione corporis atque transpiratione adhibita, pro dispositione corporum, quatenus plus vel minus impuros in venis inque prima regione alunt succos, vari generis morboſae affectiones, plus vel minus mali moris, intercurrentes nempe, item catarrhales rheumaticae, petechiales de purpuratae gigni possint. Dein de illud observationem meretur, quod contagiosa quidem haec febris fuerit, non tamen omnes, sed tantummodo milites infecerit, qui similem refrigerationem eo tempore passi, inmutatis a contagio de is, qui in eadem domo habitabant, de qui visitantur agrotos. Quod quidem luculentum est testimonio, contagium, ut effectus detur, supponere de requirere, corpora, quae succos ad recipiendum miasma de ejus activitati obsecundandum dispositos alunt. Tum non praeterendum est, quod milites valde procretae staturae vehementius agrotaverint de diutius evaserint, quam alii minus proceri. Quia eam in procreta staturae corporibus, ob longum ac difficilem sanguinis per venas perpendiculari via regressum ad cor, circums tardior est de languidior ac in parva staturae, excretionem autem de maxime perspirationis negotium circulum sanguinis tardior, vel celerior sequitur, facile patet, sub languidior sanguinis de humorum circuitu, corpora magis de facilius reddi impura, de autocritam quoque naturae in vincendis morbis, quae consilii maxime in circulatione sanguinis vegetiori de promiss excretionibus, valde languida esse de insufficientem. Tandem memorabile omnino, quod venae sectio etiam in principio administrata notam potius quam opem attulerit, quae alias non tam facile in robustis hominibus, ut multis, nocet. At quum a transpiratione prohibita de retentione excrementorum, quae per cutem diffunditur, primos malum traxit natales, aliquot jam septimanis languor de ciborum ante invasionem febri inappetentia adfuit, facile constat, sanguinis missione imbecillitatem adaequatam, perspirationem vero magis imminutam fuisse, quod utrumque non potuit non cum damno accidere.

*Contagiosa.*

## CAPUT XI.

*De Febribus Petechialibus veris.*

*THESES PATHOLOGICAE.*

### §. I.

**F**ebres petechiales verae, sunt valde malignae, contagiosae, capiti de viribus quam maxime infestae,

*Deſcriptio morbi.*

infestæ, cum variis coloris maculis junctæ, & orne à succorum vitalium corruptione ac subsequente putrida dissolutione, eaque propter lethales.

## §. II.

Nominis  
ratio.

Merito hæc febris exanthematicæ vocatur malignæ, seu venenatæ: eænim plerumque à tenuissimo, activæ, virulentæ indolis vapore, five miasmæ, è corpore decumbentis halante, oritur & propagatur. Dein difficulter sanariorem recipiunt & brevi sæpe plures jugulant. Tunc vires, à quibus morbi vitam sustinentes pendunt, & celeriter, & graviter, perfundant ac destruant. Denique, non secus ac maligni homines, mitem primæ facie exhibent indolem, medicosque cum assuetibus, ac si catarrhales tantum essent, sæpe decipiunt, postea vero perniciosum effectum tanto majori exerant vehementia.

## §. III.

Indolis  
compositio.

His tamen indicis delecteria indoles morbi cognoscenda. Ab initio statim agri conqueri solent de virium summa profusione atque debilitate, ut enclivi vix consistere, vel pedibus incedere queant, sed mox animo deficient, quam in aliis continuis & acutis morbis demum in statu de virore equinodi imbecillitas observetur. Caput ab initio valde dolet, fervet, cum torpore, animus illico deprimatur, anxius & sollicitus est, ac salutis spem absque, pessima queris omnino. Assidua urget vigilia, nec ulla refectio adeit formæ, appetentia plane perit, faciei vigor intercidit, pulsus languidus, parvus & inequalis micat, decubitus in lecto insolitus est atque inconpositus, membra quasi convulsa & corpore hæc & illuc jectigato, pectoris est oppressio, quandoque cum tussi sicca, musculorum fibræ undulatorio quasi & tremulo motu convelluntur, renascentur contrahuntur atque subaltant. Plures nec de siti, nec aestu, nec dolore, nec anxietate queruntur, & asseverant potius, nihil mali se sentire, præter linguam & sensui defectum. Urina primum languens ut plurimum tenuis sanorum simillima. Quarto, quinto, vel etiam septimo die in conspectum prodierunt macule, in dorso potissimum & lumbis, plus minus copiosæ, variis subinde coloris, plerumque tamen sine levamine, ideoque symptomatice magis, quam criticæ.

## §. IV.

Nominis  
differentia.

Exanthemata veteres generali denominatione hæc dicunt maculas. Latino ab Italici idiomate pedicularum petechiarum & petechialium nomine effluuntur, à voce pedecio, duplex, quia pulcum morbus figura emulatur; à Gallis ob colorem purpureum, purpuratæ; ab Hispanis tabedillo, à calice ex flavo rubro; à Germanis lenticularæ, propter lentis quam referunt figuram & colorem, aut puncticulares, vernacula die *Reb-Flecke*. Hungari vero propter gravem capitis dolorem & delirium convulsivum nominant Germanæ voce *die chi zige Haupte Krankheit*. Ab aliis autem exanthematicis præter figuram & odorem, quod non modo sine omni ardore, sine pruritu, cursu elevatione, asperitate & exulceratione, præcedat, sed & ut plurimum sine levamine, quia materia eorum non est saluta causa, sed potius putrida & corrupta.

## §. V.

Prognosis.

Tantum hinc abest, ut macule hæc salutis spem faciant, ut potius quo copiosiores conparent, eo *Fid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

major est corruptionis gradum, quin lividi, plumbei & ex atro viriditientis coloris, si hæc colorem plane corruptionem arguant. Qui enim evadunt, non cutaneæ excretionis, sed vel sudoribus largis, feculentis acorem spirantibus, vel alvi fluxibus criticis, convalescunt. Sed non nisi naturæ benignitate ac robore id accidit in his, ubi non adeo eminens succorum corruptio, sed temperata adhuc & quasi quodammodo alexi hæc hæc indoles. Plurimi potius occumbunt, vel si hæc colorem corruptione in ventriculo, intestinis & aliis visceribus, vel phrenitide, frequentius angustia faucium & œsophagi inflammatione, cadaveribus mox post mortem intolandum plane fetorem spirantibus. Quem functionem eventum signa præstigunt hæc: si sinus vel nulla, vel plane inextinguibiles, si lingua arida, discissa, nigricans, fauces inflammata & squalore oblecta, cum deglutitione difficilis; si post exanthematum eruptionem respiratio arthralgia & pectoris angustia persistit & invalida, vel post sudorem & alvi fluxum delirium cum aliis pathematibus ingravescit, nec urina turbida sit, nec sedimentum ponit; si demum oculi obcurantur, aëria plane delirant, agri floccos capunt, tendines subaltant, excrementa involuntarie elabuntur, sudor frigidus manat & convulsiones accidunt, spiritum cum vita præcedentes.

## §. VI.

Formalis  
ratio.

Formalis perniciosior harum febrium ratio consistit in putrida dissolutione, five colliquatione sanguinis & succorum vitalium, potissimumque in fluidi lymphatici elastici tenuissimi, quod in sanguine contentum, in cerebro ac spinali medulla separatum, per nervos in universum corpus distributum, sensum de motum partibus præstat cunctis, iniquatione & vitiosa plane diathesi. Eænim venenatum illum vaporem, quo etiam sana corpora insichantur, ejus naturæ esse æquæ potest, ut non modo sanguinis alioque humoribus putredinosis successive inducat fermentationem, sed & immediate ad interiora cerebri nervearumque partium pervadat, fluidumque ibi corruptat subtilissimum, ex eo platum fit, quod suscepto ipso, illico vires tant naturalis, quam vitales & animales languere incipiunt omnes, in perficte sanis corporibus salva adhuc sanguinis & humorum crasi & à corruptione immuni.

## §. VII.

De purpura  
differentiis.

Hoc virulens multiplicative indolis miasmæ, corpus maxime sub præ nates, fauces & bronchia. Nam nullibi tam aperti minuscule testis discurrent nervi ex prima & secunda conjugatione, ac in narium cavo. Hoc igitur dum pertransit cum aëre vechus delecteris vapor, non narium usque, eundem immediate, proxime & imine pertingere ad nervos ipsiusque cerebrum & infestæ ac propter mox temulentia, capitis torpore, virium languore, nec non vertigine affici. Maxime omnium vero committet sese salvali latius contagiosum miasmæ, & cum hoc descendit ad ventriculum, qui etiam, ceu pars nervosa, primam sive fidem præbet contagiosis hæc febribus. Hinc in venarum & præcordiis primatum se prodere solent prava symptomata, nausea scilicet cum vomendi conatu, ubi frequens cum torminibus dejectio, vel etiam fortis adstrictio, ciborum salubrium, anxietas præcordiorum, cardialgia, *das Ubelken*, & frequens copiosa lymphæ ex stomacho eructatio. Hinc restantur observationes anatomico-prædictæ.

in his febribus defunctis ventriculum maxime atrocinis lythacelosa corruptione affici. Dum vero maxima hoc de salivæ in ore & liquori mensurali gastrico & pancreatico in stomacho miscetur, multum ejus via propagativa & multiplicativa intenditur. Etenim inter omnes constat, salivales hos succos, intimæ alimentorum digestionis servientes, valde subtilis, spirituosæ, æreo-elastice fermenticibilis nature esse, eaque propter dulcia quibus commiscetur illico fermentativo motu percire. Quare quia hi succi in motu intellectivo fermentativo jam confinati, longe vique facilius delato illic subtilissimo putredinoso miasmati obsecundant, ut hoc sepe propaget & augeat, non secus ac exigua pars fermenti panifici ingentem farinæ massam fermentat.

## §. VIII.

Hinc facile jam elucescit ratio, quare ad contagium perniciosi hujus morbi attendam, nihil præstabilis jam pridem à periosissimis medicis annotatum, quam ut infestorem, præsertim quem ad extrema & putredinis acumen ventum, halituum facie averta vitemus, salivam crebrius expuendo rejiciamus, ac ore contrivamus ea, quæ salivam eliciunt, radicem angelicæ, zedoariæ, imperatoris, pimpinellæ, aut mallicæ, vel fumigemus tabacum. Neque minus inde parit causâ, cur maxima hoc deleterium longe facilius suscipiant longæque cieus perneciale vim exierit, in ventriculo copiosis crudinitibus & putrescentiæ ac salivæbus sedibus obstituto; & cur vicissim leniora emetica, alexipharmacia nupta, in recentibus infestis, certe & securissimæ ad præcavendum prima in herba morbum sint efficacæ.

## §. IX.

Primam autem harum contagio infestarum febrium originem recte omnino cum *Hypocrate* ex communi aëris vitio deducendam esse reor. Nimirum diuturnum humidus, pluviosus, nebulosus, nec non australis calido-humidus aëris status, ob eminentem vaporum aqueorum copiam, vim ætheris vividam, elasticam, expansivam, quæ solidorum & fluidorum ad vitam necessarium in corpore motum, sustinet, obdundit ac deprimit. Inde salubres excreciones, maximeque perspiratio, elanguescunt ac turbantur, inutiles, superflue & corruptæ partes retinentur, quibus inter sanguine & succis accumulatis, non possit non humana ad corruptionem & dissolutionem prona ingigni dispositio. Accedit quod sub aliena ejusmodi tempestatis constitutione, ipsa vegetabilia & frumenta alienam naturam corpori inimicam contrahant. Nam nonum est, humido & pluvioso celo diu regnante, in fecale potissimum ubere esse provenientis soli esculentis, vernacula *des Mutter - Korn*, quod noxiæ & tæneum non venenatæ est indolis. Neque propterea hoc tempore fecale, tantam copiam spiritus vini per fermentationem præbet, neque tam salubrem & resistentem panem largitur, ac illud, quod temporibus anni siccis & calidis produciunt. Ut adeo non mirum sit, insalubria & corrupta hinc confecta alimenta ingesta, simul ipsa corpora disponere ad putredinem.

## §. X.

Dein aëri insalubritas & ad ingignendos putridos morbos aptiendus induciuntur ex crebra ac diuturna aquarum inundatione. Hac enim facta, humor stagnans, accedente imprimis solari calo-

re, putrescere incipit, multaque putrida in atmosphæram mittit effluvia. Infestorum quoque vari generis copia circa aquarum stagna succrescit, a quibus causticæ, salinæ, deleteris materis subtiles multæ in aërem elevarunt. Quæ quidem omnia quam sunt sanæ infestis, historiarum utique docente monumenta, quibus uberius constat, post aquarum dilutiones magnas, contagiosa & tantum non pestilens natura febres fuisse subortas, de quo pluribus evolventa dissertatio de temporibus anni insalubribus, item tenus *II. Medicina ration. sytem. pag. 278*. Eisdem infestis naturæ est aër exhalationibus putridis ex cadaveribus inhumatis putrefectibus, vel excrementis animantium surgenibus, referens, tanto magis incarcerationis & acetis purioris destitutus.

## §. XI.

Neque tamen aër tantum impurus & infestus, verum etiam generatio horum morborum facit, verum etiam ipsius corporis ad putredinem intus concipiendam habita ac dispositio. Per ipsam certe experientiam uberius constat, phlegmatico-sanguineos, habitus corporis laxiores & spongiosiores, animo meticulosos & anxios, quorum vires luxuriant, ingluvie alimentorum valde incongruorum, ebrietate, venere, fame, diuturna molestia, vigiliis, laboribus, hæmorrhagiis, fractæque exhalatæ, facilius & crebrius gravi hoc morbo prehendi, & difficulter quoque evadere; nullam aliam ob causam, quam quod ipsorum corpora impura atque debilia ad putredinem ac corruptionem admodum præcavia. Neque minus de formis cachecticis, mensium suppressione laborantibus, item de lue venerea, vel minimum hujus reliquis affectis novi, quod ex facili corripiantur, sed ægeritæ emergant.

## §. XII.

Quæ quum ita sint, in præclivi sunt est judicare, quare contagiosæ hæc febres in militum castris quam maxime circumstant & ob id calidiores appellari solent. In castris enim omnes, quæ enumeravimus, morbi hujus causæ fere conveniunt. Ibi quippe milites aëris humido calidi & pestifera humido frigidi experiuntur injuriæ, sub quo dormiunt in locis umidis, humidis sæpe atque palustribus, excrementa animantium & hominum passim non desunt, nec tamen vento ob circumductum vallum ad intra ad dissipandos foetores huiusmodi patet, cibis vescuntur incongruis, nonnunquam plane corruptis, semicocctis, aquas quoque stagnantes & putres bibunt, fame & vigiliis corpora robur amittunt. Hinc quando ex laborioso & difficili hoc vitæ genere in hyberna concedunt, corporaque quærit dant ac ciborum copia onerant, corruptio interna sensim contracta adeo demum increvit, ut apertus in capitem hunc morbum erumpat, isque ob id frequentior in hybernia, quam castris observetur. Eandem fere ob rationem malignis contagiosis ejusmodi morbis, pauperes, in tenebris & coeno versantes, aër frons in angustis tuguriis vapido nimisque puro, frequentius afficiuntur, quam opulenti, quibus accuratius vivendi genus & sanitatis regulas quoad aërem & victum observandi est copia. Idem evenit in nosocomiis, orphanororheis & ergastulis publicis, ubi plures simul conuertuntur, & vitam colunt inopem, corpus ad concipiendum contagium dispositum.

P. R. E.

PRAESERVATIO ET CURATIO  
CUM OBSERVATIONIBUS  
CLINICIS.

## §. I.

Curatio quidem harum exitialium febrium, tam ratione indicationum, quam regiminis, remedium, medendi quoque rationis, nec non observationum praedicarum, convenit utique cum illis, quae capite antecedenti de febris petechialibus fuisse tradidimus, ut supervacaneum eadem hic etiam exponere foret. Sed longe magis a perito medico petendum consilium ad accendendum ejusmodi morbum, quippe quod multo minus, multoque certioris effectus ipsa curatione. Praecipuum vero praeservationis momentum in eo quam maxime consistit, ut insalubri ad bigignendi mali moris morbos apertis anni tempore, soboles evincant aer vaporibus & exhalationibus noxiis foras, & vivida elastica expansione destituta. Quum deinde sub ejusmodi aëris constitutione corpora jam tum admodum debilia & ad morbos contrahendos disposita sint, expedit omnino, temperare sibi ab omnibus, quae viribus adversa, languidioresque faciunt excretiones, animi scilicet vehementibus commotionibus, moreore, terrore, cura, impensioribus meditationibus, vigiliis protrahendis & nimia venere, item corporis refrigeratione, praetermodum noctu, cum leviori respectate frigiditula vestitu. Porro praescindendus curate crudiatum prima in regione proveniens, abstinendum ab ingluvie tanto magis insalubrum, à crapula, continua tabaci fumigatione & effusori potus coctile usu, qui sicut non ventriculo, ita longe minus nervosis partibus & mixtura succorum visalium amicus est. Ut deum aer purus & salubris hauriatur, fludendum, & fugienda ob id loca humiliora, in quibus aer facile fit vapidos, nec non adificia, quae ventorum perflant minus patiens, ac praeterea nimia humiditas accenso igne & suffumigis ex mastiche, succino, baccis juniperi, corrigenda.

## §. II.

Inter praefidia porro, quae ad declinandos hos morbos valent, eum quidem praestabilibus novi nullum, convenienti & moderato vini optimae noxae, & quidem Rhenani, usu. Hoc quippe mane, vel etiam inter cibos quotidie posum modice, vires mirifice reficit & sustinet, sanguinis progressum cum excretionibus promovere, ciborum digestionem juvat, ac omne putredinem ac corruptionis resistit, praestitum quando moderatio etiam corporis motus & alia diutius potius simul conjungatur. Ego sane longiori experientia edoctus, id pro certo affirmare possum, grassantibus populariter morbis ab aëris constitutione humida, eos, qui exquisitam victus rationem tenuerunt & quotidie modice bono vino usi, incommodi sensisse nihil. Ipsa etiam in pessilientia ex praestantissima praeservativa vinum esse testantur, qui ex insituro de eadem scripserunt. Quin in petechiis quoque, vinum postremis diebus facta crisi debito modo posum, vires dejectas erigendo & circulares excretionem secundando, omnia fere alia auxilia superare alicvero.

## §. III.

Ipsa autem in curatione ex omnibus remediis statim in principio optimam opem conferunt aciculae. *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

da, maximeque succus citri, prout ponantur ad extinguendum calorem & accendendum ignem in vino, item acetum vini, sive simplex, sive destillatum, mixtus ex aqua & pueritibus fucioribus diaphoreticis nupem. Praeter haec conducunt, quae vires servando salivalem etiam lacrimam colligunt, & pectus ab insula liberant. Id enim cum celeberrimo olim Etiarum Professore, *Cramerio*, quem Praeceptum colui insignem, observavi, non facile quempian huius morbi decedere, cui saliva & spumam ubi servat. Quam ob rem adeo hic in aere exercitissimus vir frequentissimus in usu habuit mixturas alexipharmicas, quas ingrediebatur, cum aceto destillato, vel aceto scordii, cumabaris, interdum bezoardicum pessimale & oxymel squilliticum. Contra ea pessima omnino praedicorum nos est, in principio statim volatilis, bezoardica & sudorifica cum regimine calido & insulo thaliformi fervente exulere. Sic etiam insectis ille putredinosis motus invalebit cum organo, majoreque vires sublequitur prostratus.

## §. IV.

In morbo declinante nulla magis salutaria excretio, quam quae fit convenienti tempore per alvum. Ego certe praxi quinquaginta & aliquot annorum uberius confirmatum habeo, rarius solo sudore & haemorrhagia, sed frequentius per diarrhoeam scitum, noxiis, aut undecimo die eruptentem, salutus fuisse hos morbos, & vicissim nihil perniciosius fuisse diarrhoea gravi statim inter initia, vel alvi fluxu citius cohibito. Neque minus conperit habeo, si catarrhales malignae & exanthematicae alvi fluxus solute fuerint, agros immunes fuisse a purpurae albae incursu, quae haud raro pulli jam aequi facto, declinante undecimo die morbo, non sine magno periculo supervenit. Perseperunt etiam jam pridem salubritatem alvi fluxus, attem cum attentione excrecentes. Ipse *Hippocrates lib. epid. memorat*, laborantes huiusmodi acutis febribus alvi excretionem fuisse sanatos. In quadam pulcherrima consuetudine diarrhoeam admodum salutarem fuisse *Galenus de art. lib. cap. IV. testatur*. Imprimis *Gerhardus Colomba de pestil. febr. multa est in laudando egregio effectu fluxus alvi*, pag. 231. sic habens: *omnes quibus alvus copiose ejecit, luctum cum jognis cruditatibus fuerat, tandem liberati. Praecedente enim alvi fluxu, in aëre calidius signa sua, erant hauri, morbus evadit elementis, & tandem alvi fluxu perseverante, fideliter & mittere gravi judicabatur. Ut miramur, quae passim hanc in rem memoriae prodita sunt a *V. liera. lib. observ. lib. VI. de febr. Schemio observat. lib. VI. de febr. Riverio observat. Cent. I. obs. XLVII. & LVII. item Cent. II. obs. XXXIV. & LXXXVII. Haversio obs. X. Johanne Rhodio Cent. II. obs. LXXXV. Sersa de febre costrensi maligna cap. IV. pag. 331. pag. 175. Boneto in thes. pract. de febr. puer. pag. 71. item de casu cap. II.**

## §. V.

Haec igitur naturae via; cui insistentum ab arctifice, eademque, si deficit, juvanda. Mihi omnino primum & multiplici observatione confirmatum, quicquid in pueris, malignis & pessilentialibus febribus curandis expectandum ab arte, id maxime in eo contineri, ut medicus convenienti tempore ea usupet remedia, quae ad alvum solvendum sine damno faciant. Sed hoc circa hos maxime

dies faciendum, qui audiunt eritici, à septimo ad decimum quartum usque, non primis, quibus ob materiam non tam coctam & excrementi aptam, peritum opis conferunt. Sicuti vero ad alvum vacuatum per transitum harum febrium decursum nil periculosius illis pharmacis, quæ acrimonia quadam caustica æquæ, nec exceptis fœne etiam foliis: ita nil certe hanc in rem magis proficuum iis, quæ nihil alieni & quod vires frangant in mixtione habent, sed blande & placide alvum subducunt. Eminent hæc inter benedicta illa manna, cum cremore tartari, hisce etiam febribus ob aciditatem non aduerso, nupta & sufficienti dosi data. Conducibilis quoque syrupus rosarum solutivus, mixtus cum salino stimulo, ex cremore tartari, sale polychresto, vel nitro ammoniato & convenienti dosi ac tempore cum sufficienti dilutione vehiculo, uni sero lactis nostra methodo dulci, vel aquis etiam temperatis mineralibus, ut Wildungerstibus & Antonianis, nblanus. Non minus spectata virtus tamarindorum pulpar, vel decocti ex his cum manna, aut thabarbaro. Quam egregium enim effectum præstent hoc in casu laxantia, testis eximius est *Morant de malign. febr. par.* plus quam viginti exemplis confirmans, se ad alvum laxandum summo cum fructu ulum fuisse tamarindorum pulpa, item infuso ex thabarbaro, foliis fœne, cremore tartari, manna & aqua acetosellæ concinato.

## §. VI.

*Hæc fissa  
proferantur  
sua magis.*

De venæ sectionis autem utilitate his in febribus discipant adhuc medecine. Ex certe tanta uniusque malignarum differentia, ut experientissimi etiam medici in iisdem experiundo demum discere cogantur. Id tamen verum; quum eadem plethoricos & plethorico-cachymicos infestant, commodum omnino in his & præterea sanguinis multissimi affluetis, diæta laeta & vinosa utentibus & vitæ sedentariæ indulgentibus, invenit locum ad præservationem. Experientia enim flos edoctus, post venæ sectionem, vel plane non corripit, vel lenius aggrare de facilius convalescere, sanguinis subractionem passus, quam non expertos.

## §. VII.

*Ex his  
et ceteris  
similibus.*

Id vero omnibus curatè tenendum: quod tam si, quam declinante hoc morbo, stomachus valde languescens non alimentorum, multo minus insalubrium, præsertim carniem mole sit onerandus. Est hoc familiarissimum, vulgo hominum plebeiorum inprimis, præiudicium, ut credant vitæ cibis esse reficiendis. Sed ipsum hoc est una ex præcipuis causis, quod acri in portu sese jam constitutos censescentes, sæpius naufragium faciant, recidivæ prioris, cum majori vitæ periculo, vel superveniente alio novo morbo.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Historia febris petechialis ANN. MDCLXXXIII.  
in Principis Mindensii grassantia.*

Quam anno MDCLXXXIII. copie Brandenburgicæ ab expeditione contra Turcas ex Hungaria redeuntis, in Principatum Mindensem hyematum reducerentur, amulerunt simul morbum castrensem, febrem nempe malignam petechialem, & successive multos pagos & vicos in

quibus sumserant hyberna, luc insecerunt eadem. Ego juvenis adhuc medicus provincialis à Serenissimo Electore Brandenburgensi Friderico Wilhelmo constitutus ibi, feci quod municiis postulavit ratio, decumtentes passim visitavi, in morbi huius maligni statum inquisivi & operam entuli omnem, ut pro mea tunc scientia perniciatam hunc morbum congruis præsidis oppugnetem & ne latus progrediretur, præcaverem. Excurri igitur & potissimum in præfectura Schlüsselfurg, plus quam centum hac febre laborantes nescendi, in quibus præter summam virium prostrationem & conficta alia malignarum symptomata, peculiare fuit, quod plurimi statim in principio atroci & diuturna cephalalgia, in syncope inprimis, cum virgine, oculorum rubore, oblivione ac postea delirio, afficerentur; consequentes simul de magno annuo & fastidio aurium. Quidam de raucedine, pectoris infatu, faucium ardore & falso catarrho conquebantur. Quibus mox corpus petechiis livida & flaviscentibus ossibus, transiebant omnes, cum iis quæ incongruo, vel nimis calido, vel nimis frigido regimine excepti & à halitatore alexij pharmacis expellentibus & thuracalibus usi fuissent. In quibuldam tanta erat corruptionis vehementia, ut acri sanguis & in patimento frigido ambulantes aliquamdiu, functum in planis pedum nanciscerentur si hæc, uni in duobus vidi. Quia tamen paucas, & subras habuerunt maculas, nec non ex phlegma, qui nec medico, nec medicamentis usi, ac minus meticolosi, solo regimine temperato, & potu serici lactis, vel decimo quarto die, remittente symptomatum vehementia, vel per largos & frigidos valde debilitatus sudores, vel per diarrhoeam sunt iudicati. In bonis fuit status tardaster circa declinationem accedens & aliquandiu persistens. Qui evaserunt vix intra aliquot menses ad perfectam sanitatem redierunt. In plurimis relinquitur tumor pedum, vel etiam abdominis, cum lenta febre & appetitus dejectione. Quidam diu stupidi & obliviosi manserunt. Nec desuerunt, qui, præsertim si caput frigidiori aere nimis cito exposuerunt, post morbum gravitate capitis & difficultate audientis affecti sunt, quin nonnulli facti sunt & manserunt per totam vitam surdi. In pago, Raden dicto, eodem morbo infecto, commorabatur delillatur quidam chymicus, qui gloriabatur, summo se cum fructu usi spiritu neri, infusilis in mensuram aque puræ, vel cerevisiæ Mindensis levis, quinquaginta ad manifestam usque aciditatem guttis, dato postea liberaliter tepido potu hoc medicato. Nec contemnenda virius deprehendi hoc experimentum, quo in aliquibus fluxus alvi cruentus quandoque suscitatus, non sine levamine cephalalgie aliorumque symptomatum, tantum quod qui eodem servati, paullo diutius imbecillitate ventriculi & intestinorum laborarunt, cachectici quasi facti, demum tamen etiam congruis remediis ad sanitatem traducti. Ego vero ad præstendum ulteriorem contagi progressum, iis, qui nobilioris fortune & conditionis erant, præter moderationem & temperantiam, in victu, regimine & animi affectibus, & vitanda refrigeratione, fussi moderationem viri boni usum. Qui sanguine crasso & gravi abundantes, uni Westphali ob victum durum & crassum fere omnes, his sanguinem subtrahere iussi, & mane alternis diebus assumere dosin tincturæ bezoardicæ, vel pulveris bezoardici, expectando postea sub temperato calido regimine cunicula-

rem



rem excretionem auctiorem, quæ etiam tam in locis infectis, quam alibi verisimilibus, egregie proficiunt. Cæterum sanos ab ægrois, quantum fieri potuit, separari iussi: pro medicina pulverem ex cornu cervi usito & lapidibus cancrorum leniter tritofum, cum paucillo camphoræ cum roob sambuci, aqua & aceto vini singulis fere assumentem ordinavi: qui in primo morbi insulso sæpius usurpatus alios statim à morbo liberavit.

#### Epiéristi.

Nulla fere regio tam ferax morborum acutorum præferunt febriem catarrhalem mali moris atque petechialem, quam Austria & Pannonia. Unde etiam peculiare & grave hujus morbi genus Hungarica *ver* *febris*, audit. Evenit autem hoc plures ob rationes. Aëther interdiu his in regionibus est intensior; etiam autumnus, & vina ob id generosa admodum & dulcissima facit, noctu vero succedit algidior aura, & ob excessivam hanc subitam coeli mutationem excreto saluberrima, potissimumque quæ per cutis poros succedit, mirifice turbatur ac intercipitur. Dein victus ibi solennis admodum plenus, ex esu carniæ & vini generosi potu, aquæ autem non adeo salubres, quibus sanguinis facile corruptibilis copia ingeneratur. Hinc non mirum est, quod frequentes ibi corrupti & puridi maligni morbi, imprimis in milibus & qui victus illius insidit, simul ordinatè vivunt, semicoccti & male præparatis cibis venterculum oecant, noctu excubias agunt sub frigida aura & in locis humidioribus & frigidioribus degunt ac dormiunt. Neque etiam mirum, dispositionem ad hos morbos cum milibus huc venientibus alio transportari, sub quiete & ingluvie in hybernis, corruptos succos augeri, cruditates prima in regione accumulari, ac tandem in apertum pernicialem morbum hujus præferunt, erumpere.

Id autem peculiare habet hic morbus, imprimis in iis qui sanguine abundant, ut caput potat; hinc statim in principio venæ sectio laudenda: si vero ex stomacho viscosiorum humorum ex ingluvie & toto corpore huc confluentium colluvie obfuso, eveniat, optimum unque consilium statim in principio, clementi, efficaci tamen emetico, stomachum, vel intestinorum simul canalem expurgare. Quem in finem ego quidem commendare soleo decoctum mannanum, cum dimidia vel una drachma radicis hyssopacanthæ, aut infusum manne ex vino cum duobus tartari emetici granis. Sic datis post hanc evacuationem bezoardicis & leniter diaphoreticis, cura succedit longe felicitas.

Ex singularibus etiam in hac lue fuerunt sudores copiosi, frigidi, per aliquot dies & noctes manantes, vaporem acorem spirantes, non tamen funestis. Hippocrates enim *Secl. IV. aph. 37.* malos eos pronunciat & moris prodromos. Nos quoque largiuntur, quod sudor frigidus qui interne viceris cuiusdam inflammationis, vel sphacelationis comes & tantum particularis est, interius calentibus & externis frigidioribus, plerumque sit funestus. Sed longe aliam ejus frigidi sudoris esse rationem, qui à defectu caloris & virium prostratione oritur, docet experientia. Luculenti hanc in rem est testimonium *Raverti in si. bot. observ. Syndleri obs. XLV.* sic habent: *viciſſim sapient & ego in morbi declinatione post XIV. dies vi-*  
*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

*ribus bene constitutis & rite se habentibus, reliquisque bonis signis apparentibus, in calido corpore frigidus observari sudores, post febres acutas & malignas bene judicatos, cum allevatione magna eripisse & ultra XXIV. horas durasse. Quamquam autem hujus generis sudores non ad mortem tendant, magnam tamen dispositionem caloris & virium indicant. Hinc si unquam, certe tunc succurrendum analeptis, dieteticis æque ac pharmaceuticis, corpus crebrius linetis calidis detergendum & fricandum, quo per externa internus calor excitetur, nec arger in limine recuperandæ sanitatis constitutus deficiat.*

Viciſſim in pessima signis fuerunt sudores ab initio & per totum morbum effusius manantes, cum urina perpetuo tenui & *visida*. Hæc enim symptomata sunt excretionis manifestumque præsent indicium colliquationis & dissolutionis elementorum sanguinis mixtionem coagulatiorem. Ex succedente tam copiose sero, crassior evadit cruor & ad cerebrum delatus, in valis meningum capillaribus facile stagnat & inflammationem inducit.

Quod præterea spiritus nieri cerebri & liberius in aquo vehiculo datus, quibuscumque eximie profuerit, partim acido tribuendum, quod putredini resistit optime, partim stimulo, quem intulit intestinis, quibus villosa sanguinis & humorum impetus a capite ad inferiora vocatus & alvi fluxus cum eughoris peritissimus. Sed longe tutior chylus animonius sulphureus, cum diluente tenui potu sufficienti copia exhibitus, quem ego, ceu præstantissimum auxilium, deprehendi & commendo.

Cæterum invadentibus exanthematicis hujus morbi, id potissimum perito agendum est medico, ut propagationem & progressum contagii tempore arrevertat. Etenim longe facilius est, corpora ab insulso harum febrium defendere, quam infecta & oppellata perferre. Ac nisi peculiare beneficium naturæ in curatione concurrat, omnia frustra molitur medicus, quantumvis doctus atque peritus.

#### OBSERVATIO II.

Juvenis robustus, sed ob vitam sedentariam sanguine non adeo puro plenus, animam laxandi causa Januario exeunte ruri exsiliatus, societatem cerevisiam gravem & spirituosam potantium offendit. Alitidetur cum iis, & vesperi domum iterum recedens, corpus admodum perfrigerat. Die post de molestio dentium conquisitur dolore, cum corporis lassitudine viriumque languore plane insolito. Altero die accedit tussis, cum febre, coryza, & æstu non tamen adeo gravi. Aucta vero præterea debilitas, appetitus perit cum somno, intercursumque subinde horripilationes & extremorum refrigerationes, capæ crepidum fuit, licet arger non lectum peteret, sed officio suo fungeretur. Accedente quarto die morbus agrum affixit lecto; hinc consultus medicus, qui serum ex lacte cocto succo citri coagulato bibere iussit. Factum id, subsequens alvi fluxus vigetis & ultra, agrum iura diem & noctem ad se illam urgens. Inde vires magis collapsæ, partium tremor cum delirio, alvo quamvis fluxus accessit, sub quo quinto die comparuerunt macule petechiales, atrociæ morbi tamen non levantes, sed sexta fluctora & urinam fere sentia reddidit, respiratio facta anhelosa & nocte septimum diem antecedente mors excepit.

*Epiſiſ.*

Hanc etiam febrem fuiſſe ex malignis illis catarrhalibus & petechialibus, quæ per aliquot menses noſtra hæc in urbe circumvenerunt, teſtatur denſum dolor rheumaticus, coryza, & raiſcedo cum tuſſi. Malignitatem autem junctam ingens ſtatem virum lapſus, appetitus plane proſtratus & ſomni defectus, cum pulſu celeri, debili æque frequenti, nec non capitis dolor ætorpor faciente teſtatur, licet ægroti, adſtantes ipſique minus periti medici, hæc haud raro minus ex æquo attendere ſoleant. Serum igitur lactis in principio ad alvum laxandum & ſiſtendam ſanguinis ebullitionem, non quidem ſine fructu commendandum. Sed ubi catarrhales affectus jam per aliquot dies adſuerunt, minus proficua ſunt ea remedia, quæ alvum turbant & ſerum iniparum ad interiora ac inferiora vocant. Licet etiam alvi laxatio, in catarrhalibus malignis critica diebus ſponte proveniens, admodum ſit ſalutaria; primis tamen diebus alvum ſtimulantiâ nocent. Intus enim retinent matrem malignam, ac ut inflammatio ventericuli & meningum tandem ſphaculoſa inducatur, faciunt. Tum potius ſemper perſpiratio ſervanda libera & ſerum corruptum diſſipandum per blanda diaphoretica & regimen moderatum. Neque minus in phlebotomia ejuſmodi corpore ante invasionem admodum proficua fuiſſet venæ ſectio, ſubſequentia poſtea moderatio & longiori diaphoreſi.

## OBSERVATIO III.

*Puerilis in ſine de  
fratre di-  
verſa.*

Virgo triginta aliquot annorum, menſium anomalis ab aliquot annis obnoxia, anno abhinc affecta fuerat eryſipelate capitis, quod in ſiſtulas mali moris, glandulas collis, gonas faucesque perforantes, deſiit. Sanata tamen adhibita nemini diligentia à medico & chirurgo; ſed ab eo tempore, languidior manſit & macilenta. Januario hujuſ anni incunæ ſubito ipſam infeſtavir ingens capitis dolor, cum torpore, ſomnolentia, virum languore, valida quoque tuſſi ſicca. Increvit hæc debilitas indeſ, nihil plane appetit, nec dormivit, ſimul conqueſta eſt de præcordiorum & ſpirandi anguſtia, pulſu frequenti, ſed debili micante. Sexto die paſſim in pectore compa-ruerunt punctula, ſeptimo accendiſſim delirium, ſequente convulſiones epileptice ac mors, poſt quam macule magis venerunt in conſpectum. Frazer demoræ imperato hoc diſceſſu mirum contriſtans, paulo poſt pariter conqueri cepit de dolore capitis & artuum, ſine catarrhoſis deſluxionibus, vires conciderunt, appetitus periit, ſomnusque deſiit, quarto die petechiæ viſæ ac pathemata mitigata, ſeptimo cum caloris incremento ſub inquietudine & anxietate accendiſſim purpura & petechiales macule diſparuerunt. Succellive tamen convulſit, terreorum bezoardicorum & abſorbentium cum ſacco cieri & aquis diaphoreticis & analepticis uſu ac potu perſiſtente.

*Epiſiſ.*

In virgine hæc orta febris ſine contagii ſuſpicionem. Sed docet omnino experienciâ, corpora valendaria imbecilliora & ubi impuritas ex menſibus retentis, gonorrhœa, vel lue venerea in ſanguine & ſuccis lymphaticis reſtat, facile corripit graſſantibus ex communi aëre inſalubribus vi-

tio morbis, & promæ quoque ſuſcipere contagium, quod nihil incertius à medicis, chirurgis & aſſiſtentibus contagioſis morbis decernendis, aſſertur. Quod autem ab initio ſtatem exquisitum & continuum capitis adſiſſit dolor, cui deinde delirium cum convulſionibus epilepticis junctum, id procul dubio ob debilitatem capitis ex perſeſſo eryſipelate exulcerato factum. Dein frequentiori etiam experienciâ eſt contagioſis morbis deſunctorum conſanguineos, ſola ſæpe animi perturbatio ac morſina diuturna, in eundem incidere mortuum. In his vero à ſanguinis miſſione, niſi corpus ſit eminentius phlebotomico, merito abſtinentium, item à valide commoventibus & evacuantibus, ac vires potius erigende, perſpiratio ſecundanda & ſuccorum vitalium integritas conſervanda. Petechias comparente purpura rubra diſparuiſſe, in exanthematice hujuſ anni febris viſæ viſum, & quidem ſine damno, ſed ubi declinante petechiali morbo ſupervenit purpura alba, id ut plurimum fuit leſale.

## OBSERVATIO IV.

Acres cum commiſſione rixas habuerat adoleſcens viginti annorum, ſimulque terrore fuerat percuſſus. Noctæ inſequenti ſomno caruit, ac debilitatem, laſſitudinem appetitusque proſtrationem per dies aliquot perſenſit. Quinto poſt die horrore, præcordiorum anxietate & aſſu præternaturali affectus eſt, cum pulſu celeri ac debili. Medicus in conſilium vocatus, ſtatem exhibuit vomitorium, ſanguinem ſubtraxit & ſubjunctis tincturam bezoardicam, nec non pulverem bezoardicum cum & ſine nitro. Sexto die compa-ruerunt macule rubræ & nares aliquoties ſanguinem ſtillarunt, ſomnus fuit paucus, vel nullus, urina ſanorum ſimilis, vires tamen non penitus viſæ proſtratae, ſed æger ſurrexit ſubinde & obambulavit, deſiit quoque delirium. Bene igitur omnia ceſſura ſpes fuit & morbus leſiſſime bezoardicis temperatis tractatus. At quum ſeptimo è lecto ſurgeret æger, & per horæ quadrantem erectus ſederet in conclavi licet moderate calido & ſufficienter tectus, ſubito in lipothymiam incidit cum horrore cuis, pleraque petechiæ evanuerunt & quæ manſerunt, nigrae compa-ruerunt, accendiſſim ingens præcordiorum anxietas cum furore, ita ut gladium in adſtantes ſtringere & è ſeneſtra ſe præcipitem dare vellet. Uſurpans quidem pulvis bezoardicus cum nitro & camphora, conquievit etiam tunc deſirium, ſed debilitas increvit & horripilatio perſiſtit, acceſſerunt convulſiones & ſub finem diei ſepſimi mors inopina.

*Epiſiſ.*

Nunquam periculo carente petechiæ, licet omnia videantur pacata & medicus conferat cuncta. Quodvis enim accidens in pejus omnia mutare valet. Hæc ſic erectus tam penicillalem mutationem, delirium & morrem adduxit. Qui quomodo in morbis acutis ex exanthematice ſit noxia, ſupra jam pluribus monuimus, ac ut evitentur iterum monemus iterumque.

## OBSERVATIO V.

Generoſa femina quadragenaria, corporis Periculi obſeſi, laxi & ſpongioſi, genio indulgens variis febriſis vici-  
bus ſeque-

## OBSERVATIO VI.

que edulis dulcibus, acidis, lacte, vino quotidie delectata, tempore quo malignae exanthematicae febres circumstant, isdem fere, quam quibus hac incedebant, affecta fuit pathematibus. Adfuit quippe corporis lassitudo cum inquietudine, cuius horripilatione, capitis dorsique dolore, accedente postea de praecordiorum anxietate variumque prostratione. Datum illico lenem emeticum, quod miram visioform horum coluvium evexit, & anxietatum & cephalalgiae levamen attulit. Tercio die vena in manu petula & sanguis largiter educus, qui frigidus factus glutinosus in superficie contraxit. Sed post vena sectionem petus habuit: sopor praesto fuit continuus, facies tumida & fauces squalidae factae, urina vero tenuis naturali similis secessit. Quinto die spiritus factus difficilis de post noctem admodum inquietam prodierunt maculae rubrae in collo, dorso ac manibus, quae quidem anxietates levarent, soporem autem non sustulerunt. Invenit ob alvum clausam chylitica injecta, qui ingentem foetidorum stercoreum copiam evocarunt: septimo etiam de largo corpus sudore persutum. Nihil tamen minus sine sensu ac motu jacuit aegra, appetens vinum, quod ipsi suspensa manu concessum. Quam vero inde melius haberet ac virium animi corporisque sentires incrementum, post trihorium quatuor iterum vini Rhenani unciae portae datur, isdemque portis, mirifice se vitibus refici asseveravit. Sequens postea sudor largior, infuso theae adjuvat, sopor mentisque stupor discessit, corpus quoque cum animo vires recepit, & aegra ad sanitatem demum traducta, alterius semper, vel ternis diebus, alvo laxantibus subducta.

## Epiresis.

Quo major pravorum succorum prima in regione colluvies, eo graviora etiam in febribus popularibus mali moris adfuit symptomata. Urinae quoque plerumque minguntur tenuis, praecordia anguntur & caput exquisite dolet. Ad hanc igitur circumstantiam arctici cum cura attendendum semper. Tum etiam optimum consilium, illico leni emeticoordes expurgare. Merito etiam sanguinis missioni praemittitur purgatio. Venae sectio haec quidem minus feliciter cessisse videtur, sanguine ad caput allecto & soporem faciente. Quare etiam praeticoeum plurimum venam in superioribus praevadere discedens, ac ut potius in pede id fiat, praecipiant, eo quod inde non facile congestio sanguinis ad caput proritetur. Crusta autem illa glutinosa sanguini emisso innata non mali sunt omnia. Nam *Baglivus* jam lib. I. opp. pag. 149. dicitur verbum scribit ac testatur: *observamus in xenodochio omnes fere ab acutis evasisse, quorum sanguini venae sectione extracta crusta alba atque chylifera supercreverat: contra mortuus, quorum sanguis valde rubrissimus*. Et certe sanguis consentientia crassior non tam facile dissolutorio motui inestitio obsecundat, quam tenuis parvis salino-sulphureis scaturis. Demum notandum & hoc, quod vinum temperatis, in malignis de petechialibus etiam febribus, non noceat, facta petechiarum eruptione de portis adaptent, sed quod potius vires refocillando, secretorios & excretorios actus partium efferturum egregie juvet. Cavendum vero ab eo, si inflammationis adfuerit indicia in ventriculo & primis viis, si phrenitis, si cutis arida & siccata.

Biennio abhinc febris maligna contagiosa, non quidem epidemice, sed tantum sporadice circumbar, potissimumque complures ex domesticis orphanotrophi Halensis infestabat. Eundem hunc morbum nancisciebatur filius Inspektoris huius orphanotrophi, theologi, tam eruditione, quam pietate & moderatione celestis, ipsi paradigma Regii alumnus. Pater impendit hunc suum natum deamans, contristari non modo corporis & de salute, tam capitali morbo correpti angere, sed crebrius decumbentem visitavit, quam lecti & hypocausti socium fecit, ac cum universa familia eodem in conclavi cibos cepit. Hinc autem factum est, ut omnes successive de contagio inficerentur. Pater quidem statim tertio post die summam virium languorem, capitis artuumque dolorem, somnum inquietum, anxietatem & ardorem circa praecordia, cum plenaria ciborum inappetentia experiret. Accessit consilium tumor, ardor & aestus faucium, quinto die delirium, postea sudores colliquativi, nono placida mors. Decumbente hoc adhuc, uxorem idem morbus prostravit isdemque affectus pathematibus, eodem, altero post obitum mariti die, funesto eventu. Excepit virgo his consanguinitate juncta, quae quinto die pariter exspiravit. Ita ut intra quatuordecim dies tres personae obirent. Medici, qui curationi praestant, catarrhalem morbum esse censuerant, & ob id venae sectionem omiserant. Sed quam morbus ad reliquos etiam domesticos procederet, & rumor passim increbesceret, eundem tantum non esse pensitarent, alius medicus in consilium vocatus, qui ob capitis dolores, venae sectionem insistentem esse in principio iussit. Hinc omnibus, quotquot postea corripuit, simul ac conqueri coeperunt, vena in pede petula & converiens sanguinis quantitas educta, tam felici effectu, ut non tantum morbus minor incederet, maculae petechiales cum purpura, secus quam in primis comparerent, verum etiam ex septem nec unus occumberet, ac ipsi contagiosus morbus sic delinere.

## Epiresis.

Perquam utique notatu dignum, servatos esse qui sanguinis missionem admiserunt, qui omiserunt, sub gravi & diuturno delirio periisse, ad quem tamen eventum summa animi tristitia multum forte connabit. De venae sectione quidem, an in ejusmodi acutis, malignis contagiosis & exanthematicis febribus prole vel noceat, medici adhuc in utramque partem disceptant. Ego vero censeo, absolute nil posse de huius, sed considerandas esse a medico circumstantias, quod circumstantias omnes, quod indeolent, causam, symptomata & tempus morbi, quod subiectum, corpus egrotans solidiorumque de fluidorum in eo dispositionem. Ego quidem multiplici eductus sum observatione, verum esse generalem hunc praeticum canonem: si corpus est admodum plethoricum, amplius vasis instructum, sanguinis missioni assuetum, si morbus sanum antea corpus corripuit, nec a communi ad putredinem inclinante aëre visio abortus, si vehementer statim caput preit ac delirium metuendum; tum utique aene invasionem tam ad praeservationem, quam etiam mox in principio, nunquam nocere potest moderata sanguinis missio in pede; quin sub his circumstantiis in morbo Hungarico ipsique persistencia

*Febris maligna contagiosa venae sectione curata.*

lentia venæ sectio est utilissima. Subtrahit enim nimis sanguinis & humorum copia, cordis & systematis valorum systole longe liberius redditur atque vegetior, una cum motu humorum ad exteriora, quo per universale illud emunctorium cutis nocens materia expellitur atque diffunditur. Neque minus à sanguinis in partibus inferioribus missione insignis ipsius à capite fit derivatio. Nam res certe est experientia, sub aceto capitis dolore, illico cordis & arteriarum pulsus immutari, irregularem fieri & inaequalem, & penitentes inde functiones vitium capere; & vicissim si caput cum cerebro & nervis à sanguinis stagnatione liberatur, pulsus mox in melius mutari una cum motu humorum progressivo vitali. Quod si vero adductæ hæc circumsistantie desunt, corpusque minus sanguine redundat, noxia omnino & perniciosa sanguinis missio impellenda. Quinque pauci ex medicis prudentia polleant discretiva, non mirandum, generoso hoc remedio plus sæpe damni, quam emolumenti affertur.

## OBSERVATIO VII.

*Hybris maxime  
signis ex-  
anthematicis  
et jugulari  
ascessu.*

Quam anno MDCLXXXIX. hyemali tempore grassaretur febris maligna, quandoque exanthematicis stipata, multoque, præsertim perverfa medicatione exceptos, trucidaret, tota domus Consultarii cuiusdam aulici eadem infecta est, & ipse cum uxore graviter decubuit, nostra tamen opera, benedicente DEO, regimine maxime temperato & lenioribus diaphoreticis, convalescit. Postea fratrem ipsius finibus invasit morbus, iisdem cum symptomatibus, virium prostratione inprimis, capitis & artuum dolore, cum inquietudine. Ego itarum in principio vocatus, lenè exhibui emeticum ex aquæ florum sambuci, cardui benedicti ana uncia, tartari emetici granis duobus, mixturæ simplicia gutt. XX; quo assumpto res vomit viciis cum bile humores & post vomitum valide sudavit. Promotus hic sudor circa noctem pulvere ex cornu cervi usi, antimonii diaphoretici, lapidum cancerorum, ana drachma una, cinnabari, niri puri ana drachma dimidia, camphoræ granis duobus, qui in sex doses divisus de ter quodidie assumunt. Ponit præterea data pilula ex cornu cervi, scorzonera, cum succo citri. Quibus morbus prima in herba feliciter jugularis & æger post aliquot dies sanus prodit ac vegetus. Quamque brevi post sanum bini eodem modo conqueri inciperent, eadem methodo facili & explicita curatione ipsos ex ancipiti levavi.

## Epitaphi.

Attentionem utique hæc meretur observatio, cujus generis plures notavi, malignum scilicet periculosum morbum, præsertim si à contagio accidit, corporibus aliis bene valentibus, nec adeo impuris, vel imbecillis, mox in principio congruis remediis oppressi postea ac jugulari. Scilicet quum miasma contagiosum primo omnium sese cum salivali lacte misceat, sub hoc fermentescibili succo acrem malignam virtutem propagat atque multiplicet, hincque in naribus, faucibus ac oesophago catarrholi quid simulat, & salivale fermentum destruendo, appetitum obviat, quin etiam acredine sua nauseam & cardialgiam faciat; sane nihil magis indicatur atque è re est, quam ut illud proxima via per

efficax conveniens pharmacum ocyus, antequam laus procedat ex primis viis, vomitu & salivatione evertatur, postea vero ministerio accommodati diaphoretici reliquæ miasmatis virulenti per poros cutis evaporent. Sed cavendum omnino ab alexipharmacis, inter quæ minime connumeranda camphora, præsertim cum nigro remota. Nam hæc nevinquam, ut vulgaris fert opinio, sanguinem commoveret, sed vel unica olei cinnamomi, aut caryophyllorum guttula, plus exafluat, quam camphoræ drachma dimidia. Non tamen prætermittendus ponus diluens sufficiens temperans ex pilula, ad componendum sanguinis organum. Ego novi prædictum quendam non infelicem in more habuisse, in principio catarrhalium & malignarum petechiarum, simul ac languor & ardor corpus infestavit, serum ex lacte cocto cum succo citri factum, largitus, sed per vices potui dare, tam felici effectu, ut post aliquot dies ardor, dolor, languor & grævedo disparuerit.

## OBSERVATIO VIII.

Plures adhuc suppetunt observationes, sed ne nimis firmis in hisloriis, brevitas causa quædam duntaxat salutaria ex observationibus depremta monita asseremus. Scilicet frequentiori experientia compertum habeo, ut in quacunque exanthematica & contagiosa febre, sic etiam in petechizante & petechiali, non ita multo post contagio tactos fuisse, præsertim ex domesticis, qui ad arcendum morbum laxans vel purgans assumere. Licet autem subdectio in benignioris indolis exanthematicis minus noceat, si tamen peyoris naturæ, uti petechiales, præstat utique ab omnibus alvum stimulantibus abstinere. Etenim ad cicurandam veneni contagio concepi indolem ipsamque iterum exturbandum, tum præservationem in mentibus, tum ad curationem in affectis, nihil aptius & efficacius, quam perspirationem liberam servare & integram, quæ, præsertim in imbecillioribus, per alvum vacuum immittitur, venenum hoc magis deinceps innotat. Hinc Celsus jam inter præcepta ad pestilentiam incursum arcendum etiam habet hoc: quod alvus non sit movenda, aut si jam per se mota est, comprimenda.

II. Crebriori edoctus sum experientia, declinante ac finito morbo, periculosiores, immo lethales excitari recidivas, quando ægri corpus plus iusto auræ frigidiore exponunt, in pavimento nudis pedibus incedunt & veneniculum adhuc languentem nimia ciborum, tanto magis carniæ, insalubrium aut semicostorum copia, simul ac sæmel onerant. Quare minus etiam sanitati suorum consulant à medentium, qui nimis cito appetentiam usû elixiorum stomachicorum, quæ spiritus mineralia acidus ingrediuntur, excitare contendunt. Ex novi utique tum à copiosiori cibo, si non recidivæ, tamen statum quendam cachecticum, cum tumore pedum & abdominis accessisse & tardissime penitus contraxisse ægros.

III. Neque minus experientia constat, diu omnino latere posse susceptum in corpore contagium, interdum per aliquot septimanas, antequam in actum ducatur & perniciem vim exerceat. Atque hinc fit, ut qui eadem cum ægris domo contenti, sæpe successive unus post alterum aliquot hebdomadam spatio morbo afficiantur, licet jam antea aliquandiu de lassitudine

*Purgatio  
ad præservandum  
morbum / in  
fines.*

*Ex regimine  
et aliis  
preceptis  
recidivæ.*

*Emeticonum  
diu dantes  
cui postea.*

spontanea & functionum vitalium & animalium languore fuerit conquesta. Ha igitur cito succurrendum congruis dieteticis & pharmaceuticis, praeter ista, quae circulant sanguinis & perfpirationem placide puvant, quae potredini resistunt & crasin sanguinis custodiunt, de quibus supra mentio facta, quo oculus venenum iterum in corpore proscinditur.

*et non  
sine  
effici*  
IV. Saepe quoque observavi, quod tempore insalubri, quo ob aërem gravem febres mali & benigni moris catarrhales & petechiales populares habuerunt circuitus, ex benigna facta sit praeter spem maligna, à contagio, quod medici à vere malignis & petechialibus decumbentibus, cum vestimento aut capillito amulerunt. Ut adeo non sine ratione a Principum aula & persona arceantur medici, qui curationem malignorum & contagiosorum morborum tractant, & saepe inter agrosos versantur.

## CAPUT XII.

## De Febre Pestilentiali.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*Definitio.* Febris pestilentialis est acutissima, à miasmate venenato ex locis orientalibus advecto orta, ac nisi vigore motuum vitalium venenum per bubones & carbunculos cito propellatur, letalis.

## §. II.

*differe-  
tia*  
Differt in eo hanc pestilentialis ab aliis contagiosis, malignis & exanthematicis febribus, quod omnium sit acutissima, ac interitum primo statim, vel secundo die jugulet. Dein nostris in regionibus nec epidemias, nec sporadicas ex prava victus vel vivendi ratione, aut insalubri aëris condicione prognata, sed sub aëre saluberrimo, à solo contagio ex calidissimis jam infectis orientalibus plagis advecto, ortum ducit. Tum hoc habet peculiare, quod non ut aliae malignae febres & putridae, per largos sudores, alvi fluxus, aut alias excretiones, sed tantum quod veneno ad partes externas glandulosas cricet & salutariter protruso, per tumores in abscessus desinentes, solvantur. Porro sicus ac in aliis contagiis & petechialibus quoque febribus, tanta constantia & tenuitas miasmatis pestilentialis est, ut prompte adhaereat rebus porosis, & ad multa miliaria, integra manente perniciosa sua vi, transferri possit. Denum singulare in hoc miasmate infectivo, quod prava & multiplicata ipsius indoles mentio frigore non modo cicuratur, sed & plane extinguitur, quo fit, ut tempestate frigida & in regionibus praefrigidis, rarius, vel plane non, sub calido autem caelo & vehementissime & frequentissime grassetur.

## §. III.

*ambiguum.* Quomodo vero in omnibus contagiis & malignis febribus miasma venenatum cum aëre haustum salubri fermentescibili laici sese insinuat, ac in his quasi petrantis partibus perniciosam suam vim exercit primum: ita idem etiam quam maxime evenit in pestilentiali contagio. Hoc enim mox caput, cerebrum, nervos & pu-

erissimum illud lymphaticum nervorum fluidum peena, capitis torporem, gravitatem, formidolositatem & acerbum dolorem, sensum stuporem, rerum omnium oblivionem, inquietudinem, vigiliis ac virium prostrationem inducit. Per faucis ad ventriculum vclunt, ciborum fastidium, nauseas, praecordiorum anxietatem, cardinaliam syncopiam, vomendi consuetum, nec non vomitum facit. Deum ad membranas medullae spinalis naticaeque arteriarum nervos delatum, horrorem, pulsus languidum, parvum, coarctatum, frequentem, quin lipothymiam, producit. Quae quidem omnia statim inter initia sunt ordinaria pestis indicia atque symptomata, tanto vehementiora & celeriora operationis, quo plus venenum pestilentialis aliorum contagiosorum & maligniorum morborum miasma virulentia superat.

## §. IV.

Quae dein sub ipso morbo praesto sunt pathetica gravia & multa, multo plenius & accuratius enarrae, ac in prima de hoc morbo descriptione, quam vultissimam Historicus Theophrastus lib. II. de bello Persico. de peste Aethiopia dedit. Reinebimus igitur hanc morbi histoniam, quam posteaquam dixit ex Aethiopia in Aegyptum, & inde Athenas pervenisse, sic insitit: *egre vero quod factum est narabo; & quibus animadversis, si quando rursus incidat, pestis aliquis praefixum quippiam non ignorare, hoc monstrabo, qui tunc ipse morbo laboravi, tum alios laborantes vidi.* Itaque ait ille, in me ea sepe est, inter omnes maxime aliorum morborum immunis fuit, quod si quis alio prius morbo laborasset, in hoc omnes decumbebant. Alios vero ex ex nulla occasione, sed continuo, quod sani essent, primum capitis calorem intodebat vehementer & oculorum rubores, & inflammationes, atque internas partes, & fauces, & lingua sanguinolenta saepe erat, spiritus difficilis & saevus exibat. Deinde ex his symptomatibus & rancore succedebat, ac non multo post labor in pectus descendebat cum usque vehementer. Quod si quando ad eor inhaesi, tum id suberzitur, tum purgationes bilis, quaeque & medicis recenserent, subierant, atque ha mox cum defatigatione. Plerisque singulis in eisdem inanis, cum ulsorem asferens & chemisem, quod nonnulli sub hac resabat, alii vero multo post. Porro corpus ex infectis tangenti non admodum erat calidum, neque pallidum, sed subrubrum, lividum parvis pustulis & ulceribus foveis. Interne vero partes usque adeo flagrabant, ut ne tenuissimum quidem stragulum, aut lineam inpositum, neque aliud quippiam, praeter nuditatem, ferrent. At juvenissimum plane eras in aquam frigidam seipsum conjeceret; quid nulli fecerunt ex iis, in quibus cura non adhibita, qui in puteos se dederunt inextingui sibi cessant, & perinde erat plus ac minus biliter. Aque impotentia quadam, qua iis quiescere non licebat, & vigilis perpetuo commutabantur. Corpus, quando morbus vigeat, non contabescit, sed praeter spem labori consistit. Quam ob rem vel interitum plurimum novem & septem diebus ex interno asu, cum aliquod roboret adhuc haberet, vel si effugisset, morbo in eorum irrumpente, & exulceratione in eadem sassa, & diarrhoea simul immodice subente; plerique mox pra imbecillitate perierunt. Erant initio sorsum facile malum, quod in capite primum confederat,

derat, uniuersum corpus pervadebat. Quod si quis maxima hęc superasset, huic extrematum partium noxa supervenebat. Malum enim ad pudenda & ad summam manus & pedes decubebat, & complures his amissis evaserunt, non nulli & amissis oculis. Nonnulli etiam, quom primum exurgerent, copis oblitio rerum agne omniunt, ac tum se ipsos, tum amicos ignorantes. Morbus, igitur, concludit paucis interjectionibus, (ut alia multa pratermittamus insulsa, quæ cuique seorsum eveniunt, aliis alia) talem in uniuersum habuit ideam. Alius praterea nullus infestavit eo tempore ex iis, qui consueti habentur, si quis autem accidisset, in hunc desinebat. At perierunt non nulli quidem ab negligentia, alii vero diligenter etiam curati. Neque ullum, fere dixerim, compersum est remedium, cuius usu homines adjuvos esse constaret. Nam quod uni opem tulerat, id ipsum officiebat alteri. Jam vero nullum corpus visum est adversus morbum sustinere, quod ad robur & debitum attinet, sed sublata sunt omnia, quavis etiam vivendi rationi ad curationem uteretur. Res porro miserrima suis in uniuerso morbo tum animi desectio, cum quis se agnovit intelligeret; nam meate penitus ad desperationem conversa, multo se ipsos magis consernebant, neque resistebant; cum vero quoniam aliter ab altero, dum curationis officio fungerentur, instat evium occidebat, atque hoc maximam eladis partem attulit.

## §. V.

Subtilis.

Neque tamen in peste unius ejusdemque indolis semper sunt symptomata, sed malum utque secundum temperamenta & constitutiones corporum variatur, quam diversitatem probe cognoscere & scrutari oportet medicum. Id vero omnis qui de pestilentiali morbo scripserunt unanimi suffragio confirmant, corpora quæ spangiosiora, rari & porosiora, nec non obesi sunt habita, temperamento sanguineo & phlegmatico-sanguineo, sexu feminas, ætate juniores ac infantes, animo timidos & abjectos, vitæ genere pauperes, insalubrem diariam colentes, crapulis desinos & comestationibus in feram noctem indulgentes, longe celerius corripit & gravius decumbere hoc morbo, quam qui animo fortes ac intrepidum, corpore macilentum, nervosi & amplioribus vasis dotati, viri, senes, fluxui hæmorrhoidali obnoxii, item qui fonticulis & ulcera gestant aperta. Neque minus per observationem compertum, nihil ad suscipiendum & delecterium miasmatis virtutem intendendam aptius esse mens, timore mortis animique consermatione, adeo, ut etiam quosdam solo timore peste affectos & extinctos esse conslet. Nam hi animi affectus sunt inter omnes præcipui, qui vitalem cordis arteriarum motum cum sanguinis circulo minuunt, destruant de vires tam vitales, quam naturales & animales deiciunt, quom tamen motuum beneficio venenum conceptum sit extremandum.

## §. VI.

Miasmatis  
bubone.

Cujus autem porro indolis ac specificæ naturæ sit venenum, quod pestem excitat, à priori accurate determinare admodum difficile, quia sensibus minus obviunt. Quoniam tamen ratione assequi & à posteriori judicare licet, duplicem esse videtur, partim sulphuræe puridæ multiplicativæ, nullas fermenti, partim tubulis valde acris

& causticæ, plus tamen alealinæ, quam acidæ, naturæ. Purida enim valde & peregrina sulphurea indoles ex eo patet, quod omnes maligni & puridus, quæ ex cadaveribus inhumatis, aquis stagnantibus putrefcentibus & aliis foetidis excrementis sordibus, trahant, & quod ipsum hoc miasmata illico contaminet nervorum fluidum, motum solidorum systolicum sistat & corruptionem sphacelorum faciat inducat. Causicum autem subiectionem acrimoniam inesse miasmata, ex eo concludendum, nam quod contagiosiorum morborum ingressum ut plurimum antecedit copia infectorum sale caustico præditorum & ex putredine genitorum, tum etiam, quod nervas fibrillas vellicando & rodendo, dolore, ardore, tumorem & inflammationem causetur, conspicuum satis in bubonibus atque antracibus.

## §. VII.

Pestilentialia hoc iustus susceptum venenum, illico, ut supra diximus, omnes omnino in corpore functiones turbat atque pervertit, ac nisi cito ab internis ad externas partes propellatur, certissime necem infert. Neque tamen hoc ut in aliis malignis sit per largos sudores, neque per alvi, aut urina fluxum, neque per hæmorrhoidum, aut mensum profuvium, neque etiam per narium stillitidum, spontaneum atque ac arte protrahunt, ut potius, tales, perierunt effluores excretiones, minentur exitum. Sed salutaris & critica, quæ perfecte solvit pestilentialis morbum, excretio, absolvitur per tumores in externo corporis ambitu producentes; ita quidem, ut non secus ac in erysipellate, intra tertium & quartum diem eadem contingit, & quo citius ac melius, eo magis morbi inde minuetur atrocitas. Formale enim venenum his tumoribus corticiteri atque excerni, vel ex eo patefit, quod si chirurgus lancetta, qua aperti, venam sani hominis incidat, in illico etiam corripitur peste.

## §. VIII.

Duplicis autem generis sunt pestilentialia he tumores. Primum à Græcis vocatur communi omnium tumorum nomine bubo. Occupant hi bubones maxime glandulosa loca, frequentius inguinales & axillares, quandoque etiam parotides & mammarias glandulas, item maxillares inferiores sub mento, necnon alperæ arteria appositæ, ac sese manifestant tumore glandularum duro, dolente, tensivo, cum ardore, ac si boni moris sunt, innalescent, molliores sunt & suppurantur. Alterum genus, primo longe detrius, græco nomine sedit anthrax, proprii significatione carbonem ignem & signans, unde Latinarum diminutivum carbunculus. Celsus quidem lib. V. cap. XXXVIII, sic describit anthracem: *ruber est superque cum nominum pustula emittens, maxime nigra interdum sublivida, aut pallida. In his sanies esse videtur, infra color niger est. Ipsum corpus aridum & durius quam naturaliter oportet. Cereæ quod quasi crusta est, eoque inflammatione ciatur, neque in eo loco levare curis potest, sed interiori carni affixa est. Ex Mindererus, qui ipse pesti interitus & de ea egregie scripsit, ita de carbunculis habet: *quando anthrax magnitudinis grani sinapis, aut comobis coalescit, contrahit circum limbum & circulum, aut ardentem balonem, amplitudinis orbis mensalis, prout carnem & locum attingit. Caro quam tetigit à sana separatur ac ut eschara, seu caro puritatis, excidit, in biæt cavum ac si lupi exedissent. Ab his carbunculis nulla**

cor-

corporis pars immunis est, obident tamen quam maxime membranas musculorum & subslantiam cutis nervorum ac fibrarum, in dorso potissimum, brachiis ac femoribus. In loco, quem afflicti, aegri primo pruritus sentiunt exquisitum, si scalpunt, passim erigunt, coloris vel rubri, vel lividi, vel albo-purpurei, vel nigri. Pusculae compressae sunt & pure pleae videmus, ac sub una, vel pluribus ex his, crusta cinerea, vel nigra concrevit, quae ablata, caro corrupta & spongiosa apparet, cum dolore intolerabili & ardore carnis circumiacentis, ac tandem insequitur totalis partis sphacelatio, sive mortificatio.

## §. IX.

Quibus autem lethalis est pestilentialis morbus, ex his non nulli primo statim, vel secundo die syncope pereunt, procul dubio ex Panico, quo percussus corripit. Sed plurimi, quando venenum vel non expellitur, vel expulsum subito relabatur, & nervosis tunicis nobiliorum partium pleurae, oesophagi, ventriculi & intestinorum, nec non meningibus inhaerens, inducit sphacelum, qui oculus ad omnia viscera ipsamque sanguinem iterum, quo fit, ut cadavera illico mire ferant, intumescant & citissime putrescant. Quandoque etiam, quando nimia tumorum pestilentialium copia prodit, non inflammationem, dolorem & ardorem intolerabilem, ex febre symptomatice, non sicut ac in variola fieri solet, occurrunt.

## PRAESERVATIO ET CURATIO.

## §. I.

Quum in conspecto sit, nostris in regionibus pestilentiam non gigni, sed ex remotis locis advehi, non securus unque & certius datur consilium praeservatorium quam fuga contagii. Venit enim jam *Celsi* est preceptum, ut adhuc integer, qui tamen securus esse non possit, naviget & peregrinetur, quod etiam in peste Italica anni MDLXXV. eximie profuisse, testis est *Natalis Comes hist. lib. XXVII. Ex Sacerdotis Med. stat. Sect. aph. 38.* libere profatur: *qui aliud remedium pro vitanda peste instituit, quam fugam, vel sunt homines iugiter, vel voluit erudescere.* Eandem etiam ob causam optime saluti civium consulant principes, qui tempore pestis advectionem & accessum contagii modis arceant omnibus, si vero domus fuerit infecta, sanos illico segregare de omnem mortuorum suppellestem comburere iubent, ne cum ea ad alios transferatur & morbus. Omnibus vero grassante pestilentia temperatissime vivendum, vitanda omnia excessiva in rerum non naturalium usu, maximeque animi affectibus, & abstinendum a cunctis, quae vires ullo modo deiecit, perfricationis succellum turbare & cruditates prima in regione gignere possunt. Inprimis animus firmandus, & terror, metus ac pusillanimitas discutienda, quum certum sit, timorem ac terrorem plures in peste necare acipimus miseria.

## §. II.

Qui autem inter infectos versari necessum habent, his videndum, ne miseria succos vitales subeat, nec salivales intra primas vias stagnantes humores in sua societatem, quod facile fit, pertrahat. Hunc in finem commendanda frequens expulso de oris, cum aceto vini, vel vino coluto, vel horum in nares attractio. Major effica-

cia adhuc, si scordio, ruta, vel corticibus citri fuerint imbuta. Acidum enim genuina miasmatis putridae & sulphureae indolis videtur esse antidota, quippe quod esse Chymia mechanica sulphur & salia volatilia figit atque emittit. Quare longe tutius est acida deglutire, vel in ore continere, quam radices alexipharmacas zedoariae, angelicae, ostruii &c. masticare. Expedit hanc quoque tum vel vinum Rhenanum, vel acetum bezoardici aliquot cochlearia, cum aqua, aut vino diluti, assumere. Locuples certe hanc in rem testis est *Forestus, ego, sequor, non gratum per. e. nunquam tre. de. ple. us cretum ludia ve ad agros conferem, illis auxiliis ac potissimum mala citius putamine succedent, dentibus strato, me mure furvi.* Turca, memorante *Cole lib. de morb. acut. pag. 88.* regimine pestilencia, frequentius ununtur succo limonium, quem liberaliter omni pauculo inthilant.

## §. III.

Inter externa adversus contagionem praesidia plures commendant fonsiculos; industi foris in primum observatione, quae constat, eos, quae ulcera chronica & scorbutica in artubus gestarunt, à peste & aliis contagiis morbis fuisse immunes. Multa inprimis in laudanda hic fonsiculorum virtute est *Hildanus, observ. chirurg. cas. IV. obs. XXIII.* sic habet. *Neminem autem, quod notandum, coram, qui fonsiculo in cruribus & brachiis habuerunt, prae unum aut alterum summe cacothymum. in peste obussum memini.* & proinde praesentaneum praeservativum non tempore pestis esse. cum in aliis multis, tum etiam in memetipso expressum sum. Existem mihi quoque à medicis qui pesti Erfurtensi interfuerant, relatum olim esse, memini. Ratio tam egregii effectus prophylactici videtur esse haec, quod materia siccipiti miasmatica, quae firmius adherere solet scorbuti sanguinis parti, naturae vigore ad partem cui fonsiculus insidet, tanquam debiliorem, cum hac cute vehiculo ablenitur, & per hoc emissarium excreatur, unde tum tunc circa fonsiculum insidiosa dolor ac tumor observatur. Forsitan etiam confidentia, quam existeret de hoc, tanquam certissimo foveat praesidio, metum excutit & reluciscendo animi vires juvat, eodem modo ac de amuletorum adversus pestem virtute censendum.

## §. IV.

In curatione porro omnia à medico perito hos in fines dirigenda: I. ut ope naturae expulsiorem suscepi veneni per congruas vias maxime tumores illos criticos promoveat horumque habeat rationem curate; II. ut vires, quae cum vires pari passu ambulant, sufficere de urgentibus symptomatibus occurrat. Sed quum quo pacto de quibus haec rite sint perficienda, ego ex propria tradere nequeam experientia, aliorum utar, & methodum, quam in curanda peste summo cum fructu adhibuit doctissimus pater & exercitissimus Medicus, *Joannes Langius.* hanc iterum, cui postea iudicium meum & monita rationi & experientiae congrua subiungam. Ita autem graviter hic auctor suam pestem curandi rationem lib. *Epist. XVIII.* describit: *Sanus probe natus, me multos, de quibus etiam conclusum erat, in hac pestifera hic hac methodo curasse. Primum, si alius, aliquis daret ante morbum initium, periculum, vel nihil existeret, tum glande imposita, aut levi enemate eam exponerem. Postea alexipharmacum*

Sphacelus natus.

Optimum praeservativum quum fuga &amp; contagio.

In acuto.

Sphacelus natus.

Sphacelus natus.

Magnum

macrum sudoriferum exhibui, quod, pro ratione  
 aetatis ac virium, sudorem duas, vel tres, aut  
 plures horas, promoveret. Cordis epithema ap-  
 plicui. A sudore hora sexta, vel septima, resellui  
 tamen aliquo jussulo viribus, venam opportunam  
 fecui, ac mox ab alexipharmaco alius singulis  
 diebus, mane & vespri, potagia alterantia, quae  
 sua qualitate & subtilitate veneno resisterent, ex-  
 hibui, & eor quoque confortantia, qualia sunt,  
 quae ex succo citri, limonum, aurantium, acetosae  
 & jugula, cum momento aceti & saccharo de-  
 colla conficiuntur. In morbi declinatione, si ap-  
 petitus edendi langueret, ad reliquias morbi ex-  
 stirpandas, medicamentum ex rhubarbo, aga-  
 rico, cassia, aut rore Syriaco, seu manna & sa-  
 marindis indurum exhibui. Postremo chirurgie,  
 ne ulceris aut carbunculi consolidationem pra-  
 ecipitarent; cognis vero ut praescripto tempore  
 commoda efuscula & poultice agro suppedita-  
 rent, edixi. Quae curationis ratione ingens ag-  
 grom numerus, Deo optimo auspice, convalescit.  
 Bubonibus, pergit paucis interiectis, vero & car-  
 bunculis, si circa emulsiaria, iuxta aures para-  
 sis, sub axillis abscessus, in inguinum adenibus  
 bubo, virtute expulsa eruptio, aut interim  
 carbunculus in brachii aut cruribus efflueret,  
 tum festinanter, veluti in vulneribus virulentis,  
 medicamenta, quae venenum extrahunt, ad locum  
 applicata, vel cucurbitulas, aut emplastrum ex  
 sermone, iberica, farina, sinapi & cepa sub ci-  
 neribus colla conficito, additis opponacis &  
 galbani gummi, accerrimo aceto solatis, imposito,  
 & abscessum auturationem scarifica, aut  
 aperi, vel cauterio adurito. Si vero papiens ig-  
 nem veretur, cautarium potentiale ex cambari-  
 dibus & sermone confectum, aut confusum ex  
 oleo flammulae radice applicato, quae sua vir-  
 tute calorifica & ardente non modo nocios humo-  
 res attrahunt, sed & non raro scissas ex his col-  
 lectiones aperiuunt.

## §. V.

*Diutius  
 & rigore.*

Et utique haec pestem curandi methodus ratio-  
 ni consentanea. Nam in omni morborum cura-  
 tione sedulo tenendum hoc momentum, ut si alvus  
 sub initium per aliquot dies, parum, vel nihil ex-  
 creverit, leni enemate ducatur, quo ab excrementis  
 liberetur intestina, ne inde tam symptomatica  
 exacerbentur, quam remedium virtus abundat.  
 Dein probandum merito auctoris institutum,  
 quo commode alexipharmaco sudorem per ali-  
 quot horas movet, ut halitusomum illud venenum  
 cito exhalaret & per cutem diffunderetur. Neque  
 etiam de nihilo putandum, quod cordi applicue-  
 rit epithema. Quamvis enim non proxime tangat  
 & afficiat cor, sed potius dextrum orificium ven-  
 triculi ejusque tunica nervosa & musculosas;  
 multum tamen interest, ut ventriculus, cui pars  
 maxime nervosa, & exquisitus sensus & quae cum  
 nervosa universi corporis partibus consensum alit  
 intimum, ac ubi venenum primo omnium perni-  
 cialium suam vim exierit, probe defendatur, quod  
 fit per topica, quae antipalmodica simulque ro-  
 borante balsamica virtute possunt; quem in finem  
 ego commendare soleo, quae ex theriaca, oleo nu-  
 citae expresso, camphora, croco, castoreo ac bal-  
 samo Peruviano concinnantur. Porro post usum  
 alexipharmacorum venam secare jussit, quod om-  
 nino proficuum. Initium enim curationis à san-  
 guinis missione facere periculosum, eo quod primo  
 vel secundo post eam die, motus sanguinis ad  
 peripheriam, adeoque etiam perspiratio, semper

quodammodo imminuitur, ut venenum inus ma-  
 neat. Ne dicam, metum & terrorem in peste  
 correptis, protinus morum sanguinis a corporis  
 ambitu revocare, ut hinc venae lectio, quae idem  
 efficit, non possit non nocere. Sed admitti unque  
 haec potest si consuetudo, sanguinis abundantia &  
 victus laetus atque vinosus urget, post usum me-  
 dicamenti sudoriferi, eo quod demta sanguinis co-  
 pia, propulsio materiae virulenta ad glandulas fa-  
 ciliatur & promovetur, tanto certius, quando pos-  
 sita lenioribus sanguinis ad exteriora fluxus subin-  
 de adjuvantur. Recte etiam laudantur acida, ut  
 succus citri, limonum, acrum &c. quod tota  
 substantia veneno resistant, quippe quae putred-  
 nem humorum & dissolutionem sanguinis valide  
 obstant & ob id merito omnium alexipharma-  
 cis & antioisimicis anteposantur.

## §. VI.

Fracto praeterea morbi vigore, sub declina-  
 tione alvum expurgat lenioribus. Quod quidem si-  
 cuti in principio pestis aliorumque contagiofo-  
 rum morborum, ob effectum motum humorum  
 ad externa retardantem, admodum nocivum; ita  
 vicissim quam maxime conducibile, in declina-  
 tione. Sic enim educunturordes sub morbo ge-  
 nitae perniciose, quibus retentis appetitus proster-  
 nitur, lentae, immo purpuraceae febres de novo  
 inducuntur, vires languent, calor fit leonius, no-  
 vissime ac capitalis habet raro repullulavit morbus.  
 At virus nam extrahendum in tumoribus pesti-  
 lentialibus suadet cucurbitulas, scarificationem &  
 vesicatorium, ac in eo pariter consentientes habet  
 Joimianros. Incipimus elegans Riverii est observa-  
 tio *Crit. II. obs. XIX.* quae cum experite virtutis  
 praesidium laudatur, ut, statim ac quis pelle cor-  
 teptus, cantharides cum sermone de aceto pone  
 aures ac in aliis fuerit emunctoris applicentur, ac  
 in lecto possent qui decumbere jubentur agri,  
 eoque facto, post XXIV. horas effluere humo-  
 rem atrum serolum & pestilentem morbum post  
 aliquot dies plane discedere. Neque minus probe  
 etiam monet *Laugius*, ne praemature ac cito ul-  
 cera consilidantur. Evocata potius ad parva ex-  
 ternas materia & suppuratione facta, tumor ape-  
 riendus, ulcus fuerit digestivis mundandum, sed  
 diu apertum servandum adnotata curanda, quo  
 virus omne per illud sufficienter expurgetur, &  
 tandem ad cicatricem perducendum.

CAUTELAE ET OBSERVATIONES  
 PRACTICAE.

## §. I.

Perquam attentione dignum est *Smittorii* in  
*Medic. stat. apb. 139.* effatum nobilium fere ne-  
 mo tum remediis, plebeji vero sine his plures, sa-  
 navantur. Nam experientia uberius docet, plebe-  
 jos, modo non omnibus subsidis destinantur, sed  
 temperato regimine & ad satietatem levi posu  
 utantur, citius & rectius tam in pestilentialibus,  
 quam aliis contagiosis malignis febribus conva-  
 lescere, quam opulentos, qui medicorum & me-  
 dicamentorum copia obscurantur plane. In illis  
 quippe valens & robusta est natura, cui si nego-  
 tium committitur curationis, longe felicius utique  
 succedit, quam si artificiosa medicatio, non-  
 nunquam plane perversa, impeditur ac turbatur.  
 In nobilibus autem, quem per se ob inordinatam  
 vitae victusque rationem jam tum debilius na-  
 tura, longe magis utique medicamentorum mul-  
 tum,

*non non  
 deinde opo-  
 neretur.*

*Plures re-  
 media opo-  
 nunt.*



sonum, variorum, quin *sepe* minus congruum  
usq; in opere suo turbatur de morbo ad infelicem  
eventum promovetur.

## §. II.

Alexiphar-  
mica sola  
sunt.

Inprimis nihil perniciosius est, quam radices  
sic dictas alexipharmacas, oleo volanti calido tur-  
gidis, carlinæ, angelicæ, perfrictis, zedairæ, ser-  
pentariæ, Virginianæ, imperatorie, vincerotici,  
pimpinellæ, collatis & ex his præparatas essentias,  
elicia, theriacam quoque & mithridaticam, cum  
gemmam antidotum, liberaliter offerre. Multo  
vero magis detestandi adhuc illi tantopere lauda-  
ti spiritus volatiles, urinæ & olei, ut corii  
cervi, viperarum, fuliginis, item salis volatilis,  
nec non balsamum sulphuris. Tantum enim ab-  
est, ut infidem noxam expellantur, ut potius insu-  
denear & paribus nervosis aliis insigatur.  
Perperna quippe hæc lex est, secretionis, quæ an-  
tecedunt excitationem retentorum in corpore,  
melius sub liberiore & moderatiori ad emuncto-  
ria impulsu succedere, quam ubi humores ingre-  
tuos ac celeriter consumantur. Augent potius  
calidiora pharmaca anxietates præcordiorum, cal-  
orem intendunt, dissolutionem humorum pro-  
mouent & miasma quoque malignum facili-  
ter cum impetu ex ventriculo in sanguinem ac ner-  
vosos parvis agitur, ut sic multiplici ratione sint  
detrimentosa. Et hæc omnino ita esse, loquuntur  
passim medicorum, qui pestilentia interfuerunt,  
scripta, in quibus nominasse sufficit *Hildanum*,  
*Chald. de Heredia*, nec non *Thoverum*, qui  
pluribus observationibus confirmat, alexipharma-  
cis calidioribus talis, peste absumas esse onuses.

## §. III.

et aliis  
supra pro-  
fere.

Neque tamen penitus radicem & herbarum sic  
dictarum alexipharmacarum usus in peste dam-  
nandus. Tum enim non nocet, quando miscetur  
cum iis, quæ vim earum commoventem nimis  
de caliditate circumat & quasi ad tempera-  
mentum reducant, ut sunt maxime acida, cum  
vino. Sic reflatum mihi est, in peste illa, quæ anno  
MDCLXXXII. nostram hanc urbem infesta-  
vit, exitim profuisse mixturam ex aquæ cardui  
benedicti & aceti vini quatuor cochlearibus, lapi-  
dum cancrorum & theriacæ drachma, concinna-  
tam & iterum datam. In pece quoque, quæ anno  
MDLXXVI. totam fere Lombardiam perva-  
gata, multi passim de præcipue Mediolani contra-  
huisse dicuntur, succo ex ruta caprarum, cum aceto,  
aqua cardui benedicti & medico theriacæ hausto,  
corpore postea ad sudorem connecto. Ipse *Thove-  
rus* *l. c.* pag. 21. testis est; nil profuisse in pes-  
te, præter acetum theriacale, inter initia ad eli-  
ciendos sudores exhibitum, eodemque hoc reme-  
dio anno MDXLIII. grassante inter milites fe-  
bre maligna, integrum gregarium cohortem  
fuisse servatum, convalescentibus omnibus, quibus  
temporali hoc acetum oblatum, exceptis paucis,  
qui ferus a chirurgo acceperant. In pes-  
te quoque Romana tam egrua præfuisse acetum  
cum ruta, radice pimpinellæ, betonica, alio  
& baccis juniperi, addito camphoræ momento  
insulam, ut quoptor illo ubi fuerant, quamvis  
inter infelices degerint, pettem evaserint, fidem  
facit *A. n. bersa de peste* pag. 275. Quin propter  
acetum, cum præcipuum ingrediens, aqua  
prophylactica sita. In malignis morbis & ip-  
sa pestis, magni semper assistantia. Ex *Gesneri* ob-  
id. *lib. III. cap. 27.* auctor est, ut omnia alexi-  
pharmaca ex vino, cui acetum admixtum, præ-

beantur. Conveniunt autem hæc alexipharmaca  
acidis nupta primo maxime die, ubi resolutione  
ac sudore opus est. Nisi enim, ex vero asserit  
*Mundererus*, intra viginti quatuor horas ab in-  
valicæ alexiteria exalbeantur, omnia medica  
præficia fore irrita.

## §. IV.

Inter ea vero quæ pestilentiali in pestilentia  
morbo efficacis, communis omnium qui de peste  
scripserunt iussu, sunt maxime acida & ter-  
rea. *Frascatorius lib. III. pag. 246. de morb.*  
*contag.* tam ad præfervationem, quam curatio-  
nem commendat hoc: recipe succi acetoſille un-  
cias duas, citri unciam, dialcordii Frascatorii  
drachmam, specierum cordialium scrupulos duos,  
aceti unciam. *Mundererus de peste* cap. XV. diffi-  
citer scribit verbum: *nulla est putredo, nulla infectio,*  
*nulla humorum depravatio, quæ per acida non*  
*superetur.* Sane, ut liberrime loquar, si mihi  
vitolicorum remedium usur, vel interdicere,  
ego ad curatioem pestis nunquam, vel certe me-  
nus, nec decem. Item testatur *Fonseca de veritat.*  
*curand. pest. Johanes Crato, Iniquica, Augustinus*  
*de Monte Sancto, Martinus Rulandus & alii in*  
*febris pestilentialibus spiritum vitrosi sum-*  
*mo, & prodesse testantur.* Et ego id testari inge-  
nue possum, ut non modo cum syrupo, sed & cum  
aceto, et rosarum mixtum, felici cum successu  
cum exhibuisse. Ex cereis vero & bezoardicis fi-  
xioribus singulæ virtutes possent antimonium dia-  
phoreticum, bezoardicum minerale, lapides can-  
cerorum, corii cervi usum & philosophicæ præ-  
paratum, succinum, terra sigillata, bolus Armena  
& cinnabaris. Ex quibus varia concinnant, ead-  
emque vel sola, vel acida nupta, in usum vocari  
possunt. De quibus tamen omnibus pluribus le-  
gendi *Anonius Schneberg in catal. med. simpl.*  
*adv. pest. opera Henrici à Bra edit. Vazzeri lib.*  
*II. antid. pestil.* nec non *Mundererus de pest.*  
*cap. XV.*

## §. V.

Deinde inter remedia in pestilentia conducibi-  
lia præcipuum fere locum tuetur analeptica.  
Vires etiam in atroci hoc morbo, tum propter gra-  
vem animi metum & consternationem, quam ob  
ingentem malignitatem, summo opere sunt prostra-  
te. Hinc medico quæ maxime eritendum, ut  
removeat ex rebus moralibus & non naturalibus  
omnia, quæ eadem offendere possunt, & in me-  
dicatione fugiat anodyna & valde vaporosa, præ-  
ventientia. Ad reficiendas autem vires præstabili  
aqua confortans, nostra methodo sic paranda: re-  
cipe mellis Turcicæ manipulos quatuor, rosarum  
cum sale consuterum, florum liliorum convul-  
sium ana manipulum, corticum citri recentium  
unciam unam semis, cinnamomi acuti unciam,  
macis unciam dimidiam, assidue vini Rhemani  
mensuram, aquæ communis mensuras tres & le-  
ni igne abstrahere duas cum dimidia mensuras. Pos-  
test hæc aqua vel cum tinidum aquæ cardui  
benedicti remittere, vehiculum præbere sumen-  
dis reliquis medicamentis omnibus, vel sola da-  
ri, cum syrupo acetoſinatis citri & spiritui salis  
acidulata.

## §. VI.

Neque minus apprimè in pestilentia proficua  
sunt emetica. Nam prima & præcipua in medi-  
catione indicatio est, ut venenum susceptum  
oculus citius & corpori pellatur. Jam vero mias-  
ma contagiosum primo omnino salivæ se-  
cretio-  
mucosæ

miscet latici, cum hoc ad ventericalem descendit & inde ad sanguinem transferretur. Hinc optimum utique consilium, ut venenum brevissima, qua subit via, iterum exarbitretur, simul atque crudissimas primæ regionis, quæ delecterium ejus virtutem manifeste intendunt, per stomachi os everruntur. Sed opus est, ut cito id fiat, simul ac quis fe infectum & languorem cum cardialgia sentiat. Sic subjuncto congruo sudorifero, prima quasi in herba jugulari posse morbum multiplici constat experientia, eodem modo ac *cap. X. & XI.* in aliis malignis morbis id succedere pluribus docuimus. Curiosa non minus quam notabilia hanc rem est observatio *Rivieri*, de quodam, qui simul ac ex sympeomatibus, dolore capitis & nausea, se peste laborare concepit, illico permixto oleo illitum in fauces immisit, quaeducta per vomitum materia, primum serola, dein flava, tandem postracea, in lectum se contulit, jussiculum sumisit, sudavit & illico convaleuit.

## §. VII.

*Sub certa conditione admittenda vena sectio.*

De venæ sectionis utilitate non æque inter omnes convenit, sed sunt qui laudant, sunt qui damnant. Optime præcipit *Celsus* lib. III. *cap. IV. de febris*, iniquis, propriam animæ deviationem in febribus pestilentialibus casus. In hac minime utilis est, fame aut medicamentis vi, aut alium ducere. Si vero vires finiant, sanguinem misere optimum, præcipue si cum dolore febris est. Neque minus fidem facit *Rivierius* in *ap. pest.* se in pestilentiali parotide, quæ plures necavit, venæ sectione, moderata tamen, ad uncias aliquot, & repetita, plures servasse. Nos quid de ea sentiamus, supra jam in episcris ad *Longi* methodum exposuimus. Omnia autem huc redeunt: tunquam in principio post invasionem statim, ubi terrore & metu æger jactatur, habet locum, sed secundo vel tertio die, si urget plethora & vires finiant, admittenda moderata.

## §. VIII.

*ad nitro.*

Sic etiam de niri usu ambigunt medentes. Qui rejiciunt, putant illud nimium refrigerare & expulsiōni venæ ob id resistere, pestis etiam venenum jam tum esse supelacivum, putredinosum ac diarrhoeas inde metuendas fere æthales. Qui probant illud non secus ac in aliis exanthematicis inflammatoriis & malignis febribus, diaphoreticis nupum, egregie prodesse contendunt. Sed his facile dirimenda. Spectanda sunt individua eorumque natura & temperamenta, & expendenda morbi symptomata. Si corpus est plethoricum, temperamentum cholericum, vel sanguineo-cholericum, ætus acris, febris intensa cum siti & dolore capitis, nitrosâ, refractâ dosi cum bezoardicis pulveribus data, commodum locum habere omnino. At ubi torpor & somnolentia, pulsus debilis, extrema frigida & timor præcessit ingens, abstinendum à nitrosa esse docet ratio. Semper tamen tutius est, si nitrum sociatur camphora, quo connubio camphoræ vaporosa & niri refrigerans indolens optime cicuratur & medicina emergit, non modo alexipharmaca, sed & inflammatoriis efficaciter resistens. Memini ego, me olim quam Londini versaretur, à peritissimo chirurgo sene, qui pesti Viennensi interfuerat, audivisse, se summo cum fructu usum esse electuario, quod vocabat nigrum, composito ex rob sambuci & mellis ana libra dimidia, pulveris pyritici uncia & camphoræ drachma, ad unam vel duas drachmas dato. Et *Gyseleri* quoque se in

peste Brandeburgeni summo cum fructu adhibuisse pulverem pyritum affirmat.

## §. IX.

Perite præterea tractandi critici illi humores pestilenter morbum volentes. Bubones quidem, si cito prorumpunt & cito maturant, boni, si autem statim redeunt, metuenda aut mors ipsa, aut minimum gravis symptomatica, ex inguinalibus parafis & gangrana ipsius lateris, ex mento relapsis deglutio solidorum & liquidorum intercepta, cum angina ut plurimum lethali. Periculosiores etiam qui pone aures, pestilenti, quibus carbunculus insidet, & lethales circulo livido sepi. Carbunculi deteriores semper quidem bubonibus, sed quo majores, quo nigrores & quo propiores cordi, eo magis periculosi. In utriusque ex internis optima sudorifica & quæ succos ad ambritum corporis agunt. Externis in bubonibus, si tardius procedunt, astrahentis imponere jubent, cucurbitulas, quin vesicatoria. Si prouerberant, suppuratio promovenda cataplasmate ex ficibus, radice liorum alborum, cepis sub cineribus stitis, cum farina lini, melle & croco; vel imponenda suppurantia simul atque discutientia, emplastrum diachylon tam simplex, quam cum gummanibus, de mucilaginis, nec non de melioto. Ubi suppuratum, aperiendi & balsamo *Aræti*, non nunquam unguento Basiliconis remitto, mundandi & consolidandi, ita tamen, ut non nimis cito coeant, sed aliquandiu materiz saniole concedatur effluxus. Anthracibus, quia humor jam corruptioni obnoxius, non admoventia suppurantia, sed curandum, ut crusta decidat: quem in finem *Loimastri* contritis digestivo insungere & acre emplastrum superponere jubent. Crusta delapsa unguento *Aegyptiaco*, vel fusco *Wierzi* cum melle rosato tractandi. Quod si autem corruptio sphacelosa adest & latus serpere videtur, prohibendum hoc scarificatione sufficienti & applicatione liquoris, qui potenter inflammatorii ac putredini resistit, expertæ sapientia à me virtutis, parandis, ex uncis quatuor spiritus vini rectificati, drachmis duabus camphoræ, drachma croci & tamundem niri artificialis, quod ex spiritu salis ammoniaci urinoso & spiritu niri conficit, ac à vini spiritu perfecte solvitur.

## §. X.

Detum quoad regimen in genere adhuc tenendum, quod, sicut in omnibus acutis exanthematicis morbis, nimius lecti & conclavis calor omni studio, ceu summopere noxius, vitandus, ita multo magis ipsa in pestilentia. Vicissim vero arcendum enarq frigus, ne tumorum erupcio & diffusio subioris venenose materiz per cutis poros ullo modo intercipiantur. Temperata potius sint omnia, uti jam in antecedentibus pulsui monuimus, iterumque monemus.

*Bubones & mela, cum vena sectio.*

*Regimen.*

## CAPUT XIII.

## De Febre Erysiplacea.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

AD exanthematicas febres merito etiam referuntur erysiplacea, in qua sub intentioni

*Erysiplacea morbi, sanguis.*

sanguinis & humorum motu, serum acre, fulphurea, caustica naturæ, ad partes extremas, cum tumore, rubore, ardore & dolore propellitur.

## §. II.

Alum  
coram  
non pte.

Certe non tam levis, innocens & simplex est erysipelacea febris ac vulgo putatur, sed gravis sæpe, periculosa & non raro letalis; quin multum affinitatis alit cum morbo oneroso atrocissimo, ipsa febre pestilentiali. Nam sicuti hæc subito cum intenso horrore, aestu, virium prostratione, vehementi dorſi capitisque dolore, vomitu quoque & delirio accedit; ita & sæpiſſime erysipelas statim in principio usdem symptomatibus stipatum adest. Sicut deinceps in pestilenti morbo inter tertium & quartum diem materia maligna ad corporis ambum propellitur, remittente postea paululum symptomatum atrocitas; ita similem succellum servat erysipelacea febris. Quotmadmodum porro pestilentialis venenata materia maxime glandulas, & quidem inguinaks, invadit, ibique dolorem primum ac tensionem efficit; sic etiam gravi erysipelate affectu, primo tumorem, ruborem ac dolorem sentiunt in inguinum adnatis, unde postea materia ferventissime & adurentis quasi naturæ ad pedes descendit. Uti quoque materia pestilentialis sedem sæpius figit in glandulis mammariis, axillaribus & parotis; ita eadem observantur in erysipelate, quod ubi capiti immittit, paritur primum parotides, si mammae, axillæ. Pestilens præterea materia in glandulis abſcessus format ac paribus extremis facile gangrenam & fistulam induci; sacrum autem ignem axillares præsertim & mammarias glandulas sic sæpe adurere, ut pus conerant, & arsus foeda corruptione afflicte, omnes qui medicinas faciunt, uberius notant. Demum sicuti in peste nil periculosius, quam si materia expulsa ab externis ad interiora relabatur; sic eadem nota indeque periculum a retrocessione erysipelatis metuendum.

## §. III.

Differt à  
peste in  
inflammatione  
non pte.

In eo tamen erysipelacea à pestilentiali febre differt, quod non ex contagio, live causa externa, sed interna oritur, nec contagiosa (si de alioſola exhalatione indicat, nec tum virulenta sit, & cum mortis periculo juncta. Inflammatio autem erysipelacea ab aliis his distinguitur, quod tumor in illa depressior, dolor non tam tensivus, color quoque roseus & floridus, qui in his magis fulvus. Neque minus à phlegmone discernendum erysipelas: In hoc enim inflammatio magis superficialis, in lanum diffusa de pressa colorem exuit, materia quoque pauca & tenuis, in illo autem profundior inflammatio, subſectam non modo cutem, sed & pinguedinem & musculos tangens, attractu ob duritiem colorem non deponens, ac sic à stagnante impuro sanguine, properea facilius in gangrenam est transitus.

## §. IV.

Alit  
verum  
vel non  
est.

Ipsam autem erysipelas à prædictis vulgo distinguitur in verum, quod & simplex, ac in nothum, quod & scorbuticum vocant. Simplex facilius obducitur commodis remediis internis & externis, ac tantum in superficie cutis hæret, nothum autem magis est chronicum, ob fœcorum impuritatem altius radices agit, difficile curari & facile abin in ulcera mali moris. Subdividitur igitur hoc iterum in illud, quod cum, & quod sine exulceratione est, in exulceratum plus utique peri-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

culi metuendum; & acri, & medicis, & per longum sæpe tempus detinet ægre consolandum. Porro erysipelacea febris quoadque idiopathica, live morbus primarius, quoadque symptomatica & morbus secundarius. In anafacta quippe, æstus, item diuturno ictero, flavo & nigro, accedit haud raro symptomatica erysipelas, & cito ægrum jugulat. Sæpe etiam complicatur vulneribus partium nervolarum, præsertim cranii ejusque membranarum, item fracturis ossium, ac tum quoque in ancipiti versatur æger.

Idiopathica  
cum vel  
symptomatica  
febris.

## §. V.

Deinceps non in omnibus unius semper ejusdemque indolis est erysipelas, ac vehementius. Etenim in quibusdam, juvenibus maxime materia nec adeo virulenta, nec adeo multa, levius facit atque benignius, quod neque glandulas occupat, neque febrem intensam movet, sed secundo mox de prodit, cum rubore, tumore ac dolore in pedibus, & sub perspiratione debita, vel leni remedio domestico, promptè discutitur. Contra ea in cacochymicis, senibus & impuris corporibus, ubi materia, & copiosior, & detrior, systema nervorum & vasorum gravior exagitur, febris est acrior, dolor & inquietudines acerbiores, ac nisi exquisita medicatio excipitur, diu affligit & ægrum cedit. Dissert quoque erysipelas ratione partium, quibus incumbit, de variis distinctis stipatur symptomatibus. In pedibus niorem inducit tibi, quin, si gravior, cum dolore ad crura ulque propagatur & levi tactu exacerbatur. Faciem occupat, inamem hanc succellive, rufescit, interſerſis copiosis aqueis vesiculis, oculi tumore clauduntur, spirans difficultè trahitur, nares & fauces aride valde sunt & sicæ, & torpor plerumque ac torpor conjunctus est, quin ob propinquitatem cerebri metuendum, ne in phrenitidem, vel lethargum degeneret letalem. Mammæ ubi erysipelas tangit, intumescunt, sæpe lapidis instar indureſcunt, cum exquisito dolore, & facile sequitur suppuratio. Sub axillis ibique positis glandulis, acerbissimo stipatur dolore & plerumque in abſcessum definit. Umbilicalem regionem in infansibus frequentius infestas, ac inde per abdomen spargitur, cum gravibus pathematibus, sæpius ut plurimum evecta.

Differt  
non  
pate  
pate.

Differt  
non  
pate.

## §. VI.

Ex peculiaribus erysipelatis generibus est illud nostro tempore paucis cognitum & à veteribus quoque parum notatum, quod *Plauti* vocat *Zoster*, nostri *zonam*. Gravioribus hoc prodit symptomatibus & supra umbilicum medium corpus ambit instar cinguli, æ præcordialis regione per dorſi tractum, latitudine ut plurimum aliquot digitorum transversorem, cum intensissimo ardore, insistentibus pustulis acerbis, instar ignis urentibus. Sed periculosum est ac interdum necat. Omnium vero, ut ita dicam, malignissimum est, quod post magnum virium languorem in corporibus senilibus, emittens cacochymicis, nonnunquam enat in febribus malignis & pestilentialibus, sub papilla & in cordis regione, vel etiam manibus aliisque exquisitoris tenus partibus, prodit, lividum mox fit, demum ærum mortis cito subsequente, quod *Plautus* inprimis *app. tom. II. pag. 23.* sub nomine maculæ luteæ describit.

Differt  
non  
pate.

Differt  
non  
pate.

## §. VII.

Ad causas hujus febris quod attinet, materialibus

Differt  
non  
pate.

neuriqum simplici, biliofa, vel falſa, ſed potius cauſaſque, acris & putrefacientis indolis eſſe videtur. Vchement enim ipſius in partes nervoſas operatione, totius corporis oeconomiam, functionum illico graviter turbata & vigiliam, deſirum, inquietudinem, anxietatem, corporis reſtigationem, vomitum & ſenſum turbationem, inducens. Longe gravior adhuc, quando expulſa materia retrocedit, quippe quæ tum haud ſecus ac venenum, cito deſiria, inflammationem internam, aſthma convulſivum & ſpaſticas ſtriſturas citè ſepe lethales. Ne dicam gangramam & ſphacellum, quæ eryſipelas imprimis male tractatum facile excipiunt, virulentiam materiz luculemter ſuis prodere ac indicare. Unde vero hæc materia trahit ortum, non adeo quidem in expedito; ego tamen crediderim, ex bile variis ex cauſis vitata & corrupta reddita, in duodeni flexura ſtagnante diutius, ibi cum ſucco pancreatico conſentientia quaſi & cauſtica acri faſta, eandem conſilari, inde ſucceſſive ad ſanguinem & cerebri ſpinaliſque medullæ membranas ferri, univerſum nervorum & vacularum partium ſyſtema male afficere, febreſcere, donec deſum ad externum corporis ambitum pellatur.

## §. VIII.

Eryſipela.

Ad concipiendam hæc eryſipelatis materiam, diſpoſiti præ reliquis temperamento ſanguinei & ſanguineo-cholici, plethorici, juvenes; viri, nec non ſæmînæ gravidæ, in quibus tamen benigniora eſſe ſolet naturæ. Sed in ſcorbuticis, ſenibus & cacochymicis, item ſæmînibus, ſuppreſſione, vel emanſione, aut retentione menſium laborantibus, deſeritatem obſinet genium. Crebrius etiam & faciùs ex cauſa eadem obnoſci, qui a parentibus eodem aſſectû prognati, & qui ſemel paſſi, ſæpius poſtea ipſius expeririunt inſultum, præſertim ſi ſenes & ſcorbutici. Ego quidem antiverſaria, æquinoctialia, quin ſingulis menſibus redeuntia eryſipelata notavi. Sed de his, in ſenibus maxime & cacochymicis, verum etiam deprehendi *Hippocratis in aphor.* eſſatum: quod qui ſæpe eryſipelate corripitur, tandem eo moriatur.

## §. IX.

Eryſipela præſentia.

Quæ autem hæc intus deſineſcentem eryſipelatis materiam cauſſam evolvere & in actum deducere poſſunt, ex rebus non naturalibus ſunt multa. Inter hæc primum ac præcipuum locum ſibi vindicant animi aſſectus vehementes, ita præſertim ac terror, & conſignavi inter alia *Fellepius* exemplum ſæmînæ, quæ, quotieſcunque trita, eryſipelas naſi incurrit, poti aquæ hordei facile diſcutiendum. Excludit dein eryſipelas æt nimis calidus & intenſior ſolis ardor, nec non vicium ſubtus & vehemens corporis, vel pedum refrigeratio. Item facit cibis calidis, potus exaſtiſſus, crebra ebrietas, nec non balneum ſervidum. Inprimis vero ad excluſionem hujus mali faciunt evacuationes ſanguinis tam artificiales, per ſcarificationes & venæ ſectiões, omiſſæ, quam ſpontaneæ per nares, utrum & ſedis venas, intercipiæ. Speciatim capitis eryſipelas frequentius accidit his, qui diu nocteque in aëre humido & p'uvio o degunt, item ſenibus. In mammis ſolumè ſi puerperia, præmictum lactantibus, poſt gravem terrorem, & tunc illico ſubitæ lactis effluſus, man mædum ſunt, & à lacte coagulato t. meſcunt.

## §. X.

Interim eryſipelas, ſi cito & ſine adeo vehementi commotione erumpit, nec corpus ſordidum, nec locus nobilior, aut cum nervoſis partibus communicata, non tantopere periculolum, ſed ſub auctiori perſpiratione, adhibitis congruis remediis, poſt unum aut alterum diem, tumor ſenſim ſubſidet, ardor ac dolor evaneſcit, color roſeus mutatur in flavum, cuicula ſinditur, in ſquamæ fatiſcens ſcedit & morbus ex voto ſole vitur. Quin ſalubritatis plane notam quandoque fert; ac novi, alios morbos, præſertim aſthma convulſivum, nec non colicam convulſivam, eryſipelate ſuperſerviente, fuiſſe feliciter ſublata.

## §. XI.

Sed ubi eryſipelas magnum, profundum, ſucci corporis emanentius impuri, pars exquiſitoria ſenſus, peticulo, uſi ſupra paſſim dictum, non vacat. Aut etiam rubor livorem & nigredinem induit, ac brevi in ſphacellum tranſiſ ſunelum, aut inflammatio diſcuti renuit, ſuppuratur, ac ulcera mali moris, ſiſtulas & gangramam inducit. Minimum in ſanguineo-phlegmaticis & cacochymicis poſt eryſipelas remanet ingens tumor pedis, ut tibia magnitudine tripla naturalem ſtatum excedat, & iſque tumor diſculter admodum abigatur. Qui autem hac morbo moriuntur, febres pereunt, quæ ut plurimum juncta eſt cum diſſiliata reſpiratione, interdum cum delirio, aliquando cum ſopore & intra ſeptimum plerumque diem catastrophe accidit lethalia.

## §. XII.

Male etiam cedit; quod perversa medicatione excipitur. Nam priſcum & verum *Hippocratis aph. 25. ſect. VI.* eſt dictum: quod ſi retropellatur, ſit perniciolum, quin ſunelum; id quod ſæpius incidit. Novi quoque poſt vomitorium & validum purgans reſceſſiſſe eryſipelas, inſequentem ventriculi inflammationem & morem. A venæ ſectiõe etiam ad interiora revocatum eſſe, & vagum poſtea cum longe majori incommodo factum fuiſſe, vidi. Obſervavi quoque, repulſo ab ipſa camphora cum minio & bolo cnuris eryſipelate, exceſſiſſe febreſcens intenſam, ſtomachi dolorem intolerandum, reſpirationem mire laborioſam, vomitum bilioſum, virium languorem, appetuſque proſtrationem, nec prius conquieſciſſe hæc pathemata, quam datis antiſpalmodicis leniterque diaphoreticis, & te vocato ad priſtinam ſedem per veſicatorium eryſipelate. De capitis eryſipelate repellentibus, frigidis, adſtringentibus, vel etiam nimis ſpirituofis, nec non camphoræ ſinimentis tractato, conſertum habeo, quod induxit vertiginem, aſſectus ſoporofos, anginam, phrenitidem, lingue paralyſin, quæ mala leniora, & ſcorbuticis haud raro fuerunt ſunelæ. Neque minus frigida, ſummaria, oleoſa, limmæ ſpirituofa, largiter camphorata, exterius admotæ, malum eryſipelatis evenum procurant, ac ut in ulcera mali moris, gangramam & ſphacellum degeneret, faciunt, uſi pluribus *Hildanus Cræ. I. obſ. 82. Moricben obſ. 11. pag. 245.* item *Timant à Guldendee lib. VI. caſ. XXXIII.* teſtatur.

## CURATIO.

## §. I.

Reſta eryſipelati medendi methodus tribus his

Reſta  
med. 170.

absolvitur indicationibus: I. ut motus iste febrilis naturæ nullo modo impediatur, sed potius si deficit, promovetur, si excedit, ad temperamen- tum reducatur; II. ut materia subitici caus- sica, nervosa paribus insidens temperetur, at- que ad se & excretionem præparetur; III. ut flas- ta lymphæ putridæ & causticæ inflammatoria in paribus externis discutiantur, & ad perfectam expulsionem traducantur.

## §. II.

*Præsidia  
prima.*

Inter ea præsidia, quæ motum febrilem natu- ræ quodam modo languentem excitant & pro- movent, ex classicis remediis laudem omnino meretur mixtura simplex, quando cum spiritu niri dulci, aut melius adhuc liquore nostro ano- dino minerali, miscetur; vel si essentia scordii, aut pimpinellæ albae, non adeo spirituiosa & con- centrata, cum tantundem liquoris anodini no- stri confunditur & ad viginti, vel triginta guttas porrigitur. Juvat quoque expulsionem insusum theiforme ex herba scordii, floribus sambuci & semine feniculi compositum, nec non ex tempe- ratoribus pulvis bezoardicus noster, aut Ludo- vicianus. Motus spasmodice excedentes modera- tur emulsio, ex aqua florum sambuci, tilie, aca- cie cum seminibus quatuor frigidis majoribus, nec non feminis napi, præsertim si loco vehiculi usurpetur, cum quo pulvis noster bezoardicus, vel solus, vel cum aliquot niri & cinnabaris gra- nis, assumatur. Idem facit, simul atque expulsi- onem sustinet mixtura ex una spiri- tu scordii Bullii & tribus liquoris nostri anodini partibus. Ubi vero motus legitimi, nec nimii, nec deficientis præstet, utilisimum omnino domesticum illud remedium, ex rob sambuci uncia, cornu cervi ulsi drachma, ex aqua florum sambuci sumum, cui ego in calidioribus cum fructu adjicere soleo decem, vel duodecim niri puri grana.

## §. III.

*Secunda  
& tertia  
indicatio-  
nes.*

Ad demulcendum humorum acrimoniam ma- teriamque recte præparandam, præter jam dicta, spectare sunt virtutis decocta loco potus ordi- narii summa, ex rasura cornu cervi, radice scor- zoneræ, altheæ, liquiritiæ & chinæ cum semine feniculi, item decoctum avenaceum. Discussio stasos inflammatorie, per externa perficienda. Sed nil fere ex his sine periculo adhiberi potest ac debet, quam pulvis ex floribus sambuci & radice liquiritiæ, relictis omnibus unctuosus, spi- rituosus, terreis, adstringentibus, saturantibus, sub temperato calore lecti & hypocausti, subinde insperietur.

CAUTELÆ ET OBSERVATIONES  
PRACTICÆ.

## §. I.

*Regimen  
sit temper-  
atum die-  
tæ.*

Perpetua in prædictis est regula: in acutis & exanthematicis febribus, corpus semper in blanda & continua diaphoresi esse servandum, quo sanguinis aequalis ad superficiem corporis fiat & maneat motus, ac cum hoc excrementitia mate- ria jugiter adfecta diffusetur. Hinc merito etiam idem in erysipelate tenendum, cum quoad totum corpus, tum maxime quoad partem affectam, quo & dolores mitigantur, & discussio egregie promovetur.

*Frid. Hofmanni Oper. Tom. II.*

## §. II.

In externorum usu cautione opus est maxima, ne nocent & vel repellant, vel in ulcus conver- tantur erysipelas. Quin quum cuiusque fere corpo- ris peculiaris sit idiosyncrasia, sive specifica quædam & individualis sensibilitas, quæ quam ma- xime in cute, seu parte nervosa, viget: hanc etiam ob causam in viciis cutis eo majori cum cir- cumspeditione topica admovenda, quia non om- nia sunt omnia. Observavi etiam sepius in mammarum erysipelate, admo- to innoxio, & in aliis vel centies probato emplastro, brevi tem- pore auctum potius fuisse cum dolore inflammatio- nem, quæ, temere emplastro, illico remisit. Hinc tutissimum nihil applicare, nisi forsitan species pa- regorgias, ex floribus chamomille, sambuci, meliloti, radice liquiritiæ, farina fabarum, in forma sacculi, vel pulveris.

## §. III.

Quod si adhibitis licet efficacibus internis & externis discutientibus, erysipelaceus tumor ta- men manet, rubor livescere incipit, dolor pro- fundus hæret, & ad periculum pertingere vi- detur, ad ulcerationem tendit erysipelas. Tum igitur transeundum ad ea, quæ suppurationem promovent, ita tamen ut simul corruptio- nem putredinose occurrant. Hunc in finem utilisimum emplastrum diachylon simplex, sine confectum, adjecta sufficienti quantitate camphoræ & croci, vel etiam emplastrum Barbette utrinumque iapo- natum, superpositis epithematis balsamicis, quæ corruptionem arceat. Quando his pus con- tractum & profundius hæret, aperientius tumor lancetta & pus succellive, non simul & semel, evocandum. Ne autem in glandulosis maxime locis abscessus in hilulosa & mali moris ulcera transeat, post materiæ secessionem, injiciendus liquor balsamicus, ex tinctura florum hyperici, essentia balsami Peruviani, myrrha electa & ali- quot guttulis spiritus terebinthinae.

## §. IV.

Quando erysipelas nimis profundum & mag- num, sphaceum, ex colore in bruno rubicundum vergente & symptomatum post expulsionem per- duratione, cognoscendum, minatur, præter in- terna inflammationi & putredini resistenda, ni- trum maxime cum momento camphoræ, exter- ne spirituiosa & roborantia, consuecenda ex aqua calce vivæ, spiritu vini camphorato, aceto vini cum lythargio, admixta quoque essentia scor- dii & myrtus, crebrius calide cum linca dupli- catis applicanda.

## §. V.

Sanguinis missio in erysipelate quandoque no- xia, quandoque utilis. Ne igitur delinquat arti- fex, tenendum: si invadit erysipelacea febris ple- thoricos, potibus spirituosius allectos, primis la- tium diebus versa in brachio peragenda. Sic enim liberior fit sanguinis progressus, & expul- sio materiæ ad cutem promovetur. Tanto vero magis utile id est, si caput penis erysipelas, tum- que gravis hoc auxilio tractandus symptoma- ta. Consultum quoque est interdum loco venæ sectionis, cucurbitulis cum scarificatione in cer- vice uti. Semper tamen post sanguinis subtra- ctionem curandum, ut exsiccatus & aequalis ma- neat perspirationis succellus.

I 3

§. VI.

## §. VI.

*Uter uti-  
um iust-  
um iust-  
um.*

In erysipellate scorbutico, quod diu desinet, in ulum vocanda sanguinem depurante & leniter laxante, cum diaphoreticis, iam quidem, ut per aliquod dies alvina regio expurgetur, dein per aliquot tempus subijungatur diuretica ac diaphoretica, idque alternatim aliquoties repetatur, simulque pro poro ordinario decoctum temperans ex lignis & radicibus mucilaginosas, cum amaris, præsertim cum radice cichorei, taraxaci & passilis, bibatur.

## §. VII.

*Residuum  
quibus ex-  
audetur.*

Quod sipe recurrit erysipelas, non sine periculo est. Hinc eo annuendum medico, ut corpus ab hoc malo vindicet. Ad quod obtinendum ego quidem nihil efficacius deprehendi, quam debitum, sub congruo regimine & victu, præparato prius, sive per laxantia, sive sanguinis nullum, corpore, institutum aquarum mineralium ulum; eoque nomine præ reliquis laudem meretur, acidula Egranæ, thermæ Emfenes, nec non Carolinæ matiores. His autem deficientibus, venæ sectio, vere de aummo præsertim, purgationes per epiorasin & ea quæ sanguini repurgando servant, cum exacto in vita victuque moderamine, operam locant commodissimam.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Erysipelas  
mucosum.*

Vir triginta annorum, pallidus facie & viæ fedentariæ adfectus, gravi terrore ex oborto improviso incendio fuerat percussus, ac per integrum postea diem sub celo humido & pluvioso degenerat. Die post ingens horror per horæ spatium totum concussit corpus, sequens calor intensus, cum dolore tensivo ac pungente in inguine, lassitudine, impotentia dextrum pedem movendi, conatu vomendi & somno inquieto. Tercio post invasionem die rubicundus & ardens tumor dextrum pedem occupavit. Adhibita hinc varia pægorica externa parabolica & domestica, interne vero nihil præter copiosum & frigidum sub calore potum, dandum. Cessavit tandem tumor & dolor pedis, sed collectus albus ingens in malleolo tumor, cum ardore, tensione, rubore & pulsatione. Applicata iterum externe varia emplastra & linimenta spiritiosa, at incassum. Hinc in suppurationem tendit. Ad quam promovendam, admotum cataplasma emollientia. Succellit etiam suppuratio, sed stipata febre & atroci circa partem affectam dolore. Aperius demum abscessus & rite ballastici mundatus fuit & tractatus, ut omnia bene cedere viderentur. At quam ex improviso ira corripitur, die post denovo ipsum incellit horror, intensus per totum corpus ardor, ac aboritur in genu sinistro infra flexuram tumor, nulla arte discutiendus. Adhuc simul febris, vigilia perpetua & inappetentia, æger ob tumoris molem ac dolorem nec pedem extendere, nec eo in latere decumbere poterat. Tandem succellit suppuratio, sed generans in femore abscessus, qui ingentem puris copiam ex cavo quod sibi in mulcula supra posita fecerat, fuisset, ægro interim penitus constabescente. Nihil minus tamen injectionibus, variis emplastris, externe & interne congruis sanguinem depurantibus adhibitis, æger sanatus restituitur.

## Epicrisis.

Cachecticus corporibus frequens malum est erysipelas, neque in his tam facile discutitur ac in sanguineis & cholemicis. Ob profundionem enim & firmiorem tubulorum obstructionem stricte viscossitatem, vel in abscessum, vel si incautus confringentibus, frigidis & quæ ionum partium deservant, tractantur, in sphacellum degenerat. Terror autem vehemens ad interiora, cor nempe & pulmones, pelliculis sanguinis, eodemque inde follicula iterum repulso, febris fulciatur, viscidus humores cum impetu minimis valulis impelli hærentes & inflammationem faciunt, idque facile accidit in pedibus, per quos sanguinis circulus iam tum diffusibilis. In hoc quidem erysipelas gravioribus stuporem fuit symptomatibus, ob perterritas, quæ occupavit, valde nervosas ac tendinosas, quarum irritatio de molesta affectio, ut semper cum exquisitione doloris sensu juncta, ita febrem, anxietatem, inquietudinem aliaque peperit utique. In his igitur paribus summa semper in usu topiorum cautione opus est, nec nimis calida, nec activiora, nec spiritiosa aut emplastra admovenda; sed potius demulcentia cum diaphoreticis ac nervinis, quo impediatur suppuratio, ex qua ulcera difficultatè sanabilia emergunt.

## OBSERVATIO II.

Vir sexaginta & octo annorum, carnosus & habitior, fluxui hæmorrhoidali ante obtundus, iam à biennio eodem carens, ciborum tam en appetentia, temperata humida & calida fecerat iter, & ira communis largum spiritum vini haustum ingurgitavit. Vespere domum rediit correptus est horrore cum vomitu, quem excepit intensissimus calor, caput occupans, somnum turbans, mensuræ alienationem inducens. Die post ingens in inguine tumor & ardorem sensit, ac tertio die dolor, rubor & ardor totum femur cum tibia occupavit. Inde remiserunt quidem priora symptomata, pulsus tamen mansit celer, & æger insuperabili sopore oppressus jacuit. Medicus accitus interius porrexit tincturam volanlem bezoardicam, naribus admovit spiritum salis ammoniaci, & loco affecto applicuit cataplasma ex aqua florum sambuci, aceto, lithargyrio, myrrha & bolo. Sed sopor discuti non sinit, quin adactus potius, ut plane non excitari possit æger. Sexto quique die color pedis rubens in brunum & nigrum conversus, facies cum rubore innotuit, venerat à prima stasim invasione oclusus, injectos quinque chylitres sine operatione reddidit, die octavo accessit difficilis respiratio, & post hanc letum.

## Epicrisis.

In senibus & plethoricis erysipelacea febris multum alit periculum. In nostro delirium secundo stasim die indicavit congectionem sanguinis & quidem impuri ad caput, quæ postea etiam gravi soporis exultavit causa. Medicus vero perperam egit, quod nec primo stasim die venam scire, nec alvum subducere iussit, sed potius interne & externe volatilia sanguinem magis exaltantia adhibuit. Male etiam pari affectu imposuit adstringentia, quibus discusso & exhalatio non modo impedita, sed etiam stasim obfirmata, & sanguis repressus ad caput vergit, præsertim quam inflexionum tunica etiam essent ducta & alvus ob-

obferata, poſtea tamen decubuit quoque ſanguis a peſtus, & ob difficilem per pulmonos curſum, anthoſolum ſpirum & mortem demum induxit.

## OBSERVATIO III.

*Eryſipelas  
ſuper  
membrum  
inferius  
ſcapulae*

Fœminam novi triginta annorum, proceram, teneram ac bilioſam, quæ per aliquot annos alvum ſegniorem & crebriorem iram fuerat experta. Hanc initianter autumnum, ſub æquilonia tempeſtate prehendit eryſipelas in manu ſiniſtra, cum digitorum tumore ac rubore. Applicata topica varia & inter alia albumen ovi cum alumine conquaſſarum. Depuſſum etiam malum, ſed brevi poſt rediit idem, non vero priſtiniſ ordine volus remedii. Tumor quædam cum rubore diſcuſſus, dolor autem lancinantiſ, cum formationis ſenſu in digitis quoque articulis ſua perſiſtit, quàm ſubſectum ſuam laudabili crebriorique animi commotione increvit quotidie. Rupit tandem tumor ploſavit inanciam ichoroſam acrem, cuncti paſſim erodentem, & ulcus enarum dolens & juriens, noctu præſentem. Licet etiam varia externa & interna ſanguinem depurantiſ adhiberentur, ſuccrevit tamen aliis dolorificis glanduloſis in junctura brachii tumor, qui ad digitorum apices radium quaſi vibrabat, ſive lineam rubicundam, cum inſenſibiliſ cruciatu. Sumiſ poſtea malum magis vires, digitis innumeraſ, apertis tandem, excrevit caro copioſe ſpongioſa & ichor ſætidus rodens extititavit, appetitu & viribus ſimul proſtratis ſummoque deſiciente. Admoverant chirurgi imperiti, aſſectæ parvi valde acris, calida, decoctum ex vino, cum ſpiritu vini camphoratum, ballamo ſulphuris & oleo tartari ſcindo; ſimulque interius decocta lignorum & pilulas purgantes mercuriales liberali manu dederant, ſed fruſtra. Applicarunt poſtea linimentum ex vino, myrrha, thure, ceraſſa, herba chelidonii, floribuſque ſambuci, qui aliquid cretæruſ præcipit admixtum, quo acris deſluxio intra binas hebdomades ſubſiſtit. Tumor quoque in junctura ſua cum ſpiritu vini camphorato, cui ballamum ſulphuris admixtum, diſcuſſum. Sed non ita multo poſt fœmina inſignem vitium incurrit languorem, plenarium appetitus deſectionem, facile animo deſecit, & ob id ſupina in lecto jacuit, crebrius præterea doloribus in manu, dorſo ac pedibus, nec non ventris torminibus aſſicta, pulſus quoque juſto ſuit languidior, cuſque mox frigore, mox volatilo æſtu perſeda. Ego in conſilium vocatus, pulverem ex lapidum cancrozum, animonii diaphoretici ana drachma, natri depurati, acani duplicati ana drachma dimidia, cinnabaris uſuſe grana XV. in octo doſes diviſum, bis quotidie dedi. Pro potu ordinario ſuaſi decoctum ex radicibus, temperantibus, & juſſi, ut mane in theſauri infuſo ſummet quinquaginta guttas mixturæ ex liquoris noſtri baſilicæ uncia dimidia, eſſentiæ croci, liquoris noſtri anodynii ana drachma. Conſilium quoque dedi ut ſubinde pilulis noſtris uteretur, & aſſectio brachio inſuri permitteret fonticulum. Quibus per tres hebdomades uſuſque, exſpirarunt ſenſim atrocia pathemata, appetitus rediit, formæ factus quietior, dolor remiſiſ, & vires cum ſanitate reſtituæ.

*Epiſiſt.*

Gravia varia & inſolita pathemata ex impuriſ ſeorbutica, ſive ſeri acris biliſi redundantia, ſi in partem extremam tendinoſas & nervas cri-

tico quaſi moni amandanæ, ſuſſulare, uberiſ certe hæc docet hiſtoria. Peſticulorum tritum in epſimodi caſibus topicorum uſu inſiſtere, quorum non alia viſ, quam ut ſonum partis aſſectæ varia modis deſtruat, materiam a ſanguine ſeparatam vel ad interiora pellant, vel aqua diſſolutionem impediunt, & ſaſin ſumorem faciunt; ut ſymptomata non poſſint non aut magis ſuccedere, aut diutius aſſigere. Longe tutior & ſacior hiſce malis medendi ratio eſt, ſi ſanitas dyſcracia humorum emendatur, materie acris aſſluxus divertitur eademque per alia emunctoria, cutem, urinam, aut alvum, excluditur.

## OBSERVATIO IV.

Fœmina generoſa, triginta aliquot annorum, ſanguinea, ſpongioſa & carnoſa, poſtquam valens aetate & menſtruum purgationem etiam recte experta, venarum interſectura ante & poſt ſolis occidum, ſub celo, rubilo, autumnali, pluſioſo, & corpus ob id non levis perſerperaverat, brevi poſt ſubito correpta eſt ingenti horrore, quem excepit artus mordax cum inquitidine de ætate die eryſipelas in crura. Brevis hæc depuſſum, ne aſcin reſerret, medicus ortum eſus ex ſanguinis plenitudine arteſſe uſ, ſuaſi, ut à pedis vena emitteretur ſanguis largiret. Sed quum ægra Octobre perſerperationem inſueneret, rediit idem malum, & longius quam prius perſiſtit. Medicus igitur vulgari jam hypotheſi, omnium morborum cauſam plethoram eſſe, adductus, eandem hæc etiam ſubſelle oſtinatus eſt, eaque propter ruſſia venam ſecari juſſiſ, largiterque extraxit ſanguinem; niſiſ tamen ſecus poſt binas hebdomades denovo inſiſſavit eryſipelas eundem locum. Licet etiam poſtea pulveres abſorbentes cum nitro, ſcarificationes & inſuſum laxans in uſum vocaret, quibus tamen nihil aliud eſſecit, quam ut binis quatuorſ menſibus eryſipelas recrud ſiceret, pedis aſcin aſſicti tumor & imbecillitas perſiſſeret ſemper. Demum ego in conſilium vocatus, commendavi Carolinarum internum & externum uſum, cum exacto in via vitæque moderamine & abſtinentia ab acidiis, dulcibus, fruſtibusque horis, quibus mære aetate deſectata, inſuſiſ quoque frequentem uſum elixiri noſtri baſilicæ, ex amaris extractis, corticibus citri & ſile tartari cum vino Hiſpanico conſectis, ſanguinis autem miſſionem interdixi. Inde eryſipelas primum depuſſum, ſuſſequenti vero doloris ſtigmatiſ, per aliquot hebdomades aſſigentes, qui tamen reſpecto inſequenti anno Carolinarum uſu, etiam poſſis abactis, & ægra perſectam recuperavit ſanitatem.

*Epiſiſt.*

Perperam omnino hæc à Medico ad recidivam accendat commendata ſanguinis miſſio eaque reſecta. In noſtra enim nataſ eryſipelas ex perſpiratione ſuppreſſa, eaque propter hæc magis adhuc ſanguinis miſſione immunita, non potuit non impuriorum ſuccorum copia exſerere, quæ per eryſipelas ſingulari naturæ vigore expulſa. Recidivæ autem frequentiores, quum de ſanguinis impuritate teſſentur, hæc vero de viſcerum maximeque hepatis vitio; ego certe aciculurum, vel thermarum, ad ſanguinem purificandum & viſcera expedienda, & elixirorum baſilicorum, quæ viſceribus & ſuccis ſpirituſcentiam reddunt uſu, præſtantiſ novi inſuſ.

## OBSERVATIO V.

*Erysipelas  
scorbu-  
ticum saepe  
insidens.*

Novi in Westphalia virum hexagenarium generosum, macilentum, sanguineo-melancholicum, qui delectatus carnibus & piscibus salinis ac infumatis, ab aliquot jam annis, ter vel quater quonannis, in pede sinistro, circa malleolum, passus fuerat erysipelas, quandoque exulceratum. Hic meum petit adversus hoc malum auxilium. Suasi igitur, ut inter malleolum & genu inureretur fomiculus, qui materiam à malleolo exquisitoria sensus parte ad tibiam traxit, intumui ab erysipellate & fomiculi & malleoli regione. Tum consilium dedi, ut loco ponas ordinarii acidulas Antonianas cum tertio vini parte biberet, à victu duriori abstineret & mane iuscula cum radice cichorei, apii & scorzonerae scorbilaret, & pedem debilem & tumidum fascia spirita vini camphorato madida ligaret arctius. His aliquandiu usurpatis, liber postea diu mansit ab erysipelatis incuria.

*Epicrisis.*

Westphalis ab victum durum & crassum semper sanguis spissus lentescens, qui è vena missus, eandem ac apud nos pleuriticorum, exhibet faciem, cum cuticula glutinosa. Hinc etiam ipsi admodum familiares inflammationes, maximeque erysipelas scorbuiticum. Adversus quod vero optime sese munium tempestiva sanguinis missione, poti ipsi frequentissimo feri lactis & vere usu insali laxantis & resolventis ex vino. Pedes autem, quia lentior in ipsis sanguinis adfusus, perspiratio quoque languidior, ob id maxime de ordematosis & erysipelaceis tumoribus sunt obnoxii.

## OBSERVATIO VI.

*Exantema  
purpureum  
scorbu-  
ticum.*

Professor celeberrimus, quinquaginta aliquot annorum, purpura scorbuitica crebrius afflictus, post corporis intensam refrigerationem, corripiebatur subito languore virium, inquietudine, somni appetitusque defectu, horripilatione, aestu, cui juncta quaedam mentis turbatio. Durabant hæc per tres fere dies, quibus elapsis, nocte antecedenti sensus intolerandum plane ardorem in præ-

cordiali regione, ad dorsum usque excurrentem, mane autem inspecto loco dolente, insolentum comparuit exanthema, rubicunda nempe area, ex præcordiis ad dorsum cinguli infra extensa, cui insidebant confertim pustule parum albe, parum rubre nigrescentes. Inde quidem symptomata remiserunt, excepto exquisito ardente dolore, qui tamen erat, ut nec somnum capere, nec locum affectum contingere posset. Medici quorum consilio utebatur, quid hoc rei, nesciebant, & purpuræ peculiare genus, aut scorbuiticum quoddam exanthema esse volebant; ego vero illico cognovi peiorem erysipelatis speciem, & interne diaphoretica temperata & externe in fine oleum ovorum adhibui, quibus aliquandiu usurpatis, intra quatuordecim dies, dolor conquievit, pustulae anuerunt, cuticula aspera facta, fissa & deliquamata.

*Epicrisis.*

Est hic affectus ex rarioribus, paucis visus, plurimis incognitus. Solus fere ex veteribus est *Plinius*, qui eundem sub nomine *Zoster* meminit. Quam periculosus autem sit binis exemplis confirmat *Joannes Langius epis.* p. 110. uno Marchionis Georgii in Ostespachio, qui eodem ex ulcere crucis à chirurgo intempestive consolidato interit, altero Comitis Palatini Ottonici, qui à lumbis ad genua usque hoc exanthemate circumdatus, febre simul ad delirium usque æstuans, incisa tamen utriusque pedis vena adhibitisque, quæ febrem relaxaverunt, à morte adhuc vindicatus. Idem etiam cum hoc esse videtur affectus, quem *Tulpius lib. III. cap. XLIV. observ. medicinal.* sub nomine exedentis præcordiorum herpetis describit, in viro pleni habitus & calidi jecinis, qui vehementer circa præcordia doluit, cum acri pruritu, insigni dolore & frequentibus pustularum conglomeratarum circulis, primum rubris, mox albicansibus & comparente in qualibet earum crusta nigra, qua convenienti lina separata, quælibet degeneravit in humidum ulcusculum, cum acri dolore, sudore effuso & interdum tam imperioso virulentæ materiæ raptu ad interiora, ut animus non secus aliquoties deficeret, ac si ipsum occupasset contagiosa aliqua pestilentia.





## S E C T I O II.

## D E

FEBRIBUS ACUTIS INFLAMMATORIIS,  
item lentis putridis Hecticis, nec non Symptomaticis.

## C A P U T I.

*De Febribus Inflammatoriis in genere,  
speciatim de Febre acuta sanguinea,  
græcis synocha.*

## THESES PATHOLOGICÆ.

## § I.

*Inflamma-  
toria fe-  
brilis.*



Tut irritatio generis nervosi spallica per omnes solidas nervæ corporis partes, proximam causam confluat omnis motus febrilis, qui horrore & velociore contractione cordis & arteriarum abfolvitur; pro diverfa tamen indole & actione materie genus nervosum præter naturam afficiens, diverfa emergit febris species, distinctis phenomenis, effectibus & symptomatibus scilicet prodens, ita quidem, ut si stimulus fit ab humore acro, putrido, seu corrupto, quem veteres vocant ichorem, exanthemæ plus minus malignæ excludantur, ubi vero sanguis, vel alius humor præter naturæ consuetudinem alicubi congestus nervosusque membranas tendit impensius, cum dolore ac premit, inflammatorie acutæ, sine exanthematibus, laboriantur.

## § II.

*Differt  
qui ad in-  
ca-*

Jam quidem omnis continua febris inflammatorum quid, sive a qualitate prava acri causifica, sive a quantitate nimia molesta, humoris cujusdam, aliter autem proprie inflammatoria febris dicitur illa, cujus causa est emittens vasculorum, secundum naturam non sanguinem, sed reus liquidum venensium, à sanguine oppletio atque distensio. Hoc autem evenit vel in pluribus partibus simul, vel in una tantum. Hinc febres inflammatorie vel universales, vel particulares. Ex illis hæc, quando omnes fere sensu & motu instructæ corporis partes, maximeque nervoso membranaceæ, leviori inflammatione afficte, quod accidit in synocha. Hæc vero sunt, quando uni tantum certe parti insident, à qua etiam in scholis medicorum variam sortiuntur denominationem, adeo, ut si meningis tangat inflammatoria, febris audiatur phrenetica; si fauces, angina; si pleuram, pleuritica; si pulmones, peripneumonia; si ventriculum, stomachica; si duodenum & biliares ductus, ardens & biliosa; si ileon, iliaca, si renes, nephritica; si mesenterium, mesenterica, si vesicam, vesicalis; si uterum, uterina; si

intestinum rectum, hæmorrhoidaria. Deinceps inter febres inflammatorias aliæ sunt idiopathice primarium morbum efficiences, aliæ symptomaticæ, sive secundariæ, quæ sequuntur alium morbum, sed pessimo plerumque de lethali eventu, ut maxime de febris continuis constat, qui ut plurimum inflammatione in splanchnum abeunt necant. Jam de singulis sermum.

## § III.

Synocha igitur, sive sanguinea febris, est acuta, continua, succitata à sanguine in partibus maxime nervoso membranosis omnium congesto, qui, nisi opportune naturæ & artis beneficio discutatur, inflammationem inducit lethalem.

*Synocha  
descripta.*

## § IV.

Corripit hæc frequenter plethoricos & succulentos, temperamento sanguineos & sanguineo-cholericos, ætate juvenes ac viros, sanguinis evacuationibus assuetos, idque quovis anni tempore, potissimum tamen vere & æstate. Indicia autem ipsius & signa, quibus ab aliis acutis & inflammatoriis febrilibus discernitur, hæc redeunt. Invadit hæc cum vix notabili horripilatione & leni admodum frigoris sensu, in aliis autem gravis est horror & longius extrahitur frigus. Aliæ mitius primum accedunt sensimque increbescunt, donec ad flatum & vigorem perveniunt, sed hæc cum gravissimis statim adoriuntur pathematibus. In aliis certis temporibus notabilis observatur symptomatum remissio, quæ in synocha rara, vel nulla, ut potius eadem quam sub accessione vehementia usque ad criticum tempus insistant, eaque propter haud incongrue à quibusdam non continetur, sed continetur, vocantur. In malignis ab initio pulsus parvus, debilis & contractus, in hac magnus & plenus. In synocha hinc in principio absolute necessaria sanguinis missio; quam aliæ continue sæpe non ferunt.

*Indicia  
de diffi-  
ren-  
cia.*

## § V.

Causam hujus febris proximam præbet diffusio sanguinis in partibus ac viceribus internis congestio atque stagnatio. Quam in corporibus, calido sanguine, ex potius spirituosorum largo usu, corporis exaltatione, animique exaltatione, plenis, ex facili inducit potus ingurgians frigidior, corporis extremorumque refrigeratio & perfratio quæcumque ex causa prohibita. Sic enim tubulis de potu in externa superficie contrictis, sanguis cum impetu plus iusto urgeatur ad interiora, ibique congestus, moleste afficit nervosorum & fibrosorum partium systema, ex quo symptomatum origo oritur. Nimirum si ad caput vergit impetus ibique colligitur

*Causa de  
inde pon-  
dencia  
symptom-*

sanguis, facies turgescit; oculi rubent & lacrymas plorant, caput dolet, arterie pulsant temporales, vertigo adest, sopor, torpor, vel plane mentis alienatio. Quando cordis ventriculi & vasa pulmonalia à sanguine impetuosiùs irrunt nimium distenduntur, essentiale illud omnium febrium symptoma, respiratio difficilis & crebra, pectoris angustia & anxietas cordisque palpitatio accidunt, iuncta simul sæpe virium corporis animique deiectione. In oesophago levior inflammatio & spastica glandularum fauciumque strictura facit sitim, ariditatem & lingue nigritiem, præsertim si in corpus biliosum, calidum, post statim incidit, tumque vulgo vocatur febris ardens *dartige Fieber*. In ventriculo inflammatoria congestio gignit nauseam, vomendi conatum, quandoque singultum; in intestinorum volumine, inflammationes malum graviter exacerbantes, alvi adstrictionem, vel excrementorum foetidorum ejectionem; in mæstacra arteria & venæ portæ vasis, dolorem fixum circa primam lumborum vertebra; in membranis spinalis medullæ, decubitus infusum, membrorum pactionem, torporem & languorem artuum, quandoque etiam convulsiones.

## §. VI.

*Simplex vel  
purida §.*

Noque tamen hæc symptomata astant in omnibus omnia, neque vehementia ubique instant eadem. Hinc in simplici a medicis distinguitur synocha, & putrida, sive maligna. Illa sæpe à sola sanguinis boni extra locum & vias sue congestione suscitatur, minor, hinc brevi duratur, nec adeo periculosa. Ubi vero cadit in corpora impuris fœcis plena, viribus a morbo præcedenti, daturum animi angore, tumia venere & inordinata victus ratione exhausta, graviora longæ prælio sunt pathemata, cum virium prostratione, morbus iple diutius ad decimum quartum, vel vigesimum profectus primùm trahitur, & quandoque exanthemata, maculæ fusæ vel nigre, excluduntur, non sine præsentis periculo. Datur præterea synocha epidemica; sed quæ plerumque cum febre catarrhali iungitur & autumno maxime ac hyeme infestat. Hæc in principio non alia, quam synocha fuerit symptomatibus adortur, maxime homines sanguine & humoribus plenos, postea vero, si bene tractatur, post diem quartum prode manifestis signis catarrhalis, per longum adhuc durans tempus, & quæ per noctem usque ad diluculum calore præternaturali, nec non catarrhosis à capite deflexionibus, coryza, nussicca & humida infestat, donec tandem discedat.

## §. VII.

*§. VIII.*

Solvitur morbus, si causa non adeo vehemens, solius sæpe bene valentis naturæ beneficio, sua sponte, de quarto, septimo vel undecimo, ordinariæ largi sudore, vel secus ac in aliis acutis, optime per liberale naturum stillicidium, vel etiam, rarius tamen, ac nonnulli ubi maligni quippiam complicatum, per alvi fluxum. Quando etiam hæc febris in principio statim, primo, secundo & tertio die, recte tractatur, sanguinis missione & subijunctis refrigerantibus, blandique diaphoreticis, quarto sæpe die exoptata fit solutio. Si vero omittitur, vel detrahatur venæ sectio, febrem ad decimum quartum, quin decimum septimum diem protraham vidi, persistens gravioribus symptomatibus ipsoque delirio, tandem vero naturæ beneficio, vel per sudorem, vel per alvum fuisse solutam. Sed quibus letalis est, à

pereunt plerumque inflammatione meningum, vel etiam aliarum partium, ut ventriculi & intestinorum sphacelosa, quam uberius restatam facit cadaverum inspeccio, in quibus præterea ob sanguinem copiosum cito in foetidam puritatem abeuntem, illico adclit insolens tumor & fetor intolerandus.

## CURATIO.

## §. I.

In medicatione febris synochæ perito artifice agenda hæc: I. ut partes vitales à nimium congesto sanguine liberentur, sique vel levior in eis inflammatio dispellatur, vel gravior impediatur; II. ut sanguinis exarbitrio simulque systematis nervorum spastica affectio componatur; III. ut illud quod flagrat & corruptum est, discutiatur & liber sanguinis circuitus, maxime ad corporis superficiem, restituantur.

*Indicatio  
medicamentorum  
§.*

## §. II.

Quo igitur vasa interiora in visceribus, corde maxime & pulmonibus, à nimium congesto & stagnante sanguine liberentur, vena tempelive perturbanda & sanguis sufficienti quantitate emittendus. Quod quo pacto sit faciendum dicitur in cautela. Deinceps ut impetuosi ille sanguinis succorumque orgasmus, vasorum, quam facit, distensione nervosæ partes irritat ad contractionem, sedetur, ex usu sunt aqua, diluentia, acida, item nitrosa. Ecce certe si in illo morbo, sine synocha, quam maxime conducit frigida potus aliaque refrigerantia, ex aceto succoque fructuum acidulorum, citri, limonum, ribum. Commendantur hæc communi suffragio veteres, cui accedunt recentiores omnes. Ego quidem experientie virtutis hanc habeo potionem: recipe aquæ fontanæ mensuram, aquæ rosarum, sacchari albi ana unciam, succi citri tantundem, vel loco hujus spiritus vitrioli guttas XX. *Reveris in præf. cap. de Synch. pag. 37.* laudat pulverem, ex sacchari uncis quatuor, salis prunellæ uncia, eundemque in sufficienti quantitate aquæ assumere, cui, si firis impetum urget, spiritum vitrioli infundere, suadet. Nobilis etiam demulcentes & refrigerante virtute gelatinæ liquidior cornu cervi, cum saccharo, succo citri & aqua rosarum confecta. Potissimum tamen profusa loco potus ordinarij usurpanda, serum lactis ex lacte cocto cum succo citri coactum, vel nostra methodo dulce, & cum succo citri, aut spiritum vitrioli acidularum, item psilane ex hordeo, rasura cornu cervi, scorzonera, cum succo & corticibus citri, nec non cerevisiæ leviores, imbutæ tinctura violarum, rosarum, papaveris rheados, parata cum aqua acetosella, spiritum vitrioli acuta, vel instillat omnium clysto antimonij sulphureo, de cujus præstabili virtute ita sentit *Baghivus opp. lib. I. pag. 50. non possum non, inquires, laudare eximias vires clysti antimonij, cujus subacida virtute febris nulla ex acris immitatione produlla aliisque ardentiores, tanquam in eo suffocantur.* Hæc acida quoque magno opere conducunt in synocha sic dicta putrida, seu maligna, quia omnium efficacissime putredinem resistunt, quæ non ab acido, sed alcalico volatili fovetur, quod acida destruant.

*Sanguis  
interiorum  
& organi  
non commoventur.*

## §. III.

Quæ liberentur sanguinis ad superficiem corporis

*Diaphoresis*

*si, seu  
danda.*

poris motum procurant, sunt uique blanda diaphoretica, pulveres scilicet vel bezoardici semperati, vel absorberentes, non nunquam soli, nonnunquam cum nitro, aut succo citri, assumendi. Idem faciunt infusa theiformia, ex herba veronica, scordii, aut cardui benedicti, cum semine feniculi, quae ingentius quando quando die morbus critico sudore solvitur, pulsusque quiescit cum somno redit, ad secundandam hanc salutarem excretionem, proficiunt.

## CAUSELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

### §. I.

*prodest  
sanguinis  
missio.*

In nulla febre, & veterum, & recentiorum omnium consensu, tam necessaria est sanguinis missio, quam in synocha, & quidem sufficiens atque matura. Recte enim monet *Trallianus lib. XII. pag. 668* conuenientes solerti tractari debere diligenter, præsertim quod sanguinis missionem spectat. Maximum enim incommodum esse, cum in omnibus morbis, tum in his delationem. *Nam febris pergit, vehementiores redduntur & vires imbecilliores, ut non amplius magna præstet curatio admissi possint. Hi vero indigent maxime, sanguinis missione, qui urinas habent rubras & turbatas, oculos rubros, intum corpus grave, venas latiores & earum teretes aperiores, calidioribus magna parte eibis, potibus, vino liberari & venæ carnibusque pinguibus uti.* Sed non imitandi veteres, præsertim *Galenus*, & qui preste hunc sectatus *Zacutus Lusitanus*, qui sanguinem ad animi usque deliquium mittere suadent. Mensuram potius sanguinis extrahendi medicus prudens ex ratione virium, ætatis, sexus & temperamenti, nec non pulsuum magnitudine venarumque amplitudine, dijudicare debet, ac ubi corpus firmum succisque plenum, præstat iterare altero die venæ sectionem, quam simul & semel nimium evocare, quo successively demta copia, perspiratio seruetur & diffusio sordium liberior reddatur. Neque pueri & adulescentes pleni sanguine hoc remedi genus detrectare debent. Qui autem penitus avertantur, his hirudines collo & mediane ipsi aliquando cum fructu admoventur iussu. Quando enim sanguis cum impetu ad caput fertur, & arteriæ in eis fortiter pulsant, faciet simul nimidia est cum oculis & rubicunda ac nares aliquot tantum guttas stillant, provocandum hilicidium, vel vetri *Ægyptiorum* more scarificatione narium, vel valida intrusione culmi straminei, quo delirium arceatur. Sed qui tali in casu venas sublinguales incidere jubent, minus securum consilium interponunt; eo quod inde aliquoties incompossibilem hæmorrhagiam abortam vidi.

### §. II.

*Refri-  
geria mi-  
nissima.*

Deinceps ex præstantissimis in synocha remediis sunt acida, refrigerantia & nitrofa. Ex ceræ in hisce auxiliis, prudenter ac circumspecte, ratione temporis ac mensuræ, pro diversa conditione corporis ægrotantis, usurpatis, præcipuum curationis momentum in synocha æque ac ardente consistit. De quo tamen infra plura dicemus. Id æquem singularis plane medico-practice observationis est, quod hæc, cum sola aqua temperate frigida, sufficiens quantitas pota, sudorem movent & somnum procurant.

### §. III.

Præstat porro in hac febre, simplex five sit, *Laxantia* five purgativa, alvum servare apertum. Sub febre quidem, non tam incernis, quam potius externis, glande, aut clystere molli, ex sero lactis, melle, oleo amygdalarum dulcium, pauillulo tiri & sale id periciendum, quo leniatur fibrarum intestinalium strictura & fluxus evocetur, qui intestini coli partem distendendo, anxietates faciat, & perspirationis successum perveniat. Declinans autem morbo & apparentibus coctionis signis in urina, ad exturbandas materias febrilis reliquias, aprime interna ex via sunt, inter quæ ego ingentius utile deprehendi laxantia ex mæna, cremore tartari, vel etiam cassia & rhubarbaro. Sed absque valida omnia purgantia, multo magis emetica: his enim, tactis jam levi inflammatione visceribus, ex facile inflammatio, inducitur funelia. Quin observavi, febre hac sanguinea laborantes, neque ferre posse pilulas alias benignas, quas, aloë, vel extractum ellobori ingrediantur, uti sunt *Becherianæ*, aloëphanginæ, marocotticæ & id genus plures.

### §. IV.

Ex iis quæ vitanda, sunt maxime omnia calida & spiritinosa, vinum, potus etiam nimis calidi largi, ut insulsum thee nec non regimen aliosum, ratione lecti & conclavis, quæ omnia sanguinem magis exaltant, acerbiora symptomata febre quæ diurno nocturno reddunt. Neque etiam synocha putrida, five maligna ferre potest essentias alexipharmacas, aut tincturam bezoardicam. Cavendum quoque à multitudine & varietate remediorum, quæ nunquam utilis, sed semper damnosa est, tanto magis, ubi partes nervosæ sensus exquisitorum, leviter inflammatae. Insuper autem fugienda sedulo omnes animi affectus, ira præsertim ac terror, quibus inflammatoria jam in intestinis præfens congeitio ingravescit, & inflammatio perfecta, quin ipso hæc, experientia teste inducitur.

### §. V.

Cæterum de morbi decursu atque eventu hæc adhuc monenda. Vidi ego in hac febre læpius in juvenili ætate ac temperamento sanguineo perennem somnolentiam, quæ tamen sine periculo fuit, admofo plantis pedum aceto, cum tale ammoniac & bacis juniperi, discussa. Delirium etiam frequenter vidi duratum, post neglectam in principio venæ sectionem, sed quando decimo quarto die sedimennum posuit urina, discellit demum & hoc sine damno. Neque enim unquam firma salutis spes, nisi coctio in urina compareret. Sed quando ex præpostera medicatione sanguinis missione neglecta, datus calidioribus & alvum diutius occlusa, febrî huic sanguineæ, ille acutior frequens nostro tempore locus, purpura, præsertim alba, accedit, pessimo id accidit omine. Neque minus pessimum & plerumque mortisrum est indicium, quando alvus diu cohibita, sponte miram quantitatem, secum biliosorum & corruptarum, simul & semel, juncitæ torminibus, profundit. Hoc enim sphyæceli intestinalium signum esse, ex defunctorum cadaveribus habeo compertum.

## ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

Adulescens annos habens octodecim, consti-

*Laxantia  
emeticum*

*non deest*

*Munda  
calida &  
aridæ effe-  
ctum.*

*Somnolen-  
tia & deli-  
rium non*

*del purpu-  
ra & deper-  
dit immen-  
sam puru-  
lentiam.*

*curatio  
liberalis.*

turione tener ac sanguineus, vultu floridus, laute vivens, delectatus maxime dulcibus, farinaceis, decocto chocoladae cum lacte & in prandio vinum Hunericum liberaliter bibens, verno tempore, post interitum, ex ambulatione per acclivia & declivia in seram noctem, corporis exaltationem, postera die corripiebatur horripilatione, ingenti aestu, inquietudine corporisque totius languore. Darum ipsi de venae sectione consilium, sed noluit admittere. Hinc dati tantum pulveres ex matris perlarum, lapidum cancrorum, ana drachma, niri puri drachma dimidia, cum succo citri ex aqua frigida sumendi. Loco ponus exhibitis polius ex hordeo, scorzonera & syrupo acrostatitis citri, alvus quoque chlystere emolliente soluta. Quibus factum, ut quarto liberalis prodiret sudor, pulsus quoad vehementiam & celeritatem sedatior micaret, urina sedimentum poneret & somnus rediret. Morbus igitur ex voto solutus visus. Quam vero aperi viribus nimium credens, dulcibus & lacticiis indulgeret, potens etiam Hungaricum vinum biberet, post septimum diem eandem rursum incurrit febrem. Sed gravioribus longe stipata erat symptomatibus, infirmia maxime atque delirio. Secta quidem d e post vena, sed sine emolumento. Aderant simul tormina ventris, & pauca biliola fecerant. Claster quoque infusus animi fere deliquium addidit. Quarto die accessit forte ex amicis noctem, qui aegro imprudenter dixit: apparere ex omnibus istum moriturum, praeparat igitur & ad discessum. His adolentia vix amantissima, marum exercitibus, virium inflexu animi & corporis ingenium expectat esse lapsum, & frustra usque parat omnibus, quae in priori morbo fuerant utilisima, septimo die vitam poluit.

#### *Epi. rijk.*

Nihil ad ingenerandam exuberantem sanguinis copiam valens dulcibus, bellariis, cum saccharo & ovis fixis, vinoque Hungarico dulci spirituosus. Arque adeo his etiam nihil aptius ad inducendas febres, quae sanguinis plenitudini debent natales. Ego certe plures novi juvenes literarum studiosos, qui delectari his dapibus & potibus spirituosos, accedente corporis refrigeratione, hanc incurserunt febrem. Omnes autem recidivae febrium, quarum fundamentum inflammatio, admodum periculose quam pleniusque captales. Quia enim corpus a priori morbo viribus exhaustum, maximeque partes, quae passae, tono adhuc privatae, ex facili iterum concipiunt inflammationem, quae primis non amplius obsecundat remediis. Accedit, quod ipsi aegrotantes recidivam ut plurimum parvi faciant, & ob id medicum serius in auxilium vocent, phar-macorum percelli sint, quorum operatio languente naturae vigore minus praeterca est efficax. Quare declinande summo studio recidivae, temperanter vivendum, corpus non nimis cibis, multo minus si in morborum potu aggravandum, nec motu aut animi affectibus exaltandum, ne sanguis urgeatur in vasa ipsius transita non dicata, ibique subsistat. Vitanda quoque refrigeratio & potius exquisitum servandum regimen. Quam facile enim hoc febris reperat cum vitae periculo, confirmatum habeo casu, qui novissime venit. Incidit, ut scilicet in synocham inflexu ingeniosus ferrarius eundemque graviter decubuerat, post quatuordecim tamen dies praeter expectationem ad iedie & videbatur, & amabat & appetebat. Sed quam

uxor, quo maritus cito vires reciperet & ad labores redire posset, ipsi apponeret carmen suillum assatum cum placentis, ipsiusque ut ederet tantum non cogetes, illico exceptis anxietas praecordiorum summa, difficilis spiratio & inenodum cum plenario virgine lapsu, ac post viginti quatuor horas interit. Et certe vix dici posset, quantum noceant cibi copiosi, viribus a morbo adhuc imbecillis. Quia enim ciborum moles in ventriculo languente digeri nequit, resolvitur in flatus, qui expandendo ventriculum & tendendo diaphragmatis velum, miras anxietates cum spiritu difficili faciunt. Hinc porro sanguis urgeatur ad dextrum cordis ventriculum, ita congestus systolem sufficientem ac in pulmones pulsus suffaminat, unde tam ipse cordis ventriculus, quam ob allatum per cavam semper sanguinem auricula dextra, plus jussu extenduntur, systole penitus interceptur & lethalis obrepat syncope. Etenim subitae moris, sive syncopis lethalis causam esse coagulatum & congruatum sanguinem in dextra cordis ejusque auriculae camera, ob deficientem robur ad contractionem, testatur utique uberior anatomico-practicae defunctorum sectio-nis.

#### OBSERVATIO II.

Virgo honoratissima virgine aliquot annorum, sanguinea, facie florida, laute vivens & liberalius paulo Rhenanum vinum bibens, solita semper erat ante aequinoctium vernale & autumnale sanguinis missionem admittere. Eo autem qui ipsi etiam, anno praeter morem calidum erat veris initium, ipsa tamen noluit discedere a consueto venae sectionis termino, sed tempus expleavit aequinoctiale & lunae decrementum. Accidit vero interea, ut ira commoveretur vensula haec & sanguine plena virgo, eoque propter absente matre & medico ordinario, post levem tunc inhaerentiam, darsi dolorem, aestum, anxietatem, inquietudinem, somniculose delectum incur-ret. Ipsa consilii inops, suavia cognovit ad bilem commotam evacuatam, summis pilulis, nostris *die gestibaffen Hints Pellen*, pilulis cephalicis acutae, quarum basis trochisci albandi. Inde quater quidem de jure, hic conquesta postea de dolore pressio & ardente sinistri hypochondrii. Quarto die accessit medicus, qui venari fecare iussit, sed sine levamine. Dedit quoque probatissima remedia, quo inflammationi ventriculi, quam singulus arguebat, occurreret, sed incal-sum. Accessit postea extoremor refrigeratio, mens turbata & septimo die placida moris. Post mortem mirum intumuit corpus, effluerunt ut papulae amplae in pedibus atque abdomine, & narius fluxit serum puridum sanguinolentum & totum corpus mox in foetidam puredinem ruit.

#### *Epi. rijk.*

Communis quidem sed valde damnosa passim regnat opinio, sanguinis missionem certis temporibus & sub certa aetate conjunctione esse influendam. Videas inprimis plurimos adeo superstitiosos, ut credant, non feliciter cessuram venae sectionem, nisi aliquot ante aequinoctium diebus & decrescens luna admittatur. Ego vero novi, plures & apoplexia, & febre sanguinea interitille, antequam praesentem hoc tempus attingerent. Nam necessitatis nulla lex, sed si sanguis redundans minatur periculum, mitemus, qu-

*Syncope  
iste mor-  
bus & de  
syncope  
non jussu  
laudat.*

quicumque sit dies, quodcumque tempus. Nostra formosa virgo perit inflammatione ventriculi & intestinorum gravi, quae uique opportuna sufficiens sanguinis subractione, danique congruus refrigerantibus, posuisset averti, alsumo vero acri purgante adaucta potius. Ut adeo pateat, morbum, alius non adeo periculosum, neglecto tempore commoventium remedium ulu & mala tractatione, brevi malignum fieri posse atque funestum nostrum. Illa vero corporis post mortem citra insensibilitatem, deformis color, putredo subito succedens & feri sanguinolenti effluxus, luculenter unque testantur facienti, à fucorum plenitudine morbum, & ab eorum putrefactione mortem, fuisse inductam.

## OBSERVATIO III.

*Spocha  
primae  
dies.* Degebat heic juvenis literarum studiosus, viginti quatuor annorum, sanguineus, succi plenus, vultu floridus, qui haemorrhagis narum antehac obnoxius & postea vene sectioni affluens, utramque vero evacuationem ab anno non erat expertus. Hic veno tempore in palestra gladiatoria vehementer incaluerat & postea in cellam concesserat, vinum potaturus. Postridie latitudinem sensit in corpore toto, quam excepit extremorum levior refrigeratio, ælius vero intensius, pulsus celer, præcordiorum anxietas, angustia spirandi & pectoris oppressio. Tertio die temporum arteriae valide pulsabant, caput intumuit, doluit, oculi prouberant, nox insomnis fuit, urina rufa, sine sedimento & delirare corpus. Hinc vena secta & minimum septem sanguinis uncie subtrache & data mixtura ex aquae florum sambuci, acacie, cerasorum nigrorum ana uncitis duabus, aceti destillati uncia dimidia, lapidum cancerorum drachma, neri puri granis XV. Syrupi papaveris erratici drachma duabus, de qua singulis binis horis quatuor sumit cochlearia. Quam etiam quarto die sanguis impetuosis ad caput ferretur, nec tamen haemorrhagia erumpit, ad discessionem fronti & temporibus sepius tepide admonum epithema hoc: recipe aceti rosici uncias duas, spiritus rosarum drachmas duas, camphoræ drachmam, olei ligni rhodii guttas XXIV. Ad sitim salientem æsthumque extinguendum tinctura florum cordialium cum spiritu neri dulci parata, cerevisiae tenui pro potu infusata; alvus præterea per aliquot dies clausa, & clystere emolliente, & laxante, ex manna, tremula tartari & rhabarbato quater soluta; eoque lacto, urina apparuit cocta & sedimentum incarnati coloris dimisit. Datis demum ulterius bezoardicis temperatis cum tinctura modo dicta, sensum conquieverunt symptomata & die septimo pulsuum celeritas remansit, sudor laevis prodixit, ægerque postea ad sanitatem rediit.

*Epiresis.*

Ad præcavendum delirium, longe præstantius epithema discutiens, quam laudata à multis venarum sublingualium sectio, quam incompetibilem haemorrhagiam induxisse vidi aliquoties. Utillissimum quoque ad sanguinis à capite derivationem alvum strictam mollire atque subducere, non quidem purgantibus, sed clysteribus & blandis laxantibus, modo id fiat, quando levamen & aliquis remissio percipitur, quod secundum nostram observationem, certis diebus, secundo præterit & quarto, accidere solet.

*Vid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

## OBSERVATIO IV.

*Pone sedit  
quarto  
die, in spem  
etiam salutis.* Monachus viginti quinque annorum, quadratus & carnosus, vitam colens otiosam, potui cerevisiae crassioris assuetus, nunquam tamen venae sectionem passus, veno tempore corpus succis plenum validus paulo in horro ad feram usque noctem exercebat. Inde illico conquisit est de corporis lassitudine, inappetentia, somno turbulento ac inquieto, alvo simul clausa. Incepit ipsum diem levis horripilatio, ælius magnus, præcordiorum anxietas, pulsus quoque vehementer saltit, facies rubicunda fuit & urina pellucida, sed rufa. Medicus in consilium vocatus, exhibuit tincturam bezoardicam volatilibus cum regimine sudorifero. Sed nullus successit sudor, anxietas porius adaucta, spiritus siccus difficilis, somno caruit, multa albosia est loquutus & tertio die accessit præterea acerbis & ardens dolor in faucibus cum deglutitione difficili. Accensit igitur medicus alius, qui venae sectionem admirabatur, clysterem impicere, gargarisma uiuipare & exaritis epithema discutiens putius applicare iussit, ac interius pulvres nuprantes nitrosos leniter diaphoreticos dedit. His dâcussis primo tumor faucium & dolor sedatus. Septimo die post levem horrorem largius sanguinem stillarunt nares, quod, ne cum damno effusus foret, cautum est mixturis diaphoreticis & pulveribus nitrosis, nec non epidemate frontali *Observatione III.* descripto. Sic octavo die ætus deservit & sudor erupit copiosus, pulsus sedatior factus, urina sedimentum poluit & æger successively convalescit.

*Epiresis.*

Male hoc in casu omisit in principio venae sectio & pessime in corpore plethorico data volatilibus cum regimine æstudo, quibus facillime inflammatio in cerebro & faucibus concitata. Neque ea propter quarto etiam die nociva fuit venae sectio, sed ad avertendum inflammationem admodum proficua. Ad angustiam vero vasculorum laxandam & stagnationem sanguinis in faucibus discutiendam, epithema mature applicatum, cum interius diaphoreticis, unque egregium.

## OBSERVATIO V.

*Symptoma  
catarrhalis  
epidemica  
anni 1799.* Quam varia & insolita plane claspio anno MDCCXXVIII. aeris tempestatibus fuerit constituto, & quam varii quæque graves inde succreverint morbi, imprimis febriles, supra *Sell. I. cap. X. obs. II. pag. 290.* pluribus jam dictum. Perstitit autem eadem hæc extraordinaria temporum anni habundantia & amplexaria inaequalitas, insequenti adhuc MDCCXXIX. anno, subitumque frigoris in repositum & vice versa repositum in frigus mutationem fecit. Scilicet assalit novi anni exordium acerrimo gelu, æquale omnino illi intensissimo, quod anno MDCCXIX. regnavit, ac perstitit ad duodecimum usque Januarii diem, mercurio interim, quod mirandum, in barometro demissionem stationem ad gradum tantum VII. servante, quam alias ascendere tum de gradum XXX. tangere solet. Decimo tertio & quarto die lenior spiravit aura & regelatum. A decimo sexto ad vigesimum usque, argenteum vivum altius iterum ad vigesimum septimum gradum elatum & frigus fuit acre. Vigesimo quarto sublevis mercurius ad duodecimum, novam & octavum gradum

gradum & sequentibus diebus successively remissio, mercurio interm modo sublato, modo delapso. Nix præterea cecidit copiosa & diu solum obruit, donec medio Februarii discerneretur iterum, ex quo magnæ aquarum inundationes. Post hæc vicissitudines, retinente hyemis asperitate, Februarius mensis, cepit passim circumire synocha febris, non simplex, sed complicata, quæ recte dici potest synocha catarrhalis, ita, ut intra mensis spatium vel malle, ex divitiis aque ac pauperibus, eadem hæc decumberent. Incessit quippe hæc febris homines medicæ potissimum ætatis, juvenes & viros, sanguine & succis plenos, minus infantes, omnesque quoniam corruptis, sine præcedenti notabili frigore vel horrore, affecti totius corporis & capitis gravitate, inappetentia, somni defectu, virium languore & æstu intencio, cum pulsu magni, celeri, quandoque inæquali. Quibusdam variæ statim in mente observate idææ atque imagines & ætus tremuerunt, aliis perpetua accidit somnolentia cum animi dejectione, & omnes situm erectum ferre non poterunt, sed mox synopticum quandam debilitatem perceperunt. Quibus vena statim in initio petula & sufficiens sanguinis copia, pro ratione corporis & virium, subacta; subijuncta postea blandis diaphoreticis, diluentibus & organismi sanguinis complicitatibus, sub æquali & moderato regimine, cito & optime convalescunt. Sæc enim quarto statim die deserta febris, symptomata remiserunt, æstus restituitur, pulsus sedator & corpus quietum factum, ac urina, comite sudare perunquæ largo, posuit sedimentum. Resiliunt tamen postea copiose defluxiones, a capite ad nares, fauces & pectus, coryzam & rufum humidam, vel siccam inducentes, sputate quandoque ætuum pedumque rheumatismo, quæ circa vespertinam exacerbant, caloris decedunt incrementum noctemque inquietant, donec decimo quarto ut plurimum die discederent penitus. Sed in quibus, aut ægri, aut medici culpa, sanguinis mistio neglecta, & usurpata calida bezoardica, hi longo gravius & diutius decubuerunt, delirio & assidua vigilia affecti sunt, catarrhos acres & rebelles experti, quandoque exanthema purpureum & sordidum sæpe ad decimum quartum diem, non nunquam longius, magna insitit vehementia. Quin fuerunt, qui accessisse purpureæ albe, aut petechiali exanthemate, plane interierunt.

#### Epicrisis.

Recte omnino complicata hæc febris dicenda synocha catarrhalis: nam ipsius incurfus vehemens statim, sine rigore, ipsius decursus sine remissione, ipsius eventus sudore, ipsius medicatio per sanguinis missionem & temperantia cum nitro, luculenter testatur, ad synochæ familiam ipsam esse referendam. Catarrhalis autem consuetudinem producit subsequentes copiosæ mucæ & seri lili, ex naribus, faucibus & bronchiis, cum nulli ac strumatione exelationes, nec non fibrilla vesperti cum calore iugravelens. Natales epidemice hujus febris non aliunde, quam ex mira, diuturna aeris inæqualitate ac crebra mutatione ex calido in frigidum & frigidum in calidum, nec non atmospheræ mox gravis & raræ habitus vario, ducendi. Sub his prementis, mox levis vicissitudinibus, non modo universale illud pessimum sordium emunctio, cuius, diversimode afficitur, ejusque canalicularis atque porosa compages a naturali tono decipitur, sed & motus

illi cordis & arteriarum systolici qui viam sustinent & ab æeris puriori elastica substantia pendunt, vineantur ac inuariant. Ex quo porro fit, ut labefactum sic & suffaminatis saluberrimis se & excretionibus, multæ impuræ & viciæ sordes in succis manent, quæ deia vascula obstruunt, ac somitem febribus, populariter circumcumbunt, præbent. Neque nos nunc primum observavimus hanc febrem, sed eandem jam anno MDLXXX. valam esse Georgius Henrichius Communi in Arcanum pag. 315. testis est, hæc haberi: anno MDLXXX. grassabantur synochæ epidemice, non simplex sed compasæ, eo quod & catarrhus, & alia symptomata conjuncta habuit, inde & catarrhus cum febre epidemica sui appellatus. Eundem etiam ipsius ætatis ac decursum fuisse, quam notat, idem auctor l.c. pag. 396. subnectit: febris, inquit, hæc in catarrhalis epidemica, quæ spatio sex septimanarum, omnes fere Europæ gentes affligebat, ex quibus vix viximus hujus morbi experti erant, præsertim in Saxonia, causa, non erat ab ætate, terra aut aqua putrida, sed ab ære, vel calo potius, nempe à magna illius & anni præcedentis æris inæqualitate, unde copiosa humorum heterogeneorum & uberior fibræ succrevis, quæ sælla mentium conspersione & probiora evacuatione, primum cutibus, & postea putrefactis, hanc febrem excitavit. Quam primum hæc invadit, omnes vires languiebant, præcordia gravitatem sentiebant, cor pressum, & palpitabat, pulsus parvi, celeris & inæqualis erat, mollior difficultis; caput erat grave, & ingravescere morbo iam ægrii languiebant, ut interiret & convalesceret. Quibus copulabant, alii profundiores somnia habebant. Ex capite fluxu ætius & subfusus humor ad thoracem, qui tussim movebat, in extremis partibus dolores vagos & fugitivos exciabat. Luvio horat & calor totum corpus & caput occupabat, & ad tæstam non erat mordax, communis tamen, cum calore oculorum & tumore. Urina primum tenuis, mox crassa; alius sanguis è naribus fluxus; plerique sudor copiosus prorupit, quo & febris finiebatur, quarto in plurimum die, interdum, sed raro, longius protrahabatur, ad septimum, vel nonam diem. Cæterum illud quam maxime notatu dignum, quod synocha hæc epidemice grassantes & cum magna vehementia invadentes, administrata statim sub initium convenienti sanguinis per venam sectionem missione & adhibitis postea temperantibus, & viscidum colloquantibus tercio mox & quarto die fuerint solute, nec in putridas, aut diuturnas transierint febres, quæ non sine periculo. Et certe dici vix potest, quam insigniter febrium synocharum æque ac ardentium vehementia in principio illico his præsidii obediens quæ ac transi. Testis est jam ipse Galeus morbi. med. IX. perit non minus, quam vere scribens: nemo ex synocha in putredinem fibræ incidit, quo sanguinem primum detrahit. Quis quidem præsidio neglecto, in summos ægri discrimen perveniat, nisi eos, vel virum robur, vel largum alvi pressurum, vel sudor ex manifesta phrenia eripiat copiosus. Ego quoque observavi frequenter, synocham simplicem, juvenes sanguine & succis plenos cum magno æstu & capitis dolore, nec non anxietate, sub pulsu pleno & cædro, prehendentes, post incitum medianam & dato pilule largo ponu ultra quatuordecim, sudore per totum corpus manante,

manare, fuisse solutam, remittente mox inquietudine cum aestu ac siti, & somno redeunte. Opus tamen est, ut salutaris hæc diaphoresis per aliquot dies adhuc congruis remediis servetur, & postea solutivo remedio, ex clementioribus marina, tamarindis & rhubarbo & tartaro, alvus ducatur. Neque etiam omittenda venæ sectio sub initio hujus febris, si corpus sanguine replectatur ac pulsum adest magnitudo, licet haud ita prædem sit admissa. Aliquot enim exinde mortui, vel in summum vice discrimen adductos novi, quibus medici ob id sanguinem subtrahere renuerunt, quia ante unum vel binos menses modo factum; quam tamen ex longo usu atque experientia in comperto sit, hac in febre, non semel, sed bis interdum, pro virum robore & sanguinis abundantia, venæ sectionem esse administrandam.

## CAPUT II.

De Febre Ardente nec non Cholericæ.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*Arden-  
tes & con-  
tinuæ pî-  
rurgicæ  
dantur.*

N<sup>ost</sup>ra quidem ætate omnes acutæ & continuæ febres, quæ præcedente rigore, cum aucto æstu, siti, anxietate & pulsum celeritate junctæ sunt, vulgo vocari solent ardentes, Germanis *heisse Fieber*. Quin ipse artis parens, *Hippocrates*, omnium febrium originem ex bile, plus minus vitiosâ & metaci deducti, nec sanguinearum, nec synocharum facit mentionem, sed in scriptis suis, febres fere omnes continuas, inflammatorias, item synochas, tam simplices, quam compositas, putridas quoque & malignas, appellat ardentes. Nihilominus tamen insignem inter has febres esse differentiationem, luculenter omnino attenta observatio incussum symptomatum & decursus singularum, nec non curandi ratio diversa, docent.

## §. II.

*Arden-  
tes fe-  
bris quid  
propria.*

Ardens itaque febris, Græco nomine *caustus*, stricte & proprie dicitur illa, quæ cum ardente & igneo quasi calore totius corporis atque siti inextinguibili, lingua simul arida, fissa & nigra, junctæ. Binos hos enim pathognomicones causi esse characteres, veteres voluit omnes, & ob id torridam etiam hanc febrem appellavit atque urentem. *Hippocrates lib. de ætione p. m. 169.* in succinctæ describit ardentem: *calor fervidus, siti fortis, lingua aspera ac nigra, color subbiliosus, & spumans biliosus.* Sed *Aretæus*, exactus historiarum morborum scriptor, *lib. II. cap. IV.* hanc saluti plenioris descriptionem: *ignis passim acer & tenuis est, sed minus maxime spiritus tanquam ab igne calidus; aeris vehemens attractio, frigidi cupiditas, lingua arida, in labiis & cute squælar, algent extrema, latum quam biliosissimum, insomnietas, articularum motus crebris, parvi, imbecilli, oculi puri, laculenti, subrubri, facies colorata. Quod si morbus ulterius crescit, omnia majora & saviora fiunt. Arteria minimis motibus & creberrimis agitantur, ignis aridissimus & acerrimus, mens delirat, acumen agnoscit, siticulosi sum, omnia frigida at-*

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

*treclare cupiunt, pariemem, vestem, pavimentum, hamorem. Manus frigent, sed polus perquam calida, naves livida, stratio crebra est & rescidus humor etia froniem & pœgula.*

## §. III.

Hæc ardentes proprie sic dictæ febres, multum differunt ab aliis continuis. Nam in synocha, tam simplici, quam composita & cacochymica, non tam acris & ingens calor est, neque tam inexhausta sitis, sed æstus minor cum maiore quodam. Synocha magis invadit sanguine-plenus, habitus laxioris, lutei viventes, idque possimum tempore verno ac in regionibus temperatis; sed caudi adiunguntur macilentæ, bibulosi, sensibilibus, generantur sub tempestate calida sicca diuturna, & regnant maxime in locis calidioribus. In ardente porro, focus ac in aliis continuis, facies flavescit, vomitus, vel conatus vomendi cum subsidio ciborum adest, urina flammea, insensibilis bile tincta mingitur, & per alvum biliosa fœtida exarbitur. Tum id quoque peculiare habent febres ardentes, & quæ a copia & acrimonia bilis substatuntur, præ aliis continuis inflammatoriis, item sanguineis & malignis, ut diebus imparibus & circa tertium exacerbentur, paribus autem remissiones sint, id quod etiam observatur in tertianis continuis, cholericis, nec non in illa quas veteres triaphyas dicere, quæ tertio die sine horrore & rigore periodico exasperantur, qualis observatur in hemitritanis, sive semitritanis. Accedit, quod febres, quibus sanguinis puri, sive impuri copia complicatur, saepius quarto statim die solvantur, sudore, vel hæmorrhagia larga sub facie rubicunda, quam ardentes demum citra septimum diem, post rigorem, vel criticum sudorem, vel symptomatice inflammatione ventriculi, duodeni & parium, ad quas bilarii ductus pertingunt, funesta, terminant. Demum ratione curationis adest discrimen: ardentes quippe posum frigidum, seu præstantissimum auxilium ferunt, sed non ita aliæ continuæ & inflammatoriæ, multo minus malignæ & putridæ. Sanguinis missio in febribus a sanguine in non minimis vasis stagnante oriundi, item inflammationis, præterea, quæ occupant partes & viscera sanguinea, summopere est necessaria; in ardentibus autem veris & exquisitis, eadem non opus, ut potius nocet.

## §. IV.

Sed simplicis ejusmodi & exquisitæ ardentes febres, frequentissime quidem fuerunt & sunt in Asia, Græcia, Aegypto ac Italia, & ob id à priscis medicis parentibus, *Hippocrate, Galeno, Aretæo*, sile & accurate quoad prognosin & medicationem descriptæ. In temperato autem nostro climate oppido sunt raræ, ac non nisi à liberaliori potu vini spirituosius valde, ardeat ardente, motu & exaltatione imperditi animi corporisque & cohibita perspiratione, suscitantur. Nostro potius sub caelo & inter nostras familiares magis ardentes sanguineæ, sive synochæ biliosæ, item cholericæ febres.

## §. V.

Synocha autem biliosa nobis dicitur illæ, quæ sine præcedente singulari horrore ac rigore, cum magno ardore, siti, vigilia, anxietate & inquietudine, in corporibus sanguineo-cholericis, copia sanguinis calidi & biliosi repleti, oriuntur,

*Differit ab aliis continuis & inflammatoriis.*

*Revera est quædam simplex & vera.*

*Sed frangitur, ac non dicitur semper.*

de diebus imparibus, seu criticis, antecedente rigore quodam, terminantur in salutem, vel mortem. In salutem quidem solvantur sudore, vel ut plurimum haemorrhagia natium. Hæc enim sunt ardentes illæ, de quibus *Hippocrates lib. I. epid. com. 2.* notavit: omnes ex iis evasisse, quibus sanguis è naribus aut aliis viis effluisset, reliquis, quibus id non accidisset, pereuntibus. Quando vero febres eventus, desinant vel in partium nobiliorum, meningum maxime, pulmonum, ventericuli & intestinorum inflammationem lethalem, vel in lethalem syncopein, ob sanguinem in dextro cordis ventriculo collectum, flagrantem & detum congruentum.

## §. VI.

*Et cholera  
in febris.*

Alterum nostris familiare ardentis complicatae genus cholericæ febris. Hæc etiam igneo æstu, siti, angore & inquietudine aggreitur, sed cum vomitu, seu perpetuo conatu vomendi, dejectione biliosa & copiosa, extremorum frigore, ardore interno, & anxietate cardiologica purgatur. Sed merito etiam cholericæ hæc febris distinguenda in acutissimam & minus acutam. In illa longe major est symptomatum vehementia, dejectiones biliosæ, per superiora & inferiora copiosissime, junctæ cum cardiologia etiam syncopeia, & plerumque ante septimum diem necant vehementi ventericuli & intestini duodeni inflammatione, cujus indicia vehementer circa præcordia & fixus igneus ardor, cum extremorum refrigerio, summa inquietudo de anxietate, singultus & eructatio bilis & salivæ liquoris copiosa, ictericus faciei color, nec non facies cadaverosa, sic dicta Hippocratica. Non nullæ non adeo acutæ, sed longæ extrahuntur, ita tamen, ut subside remissione, vel plane intermissione quadam interpollent, & vel quotidie, vel tercio quovis die, cum vomitibus, anxietatibus & refrigeratione iterum exacerbentur, merito ob id quotidianæ, seu tertianæ continuæ, vocantur. Sed hæc ipsæ, nisi congruis cito succurrant auxilii, in letales febres perquam facile degenerant, & stomachi diuturnam viam, dolores pressorios, ructus, inflationes, ob erosionem ventericuli, aut duodeni, a mordaci bilioso succo, vel superficiei, vel profundius factam, inferunt.

## §. VII.

*Causa pro-  
xima et  
distant.*

Ad causas & generationem harum febrium quod attinet, illa quidem exquisitæ ardoris, qua summo fervore de incendio, cum linguae siccitate & siti clamorosa, tam partes internæ, quam externæ, uruntur & exsiccantur, causam non habet aliam, quam cœcissimam sanguinis & humorum agitationem, per fibroso-vascularum totius corporis compagem, partim quoad minima vascula obstrueta, partim spissio tensam atque coarctatam, sub quo motu attrito solidorum ad fluida & fluidorum ad solida, intestinus partium sulphurearum quoque augetur, unde inflammantis calor, fluida diffusa atque confusum & solidas siccitas & adurent, enascitur. Hic vero æstus in corporibus sanguine & succis plenis, ob fibrarum molliorem & laxitatem, lenior est atque remissior, ac febres emergit minor ardens, minus exquisita, in qua non tam imperia cutis & faucium succitas, neque etiam sitis adeo urgens. Et in illa ardentis specie, quam cholericam dicimus, non tantum, ob partium salino-sulphurearum in succis redundantiâ, & minima non nulla vascula angustata & obstrueta, celerior est

motus, verum etiam succus biliosus copiosius in hepate secretus ac in duodenum & ventericulum effusus, acrimonia & mordacitate sua, nervos tunicas acris sollicitat, lancinat, arrodit & inflammatur, ex quo symptomata huic febri propria, ardor, anxietas, cardiologica, nausea, vomendi conatus, impetuose per superiora & inferiora biliosæ dejectiones.

## §. VIII.

*Causa an-  
tecedens.*

Omnia igitur, quæ sanguinem exaltant & uberi particularum sulphurearum in sanguine proveniunt favent, liberum quoque ejusdem per namiam partium vascula transirem retardant atque impediunt, ad generationem ardentis febrium faciunt. Hinc est, quod iidem præ reliquis imprimis possint, qui biliosæ constitutionis, strictioris habitus, potibus spirituosius indulgent, crebrius animo, præsertim ad iram moventur, compulsi vehementiori motu exagitant. Neque minus inde ducenda ratio, quod sub celo calido & in locis meridionalibus frequentissima sit ardens exquisita, nec non quod apud nos, post diuturnum solis æstate siccæ fervorem, succedens autumnus frigidiore aura, crebrius incidant, quin epidemice quandoque cum diarrhoea biliosa, dysenteria, tertianis duplicibus & continuis cholericæ grassentur febres. Quæ autem ingenitæ hæc ad concipiendum hunc morbum dispositionem effectui dant, sunt maxime perspiratio cohibita & vehementis ira. Nimirum quando sacci calidi sulphureis particulis scænt, harum vero per vascula minima exhalantia diffusio, sive per aërem calidum, sive per refrigerationem, intercipitur, manens intra, intestinum motum sustinet & letum accendunt. Vehementis autem iracundia in corpore effectus, ut non tantum in universo systemate nervorum ac vasorum motus intentionem & rigidam spasticam strictionem inducit, sed & præ cæteris in ductus nervoso-musculoso bilarios agit, eorumque motum peristalticum sustinet augendo, ex toto systemate horum canalium exprimit biliosum succum, eundemque in duodeni cavum trudit copiose & impetuose. In quo flexuoso sinu dum stagnat, cum salivâ succis & acidis cruditis mixtus fermentescit, eoque mordacem & tantum non causticam indolem acquirit, cuius index est color viridis æruginosus, qualis a commixtione bilis cum spiritui acido corrosivo, ut oleo vitæoli & aqua forti, emergere solet.

## CURATIO.

## §. I.

In medicatione probe distinguendæ diversæ ardentis species & corporum ratio habenda. Nimirum quando ardentissima est febris in corpore bilioso, macilento, sanguine & succis minus pleno, non habet locum sanguinis missio. Neque etiam eadem admienda in febribus cholericis, tam acutis, quam incriminentis typum servantibus, & cum numerosis dejectionibus per os & alvum, summa præcordiorum anxietate & extremorum frigore lippitis. Sed ubi puncta ardenti sanguinis plenitudo & febris est nostris frequentissima, quæ ex veterum denominatione synochus biliosa, sive purida, recte dicitur, nunquam non per necessaria est ac utilissima sanguinis conventus, sufficiens & pro ratione virium & vasorum amplitudinis, proportionata missio. Hæc enim facta, non modo vehementia febris & sympto-

*Sanguis  
non diffu-  
sionem  
induit.*



symptomatum multam frangitur, sed brevis etiam de felix evenus, ceteris paribus, sperandus. Contra ea experientia docet, gravius semper & periculosius decumbere hac febre, feminas imprimis & sanguine abundantes, si in principio omnia sanguinis subtrahio. Tum enim natura ipsa superfluis sanguinis excretionem, per nases potissimum, molitur, quod si non critico & convenienti tempore fit, non sufficienter succedit, sanguinis in vasa cerebri subsequitur stasis, phrenitidem valde periculosam membranarum cerebri inducens.

## §. II.

Post sanguinis missionem omni studio eo attendendum, ut igneus iste totius corporis aestus cum immoedia sit & facilius ardeat, ut, remaneat illi, quae aestuosam illam partium sulphurearum agitationem fingit de temperantia, ac praevales fibrarum rigorem suum laxant de humores in vasculis minimis stagnantes diluant, fluxiles reddant de obstructa reserant, ut aquabilis & liberior fiat per loca convenientia de vasa transiunt. Hunc in finem veteres omnes diluunt potum frigida aquae. *Hippocrates de affect. §. 1. in ardente febre danda praecipit potiones frequentes & paulatim cum frigidissimas. Aetius lib. II. cap. IV. sibilosus, aut vomitus & dysenteria, adeo fastidium, anxietas, virium labefactio, tunc frigida aqua cyathi duo vel tres propinquandi sunt ad ventris adstrictionem, facile cum frigida in ventre calefuit. Neque minus Galenus meth. med. lib. IX. cap. V. praeter venae sectionem, potionem frigidam imperat laudat, adiecta ratione, quia exiguus febre & naturam robustam reddit, ut deinceps per alvum & sudorem expellat, quae nixta sunt. Idem sentit Celsus, lib. III. c. VII. si, inquit, in summo incremento est morbus ardens, utique non ante diem quartum, magna vi accedente, frigida aqua copiose praestanda est, & ad satietatem danda, quae pro medicamento munitur. Ubi factum est, multa velle operiendus & collocandus, ut dormiat. Fereque post longam somni & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, pleuris somnus venit, per quem ingens sudor effunditur idque praesentissimum auxilium est. Haec tamen subiecit cautiones; sed in his tantum, in quibus praeter ardorem nulli dolo- res, nullus praecordiorum tumor, nihil probens, vel in pulmone, vel in faucibus, non ulcus, non desectio, non profluvium alvi fuit. Si quis vero in huiusmodi febre leviter tussit, si neque vehementer sinit debet, neque aquam frigidam bibere. Accedit Alpinus med. meth. lib. II. ita habere: in continentibus febribus vehementer astuosus, medici omnes largam potam algida aqua exhibere suseunt, quia calorem naturam concutiat, ut statim inde sitis & calor cesset: roboratur inde totum corpus & aqua epota digeritur & plerumque largissimos sudores frigida aqua potus suscitatur, non nunquam vomitus biliosus fuit & aliquando per alvum copiosi humores profluunt & urinae copiosae excreant. Mirabile est, concludit, quomodo tale praesidium hac febre expugnet; nam excretionibus, quas aqua suscitatur, haec febre finitur. Idem auctor Aegypti hoc in usu, qui inter secreta fuisse de Med. Aegypt. lib. IV. c. XV. tradit, aliqui, scribens, pro secreto habere synochas & ardentes febres, multam aquam augurill (quae cucumeris species) agrosi propinquas, sanare, si modo feberrantes Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

illis multis diebus in cibo ac potu sola utantur. Alii tempore vehementioris aestus, largius frigidam potandum concedunt, quia epota, agro multis panis contempnes, sudorem procurant, quae non pauci audio ibi sanatos fuisse.

## §. III.

Nec immerito tam magnifice de frigida potu in ardentibus sensisse veteres, uberius testatur de ratio & experientia. Nisi enim ventriculus, vel aliae internae partes jam vera inflammatione affectae, nec summa cum extremorum frigore anxietas, neque etiam pulsuum contractio & sanguis deficiat addit, utique, aqua bonae notae, subfrigida, non profus gelida, haultu, non simul & semel, largiter tamen pota, egregie prodest. Nam frigus in humido aestuosum nimium partium sulphurearum & azbeteorum in sanguine motum obtundit, fibrasque remissiores adducit, nimiumque distensis contractilitatem & elasticitatem passim reddit. Neque etiam in frigore noxa timenda, quia frigidum, successivus haultibus corpus subiens, a calore interno repellit, qui humidus tepor ad relaxandas spalino constrictas fibras & succos in minimis stagnantes expediendos & fluxiles reddendos, apprimere proficiat, ut hinc sudor & urina copiosius fluant jam in ardentibus laudat. Et Aetius aquam cum lacte mixtam in cholera commendat. Qui nostratibus proficiat deprehensi frigidi potus, sunt maxime, pulapia, ex aqua fontana cum succo citri & saccharo, nec non pralinæ ex rasura cornu cervi, radice socronetæ, cum syrupo acetosatis citri, vel julepo rosarum & spiritui virtiosi, conditæ, item aqua cum frusto panis cocta. Huc quoque referendum serum lactis dulcis, vel acidulum, cum succo citri coactum, item aqua minerales temperatae, quae nomine celebres acidulae Selzeranae, Ansonianae & Wildungenenses.

## §. IV.

Ad obtundendam tandem & conemperandam, in choleris potissimum febribus, acrimoniam acidam causticam succorum biliosorum in ventriculo & duodeno stagnantium, spectat virtutis ex compositis pulvis Marchionis maximeque pulveres absorbentes, quae commodissime ingrediantur terrea teneriora, lapides cancerorum, mater perlarum, conchas preparatae, cornua & ossa philosophice preparata, nec non ex commendatione Langii atque Cratonis crystallus montana. Nobilis quoque ad aestum exingendum & intestinum motum componendum nieri virtus, quod his pulveribus cum fructu ob id subinde admiscendum. Sed necesse est, ut pulveres ejusmodi temperantes in sufficienti quantitate diluti vehiculis assumantur, crebrius etiam & convenienti tempore. Neque minus ex usu sunt di- luentia ac demulcentia, emulsiones scilicet, ex amygdalis, seminibus quorum frigidis, praeterim cucurbitae, cum aquis florum, quae paregorica simul virtute possent, sambuci, rosarum, buglossae, primulae verae, uliae, liliorum convallium, nec non aqua cerasorum tigrorum. Conducunt quoque hoc nomine pelatinæ ex rasura cornu cervi, lac ipsum cum aqua mixtum, oleum amygdalarum dulcium, serum lactis dulce, item pulcula

Vel potius  
nisi refrenat  
tunc

Acidissima  
obstantem  
et

ex pulvis gallinacea confusus & in vase clauso cocta. Ex hac ungue remedia apprimere proficua sunt ad arcedam inflammationem partium nervoso-membracearum, quæ his morbis eveniunt demum accedit funesto modo exhibeantur debito ordine, tempore ac dosi, cum iudicio & observatis quibuldam cautionibus, jam subnectendis.

### CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

#### §. I.

*Temperio  
mod.*

Sicut in curatione omnium acutarum febrium; ita maxime ardentium & quæ ex inflammatione fiunt, tutissima & optima methodus est, per totius morbi decursum, placide & moderate procedere, omniaque quæ a temperie & moderate regimine, quod pharmaciam æque ac diætam & regimen recedunt, evitare sollicitè. Egregium in primis hanc in rem est *Celsi lib. III. c. VII.* monitum, ita habens: *etiam amplo conclavi ager tenendus est, quo multum & purum aerem trahere possit, neque multis vestimentis strangulandus, sed admodum levibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum pini folia vitæ in aquam frigidam mista, ac ne nimia siti vexandus est.* Moderatus quippe & æqualis calor, in febribus hiæ, ad materiam morbosæ correctionem, resolutionem & ex corpore diffusionem, plus præstat, quam omnis, quantumvis pretiosa, medicina. Sed nihil vicissim perniciosius, quam fervido conclavi accendere, vel etiam abstinencia ponis intendere, calorem immodicum, qui vires exsolvit, debitam viscosi humoris a succis vitalibus, & de excretionem impedit, & humidum ad expellendum sanguinem & humorum progressum & ad coarctatam & repleta minima vasorum aperienda & relaxanda necessarium, absumit. Neque ea propter semper utilis, sed sæpius noxiva, in arduosis hiæ febribus, frequens potuum calidorum & insudorum theiformium usus. Multo vero magis detrimentum procurant ea, quæ calefiunt, massam sanguinis commovent de positive sudorem movent. Deinceps non sine ratione *Celsus l. c.* commendat amplum conclave & aeris puri usum. Nam sicuti subilior & artherea elastica in aère substantia, genuinum illud pabulum & fomentum est, quod virtutem vasorum elasticam vitalem systolicam & robur parvum sustinet: ita aer multus humidus & pravis effluviis inquinatus & ob id vi elastica spoliatus, vel sanis, tanto vero magis infirmis corporibus, adversus est atque damnosus. Neque aliam subesse causam arbitror, quod plurimi ex plebeis, quorum natura ad vinceendum morbum alias satis valens, in febribus acutis pereant, quam conclavia angusta, humilia, & haud raro nimis calefacta, in quibus, præsertim quando plures decumbunt, aer morbosus & veris halitus gravis est, quem continuo hauriunt.

#### §. II.

*Horæ  
mora  
attendendi.*

Natura etiam febrium continuarum medicatrix optima: hujus monis igitur cum cura ab artifice attendendi. Exierunt autem hi sese maxime per rigorem, qui ex medulla spinali, cum horrore & frigoris sensu, venit, & certis temporibus, diebus maxime imparibus, dimidio quarti, septimo, undecimo & decimo quarto, accidit. Est quippe hic rigor non nisi affectio generis nervoli

universi corporis spasmotica, quæ sanguis & humores, ab exteriori corporis peripheria, versus interiora, cor, cerebrum & vasa majora, cum quadam vehementia pelluntur, eaque propter extrema refrigerantur, interiora vero sanguine nimis replentur & distenduntur, unde pulsus contractus est, pectus angitur faciesque cum vasis capitis turgescit. Quod si igitur post hunc rigorem, succi inus acti æquali renitu de auctiori cordis & arteriarum systole ad corporis superficiem repelluntur, sæpius tota morbi & causæ morbosæ vis, uno impetu, per largum universi corporis sudorem, aut narium stillicidium, frangitur penitusque eliditur. Sic procedens rigor salutarius est, criticus ob id recte vocatus, post quem arteriarum ictus æquabiles fiunt & molles, circulus sanguinis debitus, & vires cum somno redeunt. Sed ubi cordis & vasorum systolica vis non tam valida est, ut appulsum sanguinem iterum exus agere possit, symptomaticus est rigor & malus. Tum enim nec corpus incalcescit rursus, nec pulsus æqualis fit, nec sanguis per nares, nec sudor calidus universalis per poros, sed particularis & frigidus circa caput & collum, effluit, nec corpus cum animo reficitur, nec firmus credit. Sanguis potius inus in minimis vasis impactus subsistit, ac in cerebro phrenidem & convulsionem, circa cor & pulmones, summam præcordiorum anxietatem, spirationem anhelantem, difficilem, viriumque ad animi usque deliquium defectionem, facit, ut postea nono plerumque die, mors excipiat. Quandoque etiam extra criticos dies accidunt ejusmodi rigores, sed hi pariter sunt symptomatici malumque præfigunt eventum. Hi itaque naturæ monus, mortem, vel salutem, adducentes, probe à medense attendendi. In hoc enim præcipuum ad prognosin & tempestivum remedium usum veritatem momentum, quin totius doctrinæ practicæ fundamentum, quod optime tenuit primus artis pater *Hippocrates*, quod serio inculcaris optime & fidissimè hujus interpreter, *Mercenarius* atque *Duræus*, sed ex nostris norunt paucissimi.

#### §. III.

Quando sic natura monus insinuat extraordinarius, quiescendum medico nihilque movendum. Abstinentium quoque plane à cibo. Et corpus tantum in moderato & æquabili calore conservandum. Si autem naturæ facultas ad expellendum sanguinem & excretiones efficiendas, sola non sufficit, juvenada congruis auxiliis perire, sive interioris analeptis & diaphoreticis temperatis, sive exterioris derivantibus & discutientibus. Nam profecto tranqua magis, quam in periculosis & acutis morbis, summo prece necessaria maximeque momenti est, temporis in agendo opportunitas.

#### §. IV.

Ubi igitur post rigorem incidit cephalalgia plethorica, cum incipiente mentis emotione & nares parum sanguinis stillant, episthma nobis usitatum, ex aceto & aqua rosarum, camphora in spiritu rosarum soluta, niter & oleo ligni Rhodii, subfrigide, non modo temporibus, sed & melius rato toti capiti, admodum, egregie se gerit refrigerando, discutendo & inflammationi resistendo. Idem hoc episthma, limbo triplicato lato, præcordiis impotum, ad levandam anxietatem, inquietudinem depellendam & spirationem faciendam eximii usus. Opitum tamen etiam auxilium ad arcedam phrenidem expectan-

*Non con-  
cedenda na-  
tura, sed  
providen-  
tia.*

*Causa du-  
plex, sed  
fœdum.*

expectandum à venarum in naribus, five id fiat per instrumentum scarificatorium, five intrusum culumum stramine, apertione, repelactis simul & frictis pedibus atque femoribus, & data interius mixtura discutiente, diaphoretica & analeptica cum aceto stillarito, aqua cinisaurum, rosarum, cardui benedicti, mixtura simplici, cinisauri, lapidibus cancerorum & bezoardico minerali.

## §. V.

Ad sedandam sitim & humectandas fauces aridas cum lingua, ego non praesens vidi remedium, quam serum lactis dulcis, in ejus mensura nieri puri drachma dimidia soluta, quippe quod crebrius, sed parva haustibus subfrigidè potum, æstus praemortualem simul exstinguit. Quod quoque de fauces subinde eluendæ aqua, in qua rob diamorum & nieri sufficiens quantitas soluta. Præbere hæc etiam potest gargarisma. Injections vero per syphonem nunquam probò, quia valido aëre augent dolorem & inflammationem. Præterea ad præsciendandam anginosam inflammationem, insigniter prodest linctus lente deglutendus, ex julepi rosarum uncia, nieri puri grana quindecim & camphoræ grana tribus, in drachma una olei amygdalarum dulcium soluta.

## §. VI.

Unus alvum purgans, ratione docente & experientia monstrante, in febribus ardentibus, non nisi periculo præbeatur; òre tamen est, ut alvus semper sit libera. Sub morbo igitur hoc optime præstant glandæ de chyliferis, ex solo lacte, melle & paucillo nieri. Facta vero crisi de coctis, ex urina sedimento cognoscenda, alvum unique clementioribus laxantibus ducere, tamariadinais, mannais, rhubarbarinis, passuluis & tartaris, experitissimum, quo vinoli succi, in primis viis per ipsum etiam morbum geniti, extubentur, ne novo morbo ansam & causam præbeant.

## §. VII.

Aque frigidae potio, à veteribus eximie collaudata, heroicum hoc in morbo & magnæ efficacitæ est remedium, eaque propter attentionem & circumspiciendum medici poliet. Supra tamen satis fuisse jam exposuimus, cur & quando ex usu sit. Hæc igitur monuisse sufficiat: nunquam simul & semel magnis haustibus præbendum esse frigidum potum, sed successivè & crebro, nunquam in principio morbi, sed elapsis jam aliquot diebus; nunquam tempore accessionis, vel exacerbationis, vel etiam sub rigore & pulsus parvo, aut intermitente, nunquam nisi plethora prius soluta. Sed quando extrema calida, pulsus æqualis, celer & magnus.

## §. VIII.

Si febris est cholericæ, acuta, admodum periculosa, ob succos biliosos mordaces nimium & corrosivos, nervas ventriculi & intestinorum tunicas arrodentes, celeri & efficaci auxilio est opus. Tum igitur consultum est, pulveres absorbentes ac temperantes, crebro & majori, quam alias moris est, quantitate, propinare cum diluentibus ac demulcentibus. Quo nomine ego nunquam non expertis virtutis commendo pulverem ex lapidum cancerorum, matris perlarum, cornu cervi sine igne, crystallo montanæ, five lapidis tali calcinati, ana drachma, nieri scrupulo, de quo singulis horis sumenda drachma

una, cum emulsionis amygdalarum uncia binis, cui drachmæ duæ olei amygdalarum dulcium commixtæ. Ad impetuosas autem biliosas excretiones compescendas, præstabilis virtus est liquoris nostri anodynii mineralis, præsertim si cum aliquo guris olei macis effluenscitur & cum diluto vehiculo, vel aqua tantum frigida, propinetur. Quia enim nimis celerem systolicum, vel peristalticum motum in ductibus biliaris sistit, efficit, ut minor copia succi biliosi ad duodenum trahatur & ob id copiosior excretio sistatur. Et certe his præsidii, debito tempore, congrua dosi & mature usurpatis, & cholericam, & dysentericam passionem, brevi fuisse sublatam, multis exemplis edoctus novi.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Summus quidam militum præfectus, quem vocant Generalem, quadragenario major, sanguineus & vividus, laetæ vivens virique potissimum potui indulgens, cæcorum bene valens, nisi quod vere & autumnio, rheumaticis & catarrhis defluxionibus affligeretur, potat in convivio liberaliter vinum potens Hungaricum Toccaniense, ad mensuram minimum quatuor, eodemque plenus, vesperti sub celo nubilo de frigidis in villam suam vicinam redierat. Redux factus, noctem insomnem & mire æstusam æggit, mane expertus calorem intensissimum, cum pulsus magno & celeri, cephalalgia, virium prostratione, faucium ardore ac siti. Bibi quidem insulam theæ, sed inde anxietas increvit & vomendi conatus accessit. Summis pulverem absorbentem & nitrosum, sed symptomata persisterunt. Admisit quoque venæ sectionem in brachio, sed sine levamine. Hinc vocatus ego quarto die, offendi ipsum ingenti æstu afflictum & summo perire conquirentem de ardore venericuli ac siti. Illico igitur removi cerevisiam lupulatum valde & spirituosum, male eo ulque ad sitim exstinguendum liberaliter datam. Annuit æger ac emixit perit haustum frigide. Ego vero sic concedere nolui, sed paravi julepium, ex aquæ fontane mensuris duabus, succi citri uncia, cum tantundem julepi rosarum, de quo successivè bibet & cum quo fumeret, binis quibusvis horis, pulverem ex matre perlarum, conchiis, nitro & lapidibus cancerorum. Æger impatiens quatuor haustibus julepium ingurgitavit omne, tres etiam assumptis pulveres ac inde refrigerium sensu internum, melius quævis & parum sudavit. Jussit itaque ut denuo coniceretur julepium, ejusdemque mensuras duas intra aliquot horas me inscio ingestis. Inde vero incidit in effusissimum sudorem, sequente alvi dejectiones crebriores, somnus rediit, symptomata discussa & convaleuit.

## Epietisr.

Veteres, & inter hos maxime Galenus, Aretæus ac Celsus, aquæ frigide potum in synocha & ardentissima febre mirifice commendaverunt, quin in hujus usu omnem fere salutis spem reposerant; hæc tamen cum cautela, ne deur ubi interna jam inflammatio, scirrhus, aut tumor oedematosis est. Ego quoque præstabilem simplicis hujus virtutem multoties expertus sum in cholericis passionibus, ad contemperandum bilis ardorem & acrimoniam, vireque languentes suscitandas. In nostro egregia pariter ipsius fuit facultas, maxime quod sudorem movit. Neque vero etiam

nocere hoc in casu magna jalsupii quantitas potuit, quam sanguis à copia Hungarici vini vehementer exagritus esset & quasi incensus. Etenim debet esse proportio quadam inter vim morbi & vires remedi, maximeque huic febri, perire monente *Aretæo*, magnam ac celer remedium opponi. De singulari autem aquæ effectû sudorifero notari imprimis meretur *Riverius* seßimonium, *Cen. I. obs. XIX.* ita habens: *obseruandum, à spiritu sulphuris, vel ejus loco spiritu vietioli, cum aqua exhibitio, sudores copiosius fuisse provocatos; quod multis experimentis nobis innotuit, qui plures tertianas curatas vidimus eodem remedio, in summo accessione astu & urgente siti exhibitio, inde copiosi sudores provocabantur, à quibus non solum paroxysmus, sed etiam totus morbus integre solvebatur. Minuenda tamen est in minori aqua quantitas spiritus quantitas, ne nimium accensat.* Cæterum sicuti aquæ frigide potus & refrigerantia efficacissima in febre, quæ à sanguine propter spirituosorum abulum nimium exaltuano accenditur; ita vicissim aquæ calidæ potus, in febre, quæ in sanguineo-piuitiosis, ex obliquis per aërem frigidum & humidum cunis potus inducitur, virtutis est longe fluberissima. Vidi ego sæpe plebejos, sub celo pluvioso, nebuloso & humidum inter labores versantes diu & inde sèbre correptos, solo potu calido, ex aqua, cum carduo benedicto & scabioso decocta, adjecto æquali inensura vino, & calide pota hac mixtura, sudore inde oborto, cito ac tuo morbum dissuissile. Quod autem frigida etiam sudorem movere possit, ratione non caret. Nam expansum nimis vasorum claterem adducendo, tonum & robur ipsi restituit. Colorem fervidum resingendo, impedit feri & lymphæ coagulum, quod ipsi à fori calore induci albuminis ovi exemplo constat. Tenaces autem succi, minima vasculorum excretoriorum obstruentes liberam evacuationem impediunt. Frigidum quoque æstuant corpore immixtum sepefic, tepidumque factum fluxilitatem humoribus conciliat & aridas exsuccas partes mollit.

## OBSERVATIO II.

*Spasmodica  
cacochymia  
ex casu  
purpureæ  
febris.*

Generosissima foemina, triginta sex annorum, sanguineo-choletrica, natura sensibilior, animo in affectus prona, ingens alacris & sagax, cæterum corpore nervosa & robusta, ciborum appetens & liberaliter coenans, ob alvum adstrictiorem & collectas inde cruditates diu conquesta est de doloribus præsternis & inflatione ventriculi ac hypochocondri sinistri, mensam quoque, ob uterum ex crebra & annua sere impregnatione debilem, fluxum, ratione copie & temporis, non experta est legitimam. Ad tollenda hæc vicia multis quidem usa est medicamentis & medicis, sed sine levamine. Aquarum autem medicamentorum potum, ob ventriculi imbecillitatem & atoniam, sere potuit nunquam, melius tamen balneum ex aqua Tepidiculis. Accidit interea, ut medio vere, post gravem terrorem & exandescenciam, præcedente levi horripilatione, incideret in febrem valde æstuosam, quæ sicut cum calore accendit immensissimam, somnum excussit omnem, viresque minime prostravit. Aëcius primum medicus loci, qui venæ sectionem, ante sex hebdomades vix admissam, reiterare renuît. Quinto die vocatus ego, pullum sorem & magnum displicendi, cum æstu intolerando, anxietate circa præcordia, inquietudine, insomniis

& dolore dorsi. Pugnavi igitur adversus hæc symptomata diluentibus & refrigerantibus potibus, pulveribus absorbentibus, nitrofo diaphoreticis, cum succo citri permixtis. Fluxit inter hæc ex utero ichor cum sanguine, ad viginti quinque horas. Sed septimo die incurrit horripilatio, extrema refrigerata, pulsus celer & contractus factus, facies turgida, oculi rutilantes & levis cogitationum aberratio visa. Exactis tamen duabus horis & data mixtura discutiente diaphoretica, ex aqua cardui benedicti, cerasorum nigrorum, thieriacali, aceto destillato, antimonio diaphoretico, lapidibus cancorum, cinnabari & syrupo acerosissatis citri, redit calor per totum corpus ad pedes usque, pulsus increbuit, oculi splendorem rutilantem posuerunt, & per universum corpus fastio prodit omne sudor, quem temperatis diaphoreticis & infuso theormi secundare jussi. Inde magna sequata symptomatum remissio & agram in vado constitutam esse, visum quidem, sed quia somnus redire noluit, neque æstus penitus remissus, neque etiam vires restitutæ, non sufficientes & omnibus numeris absolutæ crises fuit indicium. Nec vanus fuit mensus: nono enim die, post lenem rigorem ex dorso, novus paroxysmus febris incellit, cum magna præcordiorum anxietate, intensiori æstu, inquietudine, spirandi difficultate, ita ut ægra corpus mirum jectigaret & lectum subinde mutaret. Postero die purpura rubra cum alba comparuit & eorum totumque pectus obfudit, quæ congruis præsternis excepta. Decimo die sanguis rursus profluxit aquosus ex utero, in abdomine oborta tormina, & per alvum feces liquide & biliosæ, postea etiam sine sensu, secesserunt, & luculenter prodiderunt gravem in intestinis inflammationem eamque isphacelofam, quam præterea borborygmi in ventre post assumentum potum arguebant. Undecimo die, post perpetuam tandem vigilias mens alienari coepit, pulsus reddi convulsus, spiratio fieri anhelosa, subsequente paulo post morte, ob vim cordis & vasorum visalem elasticam per morbum diuturnum & vigilias continuas fractam, nupsit deficientem adeoque naturam penitus succumbentem.

## Epiçisr.

Febri hæc merito vocanda synocha cacochymica, sive putrida universi corporis inflammatoria, ex abundantia impuri sanguinis progenita, quæ, si viscerum offendit minus integra, ut hic ventriculum & uterum, raro ex voto, sed plerumque funestum, sortitur eventum. Ego vero etiam summo opere improbavi, sed tacitus, ne medicus primus malum nomen incurteret, ob factum, quod insectum fieri non poterat, quod neglecta in principio sanguinis missio in corpore plethorico & cacochymico, sub pulsu vehementi, duro & magno, unde etiam ipsa natura à copia sèk per uterum liberare molita. Licet etiam septimo die crises indicia comparuerunt, formi tamen & virum defectus, cum rutilante calore, imperfectam eam fuisse, prodidit, & latere adhuc innas materiam perniciosam. Fuit hæc purpuracea, quæ sèk experientia, in corporibus impuris cacochymicis, præsterni foeminarum, sub declinatione febriæ continuæ succedere solet, critica diebus, sed funesto plerumque eventu. Natura enim, sive potentia elastica cordis & vasorum, morbi vehementia jam debilis nimium, eandem minus vincere & expellere possit, unde de novo in minimis vasculis sunt stases inflan-

inflammatione, tandemque mors excipit. Nostra in agra insanas hae inflammationes circa uterum & maxime intestina confiderunt, eademque defectiones aquozæ cum torminibus, præsertim involuntariæ, ob scissum partium serurarum à sanguine coagulato flagrant, abunde factis indicantur.

## OBSERVATIO III.

*Ab his de-  
dare san-  
guine re-  
pelle posse  
sanare.*

Dux militaris quinquagenario major, sanguineo-cholericus, robustus, sanguine plenus, laute vivens, plus vini quam creverit bibens, in iram & vehementes animi affectus pronus, creberrime, sed vixit vagæ admodum indulgens, postquam ebrius vehementer excanduit de potica cum concubina habuisset rem, incidit illico in febrem vehementissimam ardentem. Invasit hæc cum annuum tremore, junctâ fuit summa præcordiorum anxietas, æstus in pectore ingens, capitis dolor, somnolentia, nec non mentis emotio. Conquevis simul est de dolore lateris dexteri & quarto die exfuit tulli sanguinem cum pinita mixtum. Secta quidem sum in principio venæ, sed quia inde nullum levamen, vocarunt me. Erat autem æger, quem advenissem, impositus quandoque & irrequies, quandoque somnolentia & corpore obrutus, sitis ingens, alvus adstricta, calor vehementis, urina tenuis flammæ. Expensis cunctis, inflammationem ve utriculi & pulmonum ac minus faustum eventum sum sollicitatus; ideoque ad contemperandam iterum alium inflammatorium æstum pro viribus adhibui præsidia. Clystia scilicet emollientia & relaxantia, ex sero lactis, melle ac oleo amygdalarum dulcium, cum momento nini alvi incipere jussi ad uncias duodecim aliquoties, non tam ad purgandum, quam potius ad humectandas & relaxandas intestinorum tunicas, siquidem clystera stimulo carentes, aliquoties injecti de diutius retenti, balneum quasi præbent internum. Dein quem pulverulentæ aversarent omnia, emulsionem conficiendam scripsi, ex decocti cornu cervi mensura, amygdalarum dulcium uncia una cum dimidia de seminum quatuor frigidiorum majorum ana drachmis duabus, ad sic æque cerarum nigrorum uncias binis viderique totarum, matris perlarum, neri deputari ana drachma, julepi totarum uncia una. Hanc intra aliquot horas ebibit, ac præterea posuam ex hordeo, rasura cornu cervi & scorzonera, tam avide ob urentem sitim ingurgitavit, ut viginti quatuor horarum spatio, vel septem ejus mensuras eporetet, idque per aliquot dies. Dedi enim quandoque juleculum avenaceum cum aliquot cochlearibus olei amygdalarum dulcium. Et exterius thoracem dolentem atque præcordia inungere jussi linimento ex olei amygdalarum dulcium uncia, camphoræ drachma & extracti castorei liquidi drachma dimidia.

His æstus resistebat, septimoque die urina turbata ac non nihil ad fundum dimissa. Accessit nono die diarrhoea, ut plus quam decies intra diem & noctem deperceret, cum levibus torminibus in ventre. Successit hic fluxus alvi per quadriduum, ac interea nihil summa, quam julecula confortantia carniem cum tantillo vini & macia. Sic felicissime febris soluta, coque factio, vires redierunt cum faciente.

## EPICRISIS.

Natura valens & robusta, congruis auxiliis adjuncta, unque sæpe miraculi præstat, seu affectus

extraordinarius plane. Quare ego non facile sperem abscipere sulco, in perniciosâ etiam & inflammationis febrilis, quando ægri multum sinunt & copiose commoda ingerunt liquida: in his enim magna vis, febres cum magno ardore junctas, sanandi. Nam fluxiles & dilutes reddant spissos humores, qui obstructions valorem efficiendo, æstum augent liberamque exhalationem, tam in, quam extra corpus, interceptum. Aritas quoque & nimis rigidas fibras molliendo, febrem efficiunt minorem & corpus disponunt ad excretionem. Nilominus tamen prudenter etiam si gerat artifex in horum benignorum & innoxie usum remedium usui, & caveat, ne febrem, quæ naturæ in diætrici opus, quo auctiori sanguinis motu obstructions de ita viciditatem succorum dissolvit, interceptivo refrigerantium potu, nimium deprimat. Nam in febribus nimis æstusibus & corporibus phlegmaticis, diluentia liberalius data plus nocent, quam proficiunt. Ubi vero æstus fervidus in sanguineo-cholericis, & massa sanguinis copia partium sulphurearum referta, largiar liquidorum potus, modo ventriculus eum subigere possit, non nocet, sed præstat est medicata. Nisi enim in his nimis calor sistatur, vires brevi exsolvit, & lymphaticos humores incalescendo ac coagulando, ipsam gangrenam purioris internis inducit.

## OBSERVATIO IV.

Illustrissima femina tenesca & exquisiti sensus, vigintiannorum ætatem haud ita pridem egressa, appulsa in Carolinis, potuura thermalis aquæ. Sed quam tercio die ira percita esset, & cæcâ cum fragis avidius ingessisset, in prandio incidit in passionem cholericam. Vomuit nempe de deperit copiose, intra diem & noctem plus quam viresces, cum anxio æstu & dolore circa præcordia, extremorum refrigerio, magna inquietudine corporisque jactitatione. Accessit ego hac cum tanta idem puri pullorem tepide bibere, binis quolibet horis pulverem ex cornu cervi sine igne parato, laquibus cacorum & pulvere Marchionis, æquali pandere mixtis, ad drachmam unam sumere & exterius abdomen inungere jussi totum linimento, ex tribus olei amygdalarum dulcium partibus, una olei menthae & dimidia olei macis destillati confecto, positis supra linacis complicatis calidis. His anxietas & tormina sublata, evacuatio per superius & inferius os immutata, & intra triduum, addito pulveribus cortice chaccarillæ, morbus facile & explicita curatione discussus.

*Cholera  
p. feb. cas  
sanata*

## EPICRISIS.

Nil perniciosius est ira, si stomachus fermentescibilibus cibis fatus. Hic enim animi motus non solum strigis stomachi & intestinorum tunicas, & facit, ut humores in hoc cavo hærentes, diutius detineantur, ac ipsa hac mora minus quasi conformatione, indolem contrahant sæpe tantum non venenatam. Tanto vero magis omnia hæc nocent, sub aquarum mineralium potu, quippe qui semper ventriculus ipsiusque systolica vis infirmatur, ut dein eo facilius in ipso hæzere & colligi possint incongrui succi & cruditates. Hæc autem vehemens passio, à summa humorum acrimonia, ex viscidente vomitu ejectorum colore cognoscenda, suscitata, celerem opem & efficacem medicamentum postulat. Quare pleniori dosi & crebro data corrigentia & demul-

demulcentia. Et licet in principio ingesto largiore lacte subsequeretur vomitus caseosi, acidum in primis viis arguentes, insilui tamen hoc remedium, quo etiam effectum, ut vomitu exturbata, postea nec visceres, nec coagulata essent, sed liquida, mucus & bile imbuta.

## OBSERVATIO V.

Cholericæ  
febris p[er] se  
aquæ fr[ig]idæ  
sola curat[ur].

Quam anno MDCLXXXIV. Minde Westphalonum medicinam fasciare, aëtare sicca & præcalida regnante, Chiliarcha perverosillimus incidit in febrem cholericam. In hac miris torquebatur anxietatibus, inquietudine, interno æstu ac crebris dejectionibus, quæ ita vires prosternebant, ut aliquoties animi plene deliquium incurreret. Nil proficiebant pulveres terre absorbentes, cum momento theriacæ cretæ, nil disscordium *Fractisil*, nil emulsioes ex decocto avenæ cum amygdalis, nihil enim exterius linimenta spirituosa. Tercio potius die excretionum vehementia & vitium lapsu ad ultimam venam esse videbatur. Tum æger ob ardentem internum æstus emise penis haustum aquæ frigide. Ego vero propinare remisi, & suavi, ut decoctum hœdei cum rassa cornu cervi tepide biberet. Discedebam à summo debili & omnem fere salutis spem, irritis hac usque cunctis, abiecibam. Sed quum post aliquot horas redirem, incredibilem & repositum interea acidissimæ mutationem deprehendi. Neque enim amplius de anxietatibus, neque de tam magno vitium lapsu, neque etiam de tanto interno æstu conquereretur & pulsus quoque plenior & quietior micabat. Æger autem me magnopere lere omnia admirantem alloquebatur & confitebatur: se ob formidandam sibi amplius temperare non potuisse, sed, siue mortem, siue salutem procuraret, ebullire primum vitium majus unum frigida aqua plenum a ministro porrectum & post dimidiam horam alterum, sicque mensuram aquæ ingurgitasse. Inde se mox sensisse vitium quandam resolutionem, adstrictionem quasi se ipsum in ventriculo, æstus mingatione & quietem, dejectiones moderatiores cutisque antea aridam & siccam nunc etiam madescere. Nec male cessit postea experimentum, sed æger assumis juleculis confortantibus, ex caribus cum macere, vires mox iterum recepit, & sic præter omnium opinionem cito convalescit.

## Epi[st]ola.

Notabile hæc in observatione, nil proficisse præsidia, quæ corrosivam humorum acrimoniam, possidemam passionis cholericæ causam, obviunt, sed frigidum potum ægrum levasse. Ego quidem frigidam potionem roborantibus accensco, quæ non tam macrie, sed potius motum vitio tollendo apta. Frigus nimirum enim & elaterem pariter vehementi æstu & dejectionum copia valde resolutum, fibras leniter stringendo & adducendo, reparat, & hac ratione facultatem morientem tonicam, in qua vitium robur consistit, restituit. Eum enim rigoris esse effectum, ut fibrarum elasticitatem innodat, patet experimento, quo exciso carpio corde adhuc pulsante, systole illico cessat, si immittitur in aquam calidam, si vero iterum frigide incipit, moveri rursus incipit. Notum quoque est, corpora humana, sub diurna æthere aëris & humidæ constitutione, vitium ex-

periri resolutionem acque languorem, accedente autem subfrigido & sereno aëre venis ex orizonte spirantibus aëris habitu, illico in omnibus functionibus robur pristinum recipere. Sed uti cuncta roborantia, exemplo maris & sanoli corticis chiræ, cum magna prudentia usurpanda sunt, & non nisi correcto prius, tam quoad qualiterem, quam quantitatem, materie vicio, & maciebus lais paratis, neque etiam prius, sed posterioribus diebus: ita etiam id ipsam circa frigiditatem potum merito tenendum. Heroicum potius hoc meret auxilium, nec credendum, quod uni, id alteri etiam prodesset. Omnis enim moderandi methodus, nimirum exacta discretione, non modo morbi ejusque causarum, sed & individuum, circumstantiarum & quæque temporum. Ex quibus his minus observatis salutis subsequitur effectus, ad fortunam potius, quam artem referendus.

## OBSERVATIO VI.

Formina honesta aliquot supra triginta annos nata, corpore robusta, biliosa & animo impatientia, plus inter cibos vini quam cerevisiæ bibens, medio Maio incidit in febrem ardentem exquisitam. Medicus ordinarius præbuit bezoardicam electuam aliquoties intra aliquot horas. Inde pathemata exacerbata, anxietas facillima, inquietudo, æstus, vigilia, loquacitas nimia, cum alvi strictura, accelerant etiam tormina in ventre & deglutitio facta admodum difficilis. Die quarto sanguis quidem ex utero fluxit, symptomata tamen non remiserunt, sed accessit prius, quum inscio medico largum vini haustum assumissem, leve delirium. Semper autem major mane, quam vespere symptomatum fuit vehementia. Septimo die, præcedere hæretæ de rigore, animam agere videbatur, sub mente emota & respiratione cito anhelosa. Elapsis tamen aliquot horis, ad se rediit, corpus sudore diffuere cepit, & in cute, præsertim dorsi, comparuerunt macule rubre, quas petechias esse crediderunt. Ego nunc in auxilium vocatus, fusi, ut alvus per sex dies clausa duceretur elythere, & mixturam ex aquis destillatis, cum aceto lapidibus cancerorum, mixtura simplici, mihi usitatum, propinavi. Hinc circa decimum quartum diem sensim remiserunt symptomata & ad naturalem fluxum visa redire omnia. Præter spem autem hæc valde acuta & continua febris, mutata in tertianam intermittentem, quæ solito typo solinque symptomatibus infestavit, post quatuor tamen accessiones, purgans decocto manna & tamarisctum prima viis & pulverem arsebisulphuris usu, mox discussit. Quam coacti insipienti anno eadem hæc semina, eodem tempore, isdem symptomatibus iterum afficeretur, administrata sub initium febrem sectione, adhibitis diluentibus potionibus & pulveribus salino-nitrosis cum clemente laxantibus, longe minus decubuit, circa quartum diem febri in intermittentem concessu, mox pariter congruorum usu discussam.

## Epi[st]ola.

Taxandum merito venæ sectionis in forma plethorica & vini potui assueti neglecta. Notandum etiam vulgaris, admodum tamen perniciosus error prædictus, quo primis suis diebus, liberali manu essentias bezoardicas & alexipharmacas porrigere fuisse plurimam malignitatem.

lignitatem, uti folide putant, à corde pellendam. Hæc enim, si sanguis redundat, æstum inflammatorum magis augent & febrem graviozem ac diuturniorem reddunt, quin, si alvus simul diutius clausa, sanguinem nimium resolvendo, exanthema pariant. Ego quidem hunc febrem in principio fuisse tertianam arbitror, ob intermissionem autem sanguinis missionem & data bezoardica, factam esse continuam ardentem, ac tandem decimo quarto die deservescentem, naturam & genium suum repensit. Nam alias continua prima periodo in intermittentem cedere solet, sed heic id tertio demum periodo factum, procul dubio & medici & ægrore culpa, quæ in ipso etiam morbo vitium habuit in deliciis. Id vero etiam notum dignum, quod tertianæ paroxysmi non diu duravit, siquidem per priorem morbum jam corpus à pravis succis satis liberatum.

## OBSERVATIO VII.

*Febre ardente in senem ex melle curatam fuisse.*  
Senex septuagenario major, macilentus, sanguinis missionem nunquam per omnem vitam passus, à morbis etiam gravioribus immunis, nisi quod interdum vere & autumnu coryzam & nullum humidam experiretur. Februarii mensis, quo frequentes erant synochæ catarrhales, febre correptus est vehementi, cum pulsu magno, subdura & veloci; adfuit sinit magna & sonus defuit. Medicus consultus marasmodum senilem esse putavit, ideoque sanguinem non misit, sed ad sudorem movendum dedit nicturam bezoardicam & mixturam simplicem, pro posu itaust decoctum ex farsaparille uncis duabus, radicis chinæ, scorzonæ, cichorii & liquoris ac corticis cinnamonæ uncia, corticum citri uncia dimidia, & ad fauces aridas mulcoctus lactum præbuit ex maculagine feminis cydoniorum cum syrupo violarum. Sed nihil his profecit ac morbus indies potius exasperatus. Undecimo morbi die vocavit me, uti ægrum offendi viribus penitus exhaustum, miro ardore aestuanti, cum lingua arida, fissa, nigra & facie sere Hippocratica, consequentem præterea de ventris torminibus & alvo fluxa. Candide igitur adstantibus illico edixi, inextinguibile esse incendium internum, ægrum moriturum brevi, quod etiam decimo tertio die factum.

## Epiçrifi.

Febri hæc fuit ardens, ex summo æstu, siti magna, lingua arida somnique defectu cognoscenda satis. Est autem hæc senibus plerumque fatalis: multum tamen differt ab ipso marasmo senili. Hæc enim heclicæ species, mitiori æstu spiratur, diutius trahitur, nec intra quatuordecim dies necat. Consensus autem merito medici error, qui præter sanguinis missionem, statim diæteticæ & hæmectantia cum leniter diaphoreticis & nitrosis exhibere debuisset. Sic enim intra paucos dies, vasculorum minimorum a lenio in sensili corpore sanguine, obstructions, quæ inflammationis causa, facile tolli possent ratione. Noeandum præterea ex hoc casu, linguam nigram in ardente febre plerumque præfigere inflammationem in partibus internis, quæ heic in ipso fuit intestinis. In senibus enim ardentes non facile transiunt in meningum, sed potius in intestinorum inflammationem. Lingue igitur inspectio his in febribus admodum necessaria, quam etiam Hippocrates, multum commendat, quæ Coac. cap. VII. habet effatum, quod in

nostram apprimè quadrat: *lingua, quæ in his morborum rigida fuit, est, sed in calore mæsti, latronibus inde diutius exasperatur, torvis & fuscis, mortifera. Ac citre calamitissima est, nigra & viridula.*

## OBSERVATIO VIII.

Fœmina generosa triginta circiter annorum, cholericæ, vèteræ ac sensibilibus navæ, facie florida, sanguine turgida, ruri decens, post ingesta incongrua multa, iram & nocturnam refrigerationem, nanciscabatur febrem cholericam. Erat quippe ætus magnus, anxietas cardiagica, sitis vehemens, extremorum refrigeratio, corporis jaetatio, per vomitum crebrius viridissima & per ani fissellam etiam liquida biliosa multa exiebat. Remanebant quidem paullo post hæc pathemata quoad vehementiam, cum insalescere & madefcere inciperet; remanebat tamen magna debilitas, cum pulsu languidiori ac celeriori, omniaque assueta vomitu reddebant. Tertio etiam die, post levem inarescentiam, dicta symptomata redierunt eadem vehementia omnia. Acceperat à medico pulveres ex lapidibus cancrorum, tartaro virioliato & nuro, sed ab eorum usu majora in prima regione persenserat incommoda: hinc post tertium accessum me vocare jussit. Veni, ægram mire debilitatam & magnopere consequentem offendi, quod necque ex medicamentis, neque alimentis retinere posset. Expensa igitur morbi natura & causa, vomitum, quæ semper vicidescens erat, à motu non tantum venioli, sed etiam ductuum biliariorum intensiori & spasmodico-convulsivo, componendum iudicavi, & ob id liquorem meum anodynum mineralem, tertio singulis horis, ad decem guttas in dimidia uncia aque florum illarum frigide exhibui. Sedata inde ventriculi subversione, dedi emulsionem & pèlsanam, quam retinuit. Tertio die post redierunt quidem symptomata cum dejectionibus, sed longe mitiora fuerunt. Institi itaque diluentibus, emulsivis, liquoris anodyni & pulverum absorbentium leniter nitroforum usa: noluit tamen penitus discedere accessus febris. Hinc post novum demum paroxysmum, descendit ad ulum electuarii anisebels ex cortice chinæ, floribus chamomillæ, rob sambuci & syrupo acetositate citri. Quod quidem ne fieret, clam dissuasit primus medicus, ex eorum censu, quæ chinæ corticem frustra perthoracesset, felicitè tamen sublata febris & nigra perfecte convalescit.

## Epiçrifi.

Rectè dicenda hæc febris cholericæ & quidem tertiana continua. In cujus curatione omnium maxime agendum id medico, ut humores acres caustici, primis in vis visceribus, circumferantur, & obundantur, simul atque ductuum biliariorum, nec non ventriculi motus spasmodico-convulsivus, bilium continuo exundans, sistatur, quo vomitus & fides compescantur. Sic tandem ad febrilem etiam motum coarctandum, sine damno perquam commode dari possunt specificæ.

Notatu dignum exemplum legas in *Consule Med. Tom. II. Sect. IV. cap. cxcviii.*

trema, manus, pedes &amp; nasus, magis frigeant.

## §. V.

## CAPUT III.

## De Febre Stomachica Inflammatoria.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*De inflama-  
tione  
particulæ  
virescens  
stomachicæ.*

**D**antur febres ardentes & acutæ universales, ubi totum corpus æqualiter magno aestu & ardore sicco afficitur, propter inflammatoriam, in minimis vasculis, vel obstructis, vel spasmo contractis, flasin, cujus generis sunt descriptæ modo synochæ & ardentes. Dantur vero etiam ardentes particulares, quæ a curatum tantum partium, præsertim interiorum & sensibilibus, inflammatione oriuntur & magno cum dolore, ardore interno, aestu, ac functionum vitalium læsione stant, neque minus periculi alunt, quam quæ universum corpus occupant. Hæc inter præcipua fere & frequentissima admodum, parum tamen à medicis notata est illa, quæ in ventriculi & intestinorum substantiam cadit, veteribus epide & lipetia dicta.

## §. II.

*Epide  
stomachicæ.*

**E**st igitur stomachica febris, passio acuta, ardens & inflammatoria, oriunda ab inflammatione nervosæ & membranacæ ventriculi substantiæ, universum nervosarum partium systema afficiens & ob id admodum periculosa.

## §. III.

*Signa.*

Symptomata, individui ipsius comites, è quibus, cum pathognomonicis signis, cognoscitur, sunt, vehemens internum incendium, summa anxietas, dolor gravis totivus in præcordiis, namqueque scrobiculi cordis regione, sitis magna, vigilia, inquietudo, corporis jactatio, extremorum refrigeratio, pulsus subdurus, contractus & frequens, vel etiam inæqualis, spiratio difficilis, creber sonans vorandi de doloris ad omnia assumpta, maxime irritantia & medicamenta, exacerbatio.

## §. IV.

*Differen-  
tiæ.*

His etiam distinguitur ab aliis, quæ in stomachum cadunt passionibus. In cardialgico quippe dolore, sive cardiaca veterum passione, pariter quidem magis circa præcordia anxietas, dolor præstiorius & acutus, usque ad dorsum pertingens, extremorum refrigeratio, assiduus ad vomendum stimulus corporisque inquietudo, sed in ventriculi regione ardor non tam impensus, nec tanta sitis & lingue ariditas, neque etiam pulsus tam celer & contractus; melius quoque ferre possunt ingesta tam alimenta, quam medicamenta, ipsam, quam inflammatione ventriculi affecti. Erosio dein stomachi, quæ sæpius biliosas febres, choleram morbum, item iracundiam, excipit, caret febre, non tam subito infestatur, sed successivo, per intervalla tantum ingravescit, neque dolore tam ardente spiratur & diutius trahitur. Quæ autem in intestinis consistit inflammatio, habet tormina circa umbilicalem magis regionem, cum crebris dejectionibus secum spumosis biliosis, aut leviter cruentarum, aestus quoque totam corporis superficiem, cum pulsuum celeritate & magnitudine occupans, major est, ac si ventriculus inflammatus, ubi ex-

Causa inflammatorii ventriculi est sanguinis flasis, non tam in tubulis arteriosis & venosis, qui sanguinem destinatio vehunt, quam potius in lateralibus, qui ob angustiam diametri, non rubundis sanguinis globulis, sed tantum tenuem lymphaticum humorem secundum naturam admittunt. Hinc etiam partis inflammatae rubedo derivanda. Ardor vero & flammæ quasi in ventriculo sensus fit, dum, partim affluens jugiter sanguis per canales semi obstructos, vel contractos, majore celeritate feratur, partim etiam libero transitu exclusus, ad ramos amplores regurgitat, ibique crebriorem distolen facit ac systolen; unde magna accidit partium sulphurearum attritio motus & calor maximus, qui eo sensibilibus, quo magis exquisitis sensus membranæ ventriculi nervosæ, in quibus consistit. Ex dolor punctus tribendus pressioni membranarum nervosarum à minimis æque ac majoribus vasis nimium distentis, quæ inter tunicas nervosæ-membranacæ collocata.

## §. VI.

Quod autem liber & æqualis sanguinis cursum, per minima arteriarum & venarum intercipitur, isque in exiliora a quasi tenuis humoris receptacula præter naturam impingitur, duplici ex causa accidit. Una, quando extrema arteriolarum venis connexa, à lentis, crassis & glutinosis sanguinis particulis obstruuntur, altera, quando vehemens fibrillarum nervosarum strictura & spastica crispatura, capillares subtilissimos canaliculos, potissimum arteriosos, plus julto angustat acque coarctat.

## §. VII.

Ob id in proclivi est judicare, ventriculorum perquam facile posse inflammari, si sanguis, crassus præsertim & glutinosus, vehementiori corporis, aut animi, ab iracundia, commotione, balneis nimis calidis, potu spirituosorum & medicamentis sudoriferis exaltatur, in vascula minima & angustissima impetuose impellatur, à potu autem superingesto frigido incarceratur & ad stasim cogitur. Neque minus facile patet ratio, quare venena coleriva, infame potissimum arsenicum, acriora item emetica subiant, nec non cathartica valentiora, stomachi inflammatione cito interficiant, dum caustica sua virtute nervas fibrillas stringunt, vascula coarctant, sanguinisque progressum sistunt. Eandem ob rationem ventriculi inflammatione pereunt, qui peste, ardentibus, cholericis & dysentericis febribus, item ex vehementi ira, assumpto potu frigido, vel porrecto emetico, aut purgante, moriuntur. Idem accidit illis, qui variolis, morbillis, periculis, purpura, podagra & scabie retro pulsus decedunt, in quibus materia subtilis caustica ad nervos ventriculi membranas relaxata, ipsamque & confractionem vehementem vasculorum inducit, sanguinis cussum sufflammanem. Opiata autem & narcotica, non alio modo, infirmos præsertim & debiles, necant, quam quod moricibus nervis fibris stuporem inferant sanguinisque progressum sic sistant.

## §. VIII.

Pro differente tamen harum causarum indole & agendi potentia, differt quodammodo inflammationis gradus. Nimirum, quæ à potu frigido corpori



corpori affuanti ingesto, item à bile per iracundiam commota & copiosius in duodenum effusa fulcitur, minoribus stipatur symptomatibus, non tam facile necat, diutius trahitur & datus inter initia congruus remediis protinus obsecundat. Sæpiora vero de periculosa sunt pathemata, quæ à venenis causticis, ab emeticis acrioribusque drasticis inferuntur & celeriter jugulant, nisi cito efficacia opponantur præsidia. Et omnium deteriora illa est inflammatio, quæ senibus, infirmis, scorbuticis & diuturno morore confectis, item in fine acutorum morborum accidit, ob succorum vitium inremediabile & magnam virium impotientiam, medicamentis non tam facile reparandam.

## §. IX.

*Sumus  
functus.*

Sed quando iniquiata est corporis iactatio, porus ingesta eructantur, singultus venericuli & diaphragmatis convulsio accidit, animus deficit, facies comparat Hippocratica, pulsus intermitens est, mens emouetur & ætus convelluntur, funestum denunciant, ex inflammatione sphaeculosa facta, eventum. Tum enim facta post mortem cadavere, non modo ventriculus admodum rubicundus & lumen obtensus copiosissimis ramulculis sanguine turgidis distinctus comparat, sed & interdum passim multis nigris maculis latis & parvis oblectus, interdum in fundo cum duodeno & amenis biliaris ductibus ac pancreas, niger, foetidus ac putris, interdum etiam flantibus mirum diversis atque opulentis conspicitur, fluctuantibus simul in ipsius cavo aliquot cochlearibus foetidi & nigricantis ichoris.

## CURATIO.

## §. I.

*Indolentia  
aut anodynitas.*

Genuine periculosa hanc passionem sanandi indicationes eo tendunt: ut I. obstructions, à tenacibus succis, locis ac tubulis minus congruis impæctis, expendantur; & II. ut vascula à spastica strictura coarctata amplientur & ipsi spastici motus componantur, quo liber, æqualis & naturalis sanguinis progressus per ventriculi substantiam restituantur. Quæ ut ex voto obtineantur, commodissimam locant operam d. luentia, aquosa, humectantia, demulcentia, antispasmodica, æstus qui fluida in crassas reslinguentia, nec non fibras strictas relaxantia. Quum vero non una, sed plures causæ ventriculo inflammationem inducere valeant, prudentiæ medicæ est, pro diversitate causarum ad eas removendas medicationem dirigere singulisque præsidia opponere congrua.

## §. II.

*Atrocissima  
causarum  
ex biliosa  
obscuratione.*

Quando igitur ab assumto veneto caustico, septico, arsenicali, vel acerrimo purgante, emetico, mercuriali, aut metallico medicamento male præparato, inflammatio accidit, non certum, non rarius & celerioris efficacie est auxilium, quam demulcentia, oleosa, pinguis, lac scilicet, cremor ipsius, oleum amygdalarum dulce, nec non olivæ, crebro in copia hausta. Horum enim ea est virtus, ut tenuia causticorum intima fibrarum penetrantia spicula obendant, involvant & quasi invicent, simulque fibras rigidas & vasa coarctata laxent, sicque ipsos horridos, inflammationis, symptomatum graviorum ipsiusque moris causas, sistant. Insuper hæc ipsa,

*Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.*

mole sua ventriculum ampliando, salutarerunt hunc simul exerunt effectum, ut motus peristalticus naturalis, à spasmus rigore dissolvanter, restituantur, stomachus ad ventum permovetur & cum hoc simul venenum dilatum iterum extirpatur. Si à bile acri corrosiva, ut in cholera, metuenda est inflammatio, tunc terrea, absorbentia fixiora & inter hæc maxime ossa & cornua philosophice, un dicunt, præparata, cum decoctis gelatinosis, ut pedum vituli & vervecis, gelatina cornu cervi, decoctum hordei, avenaceum, cum, vel sine lacte, item cum oleo amygdalarum dulcium, ex usu sunt. Quando porro ab iracundia vehementer obortus in ventriculo spasmus inflammationem minatur, nihil efficacius est pulvere absorbente nitroso, cum liquore anodyno alternatim dato, vel in aqua quadam antispasmodica, vel emulsione ex seminebus frigidis, aut papaveris albi. Postea compositio spasmis, ad educendas biliosas sordes, accommodatissima fuit thabarbarica & palliata.

## §. III.

Quæ à retrocedente ex corporis superficie recrudescit acti materia, imminet, vel jam inducitur ventriculi inflammatio, depellatur optime emulsionibus ex semine cardui Marie, cardui benedicti, napi, quoniam frigida majoribus, cum pulveribus bezoardicis temperatis, quibus subinde citum cum momento camphoræ addendum. Incomparabilem etiam his in casibus ad arcendas inflammationes efficaciam exivit, liquor noster anodynus mineralis, spasticas stricturas resolvendo, & dolores sine viam lassu, vel torpore, quod aliis sedantibus opiatum solent, sed potius refectione, complicant. Inprimis egregie se gerit liquor hic, quoniam partibus, cum una parte spiritus bezoardici *Bayli* remixtus & parvis dosibus crebrius oblatus, ac dum sibilum solvit, iudoremque placidum movet, efficaciter materiam virulentam exandemam ab internis ad corporis superficiem agit. Si etiam miasma pestilentielle, aut aliorum contagiosiorum morborum corpus subit, quod primario ac celeriter vim suam putredinofam & inflammatoriam ventriculo insinuat, illico lenissimum exhibendum emeticum, ac postea subjungendi pulveres blandi diaphoretici, cum nitro & paulillo camphoræ, vel oleum bezoardicum *Wædelii*, ex uncia olei amygdalarum dulcium, in quo drachma camphoræ soluta, ad octo vel decem guttas dandum. Ex iisdem his discutientibus quoque depellenda inflammatio stomachi, quæ aliis acutis morbis in statu supervenit.

## §. IV.

Præterea exterius dicitur huic malo omnibus modis obviari eundem. Sed improbo, quæ vulgo stomacho admoveantur calidiora, ut spiritus vini camphoratus, olea destillata in spiritibus soluta, emplastra quoque stomachica. Hæc enim calore suo humores stagnantes magis coagulant & exsiccant, quam discutunt & in motum eient, eodem modo ac notum est, albumen ovi à forti calore indurari, a leni autem liquefieri in tenuem humorem. Quare ego quidem magno cum fructu multoties tepide tantum applicare pulsæ vesicæ lacte cum floribus emollientibus & croco decocto plenam. Neque minus admodum proficuum censio linimentum ex olei amygdalarum unciis duabus & camphoræ drachma, cum quo præcordia frequentius inungenda & superius po-

*Materia  
exanthemata  
marica cum  
capiis a se  
extirpanda.*

*Exanthemata  
marica cum  
capiis a se  
extirpanda.*

L

nenda

neoda linea calida. Egregium quoque ad discutendum & sudorem movendum est epithema, ex aceti rosacei uncia binis, spiritus vini camphorati drachmis duabus, essentie croci, callorei ana drachma, neri drachma dimidia, composuitum & tepide præcordiis admotum.

### CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

#### §. I.

*Vena fellic  
illa, vena.*

Venæ sectio certum quidem & efficax remedium in inflammationibus parvum & vicerum, quæ copioso sanguine referta, sed ubi partes nervæ ac fibrosæ valde sunt, secundum veteres frigida dictæ, cuius generis intestina, vesica & viæ urinariæ, quæ vehementibus spasticis stricturis patent, & uberiorem sanguinis affluxum non admittunt, vix usus utilis, sed potius damnum inde expectandum. Ad declinandam autem ejusmodi inflammationem, si à dolore gravi colico & cardialgia, nec non post iram imminet, corpus valde est plethoricum, juvenile & vini penitus assuetum, inseri incisa statim cum fructu admittenda sanguinis missio.

#### §. II.

*Anodyna  
infusa.*

Sic etiam cavendum est in periculo hoc affectu ab omnibus silentibus, anodynis & præsertim quæ opium ingrediuntur. Nam hæc, cum sudoriferis mixta, in principio quidem arcere possunt inflammationem, quam atroces dolores ac spasmi minantur. Verum si adest inflammatio & paullo diutius jam duravit, perniciosissima sunt & mortem, spasmus inducendo, accelerant. Quin neque tunc liquor noster anodynus mineralis, longe tamen natus opiatiss, ex usu est, neque etiam ipsa nitrosa, quæ alias in principio egregie resistunt inflammationi.

#### §. III.

*Angile &  
horum  
mor.*

Quemadmodum porro nihil aptius ad inducendam inflammationem frigido potu; sic etiam ad augendam si jam adest tandem, hoc nihil efficacius. Ob id etiam niterum, quod liberalius sumum admodum refrigerantis est naturæ, refracta dosi tantum, cum demulcentibus, lacte, vel emulsionibus, repetita vice dare expedit. In gravi autem cardialgico dolore, quem perperam tractatum facile excipit inflammatio funesta, sollicitæ cavendum ab omnibus irritantibus, maxime emeticis, purgantibus, imo salibus sic dictis digestivis majori copia oblatis, quippe quæ spasmus magis intendunt, & malum exacerbant.

#### §. IV.

*Post iram  
que fa-  
lenda.*

Ira quoque gravis sæpe funestæ inflammationis mater, quando mox post eam cibus, præsertim minus salubris & difficilioris digestio, ingeritur, aut frigida potus ingurgitatur. Hoc vero ubi accidit, ad arcendum malum in principio nihil conducibilis, quam elicere vomitum, non tamen per validam emeticam, sed aquam tantum tepidam, cum oleis ac pinguibus mixtam, & largius potam. Sic novi quosdam post vehementem iram pessime habuisse & in propinquo fuisse inflammationem, usu tamen liquoris nostri anodynici, cum potu aquæ tepidæ, repositos esse humores biliosos copiosissimos & morbum discussum. Sed de his aliisque in somico hoc morbo tenendis,

pluribus evolvi poterit dissertatio nostra, de inflammatione ventriculi.

### ENARRATIONES MORBORUM.

#### OBSERVATIO I.

Canonicum novi Halberstadii, robuste constitutionis, ætate adhuc florentem, sub sanitate integerrima subito ac cito lethali ventriculi inflammatione affectum. Quum enim inter rixas ac jurgia vehementissime excaudisset, & paulo post vinum spirituosum, quod vocant Seel, bibisset, insequentis statim die habuit pessime. Incredibiles quippe circa præcordia dolores ipsum torserunt, cum mira angustia & vomendi conatu. Ardor quoque ipsum excruciauit stomachi, & in ipso sensus sui perquam molestus, ac si inhæret quippiam, quod exitum moliretur. Rogatum igitur à medico consilium, qui præsertim vomitorium ex sulphure animoni aurato dedit: inde æger ter valide quidem, sed sine levamine vomuit. Adauclæ potius pathemata, pulsuum ictus parvi & sere imperceptibiles facti, frigidusque sudor malo omine erupit. Subsequuta mox mentis emotio, accesserunt convulsiones & intra decem horas excepit ipsa mors. Cadavere dissecto, in ventriculo vidæ maculæ plures, nigre parim, parim rubræ, quarum nonnullæ alias in ipsa substantia constituntur.

#### Epietisi.

Quantum valeat ira vehemens ad concitandos in ventriculi regione spasmos, hæc uberius docet historia. Inprimis hunc animi affectum excipit ut plurimum gravis in illa regione compressio, in qua pylorus ac duodenum situm habent. Quin ipse hic spasmus haud raro ad ductus usque bilarios propagatur, ac ut bilis effusio in duodenum impediatur & ipsa facia reasundatur, facit. Hinc non infrequens observatio, iracundia succedere ictum, cui Sybilis juxta recte non aperientia, sed anodyna & sopientia opponere suadet. Dum vero ira fursum etiam bilem trudit, ut semper amaro sapore plenum, & restricto validus pyloro, vomendi fit conatus. Quum igitur tanta spasmorum post iram violentia; ipsa sua ratio dictat, vomitorium plane non convenire, eo quod teneras ventriculi fibrillas magis irritant, & spasmos augendo ad inflammationem pandunt viam. Mors autem tam subito in nosse, non tam inflammatoria, seu causæ proximæ, adscribenda videtur, quam potius spasmus violentiori, qui totum systema nervorum & vasorum convellens, liquidi nervi influxum in cordis musculos etiam sustinavit, ita, ut quatuor mortem novissime antecedentibus horis, vix pulsationis vestigium fuerit observandum. Illa igitur intoleraanda anxietas, quæ tam vehementem ventriculi spasmus excipit, non tamen nervosorum partium præternaturali contractioni, verum maxime nimie distensionis dextri cordis ventriculi & arteriæ pulmonalis à nimium congesto sanguine debetur. Quod enim dolor est, à male affectis dilatais nervosis membranis, id anxius etiam ille sensus, quando vasa sanguinea, præsertim circa cor & pulmones, valde diducuntur & præter naturam afficiuntur. Quum itaque nimia sanguinis copia, à spasmis ex partibus inferioribus ad ipsum cor quique cameram & auriculam dextram compellatur, ab ipso quoque hoc spasmus

spafmo liquidi nervi fufficiens in machinam hanc motoriam, nines vales totius corporis humores circumagentem, influxus impediatur ac intercipiatur, quam facile intelligi poffit mortis caufa, quae subinde tam fubito, ficut praecedenti fphacellatione, venarum affluminum h. quatur.

## OBSERVATIO II.

Spasmi  
infantibus  
in vena  
omnibus.

Balneor quidam ultra fortem, ut genius horum hominum, scilicet, foeminae triana laboranti propinquare animi virum in fubfiantia ad oculo gratis. Aegra affluta hoc, accedente febre frequentiffime vomuit, diucente tamen febre, vomitus etiam de febre iterum confitit, fed reffitit virum lapfus ingens. Reduente tertio die febre ejufque comite indivulfo frigore, vomitus quoque de purgato repetit, fummo cum dolore in firobolic cordis regione de anxietate tantum non intoleranda, remiffum hac tamen iterum de fervefcente febre. Quam vero tertia febris accessio, denovo etiam accessit vomitus, de comitem habuit dolorem stomachi omnium acerbiffimum, de qui fuprema inflare non obdure fignificavit. Nec vana fuit fufpicio Paullo enim post fumma inquietudo, extremorum frigida, animi de fectio, armum convulfo ac pofterno mores ipfa miferam fciniam occupavit. Apertum cadaver, inflammationem offendit inferiorem ventericuli partem, maculis rubris de nigris pallis, tam in duodeno, quam annexis intestinis, comparentibus. Et quod magis mirandum, virulentus viri animorum pulvis adhuc adhuc tunicis cruffaceis, ut vel manibus mortis caufa poffit tangi.

## Epicrisis.

Similis fere est obfervatio, quam confignavit Blafius, de puella quinque annorum, quae affluta croco mitaliorum, vehementiffime vomuit de convulfionibus demum perit, in qua ventericulus anguftus de contractus reperit, ut vix ovum magnitudine aquaret de veficula fellea praeter morem turgida. In noftra vero obfervatione perquam dignum, quod viri animoni, virulenta fphacilla ftricturas excitans faculas conquieverit, accedente in paroxifmo afth de febris fine, de quod viciffim frigore durum ingruente recruduerit, de effectum vehementer vomitorum exduerit. Sed notum habetur, accelfionem febrilem cum frigore de horrore fphacilis deberi, qui ex fphacili modula venient, tonaque genus nervorum, atque adeo etiam ventericulum, afficiunt. H. contrarius est motus ad exteriora tendens fub afth, qui ob id fphacilorum de convulfionum quali antidota. Quod autem post paroxifmum quieverit operatio veneni, in univerfali lege motus microcofmica rationem habet pofitam: fci licet valde vehementem de diuina perfiffentem fphacilam ftricturam ftricturam excipere ejufdem partis afflictae resolutionem de anioniam, fub qua afth ventri effit ftricturae. Ur adeo patet, ad actionem veneni, atque ac medicamentum activi, requirit partium vitalium ad motum difpofitionem.

## OBSERVATIO III.

Infantibus  
in arfenico  
vomitorum  
infantibus  
in difpofit.

Hofpes quidam admifcuerat jufculo ex errore loco facchari arfenicum, idque appofuerat convulfionibus fuis, quorum plurimi generofa de no-

Frid. Hofmanni Oper. Tom. II.

bili fuppe fuit. Vix deguffata jam, quam omnes peccato augi inciperent, circa flomachum dolore, cum laborum tremore de vomendi conatu. Advocatum illico uter, utri de cognita mali caufa, copiose ingurgitare juffi lac cum oleo amygdalarum dulcium. Vomuerunt inde per diuturnum dei flume, quidam vel cenit, fimp- per tamen denovo ingere juffi lac, donec nihil amplius veneni fupereffe videretur de vomitus quieveret. Sic evaserunt plurimi brevi de explicita ratione praefentem mortem; non nullis tamen, qui lac de oleo juffo parcius potarant, emollicentis adhuc de ulceris clyfluris adhibere fuit neceffum.

## Epicrisis.

Optima de praefentia veneni antidota heic ex fimplici, vili de domufico dysnomia. Certe vix cuiquam credibile foret, in lele de oleum nobiliter latitate virum, nifi experientia ita omnino effe demonftraret. Ea enim mentis humanae indoles, ut exotica, perniciosa de agria obtempera caput atque vult; domeltica autem, parabilia, ulvis obvia de vilia negligat de contentui habeat. Sed divina fapientia ab oculis hie longe nobiliorem de fructuofiorem indidit facultatem medicam, ac magno pretio, labore de artificio compandandis. Notum hinc in arte exercitatis, fimplicem aquam calidam, vel frigidam, lac, fctum lacris, olea expreffa, acetum, nitrum, terrea abforbentia, falta mineralia, ulvis regetunda, optima adverfus longos, graves atque rebelles morbos effe praefidia.

## OBSERVATIO IV.

Sereniffimus Princeps, aetate florens, fanguine de fuccis plenus, vixum potens fpirituum liberaliter potarat, poftera die corpus fub venatione ad fudorem ufque largum vehementer commoverat, ficque affluens de fitiens magnam cereviziae haufum ingurgitavit, frigide quoque aurae corpus expofuit. Inde mox conquafus effit de horrore, languore, interno ardore, vigilia de inquietudine, cum vomendi conatu. Medica accitus, terram intermitten- tem, tum popularum, fubelle rana, potexit vomitorium, ex tribus tartari emetici granis. Hoc affluto ter vomuit maxima cum anxietate, quae certis intervallis ita increvit, ut nullus fuffilere ac detineri poffet. Aderat praeterea virum proflratio maxima, ut non fine animi defecfione trechus effe poffet, pulfus emicuit languidus, irregularis, interdum celer, ex ore fpiravit halitus mirum foetidus, mens tamen exacte fubi confitit. Nocte mortem antecedente inceffit ipfum horro ingens ac frigus, accellerunt convulfiones de feptimo die fyncope quali correptus obit. Scclum effit post mortem cadaver, in quo ventericulus fume totus vifus inflammatus, de in ipfius cavo, quod omnium rarum, aliquot cochlearia feridi de corrupti fanguinis, ipfe etiam flomachus expanfus de corruptioni propinquus, ut ad levem anafthum ipfa fubfiantia diliceret. In venis, de maxime feparata ab hepate cava, nullus fere fanguis reperitur. Lien de finiftra ventericuli pars, cum pulmone lobo finiflro, tota corrupta, nigricans de foetida. Quumque fpongia puridus ichor abfliteretur, is adeo infecit fpongiam, ut tota auro de nigricante colore imbueretur, nec calida, nec frigida detergenda.

## Epiſtola.

Paret igitur, brevi tempore ſphaceloſa corruptione inſeſſe viſcera, ut hic ventriculū, ſicem & lobum pulmonum ſiniſtrum, quæ atro colore & ſordidiſſima corruptione naſes inſicere ſerient inſecta. Sine dubio tamen, ventriculus primū ſphacelatus, viſcera inſeſſe reliqua. Ad generationem autem huius morbi ſecū non tantum hauſus largus frigidus corpori calenti immiſſus, verum etiam improvida emetici aſumtio. Nunquam enim certius & gravius damnum à vomitorio menendum, quam ſi ventriculus & inſeſſina graviſſi ſpſmo, vel inflammatione aſſecta. Mineralia quippe emetica virulenti quippiam alunt, quā in convuſſiones & ſpſmō ventriculi & tonum nervoſum genus acripiunt. Hinc peſſime agunt medici, qui tam temerarie ad ipſorum uſum deſcendunt, atque ſedem, vel cauſam morbi exacte ſcrutari. Quod ſi enim poſt uſum quaiſmodi pharmaci ſymptomata ingravescunt, & ventriculus deprehenditur inflammatus, juſta omnino hæc conſuſio: inflammatio aut jam ante emeticum fuit, aut non; ſi ſunt, male datum emeticum, ſi non, lubrequas ſymptomata inductum eam eſſe teſtantur. Interim demum partes eſſe inflammatas recte conſiciendum, quando virium magna eſt proſtratio, ut aegri facile animo deſiciant, quando evanefcente ardore exquiſito, conqueruntur de ſenſu frigoris circa præcordia de ſaliva ſubinde eructat in os; quando horrore ſpſmi & meteorifmū ſenſu percipiuntur ab aliſſimis liquidis in abdomine; quando demum oculos ob debilitatem claudum ſubinde & dormire videntur, poſtea vero de majori debilitate & anxietate conqueruntur.

## OBSERVATIO V.

Inflammatio ventriculi dicitur de ſeſſina.

Fœmina quinquaginta & quod excurrit annorum, ſanguineo-phlegmatica, corpore ſpongiſſa & animi ſic ſans ſedati, omiſerat ab aliquot annis fuſtam aſis ſanguinis miſſionem, vitam quoque coluerat maxima ex parte ſedentariam, & tamen appetitū largius paulo indulſerat. Hæc gravius urinata corripiebatur ira, & poſt hanc languorem perſentiebatur virium cum inappetentia. Poſt aliquot dies denuo iracundia commovebatur, ſimulque aſſumebatur intrita panis cum cereviſia frigida. Inde mox horrore ipſam inſeſſat, inſequenti nocte ardor inſenſus, præcordiorum anxietas, inquietudo & punctior in ſtomachi regione dolor, ad doſum uſque excurrente, ruſibusque exitum præcludens. Medici morbum colicam eſſe aſſumantes, carminativa cum anodynis dederunt. Perſeverante autem anxietate præcordiorum cum maxima inquietudine per totum morbi decurſum, interveniens ſubinde convuſſivi quidam motus, cum manuum tremore, aquoſus humor in os eructatus, & pulſus antea celer ac fortis, in debilem & inæqualem mutatus. Quarto die neque de æſtu, neque etiam de ardore, ſed tantum de ſui & maxime, quod exquiſitum frigoris ſenſum in cordis regione pateretur, conqueſta eſt. Hinc frigidum non appetit potum, ſed calidum ſemper, maxime inſulm thæe ſorbavit, ex quo tamen peſſa ſemper habuit. Quæta quidem ſemper jacuit dormire viſa, non tamen dormivi, mens ſibi conſuſa, debilitas autem magis magisque increvit, alvus ſine clyſtere diſmiſſa nihil, nec ullum medi-

camena exſtiterunt effectum. Sæpimo poſius die acceſſit ſingulus, nono refrigerat prius extremis, per aliquot horas ſine ſenſu jactus, ac demum placide exſpiravit.

## Epiſtola.

Nullum omnino eſt dubium, quin morbus hic conſideretur in ventriculo. Huius quippe nervoſo membranacea ſubſtantia paſſa eſt inflammationem, ex præcedente repetita iracundia & ſuperinſeſſa frigida cereviſia. Et quoniam corpus fuit cacoehymicum, ſurcis craſſis & impuris plenum, promta in ipſo fuit ſtaſis ſanguinis geneſis. Faciam autem eſſe inflammationem, horrore, æſtu, anxietate præcordiorum, dolor pungiſſivus in ſtomacho, ruſus interſeſſi & accedens demum ſingulus luculenter arguant. Lenius tamen præceſſit & increvit inflammatio, ac demum in ſphacelum conſeſſa, quem frigoris in præcordiis ſenſus, ſumma debilitas, pulſus languidus & ſingulus præcederunt. Notandum enim inflammationem leniorem, vel celeriſſimam progreſſi, pro corporis diſcrepantia & diſſerente cauſarum vehementia. In ſenſibilioribus quippe & poſt venenum ciſſime fit & ciſſime decurrit, in phlegmaticis autem, ſenſibus, ex iracundia & refrigeratione lenius ſerpit & ſcripto demum, decimo & longius die necat. Nihil minus cita ſemper opus eſt ope, eodem modo ac in ſphacelo exterioris imminente. Neque ea præter dubitandum, quin in noſtra etiam, adhiberi tempeſtively congruis præſidiis, ſanctus averſi poſſiſſet eventus.

## OBSERVATIO VI.

Vir, circiter quinquagenarius, ſanus, robuſtus & integer, poſt iram graviffimam, mox afflictorum tremore, horrore ac refrigeratione exterminatus, cum ingenti præcordiorum anxietate viriſſime deſeſſione, noctem etiam ſequentem, iſdem ſymptomatibus adhuc perſiſtentibus, tranſiſſe, nauſam percipiebat continuum & vomendi conſum, una cum labore tremore & oris amaritie. Hiſ jactans ab advocato medico impotente flagitabat vomitorium, qui primū illud dare reuſus, victus tamen conſens precibus, porrexit. Sed quia ſumto hoc bis vel ter tantum cum ſumma anxietate & diſſiculate pauca biliſſa & mucoſa vomuerat, ob uberiores evacuationem aliam poſtularit doſin, quæ ipſi etiam conſeſſa: hinc autem non ita multo poſt in deterius verſa ſunt omnia. Adfluere quidem ſinguloſi ruſus continui, ſed nihil repiebatur, afflixit præterea inquietudo ſumma, oppreſſio, ſpirandi diſſiculus, intolerabilis ardens & anxius dolor in epigaſtrio, cum extremorum refrigeratione, pulſu parvo & non nihil intermitente. Peritum tandem à me auxilium, qui accedens, ægrum extremam ſere agentem inveni, ob ſpſmōm vehementem, quæ omnes ſere corporis nervoſas ſenſus & motus vacantes partes occuparat. Hæc videns, expendi mecum, & quom à ſumto veneno ariemali eadem ſymptomata oborta largiori lactis & olei cujuſſarum expreſſi poſui ſeſſicillime ſubſtata laborantes tantum non e moris ſaucibus creptos, cognatum haberem, pariter lac bubulum reſpidum, ſuccellive, ac copioſe, bibendum, ſuſi. Inde inſigniter quidem atrocia hæc ſymptomata conquieſcere & per noctem remittere viſa, mare autem ipſe æger, inſcio medico, unciam unam ſalis

Ex vomitorio & ſola purgatione poſt iram.

Ela-

Erbahmentis, adaperiendam quæ firmiter clausa erat, alvum flantique & anxietates discutiendas sumis, pessimo vero succellu. Symptomata quippe priora revera omnia, aetioia longe majori, ut assumis licet analeptici anisipalmidici, animam, inera tertium a summo primo emetico diem, efflaverit.

## Epietisi.

Vel hanc ob causam commemorabilis hæc observatio, ut medicorum quisque inde discat, innotia alias remedium emeticum sibiisatum, moderatiori dosi, uni tartarus emeticus ad duo grana datus, pro certa dispositione spasmodica ventriculi & parium nervosorum, veri veneni vim habere & lethalem effectum exorire posse. Quamobrem circumspiciat quilibet medicus, non tam promptus sit ad dandum ejusmodi pharmacum, sed prius scrutetur cum cura corporis ægrotantis cum ventriculo dispositionem ipsamque morbi causam urgentem. Deinceps illa quoque unilissima cautio ex funesto hoc casu elicienda: salia neutra, etque amaricantia, ut sal Egratum, Erbahmentis, Sedlicense, ad deducendos effricat & sineremolitia per alvum viscosos humores egestia, tali in casu ubi primæ viæ spasticis striculis tenerent, nequam esse proficua, ut potius noxam possint inferre & gravissimam & periculosissimam. Sed hanc in rem plura jam attulit in *Diss. de medicina emetica & purgante post iram venena*.

## OBSERVATIO VII.

ventriculi  
duo anni  
jam inanis  
draculi, duo  
phragma-  
tis inflam-  
matio in-  
solita. §

Juvenis virginis annorum, Juris Studiosus, sanguineo-cholericus, macilentus & in iram levi ex causa proclivis, ebrius ex largo vini potu rixas habuisset cum quodam, ac sub his excanduerat vehementissime, postea vero sub coelo algidissimo vesperi traha vectus fuerat. Domum delatus, prævio horrore incidit in alvum gravem, inquietudinem, præcordiorum anxietatem, ardore & petulantiis in dextero lasso dextorem, cum magna spirandi angustia & pervigilio. Irro utipais non nullis, tertio die secta vena & sanguis extractus crassus ac niger. Nihil minus de interiorum ardore perpenas habuit querelas æger, ac simul ac quicquam allumisset, illico gravem perferens dolorem, kreans materiam cruentam egerit, pulsus fuit celer, debilis, quandoque plane intermitiens, & crescente indicis virtum lapsu, septimo die è vita decedisset. Sub excrucio mox post mortem cadaver abominandum exspiravit hæterem, & scrutantibus mortis causam ventriculus sese obnolit mirum tumida, inflammatus ac in fundo, cum ipso pyloro ac duodeno, niger, corruptus & putridus. Dexter quoque pulmonis lobus sphaicellatus comparuit & fouda purillagie albedus, una cum diaphragmatis portione gibbe partis hepatis.

## Epietisi.

Quantum ebrietas, gravior ira & impensior corporis refrigeratio valeant, ad labeficiendum sanitatem, sphaicellum visceribus internis inducendum & brevi necandum, hoc unicus testis facit casus funestus. Certe vix fortissimum venenum tam deleterium obinet facultatem, ut tam cito tantam corruptionem sphaicellum invahere queat. Sed adeo non nunquam in trivisum aguntur mortales, ut cupiditatibus præ-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

via obsecundando vitæque sectando, mortem sibi procurare ipsi, tanto certius, quando tria, uni heic, simul uno tempore concurrunt atque conspirant.

## CAPUT IV.

## De Angina.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Angina est inflammatio faucium, juncta cum ardente dolore, numore, rubore, respirandi vel etiam deglutendi difficultate & febre, orta a sanguinis, vel feri viscidis acris, in sanguineis, vel lymphaticis tubulis stasi, periculi non expeti.

## §. II.

In dignotione hujus morbi, locus ubi consistit, imprimis notandus. Est autem sedes in faucibus maximeque in partibus, quæ pharyngem & laryngem occupant & constituunt. Heic occurrunt phares numero & maximi usus ac sensibilibus indolis partes: radii scilicet lingue cum osse in orbe, narium foramina in os hianzia, oesophagi initium, musculi pharyngis, item laryngis interni, & exacti quorum numerum tredecim, glandule potius majores & minores, tonsillæ, musculi maxillas moventes, valvularum sanguinorum & lymphaticorum, nec non tuncæ nervorum præpagines.

## §. III.

Proue igitur inflammatio alias atque alias ex his partibus tangit & occupat, gravior, vel levior est, & varia etiam sortitur nomina. Nimirum vultissimam est distinctio anginae generalis in interioris & exterioris, five manifestam & occultam. Illa in interioribus nervis & musculosis faucium tunicis consistit, & ob id neque in collo exteriori, neque in ore, quantum visui patet, tumor & inflammatio conspicitur, sed ardor interioris, febris acuta, in graviori casu non modo spirandi, sed & deglutendi difficultas, multumque periculi subest. *Aetiani* na tamen describit, lib. I. cap. IX. lingua extra dentes & labia præmanens, saliva effunditur, pennis crassissima, facies rubunda & inflata, oculi exserti, patentes, valde rubenti, potius in naves refunditur, dolores acerbissimi, sed strangulatione vexati, eos obscurus sentimus, pectus & cor ardent. Frigidus aeris desiderium adeit, & admodum exiguitas inspirant, consuepe ducere demum intercluso pectore transitu strangulantur. Externa autem magis in oculos incurrit, & occupat possitum musculos & glandulosas externas partes, amygdalas, lingue radicem & uvulam, facilius quoque discutitur.

## §. IV.

Specialius ratione partis affectæ considerata angina, gravissima & periculi plenissima esse solet ea, quæ interioris laryngis musculis insidet, & in qua exterioris non rubor, nil circa cervicem aut collium observatur, sed interne ardens dolor urget, & ob angustiam aspectus arterie caput, vox non modo suppinitur, sed & spirans difficultas redditur, quæ quandoque plane præcluditur, & quidem tam celeriter, ut observantium fide, haud raro intra viginti quatuor horas, vel tertio die necet. Græci hanc vocant cyncanchem. Quæ autem ipsa synanche audit, interius

*Synanche  
& cyncan-  
chem.*

pharyngis musculos occupat, pariter sine conspectu externo tumore & rubore, majori deglutendi, quam spirandi difficultate supatur, sed ingesta plerumque cum impetu per nares redduntur. Sed quando tumor & rubor oculos & tactum incurrit, inflammatioque externis pharyngis musculis incumbit, parasyneanche, quae autem laryngis, parasyneanche à veteribus appellatur.

## §. V.

Deinceps à praëdictis angina distinguitur in veram, sive exquisitam, & notham. Vera oritur à sanguinis stasi, spuria vero magis à congestione feri, quam sanguinis inflammatoria, in faucibus & colli internis. Illa morbus acutus est, nunquam sine rigore & febre, hac autem junctam habet febrem plus lymphaticam & catarrhalem, quam acutam. In exquisita non modo dolor ardens & pungitivus circa interiora faucium observatur, sed & lingua sanguine turgens, obscuro rubicundo colore tincta, facies simul rubet, arteriae temporales valde pulsant, quandoque cephalalgia, sopor, vel sensuum torpor pangitur, quandoque hypophymia accedunt, quin, si gravior, spirans difficulter trahitur, anxietas est maxima, inquietudo & extremorum resipiscencia. Citam hinc poscit opem, multumque periculi alit. Sed in spuria gravia haec postrema pariter plane absunt, pariter mitiora adiunt, minus etiam periculi, si rite tractetur, mendum. Distingui porro angina potest in siccam & valde ardentem, & humidam aut valde mucosam. Illa fit à sanguine, cum febre valde acuta, uti dictum de vera. Hac autem magis chronica est, febribus catarrhilibus associatur, cachecticis & scorbuticis familiaris est, atque etiam lingua & faucis crasso viscido muco cum oris fetore obducitur.

## §. VI.

Omnes haec anginae species merito discernendae ab aliis faucium afflicibus. Vera quidem & sicca non permutanda cum illa inflammatione oris & oesophagi mucosa, quae vocari solet prunella alba. In hac enim muco albo tota faucium regio & lingua obducitur, lingua filiformis doloris contrahitur, & junctus est simul magnus ardor, qui usque ad praecordia pertingit, proptereaque Germanis audit *die Herz-Brand*. Malignis hac sepe accedit febris, omne plerumque malo, quia praeterea arguit ventriculi & oesophagi inflammationem. Neque enim omnis faucium inflammatio est angina, sed ea tantum, quae cum spirandi & deglutendi difficultate praëta. Hinc multum ungue ab ipsa discrepat levior inflammatio colli & iomorum in faucibus, cum tumore & dolore glandularum, quam nostri dicunt, *die böse Hals*, quae frequens admodum est febribus, nec non si malum emittatur cum erosione, huc venerea afflicta. Vera quoque & interna angina discernenda à solenibus fauinis hystricis & hypochondriacis spissis, qui faciem constringunt & respiracionem aequae ac deglutitionem reddunt difficilem. Hi enim sine febre sunt, mox remittunt atque recedunt, atque etiam discuti possunt facile. Denum angina differt ab ardentibus illis & doloribus in lingua pulsula, quas dicunt aphthas. Enemim in angina dolor & ardor laevis hic diffundit de vicinis partibus simul in consensum trahit; aphthae vero curtas duntaxat partes afficiunt, quibus pulsulae cum dolore & rubore

insident, neque tam facilem habent comitem febrem, quam angina.

## §. VII.

Causa igitur anginae proxima stasis, vel quodque congestio feri inflammatoria in faucium internis eveniens, ad quam inducenda faciente multa. Scilicet observacione constat, eandem frequentius incurrit, quibus evacuationes sanguinis spontaneae per nares, utrumque haemorrhoides, aut lochia, supprellae, aut omisse artificiales, per scarificationes, vel venarum sectiones. In his certe promta ipsius generis post impensioem sanguinis commotionem, sive per ponam spiraculorum inebriantem, sive per validam corporis exercitationem, vel etiam nimiam vociferacionem, praesertim in aere frigido factam. Observavi quoque à fumo foriori sudorifero, admisso mox aere frigidiori, item à balneo nimis calido, post haustum potus frigidi, inflammationis anginae initia, quae tamen adhibitis congruis internis & externis remediis, feliciter mox disculsi. Neque minus frequens anginae generatio admixta in faucibus acris, fibras valisque irritantibus impenditur & constringentibus. Sic experientia teste, funesta saepe faucium inflammatio accidit illis, qui conclavia calce reteneret inducta inhabitant in infirmitate dormiunt, quo eadem aliquando plures simul instantes erectos esse ego novi, ac idem notabili exemplo confirmat *Tulpus lib. III. cap. XLII*. Eandem inflammationem venenos causticis inelle facultatem, iter omnes constat. Ex purgantibus, elleborus albus specificus quasi indole petit fauces & strangulationem facit. Argemum vivum, praesertim male ex ipso preparata pharmaca, fauces male afficere & inflammare pariter constat. Ex idem quoque de solano furioso, nec non mortui canis rabidi accidere, medicorum testantur observata. Inprimis arsenicalium etiam & mercurialium mineralium fumi, item vaporum spirinum mineralium, idem hoc malum improvide hausti causantur. Horum quippe omnium subtilissima & magnae penetrantiae fucula alius scilicet musculis, qui cartilagineis laryngis movent, infiltrando, nervosis ibi tunicas stringendo & liberum sanguinem per vasa transiunt interceptando, tumorem ejusmodi inflammatorium, pulsatorium, cum dolore pungitivo, saepius excitant funestum. Quod enim res acutae pungentes, firmis hisce partibus inhaerentes, solam hujus afflicti suppedinare possint causam, manifesto testantur sicut piscium aut officina aspera deglutita & faucibus intrusa, à quibus tale malum saepissime excutitur, de quo coratibus observatio est *Hildanus Crat. III. obs. 42*.

## §. VIII.

Sic per se & sua sponte exoritur angina; succedit vero etiam huius raro alii morbi etiam symptomata. Accidit hoc saepius in diarrhoea & dysenteria, praeterea si fluxus interpellive cohibetur, de quo memorabile exemplum apud *Hildanum Crat. III. obs. XXVII*. Idem evenit, à repulso praepollere erysipelae, aut topici perperam tractato podagrico dolore. Neque minus in variis & febribus malignis ac pestilentialibus, cum summo vix discriminis, denum supervenit. Inprimis de febre sic dicta Hungarica, observationes anatomico-practicae testantur, quod ut plurimum inflammatione meningum & faucium, quae ad ventriculum & oesophagum extenditur, necet. Sed causa hujus symptomatici infusus

Symptomata  
etiam  
est quidem  
symptomata

Parasyneanche  
est  
parasyneanche

Vera, vel  
spuria

Sicca vel  
humida

Differt à  
prunella

à leviori  
inflammatione

à spissis  
hypochondriacis  
fauinis

ab aphthas

plerumque vel in nimis diuturna alvi confipatione, vel perpiratione improprie cohibita, vel repulsa praeposita ad interiora materia acti quassata, querenda. Quando vero epidemium est malum, aeris vizio tribuendum, & plerumque aliquid maligni complicatum. Accidit hoc haud raro, si diuturna aëris pluviosa & humida fuit constitutio, si ver est, vel autumnus, prius jam Hippocratis Sect. III. aph. 16. 20. 22. testimonio, & illud verum esse, propria observatione confirmat Beribolus Lem. I. obs. LXXXI. Frequens quoque huius mali incursum, si aer effluvis sale acerrimo subtili, ob insectorum copiam, refertus, sole praesertim occiduo, lauritur, eamque ob causam Romæ familiarem esse, & quandoque pestis insulas grassari anginam, fidem facit Hollerus lib. I. praex. c. XXXIII.

## §. IX.

Cæterum anginae morbus, tam ob febrem haud raro acutum, quam suffocationis metum, multum alit periculi. Periculosissimam autem esse veram internam & latentem, jam diximus, & de hac valet illud Hippocratis editum praedit. lib. III. c. VIII. angina graevissima est, & celeriter interit, quæ neque in cervice, neque in faucibus constituitur quid habet. Haec etiam eodem die, & secunda, & tertia, & quarta, strangulat. Inprimis maximum suffocationis est periculum, quando mûculus, qui vocatur thyroarythnoides, nimæ occlusioni ducatur, affectus. Anteça porro admodum est symptomatice, ob corpus jam debile & materiae virulentiam raro superanda. Malum etiam, quando tumor in externis subito disparet, non imminuit, sed auctis potius symptomatibus. Tum enim alias nervosae partes transili morbus, & vel cerebrum petens, phrenitidem cum convulsoribus, vel ad pulmones delatus, peripneumoniam facit, testimonio Hippocratis Sect. I. aph. X. lethalem. Sed quando suffocatio strangularia remittit, tumor, dolor & rubor maris extoriorum vergit sensimque evanescit, felicem solutionem nunciat. Sin lectus, in apostema aut morem fit transitus. Si in apostema, ac pus in bronchia & pulmones effunditur, tetis Praetor lib. XV. obs. XXXIV. except admodum eventus. Si in morem, nunciant hanc spuma ante os, lingua valde humida, purpureo-tigra, extremitatum rigor, flamma praecordiorum angustia aequæ anxietas, cum pulsu duro, convulsivo & intermittenste.

## CURATIO.

Cum methodo Medendi.

## §. I.

Ipse truculenti huius mali curatio differt, prout variae ipsius sunt species de singularum causis differunt, ad quas recte permiscendas de opportune removendas, unice directæ esse debet medicis intento. Quando itaque ex manifestis signis eminet sanguinis ad caput congestio observatur, quæ non modo vehementem inflammationem suget, sed & lethalium symptomatum est causa, protinus de primo omnium hæc debet esse medici cura, ut impetum sanguinis a parte affecta deriverit, id quod commodissime sectione venæ confinis perficitur. In hoc enim auxilio precipuam de unicam fere salutis spem, inde ab omni ævo, tam veteres, quam recentiores me-

dici, collocarunt. Insat omnium sit Hippocrates, qui lib. de lac. in bum. §. 1. sic angina tradit curationem: angina affecta, a sanguine in venis colli collecto & coagulata, sanguinem ex venis brachiorum & pedum detrahet, & simul alium inferne subducat, quæ, quod morbum exuberet, destrabitur. Sed quo pacto de ubi id faciendum, non omnes æque consentiunt. Plerimi enim sectionem venarum sublingualium suadent, quam alii rejiciunt, quia si non fiat sufficiens apertio, parum sanguinis effluet, si vero amplam fixationem, hæmorrhagia sequetur non raro letalis. Inter eos qui spectant, pusillimum Tulpus lib. I. obs. LI. hanc ob causam, quoniam sanguis eadem attrahatur ad locum per se angulum & facile suffocatio inducatur, lepius ab ipso annotata. Alii, ut Zacutus Lusitanus Hist. Med. praex. lib. I. hist. LXXXVI. Job. Stephani in Hippocr. de frust. bon. Trillavius & Ferrius in lib. epid. sectionem venarum jugularium externarum, praesertim in malo desperato, sique praesens est strangulationis periculum, mirifice commendant. Sunt porro qui scarificationem dilaudant, in nucha de more, ut Platerus lib. II. pag. 355. Annotat Lusitanus Cent. III. curat. XXVIII. Zacutus Lusitanus in praex. admirand. lib. IV. quæst. LII. circa laryngem Riolanus in eschirid. anaton. lib. IV. p. 385. Hirudinum appositionem pone aures atque in cervice Capivaccius & Hollerus Malum.

## §. II.

Post sanguinis missionem, præcipiente eodem Aetio de Hippocrate, aperienda alvus, quo etiam huius beneficio humores versus inferiora trahantur & evacuentur. Sed his minime acriter, neque cathartica, in forma pulveris aut pilularum, sed minora, & quidem liquida, convenient. Ut vero una, quod dicunt, fidelis duo debeat nec parietes, ac non modo superflui humores detrahantur, sed de acris salis contentemur, unilissimum erit, decoctum ex manæ uncis duabus, niri antimoniati drachma una cum dimidia & feri lactis uncis decem. Si autem per os nihil ingeri potest, enema injiciendum ex lacte, melle, oleo amygdalarum dulcium & sale communi ac citro.

## §. III.

Evacuatis sic ram sanguine superfluo, quam humoribus impuris, opera danda, ut humor sanguineus, vel scrolicus, tubuli impactus, resolvatur & discutatur congruis remediis, tam internis, quam externis, & febribus æquæ simul contemperentur. Hunc in finem peritus conducibilis frequens usus maxime diaphoreticæ & levis admodum ex aquis antispasmodicis de diaponicis, florum sambuci, nîæ, primulae veris, acacie, galegae, herbae cardui benedicti, scordii, cum discolo Fracallari, antimonio diaphoretico, lapide prunellæ, aceto quoque & cancrorum lapideis, nec non fymopo papaveris rhæodæ. Conducant etiam ponis diluentes & humectantes paulo liberalius danferum quippe lactis dulce & acidulum, cum succo citri & liccharo paratum, pelina ex hordeo munda, radice scorzonere & rasura cornu cervi, cum fymopo acetositas citri, decoctum avenaceum, ipsum lac quoque, tantundem aque remixtum de saccharo atque mo-

## §. IV.

*Externis  
sunt remedia.*

Externis præterea ancipiti huic morbo obviam eundum, non nullis quidem in oris cavo, non nullis exterius in collo atque cervice, quo his etiam dolor & æstus inflammatorius mingeatur, acrimonia humorum temperetur, &c., qui in vasculorum angustis firmius subsistunt, succi dissolvantur. Externe frequentissimi usus sunt cataplasmata ex emulsionibus, paregoricis & discutientibus, floribus sambuci, meliloti, chamomillæ vulgaris, verbasci, radice liliorum alborum, ficibus, croco, semine anisi, fœniculi, farina lini, ex lacte coctis, quibus non nulli, nidos humorum & stercus canis, seu specificæ, adjiciunt. Meretur hoc nomine etiam commendationem emplastræ lenientis, ac mollientis, uti est diachylon simplex, aut de meliloto, malaxarum cum oleo amygdalarum dulcium, vel admixtione spermaris ceti, croci & camphoræ efficacius redditum. Intra os vero non facile fuerim gargarizata, cum injectione per syphonem, ubi magnus dolor & siccus ardor est. Sufficit os subinde colluere, congruo tepido liquore, cui concinnando serviunt pœura, ros dianicum, diamoron, syrupus granatorum dulcis, papaveris rhœodas, violarum, mucilago seminis cydoniorum, cremor lactis, lactis prunellæ, quæ omnia pro circumstantiarum ratione, vel lacte, vel decocto liquiritiæ, ficum, aut avenæ miscei possunt. Neque minus nobilis est virtus olei amygdalarum dulcis recentis, cum spermate ceti, croco & syrupo violarum, in decocto avenaceo dati & aliquamdiu in ore detenti.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

*In angina  
nisi misceatur  
pericula.*

In angina sanguinea & corpore plethorico, omnium primo per sanguinis missionem succurrendum. Nam si in ullo morbo, certe in hoc, à præsentaneo periculo ipsius mortis liberat. Sed momentosa & præcepti est juvandi occasio. Optimum auxilium ex sectione jugularium. Si vero hanc inflatendi copia deficit, aperiendæ sublinguales, ita tamen, ut prius secetur Æschialis. Et quando angina sanguinea accedit febrî ardenti & Hungaricæ, simulque phrenitidis mens est, vires tamen imbecilles largiorem sanguinis subtractionem non ferunt, cito sublinguales tantum aperiendæ. Quando autem ab acrimonia causata nervosis faucium & laryngis tunicis inherente hoc virium oritur, neque manifesta adeit sanguinis redundancia, indicatur pœura scarificatio in cervice & mento, vel hirudinum appositio. Ubi etiam in cacochymicis & phlegmaticis, à copia seri viscidî, fauces & externas colli partes obidet tumor cum dolore & leni inflammatione, præferenda venæ sectioni, scarificatio, in nucha & scapulis.

## §. II.

*Externis  
in angina  
ardente.*

In usu externorum attendendum merito ad diversitatem inflammationis in faucibus generis, & singulis accommodata remedia sunt opponenda. Itaque in omni faucium inflammatione dolorosa & ardente, julepus rosarum cum nitro & momento camphoræ deglutitus, eximie conducit. Gelatina quoque cornu cervi rite parata, cum albumine ovi probe depurata ac lucco porcorum Chi-

nensium, nec non saccharo condita, iterato summa, egregie levat. Si autem fauces ærem, ardere, lingua tueret & respirationis æque ac deglutitionis difficultas esset, insectus paradoxus, ex albuminis ovi in aqua quassati uncis binis, æque rosarum uncia, syrupi granatorum, diamoron ana uncia dimidia, salis prunellæ granis duodecim, cui, pro circumstantiarum conditione, viginti vel triginta liquoris anodynî guttæ indantur. Tum etiam exterius collum & cervice oleo camphorato, ex oleo amygdalarum dulcium uncia, olei papaveris albi drachma duabus & camphoræ drachma dimidia, inungendum.

## §. III.

In angina latente interna, valde æstuosa, solo lacte & ejus cremore, addito lapide prunellæ & syrupo papaveris rhœodas, os subinde colluendum, & frequenter bibendum lactis serum. In œsophagi autem inflammatione, febribus malignis in statu haud raro superveniente, ex usu est pulvis, ex nitri drachma, camphoræ granis tribus & sacchari uncia, cum emulsionem amygdalarum dulcium, & immixtus dandus, & exterius in ore aliquandiu tenendum. Et ubi ab hæc illæ inspiratis exhalationibus acerbis metallorum, mineralium, calcis etiam vivæ & argenti vivi, suffocationis periculum accidit, nec purgantis, nec venæ sectionis locum habent, sed contentiosissimum locant operam humectantia, demulcentia, interna & externa, hæc cum nitro, cataplasmata superius descripsit, nec non enemata.

## §. IV.

Inflammatorius ille dolor, qui à sero falso acris in glandulosa faucium carne, circa pharyngis & laryngis confinis, fit, cum rubore & copioso salivæ fluxu, sine febre, opeime discutitur ab initio statim gargarismo ex spiritu vini Rhenani, vel Francoeci. Quam præsentanea enim hujus sit virtus, diversis verbis testatur *Walavi meth. med. pag. 112.* inquit, *angina afflicta in principio sese spiritus vini gargarizet, omnis guttaris inflammatio cessabit trium horarum spatio, sive solus hunc in usum cedat, sive cum aliis remiseratur.* Et *Marrivau* hanc ob causam in cynanche vera commendat actu calida. Ipse quoque novi, faucium inflammationem brevi fuisse discussam, gumulis octo vel decem spiritus vini camphorati, in quo granum nitri liquatum, lente per fauces dimissis. Quem in finem alii commendant essentiam pimpinellæ albæ, cum spiritu vini confectam.

## §. V.

Quando magna colluvies humoris impuri ferrosi ad palati & faucium glandulas decurbit, crebrius usurpanda sunt leniora laxantia, manna, stibabarbarina, tartarea & passulata. Tum etiam apprimè conducit gargarisma, quod probasi habet sal pharyngæum à *Zobelo in sarsologia* descriptum, quod preparatur ex cremoris tartari & nitri uncia, aluminis ulsi uncia dimidia, solutis in aceto destillato & solutione postea secundum artem coagulata. Sic quippe parati salis drachma, cum duabus drachmis mellis, in quinque uncis aque plantaginis solvenda & cum liquore hoc fauces tam crebro eluendæ, quam idem cum syphone subinde inspiciendæ.

## §. VI.



## §. VI.

*Empyema  
non  
diffusa-  
tum de in-  
flammatione  
apice.*

In faucium & glandularum tumoribus inflammatoriis, empyema emollientia, supra tradita, præferuntur merito cataplasmatibus, quibus ob plures difficultates, rarius uti soleo, sed frequentius decocto specierum emollientium ex lacte, vesica indico. De gargarismatum vero usu notandum, quod cum syphione injecta locum non habent: impensiori enim atritu dolorem & inflammationem magis exasperant. Melius igitur ac tutius, os cum liquore ad gargarismum subinde cluere. Quod si autem de hoc propter impotentiam fieri nequit, injectio tenuissime tantum adigenda, ne irritatio ad vomitum fiat, caput quoque antrosum inclinandum, non retrosum, ne diabibendo ad asperam arteriam suffocationem minuetur, de iterato incipiendum, si magna mucicopia inhæret. Præstat præterea in omnibus hisce faucium affectibus abstinere a loquela, quia crebrior et fortior lingue agnitio malum exacerbat.

## §. VII.

*De suppu-  
ratione  
apice.*

Si tumores faucium ad suppurationem tendunt, eadem optime procurari potest caricis pinguis ichore detentis. Et quando tonsillarum tumor inflammatorius ichore repletus, externe nihil præstabilis deprehendi melle rosato, cum syphione vitrioli remitto, & sæpius cum penicillo admo, quod tumorem minuit, mundat, ulcerem affluxum impedit, & pinatam substantiam colligat. In aphthis infantum, que linguam cum dolore & ardore obfident, ad hunc mulcendum nihil utilius, quam papulas subinde illinire cremore lactis cum tantillo neri imbueo. Interdum etiam expedit ad pinatam colloquendam & arcendum nimium affluxum applicare vitriolum album, in aqua pluviali, vel melius rosarum, aut florum sambuci, liquorem.

## §. VIII.

*Revisio  
apice.*

Demum ne faucium inflammatio, quod haud raro accidit, repetat, vitanda cum cura omnia, quæ ad inducendum eam facere supra diximus. Potissimum perspiratio custodienda, ac imprimis caput, cervix & collum ab omni refrigeratione defendere ex usu est, ne humores & acris per poros diffusa materia ad interiora agantur ac in molli faucium substantia subsistant. Cavendum quoque ab omnibus, quæ succos impensius exagitant, maximeque ab impensiori vociferatione, qua humorum affluxus ad superiora allicitur. Si corpus plethoricum, tempeliva sanguinis missio insinuenda, & minus riu succedentibus hæmorrhagiis spontaneis, ut eadem in ordinem redigantur, videndum. Neque minus subinde alvus subducenda, quo & impunitas expungatur, & congestior versus superiora motus interceptetur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Angina al-  
vi fluxu  
fulva.*

Fœmina triginta annorum, cholericæ & catarrhus defluxionibus admodum obnoxia, levius vestigia surrexerat tempore autumnali è lecto ac frigide sese curæ incautus expulserat. Inde nocte est ræcedendum cum ardore & dolore gutturis, difficulter simul deglutire & loqui poterat, & pulsus, præsertim noctu, fuit celerior. Quam

ignitur mentes resirassent, missus primum è ventri brachii sanguis & injectum dein chlyma, sed sine levamine: gargarismata vero, propter dolorem, ferre non poterat. Interim gutturis tumor, tam interior, quam exterior, mentis increvit, & parum abiecit, quam angustam strangularet: quinto tamen die sublevis tantisper tumor, & dolor mitigatus est. Hinc emollientia collo admodum emplastrum manarivum, ex emplastro de melikoto cum croco, cui impositi succus calidi, ac os inditum decoctum ex emollientibus: his maturavit tumor & noctu incisa ægra etiam sublevis rursus. Sed illapla procul dubio fuerat materia acris pulmonibus, & ob id suffocationem minari visus est. Ad quam dispellendam, aqua hyssopi, cum essentia castorei & liquamine, additis alioque guttulis syphonis cornu cervi luccanum, insilium quoque thelisme ex herbis psychotrius cum aqua calida, utrupta. Inde sudor erupit per universum corpus simulque materia tenax viscida, seixis minimam quotidie, per alvi feculentum ejecta, non sine immota ventris contractione. Medicus autem mensens damnosam fore hanc diarrhoeam, de supprimenda eadem cogitavit, de electuario ex discordio *Tracastori*, contra rosarum, pulvere hæmanis & nucis dedit. Cohibitus enim protinus alvi fluxus, sed sequens singultus cum ardore per totum oesophagi tractum, sputatione materie viscidæ virumque languore. Hinc alius advocavit medicus, qui pathemata hæc a perperam supprelo alvi fluxu deduxit & ob id suavit pilulas ex myrrha electa, diagrydio sulphurato, mercurio dulci, croco, castoreo & sale succini, cum vehiculo calido sumendas. His non modo singultus idem, sed de materie serose per alvum excreto revocata, cum lumino ægræ levamine, quæ succedente potest ad salutem redire.

## Epitript.

Memorable omnino, quod faucium inflammatio, pinatulo ac seroso aivi fluxu fuerit soluta, quod hujus adlincio præpollera gravia induxerit pathemata, & quod hæc reverente illo exspiravit iterum. Sed largissime in inflammatione faucium affectibus, oesophagus, quin ipse ventriculus, affligitur, ita, ut eadem quasi labe eodemque vitio laborare videantur. De aphthis sæpius notavi, quod eadem oesophagum & ventriculum obfiderent: id enim factum fuisse, ardor, per totum oesophagi tractum ulque ad præcordia excurrere, prodidit. Tum etiam agri salisti, acris & calida plane non ferre poterunt, sed decoctum hordei, avenaceum, raparum exticatum, insilium thelisme cum lacte, ex usu fuerunt, hujus assumpti, ardores, succitates & dolores anni circa præcordia lubati. Vicissim vidi, ex ventriculo, in ardentibus febribus, a venenis, aut acrioribus purgantibus inflammato, inflammationem ad fauces & laryngis mufculos fuisse propagatam. Hinc manet utique firmum, in faucium orisque affectibus, præsertim si pinatita viscida, crassa fuerint oblecta, laxantia præstanteana exorere opem.

## OBSERVATIO II.

Sexagenarius quidam, diu quartana decem, hæmorrhæ hæc discedente, catarrhis & ventriculi imbecillitati admodum fuit obnoxius. Is quom noctu aère pluviali fecisset iter, incidit in faucium difficul-

ficulatem, ut solida quidem, non autem liquida posset deplurire, ac non nisi cum magna intentione deglutitionis, anxietate ac subsequente copiosa excretionis phlegmaticae. Interius quidem rubescere non nihil fauces, sed exterius nihil tumoris comparebat. Iudicavimus igitur, epiglotidem, quae instar operculi officium asperae arteriae claudere sibi mucido oblectum esse & urgendam, ut rimam subiectam non exacte claudat, sed liquidum deglutitum in asperam arteriam delabatur & anxietas subsequens faciat. Quare iussi exterius applicare spiritum vini camphuratum, interius os subinde colluere aqua florum sambuci, mixta cum spiritu salis ammoniaci atque essentia croci, & quotidie usurpare pilulas nostras. His intra aliquot dies malum feliciter sublatum & aeger convaleuit.

#### Epigrapha.

Propeium anginae symptoma difficulus deglutendi, tam solida, quam liquida. Si enim tumor paullo amplior oropharygi principium obfudet, illudque angustat, liquida quidem, sed non solida dimittuntur. Si vero tumor haeret in principio gumaris, quod tegit epiglottidem, solida quidem, dum comprimunt tumentem epiglottidem, transeunt ad oesophagum, sed liquida minus premensa per hians à tumore spatium asperae arteriae illabuntur, ibique magnas creant molestias.

#### OBSERVATIO III.

Putarant medici formam quandam venereo infectam esse contagio, eaque propter ipsi mercurialem adhibuerant salivationem. Hinc factum est, ut ipsa postea levi ex causa, ab aere frigido & nebulofo, ab ira, ab assuetis scribis cibis, à refrigeratione capitis, à turbato mensium succellu, sepius incurreret exquisitum palati, nec non in faucium internis, circa pharyngem & laryngem, ardorem atque dolorem, sive fetes tamen, sed cum respirationis difficultate. Accidit vero, ut dormiret in conclavi humili, noviter exstructo & vaporibus calca pieno, ac inde non modo capitis dolore, sed & impensio faucium & colli ardore atque dolore, cum inquietudine, spirandi angustia, anxietate & arsu afficeretur. Ego vocatus sanguinis missionem, ob vasa minus turgentia omisi, sed tamen applicare iussi collo cataplasma ex farina lini; floribus sambuci, ficibus, croco, oleo amygdalarum dulcium & lacte. Suasi quoque ut clyster injiceretur ex lacte, nitro, sale communis, melle & oleo. Potui dedi lac, cum dimidia parte aquae hordei, si ve pisanæ remixtum, adjecta debita quantitate nitri & syrupi violarum, quod copiosius hausit & frequenter ore continuit; quibus brevi malum diffusum est. Ad arcendam autem crebriorem recidivam, dedi consilium, ut aquas Spadanas, vel Selteranas cum lacte per mensem & ultra biberet, & quotidie mane fauces gargarizando, vel cum aqua sic dicta sclopeteria, vel decocto plantaginis ex vino elueret.

#### Epigrapha.

Prompta est tumoris & affectus anginoidis genesis, quando compages fibrosa, glandulosa & tubulosa faucium debilitata & tono privata, quod heic factum per salivationem mercurialem.

Quare qui semel, vel iterum ejusmodi tumore laboraverit, qui non statim congruis praesidiis atque regimine discussus, ex facili postea, per nimium vocis intensionem, animi affectum, vitium copiose haurium ac frigido-humidum, vitium admissum, idem malum rursus nanciscitur. Optime autem ejusmodi recidivae praecavetur, quando malum primum statim recte persanatur, penitusque tollitur, ne parvis labem infestat aegre emendandum.

#### OBSERVATIO IV.

Virum novit honestum, quinquagenario majorem sanguineo-melancholicum, robustum, sanguinis missionem nunquam passum, belle tam valentem, licet creverit lupulæ & spiritus ardenti ponit admodum delectatur. Sed quum gravius inter rixas cum uxore exardesceret, in exquisitum capitis incidit dolorem, sub quo arteriae fuerunt rurgidae, facies rubicunda, oculi torvi, noctes insonnes & arteriae tam valide pulsantes, ut de sensu mallei quasi in capite pulsantis aeger conquereretur. Hinc admovent cataplasma ex mica panis, bacis lauri, juniperi & aceto rosaceo. Fronti enim & temporibus ex consilio venulae applicatum albumen ovi, cum alumine conquantassum. Sed gestans his aliquandiu, conquestus est aeger de insigni dolore pungiivo faucium, deglutendi difficultate & spiranti angustio; lingua mirum in modum, atro colore tincta, siccam linguam ex ore hians exstruxit, liquida indefinenter appetit, pulsus celer & vehementer manum vibravit & propter spiritum arctius meantem in erecto semper esse debuit sine. Ad gravissima igitur haec puermenta depellenda cum fructu usurpare sequentia. Sanguis è vena missus largiter; clyster injectus acrior; cataplasma ex stercore canis, hirundinum nodo, ficibus, cepis tostis, floribus sambuci, chamomilæ, nucis, semine cymisi, nitro & camphora, cum aqua florum sambuci & vino tepide collo aspositum; interius mixtura ex aquae florum sambuci, rosarum ana uncis duabus, aceti destillati drachmis sex, lapidum cancerorum drachma, nitri drachma dimidia, camphorae grana quatuor in oleo amygdalarum dulcium solvitur & sufficienti quantitate julepi rosarum, sacchari ad aliquot cochlearia data & potum quoque insulsum theiforme ex veronica, floribus sambuci & radice liquiritiae; quibus felicitè diffusum iussu rationis periculum. Postea laxans ex syrupo rosarum solutivo, cremore tartari, diagraeco & rhubarbo exhibitum, quo aliquoties deiecit. Os denum frequentius elorum aqua pluviali, in qua nitri ac varioli parum & saccharum ad gratiam solum. Sic brevi explicita ratione concepti hic morbus ex voto depulsi.

#### Epigrapha.

Attendenda merito in nostro cruculoni hujus mali genesis. Orem quippe duxit ex sanguinis ad caput congestione; haec opposita exitus constringentia; his sanguis ad interiora repressus ipsaque fauces; heic copiose collectus cruor sublitit de dolorem, tumorem, ardorem atque symptomata induxit. Albumen enim ovi cum alumine insigni repellente & vasa constringente virtute polleat, ex ipsius usu in ophthalmia patet. Ex ex constringente in externis facilius ad interna esse transiunt, docet vasorum munus com-

Anginae  
epiglottidis  
sive  
propeium  
venereo  
infectam  
esse  
contagio.

communicatio. Sed quum illico venæ sectione & internis aque ac externis discutientibus flasi & stagnatione obviatum, non ponit non feliciter succedere curatio. Nam si occasio præcepta capienda unquam, cere in congestionibus inflammatorius id faciendum, quæ nisi celeriter remoueantur, transit fit in corruptionem lethiferam & sphacelofam.

## CAPUT V.

## De Febre Phrenetica, sive phrenitide.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Phrenitidis  
æstus.

**N**ulla inflammatio, sive particularis febris, tam magni in medicina momenti, quam quæ in parte omnium nobilissima ipsiusque animæ rationalis domicilio, cerebro, consistit, & tam omnem rationis usum evertit, quam præsentaneum vite periculum incitat, ac Græco nomine audit phrenitis. Est igitur hæc phrenitis febris acuta inflammatoria, orta à nimia sanguinis congestione ejusdem intercepto, per minutas potissimum membranas cerebri arteriolas, transitu, juncta cum magno æstu, delirio atque vite discrimine.

## §. II.

Signa  
æstus.

Signa imminenti phreneticæ affectionis sic exacte & compendiose exhibet Trallianus lib. I. cap. XIII. *phrenitidem, inquieta, futuram vigilia somnium continua & inmensa summaque turbulenta præcedunt, agri exultant & somnium imaginacionibus deimantur, & facile æstum, quæ dicuntur, obliuiscuntur, si respondens, ferociores ac iracundiores, quam prius, apparent, pulsus habens paruos & duros atque æcipiti frequentius indolescent. Si æstus inciderit, fixioribus oculis cernunt, eosque rubentes habens, nec non lacryma ex utrisque fluit. Præsentis autem indicia & pathemata omnium optime ex veteribus consignavit Celsus Aurelianus lib. I. cap. II. pag. 12. ita habens: in phreneticam passionem decesses sequitur febris acuta atque pulsus difficile ad superficiem corporis ascendens, sive humilior, tenior. vultus subinflatus, sive plenus, sanguis per nares destillans, vigilia pugæ, aut turbatus somnus & insania turbulenta, mentis sollicitudo ac præcærit sine ratione, frequens terrorem est versio jacendi, cum capitis æstus commotione aliquando etiam sine causa bilariata, oculorum rubor, cum levi lacrymatione & circumjectione manuum, sine ullo capitis dolore, articulorum frigus, sine tremore, urine abundans flava, aquata, tenuis & paulatim exclusa; aliquibus etiam semitis capitis atque aurium tinnitus, dolores quoque capitis non quiescent, nulla ex manifesta ratione præcordiorum tensio, visus attentus, cor frequenter palpitans.*

## §. III.

Causa  
æstus.

Omnes hæ phrenitidis junctæ functionum in corpore læsiones, pendunt à nimio & impetuoso sanguinis ad caput applulsu, ejusdemque ex intercepto per minima libero transitu, flasi & per alias insolitas vias celerissima trajectione, unde di-

stensiones sunt vasorum cerebri & faciei, serosus humor secedit, passim obhærescit, & cerebrum in functionibus suis, maxime rationis usui servientibus, prius turbatur. Ex vero enim *Hippocrates lib. de flat.* & passim alibi tradit prudentiam & rationem hominis in conflanti sanguinis habitu in cerebro, sive rectius ejusdem æquabili motu consistere, adeo, ut, hoc interrupto, concidat simul & prudentia, & ratio. Et hæc omnino ita esse veramque phrenitidis sedem in cerebro consistere, testatur facit uberius scilicet eadem defunctorum. In his quippe vasa, tam duræ matris cum sinibus suis, quam pie meningis, mirum destituta & crasso coagulato cruore sarta, ipse membranz aride & exsiccate, ut pia mater facillime a cortice separari queat, reperiuntur, & præterea medulla cerebri multo serolo humore perfusa comparat. Id quod pluribus confirmant *Blancardus in anat. pract. obs. III. S. Bernicus lib. I. fol. 64.* nec non *M. N. G. Dec. II. A. V. obs. LXII.*

## §. IV.

Inter antecedentes causas recte *Celsus Aurelianus l. c.* refert violentiam, vel vigiliam, aut jugem in sole moram, mentem naturæ mobilem, iracundiam, caput per literarum disciplinas debilitatum, ætatem juvenilem. Et certe ad phrenitidem disponent omnia, quæ caput debile ac imbecillum reddunt, ut deinde in ipsius vasis facile fieri possit sanguinis & humorum mora, nec non quæ sanguinem, crassum præteritum & copiosum, ex partibus inferioribus impellunt ad caput agunt ac conperunt. Hinc observatio medico-practica constat, ad deliria ejusmodi febres admodum esse proclives, qui diuturna morborum, cura, studiorum & meditationum profundiorum immoderantia, mentem nimis sanguant, quæ vegetæ ætate, constitutione melancholico-cholerici, læpius animo per iram aut odium moritur, desideria vehementioribus jactantur, vigiliæ, inquietudini, crapule ex cerevisiis liberaliter lupulata, vel vino dediti, qui veneri liant, sedentariæ vite motus & exercitacionis experti indulgent, & ob præviam victus rathem, & copiosum, & impurum sanguinem in venis alunt. Hinc porro per experientiam in comperio est, à cessante consuetudine, vel etiam repente suppresso hæmorrhoidali fluxu, emanante quoque aut cohibito menses, nec non in puerperia lothiorum profluvio, promtam esse, præteritum alvo simul adstricta, phreneticarum affectionum genesin. Tum enim ob stagnationem sanguinis in abdominis visceribus, in nervosis partibus spæssæ fuscitantur stricture, quæ inæqualem reddunt sanguinis circuitum & faciunt, ut in cum impetu aliorum ruat, ibidemque nimium congeratur. Demum phrenitis etiam hæc ratio inducitur per violentiam extenuam. Accidit hoc in veneratione & coarctione capitis perquam facile, imprimis plethorico-carochymicis, nisi cito sanguinis missione & discutientibus occurratur, nunquam cessat *Hippocratis Sect. VII. aph. XIV.* æventus sequitur ut plurimum funestus.

## §. V.

Merito autem phrenitis distinguenda in idiopathicam & symptomaticam. In utraque quidem febris adest acuta, sed ea cum differentia, ut in illa præcedat, in hæc vero individuum sit comes. Idiopathica in temperato nostro climate rarior, frequentior autem in calidis siccis & mor-

æstus  
æstus.

idiotæ

ridionalibus locis, unde etiam veteres Græci medici, imprimis *Aetius*, *Trallianus* optime & copiose de hac passione in monumentis suis differuerunt. Dantur tamen subinde etiam inter nos exempla phreneticæ febri, sine præcedente alia, potissimum à nimia crapula, comitibus animi iracundia & cerebri per profundas continuas meditationes & vigilias sanguationes, imbecillitate, in sanguineo vel etiam cholericomelancholicis hominibus & vitæ sedentariæ addictis, hypochondriacis, vel hæmorrhoidariis, præsertim si fluxus imprudenter cohibetur. Sed de hac re est omnino confirmatum id ipsius experientie suffragio, tradit *Willelmus in parol. cerebr. cap. X. pag. 234.* quod, nisi cito & opportunis remediis discutatur, quam facile in maniam, sive delirium furiosum transeat. Neque etiam infrequens est idiopathica ejusmodi & in maniam degenerans phrenetia, post superatas febres acutas, item purpuras, exanthematicas & cutaneales, male tractatas, per nimis æstuosum regimen, per medicamentosa volatilia, sanguinem commotionem, oporata etiam, aut repellentia nimis, refrigerantia, nec non incongruas venæ sectiones. Id quod eo certius & vehementius fit, quando æger ad iram levi et causa promptus est ac facilis.

## § VI.

*Vel symptomatica.*

Frequentior tamen apud nos symptomatica: sæpius enim evenit, ut in febribus malignis & exanthematicis acutis, petechiis, variolis, catarrhalibus malignis, potissimum castrensis & omnium maxime Hungarico morbo, præsertim male tractatis, phrenitis accedat in statu & mortem inferat. Scilicet supervenire solet circa dies criticos, cum rigore, tremore artuum, præcordiorum tensione, exteriorum refrigerio & urina tenui, vel parvis, vel effusa nimis fluente. Sed quia ob morbum præcedentem & diuturnas vigilias fractæ jam fere penitus vires & tonus quoque vasorum membranarum cerebri nimium labefactæ sunt, stases sunt in iisdem ex sanguine irresolubiles, quas tertio plerumque die mors excipit.

## § VII.

*Differt a mania.*

Licet autem phrenitis sæpius in maniam transeat, veterum etiam, *Hippocratis*, *Celsi Aurelii* & *Aretæ* testimonio, qui illam ob idcum hac plerumque conjungunt, vel plane confundunt; ambo tamen multum discrepant. In phrenitide enim semper adest febris, cum pulsu celeri, duro ac parvo, delirium quoque non intermittemens peritus, sed tantum subinde remittens, quo tempore oblivio est omnium, quæ sub delirio contigerunt. Sed mania chronica est pulsio, sine febre acuta, licet cum pulsu præternaturali, duro & inequali, quandoque parvo, quandoque magno & celeri. Habet quoque maniacus furor sua intervalla, junctus est ordinario cum magno fastu, ira & odio adversus amicos atque propinquos, & paroxysmo cessante, exquisitam ut plurimum memoriam omnium, quæ amicta habent maniaci. Deinceps phrenitis etiam differt à leviori illa mentis alienatione, quæ in acutis febribus, aut expulsiōnem criticam exanthematicam non raro observatur. Nam hæc facilius transit, neque etiam urinas tenues aquosas, vel rigorem & refrigerationem partium exteriorum habet comitem. Neque minus, quandoque post declinationem febri acutæ, observatur per aliquot dies, aut hebdomades, quedam desipientia

*Differt a delirio in comitibus.*

& mentis inconstancia, à phrenesi diversa, quæ propter summam virum & cerebri ex perpeffo morbo debilitatem oritur, & redeuntibus viribus, vel sponte cessat, vel congruis præfidiis facile iterum penitus discutitur.

## CURATIO.

## § I.

Quam gravia illa & exitialia pathemata, quæ phrenitide juncta, à meningum inflammatione, seu causa proxima dependant; prima utique de princeps medentis esse debet intentio, ut hæc in præservatione arceatur & in curatione removeatur. Hujus autem causa quam sit sanguinis in vasculis meningum alibi stasis, alibi cum dolore, tensione spastica & ardore, celerissima tractatio: ipsa certe sana ratio dictat: ea remedia, quæ effrenem sanguinis impetum ad caput sistunt, ibi congestum derivant, subsistentem expediunt, atque discutunt, & meningis spasmum contractas relaxant, omnium esse, ut ita loqui liceat, indicatissima.

## § II.

Jam in phrenitide, & curanda, & præservanda, principem merito locum obtinet, communi veterum & recentiorum omnium consensu, sanguinis missio; quam etiam circa affectam partem insinuare præcipiunt omnes. *Trallianus* olim & Arabibus frequens jugularis venæ sectio, quæ nostris temporibus perperam exolevit. Nam per experientiam in comperto est, hanc in omnibus capitis à sanguine congesto & flagrantæ oriundis passionibus, aliarum venarum incisioni longe multumque esse antefereendam; eo quod hæc vena jugularis externa, cum internis, & arteriis carotidibus & vertebralibus cerebri proxime sanguinem derivat atque deducit. Nec difficilis adeo & periculosa, ut vulgo putant hujus venæ incisioni, sed restrictio tantisper fasciæ commoda, ut turgat vena, collo, & facili negotio insinuanda. Deinceps magna æstimatur à medicis in hoc & aliis capitis morbis venarum sublingualium sectio. Imprimis *Ammonius in parol. facitur*: ex multis quæ anno MDCLXIV. ab expeditione Hungarica redierunt, & in nosocomio morbo Hungarico laborant, evasisse omnes, quibus tempestive ramina venæ perne, quibus non, esse mortuos. Atque ego etiam novi, eandem utilissimam fuisse ad præstidendum imminens in febribus acutis delirium, quanto, vel sexto die, sana adhuc mente, institutam. Sed difficulter admodum perficitur, si delirium jam adest, ac præterea ex foramine nimis amplo, ob sanguinis ad caput impetum, hæmorrhagia metuenda funesta, ex iusto minori parum languinis fluit, & dato ibi spatio, fluxus potius ad cerebrum allucitur. Alii commendant venæ frontalis, restrictio prius collo, incisionem, eademque potissimum *Trallianus* se magna phrenitide correptum sanasse, testatur. Nonnulli præferunt arteriotomiam in temporibus, quos inter est *Pasareolus*, qui *percutit*. *I. obs. XIX. pag. 18.* testis est: se se arteriotomiam in phrenitide magna cum felicitate expertum, ut ipsa vexari statim resipuerint. *Celsus Aurelianus* scarificationem in toto capite prius ratio in usum habuit. Longe magis tamen probandus *Ægyptiorum* mos nares scarificandi, cuius vires, deficienti commodo instrumentum supplet experimentum, quo culmo straminis, aut bacillo exili

exili acuto, in nates validius truso, sanguinis propter stillicidium, quod ego quidem cum praesentaneo commodò aliquones factum esse vidi. Et hi in confini afflictae parte minendi sanguinem modici, tam in phrenitide idiopathica, quam symptomatice locum inveniunt. Sed quando ex lochiis, nec non menibus reventis, aut suppressis, malum hoc metuendum est, cito in pede vena aperienda & sanguis largius emittendus. Neque minus, si ex vitio, aut intercepo haemorrhoidalis fluxus successu, delirium imminet, optimum levamen ex aperture venarum haemorrhoidaliarum, per appositionem hirudinum, expectandum.

## §. III.

Post sanguinis evacuationem alvus ducenda, quae assuetis, ad superiores partes, & quae soluta, ad infernas, humorum convertitur affluxus. Scite autem Hippocrates lib. III. de morb. §. IX. monet: in curatione phrenitidis alvum esse praeparandam, ut operat, humectantibus potionibus, quae tunica intestinales qualem contractas relaxant, quia primarum viarum spasmus frequens deliriorum est causa. Ego insill omnium hunc in finem commendando potiones mannatas, ex munnat minimum uncia quatuor, solutis in libra scilicet cum cremoris tartari drachma, nisi drachma dimidia, & olei amygdalarum dulcium uncia una. Baglivi lib. I. prax. pulverem Cornachinum commendat, ita pag. 102. scribens: quum pluries observatum fuit, alvi fluxus solum fuisse delirium, idcirco natura id docente, profectum non semel experiri nos pulverem Cornachini, superbibendo ei longa diluentia, ex decocto hordei limati, salis prunella aliisque distillis acribus, praecipue, si nimis viscerum ardor adje & interna inflammatio. Si vero ceteri opus est auxilio, alvus leniter & pargorico domestico enutiat est solvenda.

## §. IV.

Ex internis porro adfueris phrenitidem praefidis, sunt maxime potiones diuturnae, demulcentis & humectantes, largissima copia datae, modo, quod rarius fieri solet, ut innuit Aretaeus, phrenitici sitiant. Insill omnium est potus ex lero lactis dulci, vel acidulato, cum succo citri parato & julepo rosarum, vel syrupo papaveris albi edulcorato, in cuius mensura cum fructu dissolvitur drachma una nisi deputati, vel salis prunellae. Utres quoque emulsiones ex decocto hordei, rasurae comu cervi & seminibus quatuor frigidis, cum julepo rosarum, praesertim quando mensurae duo nisi scrupuli adiciuntur. Non minus confert lac cum acidula Selzeriana, vel Antonianis remixtum, item pitana. Quae potus omnes quo largius bibentur, eo plus efficacit in diluendis humoribus, relaxandis contractis tubulis, expediendis obstructionsibus & extinguendo aethu praestabunt. Ex medicamentis autem mixtura diaphanica & discutient, capite antecedente descripta, uti in omnibus inflammationibus, sic etiam phrenitide, effectum exicere longe saluberrimum.

## §. V.

Inter externa, quae caput ab humorum affluxu liberant connumeranda pediluvia, vel involutiones pedum in linna humida calefacta, & quae omnium optima, balnea aquae dulcis temperata. Horum insignem utilitatem quotidiana

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

uberius confirmat experientia & laeuples imprimis testis est Traillianus, qui lib. I. ita dissert: lavare eis & perungere convenit, quibus iam quantitas salta est & quantitas totum corpus non offendit, verum faciat & vigilia plurime arguit. Et si febrius ager, nisi nocuit ei, si in leviter, praecipue etiam, cum balneum tepidum adhibere fuerit, ut neque alit suu iurari, neque faciat nimis calidum. Qui autem febris metu eis non levatur, maxime offendant. Nam atri vigilia magis inquantur balnei abstinentia, adhuc magis etiam animo turbantur. Levandi igitur sunt, quomodoque comprehenduntur est. Sic enim balneo mures, ad bonam temperiam revertuntur, & in praesentem delirio & affectu febrem accendunt, liberantur. Dein veteres, ac inter hos possidimus Traillianus & Aretaeus, post sanguinis & alvi vacationem, caput oxyrhodico, ex aceto rosaceo composito fovebant, ne, ut loquuntur, caput liberalius attraheret humores idcirco repleverat. Nec male. Interim nos summo cum fructu, in omni delirio, caput totum rasum fovere suavisimam, temperato hoc epithemate: recipe aceti rosacei uncias duas, spiritus rosarum, in quo decem grana camphorae soluta, drachmas duas, nisi puri scrupulos duos, olei ligni Rhodii guttas XX. M. D.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICAE.

## §. I.

Quam modo tradidimus phrenitidis medicationem, tam in symptomatice, quam idiopathica, & praesertim illa inveterata, quae in maxime affectum trandire videtur, quam maxime esse accommodatam, experientia scribo, nec quicquam praeterea vix potest excogitari, sed opus est, ut aliquandiu horum usui insistant. Quae autem in regimine phreneticorum servanda, egregie tradit sepe laudaria Traillianus lib. I. pag. 60. sic praecipiens: considerari debet etiam habitus, in qua degit ager, ut aetatem nec admodum crassum, neque laetudinem frigiditatemque, ut nimis calidum habeat, ne capiti meatum densius, aut repleto supercrassus, sed temperatus existat, quo animalis spiritus temperie ipsius resocilletur ac relaxetur. Sit autem magis lucidus, quam tenebrosus, ut ager per hoc in sensum ad consuetum percipiendum ac consuetum perveniat. Quare & anni non nulli admodum familiares ei assint, ut etiam incrementis ipsam propter ea, quae faciunt, revertantur. Neque vero domesticum, aut cognatum, cuius causa aliquando tristitur, aut cui irascitur, ingredi debet, quippe hoc irritare agros & commovere solet: & ut valde perturbetur, manifestam praebet occasionem. Sed nec amici frequentes & copiosi ad eum ingrediantur, quippe in eam etiam tantum excutiant, praeterea aetatem quoque crassum efficiunt, frigidi emittentes spiritum. Jam non tulerit movendus est, sed leniter, ne in lecto propter imbecillitatem chorruat. Hoc enim, si quid aliud, agrum uras & somnum impedit, ut vero, qui adsum, omnia ipsius membra circa violentiam tenent, leniterque perficiunt, & praesertim inferiora: atque tunc magis, ubi convulsiones agros oboriantur, arum vinculu excipiantur. Quippe hoc maxime ad usum praestat, praeterea convulsiones lenit. Sanius autem est inferiora quoque, ubi perficitur fuerit, fovere atque sic deligere, ut materia, quae sibi simul & fricatione actua fuerit, ad una parum derivari possit.

M

§. II.

alvus ducenda.

Humectans cum & discutientibus.

Interius affluens.

Regimen phreneticum.

## §. II.

De sanguine  
in mense.

De venarum sectione tamen, hac adhuc tenenda: quod si, ut simplicissime fit, phrenetica eam admittere propterea temerum, ego nil praesentius & factu facilius novi, quam ut ex improvviso calamus, aut culinus stramine valide in narium cavum adigatur: sic enim sanguis sepius illico liberaliter & cum comomodo evocatur. Ad venarum tamen incisionem, si idiopathica & chronica est passio, non prout accedendum, praesertim in corpore plethorico, quam aperta prius brachii, vel pedis vena, ne impetus ad caput crescat. Cavendum etiam sub hac operatione, ne instrumentum adhibeatur acutius, venam perfolvens & pericranium cum detrimento laedatur.

## §. III.

Phrenetica  
ex febre  
profecta  
in mense.

Quae etiam ex mensium, vel haemorrhoidum vitio & oriundis inde vehementibus spasmodicis pulsat phrenetica passio, optime levatur balneis, mineralium aquarum potu & appositione lustralium ad venas atri, vel utri, adhibito simul compro victu aequae regimine. Novi enim, phreneticum diu durantem, eruptive mensium, vel haemorrhoidum fluxum, secessit fuisse discussum. Sed quando phreneticum malum non tam à sanguinis in valis cerebri congesti copia pulsatur, quam potius a materia luesali, acri, violenta, vel repulsi ab externis, uti in erysipelatibus, vel per calidiora & volentia nimium exarsita, quae firmiter nervosae duae matri impacta spasmodicam concitat, liberum sanguinem transitum de ad cor recursum interceptantes, praeter venarum, quae capiti propinquare, scilicet, expedit calvariae rales partes de viscera ex animalibus recentibus mactibus adhuc caletentia, ut pulmones, hepar & omentum, admoveat, & quando reitervat, calidae eadem immergere, quo iterum calidant.

## §. IV.

Dum plicam  
plicam.

In Poleria frequens est delirium phreneticum, melancholicum & maniacum ab aenem plicam, hacque eruptive instantia cessat. Hinc optimum consilium plicam cretalem elicere, quem in finem usurpare facit decoctum ex mulci clavari marisulphuribus, in duabus aequae mensuris decoctis. Quo dum bis quotidie caput & crines abluant, intra hebdomadam decursum prodire solent citra, delirium discurrentes. Non raro etiam abscessum plicam sequitur crudelis capitis dolor, quatenus excipit phreneticus furor cum febre ignisquae mania, quae tamen usque decocti, vel limamenti ex musco clavari in *M. N. C. Dec. I. Ann. II. obs. LIV.* descripti, plicam revocantis, prompte iterum aligatur.

## §. V.

Alia  
comomodo  
sic.

Cavendum autem, sicut in omnibus inflammationibus, sic etiam in phrenide ab acutis & commoventibus, liquoribus firmos, à mone atri & corporis hostiori, nimio ab omnibus, medicamentis sunt, sive alimentis, quae sanguinem in praematuralem motum erit valent. Imprimis nullo modo ad iram irritandi atri & ob id accendi ab eis, a quibus lesi & quot ferre nequeant, domesticis sint, sive alienis. Operta & narcotica absque penitus, praesertim ubi vires iam imbecillae. His enim deliria quandoque in febribus induci testatur experientia. Parie hinc monit *Trallianus I. c. si vires, inquietas, imbecillae* *fit vult, tunc maxime cautus, ne quid corpori foveat*

noque inducendo incommodum exhibeat. Non in hi, qui infirmas vires habent, non tardioris exactum potiorum remittat. Vesicantia etiam, non nullis solemnia in phrenide improbo. Nam cantharides acri, quo pollent, stimulo strictis iam & tensis spasmo membranas irritando, delirium augent, & convulsionem facile accerunt. Testatur id dulere *Baglivi, lib. I. praes. pag. 102.* ita scribens: *in atri Romano, per adhibita vicia vesicantia plures vidimus moriens, ac sanatus. Praeficere autem magis famula, quam vicia, vidimus.* Et paulo post sic pergit: *doloribus cum febre acuta, lingua arida, induritis maxis vixit cum inflammatione, si applicentur vesicantia, cito fore in peris ruit, & magna ex parte moritur convulsi.*

De vici  
causa.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Laborabam ardente febre cum intolerando fetore capitis dolore, quadragenarius quidam, cui sexto die accedebat alvi fluxus, quem medicus detrimentosum esse putans, pulvere ex boli Armena, hematite & laudano opiato composuit. Cohibito hoc, dolor capitis gravior factus, & cito praetera vix, cui essentia ambrae infusilla, maxime praecordiorum anxietates subsequente, fluxus cum oesophago inflammatione affectae, magnaeque colluviae viscidae mucosae materiae in oris cavo collectae. Succellit etiam delirium furiosum, tam vehemens, ut seget vix a quatuor robustissimis viris in lecto conari posset. Adversus hoc multa quidem & varia adhibita praesidia, vena in pede petens, admodum epistimata, appositus calena vinuli pulmo, sed omnia in cassum, persistit potius per quinque dies delirium non interruptum, donec decimo quarto, à primo morbi insultu, die mors vix faceret finem.

Phrenide  
ex rebus  
viciis ab  
fuit.

## Epicrisis.

Nihil profecto periculosius, quam in ardente biliosa febre, ex colluvie acrimae biliosorum prima in regione succorum oriunda, alvi fluxum, tempore praeterea critico eruptentem, imprudenter silire. Neque enim hoc facto fieri potest aliter, quam ut materia biliosa retenta, vel inflammationes in ventriculo & intestinis, vel etiam in capite, uti hic factum, suscitetur. Id quod tanto certius accidit, quia à medico temerarie vini usui concessus, qui nunquam, ubi motus inflammationis in prima viis, etiam in parca quantitate, admittendus. Accessit etiam delirium furiosum alvi suppressa, quia ex spastica primarum viarum constrictione, sanguis cum impetu ruit ad caput, ibique congestus, dolores primum, ac postea, ob meningum inflammationem, deliria, peperit. Atque adeo praefixi, imprudentem medicationem, frequentissime atrocium non modo pathematum, sed & ipsius moris esse causam, tum maxime, quando eadem critica humoris peccantis excretionis supplicantur, & materia nociva in corpore retinetur.

## OBSERVATIO II.

In puerpera tenera, ad iracundiam prona, cerebri & vini potui assueti, resiliat penitus post parum loquiorum fluxum, cum visum integritate, ardore, praecordiorum anxietate & spirandi angustia. Medici igitur ad provocan-

Phrenide  
in senem  
& viciis  
cum accen-

dum sanguinis profluvium pulverem ex myrrha, flavedine corticum aurantium, lapidibus cancrorum, succino & oleo cinnamomi propinquant, ac praeterea fal volatile cornu cervi, in aqua cinnamomi solum, dederunt. Sed his nihil aliud effecit, quam ut anxietas praecordiorum ingravesceret, urina suppuraretur & alvus dura ac terribi plane nihil dimitteret. Quin post sex diem pervigilium, oculi fulgidi & facies rubicunda delirium nuntiavit, quod etiam paullo post, tanto cum furore successit, ut aegra & lecto surgens in plateam excurreret, nullumque frigoris sensum experiretur, sed potius in extremis intense caleret, licet hyems tum regnaret algidissima. Accitus hinc alius medicus, qui venam in pede perurade iussit, interius dedit in emulsione feminis papaveris albi pulverem ex niri drachma, camphorae, theriacae coelestis ana gravis sex, in quatuor doses divivum & exterius temporibus admovit epiderma nostrum cephalicum. His aegre placidus somnus conciliatus, cum sudore largo, ex quo expersa facta, de languore & debilitate maxima est conquesta, sudor autem ille per totam hebdomadem manavit, sub quo ipsi liberali manu potui datum decoctum cornu cervi cum succo citri. Sic periculum hunc morbum evasis quidem, sed remansit lenta febris post puerperium, quae inordinato victu sustentata & adacta, tandem degeneravit in hecticam, quae circa aequinoctium autumnale attulit mortem.

#### Epitaph.

Peccant communiter medici, quando lochiorum fluxum imminutum, vel penitus emanentem, calidioribus & pellentibus utuntur, quae majorem oppulsum sanguini inducendo, anxietates augent alvumque siccant. Tum potius, in exquisitis praesertim sensus corporibus, anispaemodica & sanguinis aestum temperantia, naturam de calore, ex usu sunt, & longe felicius restituentem fluxum revocant. In nostra matris mitemus fuisse sanguis, quod praesidium ex optimis in puerperis lochiis delinuit, ad praescindenda pathemata gravissima. Neque dubitandum, quod ne huiusmodi venae sectione, sanguis, ob spasum internum, ex utero & alvi suppessione cognoscendum, sit ad caput delatus cum impetu, itaque induxit phrenidem, quae deinde aliis conviciis auxiliis, venae sectione, nitrosis & internis aequae ac externis discutientibus, depulsa, felicem finem per magnam criticum sudorem nacta est. Quod autem remansit lenta febris, ad non infrequens in puerperis, praesertim inordinato & incongruo victu indulgentibus. Nam naturae robore per puerperium & morbum fracto, ventriculus etiam debilis est, ut postea ingesta non rite digerat & coarctatur, sed cruditates gignantur multae noxae, lentis febribus aniam & causam praebentes.

#### OBSERVATIO III.

Phrenitis  
ac calidior  
nitris in  
phren.

Sub initium hujus anni, in febrim nobis aliquandiu epitemicam, synocham catarrhalem, cum animi deliquio, horrore, aestu & catarrhis, incidit vir probus & profunde eruditionis, muneris ecclesiastici haud ita pridem praefectus. Medicus vocatus, ad malignitatem accendat crebrius exhibuit mixturam simplicem & tincturam bezoardicam, iussit quoque, ut aeger in lecto & conclavi calido demoreretur, ac ipsi nihil aliud potui praebere, quam insulam calidam her-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

bae theae. Quanto die apparuerit in cute exanthemata: hinc continuata eadem remedia, additum oleum bezoardicum *Wideli* & interpositi quoque pulveres nitrosi. Aegrum vero a primo morbi initio affluerunt vigilae assidue, sinus intensi, corpus sudore diffusum, iactatione anxietate perpetua ac inquietudine, eademque pathemata perfluerunt jaguer, licet purpura esset expulsa, firmataque in cute servatae nationem. Nono die data a medico ad quietem conciliandam medicina, opii contagium haud obscure prodens; perfluerunt tamen anxietates & corporis iactationes, & aeger subinde delirare vilis, absurda non nulla loquutus. Accidit postea, ut, nescio cur, vehementius animo commoveretur aeger, quo in furorem per intervalla delirium erupit. Ad quod componendum medicus alias accessit undecimo morbi die venam secare iussit, emissis decem circiter sanguinis uncias. Inde primum quidem somnus inducitur, sed post hunc plane furescens aeger, ut vix ab aliquot viris in lecto contineri posset, omnia discerneret & domesticos, parentes atque agnatos, diis verbis, quin verberibus exciperet, donec vigesimo primo die motus nutricularum faceret finem.

#### Epitaph.

Pervenit ad nos trista haec historia, eo ipso tempore, quo haec de phrenide tractatio typis exhibebatur, quam non levis causis indidit huius intendam duximus. Luculentum autem praebet exemplum, quomodo ex praepostera medicatione, regimine nimis assensu externo & internis calefactis venis, exanthemata alias benignae indolis materia, malignam & fulentem in intima membranarum cerebri penetrantem inducere possit naturam, ad delirium atrox, maniae tantum non aequale, inducendum, praeterea ubi cerebrum jam tum imbecille. Dicum igitur hoc sibi putant, juniores imprimis medicinae praedicti, ne unquam in exanthematis, etiam purpura, calido regimine & calefactis venis pharmacia, suos excipiant, vires possident, morbum exasperent & truculentia inducant pathemata. Deinceps venae sectione undecimo morbi die largior, levamen afferre ponit nullum, ut potius, uni subside observavimus, detrimentum fuisse. Nam in principio quidem, si vires adhuc valent & corpus sanguine redundat, nullissimum & efficacissimum praesidium est ungue; sed ubi vires ob morbum, vigilas & praeposterum calidum regimen calidaque pharmacia exhaustae sunt; respicienda largior subtractio, quippe quae vires longe magis proferunt, ad vincendam morbi causam tamen necessarias. Recte ob id monet *Sydenham* in opp. phreneticis & maniacis, plus interdu succurrendum esse analepticis, quam sanguinis missione. Quod si tamen sanguis in cerebri vasis subsistens ventilationem possit, satis est, ut eidem proxime per nares procuretur exinus, eo quod ex anatomicis notum est, quod internae carotidis ramus per os cribiforme, una cum nervo olfactorio, ad pituitarium narium tunicam feratur. Hinc aegre sapius cum fructu, ad phrenidem arcendam, sileo in nares provide, sed alte intruso, stillicidiump elicere iussit.

#### OBSERVATIO IV.

Virgo tenera & in iram prona, septendecim annorum, à pariori mensium fluxu febrem incurrat pleuritica, cui accessit phrenica. Libere

M 2

raza

rata tamen à moris periculo liberali narium succidio; sed refusa postea mentis alienatio & phantasia corrupta, ut interdum angore ac more afficeretur, interdum furore perceretur, cum crebris tensivis artuum tractionibus. Ego in consilium vocatus fuisti Sekestanum cum lacte potum ad mentem cum balneo aque dulcis. Peracta hac cura, pro potu dedi decoctum hordii amygdaleum, cum nitro & saccharo conditum, quod largiter bibit. His non modo mens ad constantiam & sanitatem, sed & mensum fluxus in ordinem redactus, ac intra semelre spatium perfectæ redditus est sanitas.

## Epiris.

Dici vix potest, quam spectatæ virtutis in cerebro & nervorum gravibus affectibus, tam convulsivis, quam cum infania junctis, sit diluentium & humectantium usus: his enim humores fluxiles redduntur, obstructions expediuntur, acris succi diluuntur, ac temperantur, spissio crispatae fibre remittitur, & insigne imbecillis paribus adjuetur robur. Quo nomine, ego quidem, imprimis celebri balneo aque dulcis & lac, si obtinendum, optime asinusum, cum aquis mineralibus temperantioribus, ac alio sale fixis, quales sunt maxime Sekestanæ.

## OBSERVATIO V.

*Pleuritis  
et ira in  
ebriorem  
infantem  
mutata  
et  
cra.*

Adolescens quindecim annorum, literarum studia intemperantius tractans, iracundus & cum sodalibus inter perpetua pugna versans, aliquo die duras à paroste verbis paulo post cibum fuerat exceptus. Ex eo male habuit, parum appetit, minus dormivit, somno indormis terribis interurbato, donec post septimum diem in phreneticam parastatam erumperet febrem, cum motibus artuum convulsivis, qui per intervalla gravius affligerent. In paroxysmo vehementissime vociferabatur, maledicta in omnes eructabat, cœdebat & discerebat obvia. Lacer enim summum ad aliquot horas caperet, ut videbatur placidum, delirium tamen manebat idem. Comparuerunt postea non nulle pustule rubicundæ in dorso ac pectore, urinae fecerunt tenuis sine sedimento, & pulsus durus semper fuit, celer & inæqualis. In hoc tertio gravi morbo, æger præter pristinam, cum lacte, syrupo rosarum & nistro, bibit nihil, sed largiter, tam salubri effectu, ut gravia symptomata cum febre discederent. Non tamen perfecte mentis morbus sublatus, sed incedit animum odium erga propinquos & præpositos, levi ex causa vehementissime excanduit, ut tremere, falsus fuit insolens & domesticos cibos plane respuit. Hinc durum consilium, ut Scholabacensis aqua biberet, per mensem, & postea per quatuordecim dies balneo uteretur ex aqua Schlangenbadeulibus, quod etiam tam feliciter cessit, ut sanus, & corpore, & animo, domum rediret. Ut autem integritas hæc servaretur, fusu medici abstinent postea à ciceris gravi lapulata, ac pisanam ex hordio cum radice kortexæ loco ordinarii potus bibit, mane etiam usus infuso theiformi cum lacte, cui subinde narium indunt.

## Epiris.

Quin noxia post cibum sit ira, ex his uberiori patet. Ac uti verum omnino est trinum: ira facit bectis, sic etiam in disposita ira in se-

brem facile degenerare potest furibundam. Patet dein, quam utilis sit humectantium & diluentium potus, ut recte adhibeatur, curatiois punctum absolvat fere omne. Porro notandum, ad abigendam infaniam, multum conferre ieiunia, ob loci, aëris & personarum invilam mutationem corporisque morum. Multum vero etiam præstat, recte jam notante Hippocrate, ætatis mutatio, ut sponte sæpe, post vigesimum primum ætatis annum, ejusmodi capitis morbi discedant.

## CAPUT VI.

*De Febris Pneumonicis, sive Pleuritide & Peripneumonia.*

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

**P**neumonica febris est acuta inflammatoria, *Descriptio*  
orta à stasi sanguinis intra sanguifera vascula *pneumoni-*  
pulmonum, vel etiam venæ arygos ramulos in *ca febris.*  
pleura, juncta cum acuto & pungitivo dolore lateris, spirandi difficultate, æstu immoedo, pulsû duro & frequenti, tussis sicca, vel etiam humida, quandoque cruenta; periculû nunquam expati.

## §. II.

Nulla febris inflammatoria est, quæ omnis ætatis, sexus & temperamenti hominibus, in frigidis, æque ac calidis, & temperatis regionibus degentibus, adeo infecta est, & quæ etiam simul plures ob æris inæqualitatem & intemperiem epidemicæ corripit, quam quæ in thorace fit, sive in ipsis pulmonibus, sive in musculis intercostalibus, tam internis, quam externis, pleura nervosa interius cinctis. Prox autem inflammatio in thorace paribus insidet diversis, varia non modo accipit nomina, sed & symptomatibus, eventus & curandi ratione, plurimum differt. Veteres quidem, accurata anatomica partium cognitione destituti, subiectionem pleuritidis & peripneumonice esse putarunt pleuram, ob id utramque fere thoracis inflammationem dixerunt pleuritidem. Hippocrates tamen distinctionem jam fecit inter pleuritidem & peripneumoniam. Quo forsitan omnes fere præci & mediæ ævi, quin superiori adhuc sæculo medici, industi, ut in peripneumonia pulmones, in pleuritide autem vera hos plane non, sed tantum pleuram cum thuscis, quos faccingit, affici, afferuerint. Falsum autem esse hoc assertum, & pleuritidem malam omnino etiam in pulmonibus consistere, pluribus & momentosis rationibus docui in *dis-*  
*sertatione de pleuritide & peripneumonia.* Validissimum enim est argumentum ex sectione pleuriticorum, quam *Perus Servius* teste *Welsch* *Dec. I. curat. IV.* Romæ in nosodochio ad S. Spiritum, vel in trecentis insinuit, & semper lobum pulmonis infectum materieque replem compexit, pleura aut nihil omnino ad sensum vitata, aut leviter tantum quodammodo inquinata. Hinc, mea quidem sententia, ita sedes diversa inflammationis in thorace determinanda, ut si externas tamquam partes occupet, emergat pleuritis spuria, si membranose pulmonalis substantiæ superficiem, insit erysipelata prehendat,



hendat, pleuritis sit vera, & ubi alius in ipsam pulmonum substantiam descendit, gravior sit atque profundior, peripneumonia excludat.

## §. III.

*Signa pleuritis.*

Hæc igitur inter se diffidentes inflammationum in thorace species probe sunt discernendæ a medico, per notas quidam essentielles & characteristicas, jam singillatim commemorandas. In pleuritide quippe ipsa dolor est valde acutus & pungivus lateris, qui etiam tactu augeatur, decubitus in latere affecto difficilis, tussis frequens, sine expectatione materiarum purulæ, vel cruentæ, dolorem tamen, si valida est, exacerbans: junctæ etiam simul est febris, cum pulsu subdulo, depresso & frequente. Causam deinceps ipsi præbet, non tam sanguinis, quam potius feri acris flasis, in sinus arteriorum & venularum angyæ connexarum, nec non tubulorum lymphaticorum, in pleura, vel etiam peribis costarum, ubi sensus adhuc est acutus. Hinc nihil aliud quam rheumatismi specus est, & ob id familiaris illis, qui catarrhis, doloribus rheumaticis, arthriticis obnoxii sunt, vel hæmorrhia subinde veniunt, prædictum si ex ætate nimis calido in frigidum, vel contra, ætate potissimum versatum, concedant. Neque ea propter sanguinis melleorem potius, nisi eminent admodum urgeat plethora, sed sola diaphoresi & aërii perpirationis fucellu, mox & facile iterum, cum se primum pleniusque diem, solvit ac periculi experti est.

## §. IV.

*Pleuritis vera.*

Pleuritis vera inflammatio est sanguinea, a flasi sanguinis in vascula valorum bronchialium, quæ superiori sæculo dicitur *Rhytism*, & quæ tantummodo nutritiora membranarum, vesicularum & valorum, pulmonum concipiem consensum, ferunt. Atque adeo principaliter ipsi pulmones sunt affecti, sed quoad partem tantum externam superficiem. Et hinc est major, quam in ipsa spirandi angustia, spiritum cruentum de quo expectatur morbus solvatur. Febris etiam juncta ut plurimum, sed magis acuta ac in spuria, adsum quoque dolor, sed non tam acerbis, nec tactu exacerbandi, in latere affecto. Trahitur enim simul in consensum pleura thoracis invethens, tum quod exterior pulmonalis membrana pleuræ foveles, tum etiam quod in plurimis hominum pulmones in alterutro minimum latere pleuræ anniæ atque concreti sint.

## §. V.

*In peri-*  
*pneumonia.*

In peripneumonia dolor est magis sensitivus, obtusus, pressorius, quem acutus de ad dorsum usque de scapula propagatur. Sed major spiritus difficilis, anxius, & ægra expectatio, qua spiritum vari coloris ex imo ducitur. Nam in hac vasa pulmonum ipsa, quæ singulis casum ex uno cordis ventriculo in alterum abstruunt, affecta, & sanguine crasso, in solidiorem naturam abeunt, facta sunt atque obstructa. Quare majori libetur periculo de facie, quos corripit, necat, prædictum si fines, & tempestiva sanguinis omittatur ventilatio.

## §. VI.

*Morbi huius*  
*causa est*  
*causa.*

Invenit licet veteres minus exacte distinguere thoracis inflammationes; quia tamen frequentissimus fuit morbus, ubi vixerunt præci illi nati.

*Erd. Hoffmanni Oper. Tunc. 11.*

dicitur principes, *Traffacum, Arriam, Celvæ Aurelianus* & reliquis, ex ipsa morbi symptomatum historia accuratior peti possit, quam sortem ex recentioribus. Mibi præ rebus si cum *Arriani* descriptio, quam sit. *L. cap. XI.* de pleuritico morbo consignavit: *comitatur, ait, ille non dolor acutus, ad trepidum ascedens, immo acer. Quod videretur vero & in terra & in scapula dolor fortenditur. Sentitur etiam difficile spiritum, vixit, et laborum fastidium, malorum ruber, ingit in alia, spata ære vixit, pituitosa, aut alimide vixit, aut sublevis. Perit est, si eximium spiritum non cessit, si delirant, vel comate occupaverit. Scribit porro, ægros iusta teponiam, vel decubitu ostantum diem convalescere, aut perire, pro lyptogoniam velenem. Vel si ad viginti diem malum extendatur, ferri empyricos. Adit etiam, quod hyems maxime ferax sit, secundo autumni, vel nimis, nisi inardum peritigulum sit, a. las vero mittine; item quod iacet ætatis fines maxime huic malo obnoxii sint, pueri minime, vel imius eo periculum, quia puerilia corpora rara sint, humida & fluxa, multaque in eis diffusio & caliditas.*

## §. VII.

Quam autem gravia omnino, quæ sittem peripneumonia comitatur pleuritide, utice fundamentum suum habeat in inflammatione pulmonalis substantiæ; in procihiu est judicare: quod omnia, quæ sit ero sanguinis progrellum per minima pulmonum vascula, vel cavatum a copia crasse materis obstructione, vel eorum vala spastica, a materia tenui, acris, constrictione, obicem ponant, ad ingenerandum inflammationem hanc scetrem sine æquissima, perferunt quando plures simul cause, quæ dicuntur amice demes, præcaritæ & remore, in unum hunc effectum conspiciant. Igitur si, qui ex victu crasso, impuro, ponu spiritibus, humidi & mucus delectu, sanguinem in venis alunt, & copiosum, & spissum, qui recte *Sydrhamus* ait: *Ægypti* dicitur pleuritica, quam facile, configurationis alia præcaritæ causis, morbum hunc nascuntur, tum maxime, quando corpus per intensiorem excitationem, operum laborem, balnea item calida, nec non spirituum ponum, vehementius exasuat, & postea frigida septentrionali auræ incassus committitur, aut, quod pejus adhuc, subito ponu ingurgietur perfringimus. Proci etiam eandem ob causam huius passionis genesis in sanguine & plethorica est, omilla tempestiva sanguinis missione. Idem evenit feminis, quibus menses, vel inordinate, vel pultu parvus fluunt, vel etiam si ob a. tatis rationem plane emant, nec non viris, quibus hæmorrhoidum fluxus non rite obtingit, aut plane suppressus est.

## §. VIII.

Deinceps non simel, sed sæpius observavi, mienaria, spastica & colicos, nec non hypochondriacos in abdomine & intestinis dolores, cum alvi vehementiori constrictione, sequantur fuisse inflammationem pulmonum, maxime in plethorico-cachymicis. Nam horum ea est natura atque facultas, ut comprimendo vascula, præferent venosis, liberum sanguinem iter impendant, ejusdemque motum inæqualem & majorem præter naturam æquilibrium ad alias, imprimis superiores partes, efficiant. Quo postea nimio appulsu sit, ut sanguis non inælo urgeatur ad tubulos, qui ob minimam diametrum sanguinem ordinario

M 3 nec

nec vehunt, nec capiunt, sed & in hisce valorum angustis impactus hærens, æquabilem & inoffensum progressum interceptat, & omnes functiones, quæ sunt secundum naturam, perturbat. Et quia corpora hæmorrhagis admodum obnoxia, plerumque sanguine sunt complexioris & spatio in imo ventre strictioris patens; hinc fit, ut juvenes qui largas variis hæmorrhagiis, spiritum cruentum & hæmorrhoides præternaturæ experiantur, perquam facile, accidentibus occasionalibus causis, in pleuriticis & peripneumonias febres incendant. Porro frequenti observatione constat & illud, quod à scabie retropulsæ, à præpostere colubino simplici, vel dysenterico alvi fluxu; à consolidatis antiquis ulceribus, à cruce confuso pedum, vel totius corporis sudore suppresso, vel purpura chronica ob frigoris externum retrocedentis, pectoris obortæ fuerint inflammationes. Illa enim materia acris causticæ indolis, recrementorum, nervosis pulmonum & thoracis tunici impacta, ob spasticas, quas suscitatur, stricturas sanguinis progressus obicem ponit, eundemque in æqualitatem turbat. Neque etiam rarum est, post variolas & morbillos, præsertim male tractatas, gigni in thorace inflammationem, quam hi morbi nunquam non pulmonibus insideli esse, ac in eisdem labem & imbecillitatem relinquere solent.

## §. IX.

Epidemice

Præterea, quandoque ab extraneis & infectis aëris temporumque continuatione, pleuritides, tam vere, quam spurie, populares sunt & epidemicæ. Evenit hoc si hyems durissima nimis rigida regnavit, item quando longam austriam aëris temperiem & levem atmospheram, repente frigida & borealis, valde elastica aura excipit. Quod postremum quam imprimis vere & autumnum contingere solet, hinc tum febres tam catarrhales, & malignæ & benignæ, quam pleuritice circumire solent. Post asperam etiam hyemem notavimus grassantes pleuritides crudas, in quibus vix non de decimo die spiritum apparet. *Hippocratis morbi lib. II.* vocat siccas, & in ipsa aëris primis diebus admodum anguntur, vixque dolores & inani nulli admodum concidunt, ut procedente spum; expectorationi vix sufficiant & aëri difficulter convalescant. Endemice etiam dantur peripneumonice. Nonum quippe est frequentem admodum esse peripneumonice morbum de plures, in Westphalia, Pomerania, Suecia, Dania & Russia interficere. Id quod vero tam propter solennem his in regionibus vicium durum & crassum, quam propter aërem frigidorem & asperitatem, septentrionalibus locis proprium, accidere arbitror.

## §. X.

Epidemice

Ego quidem vix in ulla febre tam accurate observavi crices, quam in pneumonica, pleuritica scilicet & peripneumonica. Nam in juvenibus & qui paulo vegetioris naturæ, circa quartum plerumque diem spiritum prodiit cruentum & sepius die morbus sponte sua per sudorem largum solvitur. In plegmaticis & senioresibus, nec non ubi vitium pulmonibus insidet aliud, undecimo, vel etiam decimo quarto die, morbi fit solutio, parum sciretur, parum sudore, pulsu factio molliori, accedente somno placido & virium incrementis. In imperfecta autem crisi crices diebus etiam apparet sudor, sed non sufficiens, ideoque nec ægrum levat, nec morbum

solvit. Et ubi symptomata durant ad vigesimum primum diem, minus est abscessus in pectore periculosi. Bonum igitur indicium, quando expectoratio ex imo pulmonum succedit bene, eveniens materiam viscidam, quarto die cruentam, dein flavedinem tinctam, interdum etiam purulentam. Et quo expedioris sciretur, eo major facilitatis spes, quo impeditior, eo minor. Laborandum modo, quando morbus expectoratione materie copiose virulenta terminatur, ne in fine phthisis, vel hæctica accedat. Nunquam autem euta crebra alvi fluxio, suspecta etiam urina sine sedimento & minus quoque fausti omnis sudor largus, extra dies criticos. Quando tamen undecimo, vel duodecimo die alvi defectio non nimis copiosa accidit, non adeo perimenda, sed purulenta materia quandoque simul ejicitur. Quando etiam circa diem quartum nature beneficium narium prodiit stillicidium, id non sine notabili contingit euphoria.

## §. XI.

Nulla ex inflammationibus tam facile recidivatur, ac febris pneumonica, præsertim quæ paulo profundius fuit cum quadam abscessu. Mihi nota sunt exempla, ubi quidam vii convalescentes, inordinata dieta, potu imprimis copioso vini meraciori, in eundem morbum, elapsi vix mense relapsi, lethali plerumque eventu. Quam novi inflammationem hanc, bis, ter, quater de pluries ante, eodem in loco, ubi primum coarctata, recruduisse. Ut adeo, qui semel hoc affectu tinnisi, eisdem repentinum insulsum exacta vix victuque ratione, semper opus habeant accere cum cura.

## §. XII.

Qui autem inflammatione pulmonum moriuntur, suffocatione pereunt, quia materiam in vesiculis aëreæ & ductibus bronchialibus hærentem nulli amplius ejicere nequeunt. In sectione pulmonis inveniantur inflati, duri, instar hepatis, & ob vasa sanguine crasso tenaci facta, aquæ injecti fundum penunt. Vidi etiam pulmones abscessibus parvis & tuberculis duris obfissos, cum inflammata & sphacelata pleura, pulmonum substantiæ adherente. Neque minus, nota mihi sunt exempla, ubi polyposæ concreciones, in vena pulmonali, item arteria magna reperiuntur, obicem posuerunt liberiori sanguinis per pulmones cursui, & inflammationem, ob sanguinem copiosius, quam debebat, eo delatum, induxerunt.

## CURATIO.

## §. I.

Quia igitur sanguis subsistens & æqualem circuitum interceptans unica proxima hujus morbi causa, palmarium unque in sanando est momentum, ut is expediar iterum atque discutiar. Ad quod persequendum, hæc subordinate faciunt indicationes: 1) quando ultior sanguinis stasis atque stagnatio impeditur; 2) quando lentor in sanguine pleuriticorum obvis diluitur & colliguatur; 3) quando pari affectu, peripulmonum, dolorem & copiosum fluxum rigida mollietur & laxatur, quo impactus, quos ad appulso sanguine arteriolo elatus ac in motum rursus clauduntur; 4) quando expectatio materie viscidæ, sanguinolentæ ac purulentæ, in bronchiis pulmonum

moniam hærentis, per scærum faciliatur, simulque abscissus & empyematis generatio præcinitur.

## §. II.

Ad præcavendum inflammationis incrementum, nihil minus est sanguinis missione, quæ quo citius administratur, eo plus auxilii præstat. Secetur vero vena in brachio, & quidem illius lateris, quod affectum est: mittatur etiam liberalius, si plethora eminet & cum impetu exsistat sanguis. Quin ubi serum admodum tenax & glutinosum emissio sanguini innasat, & respiratio post sectionem adhuc valde difficilis urget, considerenter iterato subiectio administranda, præsertim si paullo profundiora hæscos inflammatoris suspicio.

## §. III.

Ex internis quæ maxime proficiunt, quæ sanguinem, serum ac humores tenues reddunt ac fluxiles, crassos vero ac spissos colligant, blandamque simul movent diaphoresin. Quod ut obtineatur, conducunt hæc: Insulsi theiforme, ex herbe veronica, chæresoli, salvie ana manipulis duobus, radicis leiquiritiæ uncia, seminis feniculi drachmis tribus, de quâ frequentius patelle quatuor vel quinque frõillandæ. Dein mixtura dilutioris & diaphoretica, hunc in modum: recipe aque cardui benedicti, scabiosæ, florum sambuci, acaciæ ana uncias duas, theriacalis utriusque semis, aceti de stillati unciam, lapidum cancrorum drachmam, animum diaphoretici feripulus duas, syrapi papaveris theocados, vel syrapi croci, ex sacchari dissoluti uncia & extracti croci grana octo parandi, drachmas duas. De qua dua vel tria cochlearia; hysiorij quovis, alternatim danda cum pulvere hæc: recipe animonii diaphoretici, sive cerussæ animonii, lapidum cancrorum, maddibularum laci pælis, dentis hippopotami, solutonis oculorum cancri ana drachmam, nuri puri drachmas duas, cinnabaris scrupulum. M. f. pulvis ad drachmæ dimidiæ pondus pro dosi sufficiens. Quando etiam natura paullo segnior & pleuritici epidemia mali moris, pulveri huic adijcenda camphora, quæ potenter resistit inflammationibus, & ne lausis serpent, impedit. Tenendum tamen, dimidium granum pro dosi sufficere & desuper bibendam esse emulsionem ex seminibus quatuor frigidis majoribus, cardui Maris & nucleis pinearum, cum decocto hordei & optus cervi paratum.

## §. IV.

Dolores acutos, pulset. & rigidas fibras optime remittit, vesica calida dolenti parti tantum non perpetuo admodum, plena decocto emollientium specietur; uti florum sambuci, meliloti, verbasci, chænomilæ, malvæ, hysiorum alborum, seminum quatuor carminativorum, croci, ex lacte. Recte etiam jam Arætu lib. I. in curatione pleuritidis præcipit, ut lausis dolenti applicetur vesica calente oleo sapienti, modo fons levis sit, ne pondere dolorem efficiat. Ex certe hoc topico mirifice levatur, doctores, respiratio faciliatur, simulque sanctorum ad expectorationem præparatur. Ipsum tandem expectorationem egregie promover inlatus: ex oleo amygdalarum dulcium uncia dimidia, spermati ceti drachmis duabus, croci grana decem, syrapi violarum, sacchari cardui ana uncia una cum dimidia. De quo crebrius quicquid deglutendum, vel cum decocto avenæ excoctis, aut sero lactis dulci assumentum.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

Possimum curationis momentum suum est in sanguinis missione, de qua perit Arætu lib. I. pag. 186. monet: nulle more atque diutius in pleuritici, quin protinus valenti remedio succurratur, datur occasio, quo primo præcipue de vena secanda est cubiti, & quoniam mediocriter effluxerit, retrahendus homo, interjecto temporis spacio, iterum detrabi potest, si bene habeat, seu minus, postulat. Hæc quippe non tantum in juvenili ætate utilis, sed & senili, quia hæc plus sanguinis abundat, quam alia, magisque crassum ac tenacem in venis alit, quæ inflammationes facile profundiores ægre discutiendas, eaque prosperæ hac in ætate etiam, si vires patiuntur, venæ sectio potest repedi. Inprimis curandum, ut pro viibus & quantitate sanguinis, nec minimum, nec parces extrahatur. Quod si enim iusto plus emittitur, non modo expectoratio inhibetur, sed & stasis sanguinis dissolvenda obfirmatur magis, vel plane in sphacelum transit. Si autem minus, quam par est, evocatur, parum juvat, sanguis, nacto spatio, impetuosiùs affluit, & stagnatio cum inflammatione increfcit.

## §. II.

Deinceps curandam quam maxime in his potius moribus febribus, ut alius aperta & insensita si spasmus libera maneat. Studet id jam Trallianus l. c. nec non Hippocrates lib. III. de iurib. §. 17. alium, inquit, in primis quatuor aut quinque diebus subducere oportet, & hoc paullo amplius, quo & febres obdurosus sunt & dolores leviores. Nos quidem commendamus hunc in finem clysteres emollientes & paregoricos, domesticos cum oleo amygdalarum dulcium, quibus & alvus referatur, & structura inefficacium spastica laxatur. Recte etiam Arætu l. c. præcipit: modum inferiendi paribus adhibendum negligere non oportet, viri quidem in ætate, alvus ruerem, mulieribus in uterum, infundendum est. Quod experimentum etiam locum habere potest, si intestina crassa spasmus contriata, vel spasmotica uterina passio mulieres decinet.

## §. III.

Trallianus lib. VI. pag. 269. maiorem in modum in ejusmodi inflammationibus affectibus commendat, & quidem metico, potus aquoso-mulso. Commendat quoque & laudat cremorem psianæ, bene decoctum, largior suum, cum amygdalis incoctum: neque desinas, ait, tepidum adhibere, dum citius & alia potiones exhibentur, & addit, nullum aliud auxilium pleuritici ita accommodatum invenire, etiam si febris adfuerit vehemens. Psianam suam semper etiam laudat Hippocrates. Et certe humida tepide fumata, omnibus præferenda esse, expetis scribo. Ad humores vero diluendos, nil nisi decocto avenæ, vel hordeaceo, addita decent quantitate mellis Præfici, nec non sero lactis dulci. Ex quo plus humidi, præsertim si corpus valde siccum, assumitur, eo salubrior est.

## §. IV.

Ubi in omni febre inflammatoria, sic maxime in pneumonica, abstinendum a regimine nimis calido,

calido, quoad lectum & conclave, pota etiam nimis calida. Cavendum vero etiam vicissim a refrigeratione & pota frigida. In medicatione exulcent omnia fornice urinae, sudorem, nec non alvum movenia, ne lymphatic remane humores, quorum beneficio stasis dissolvenda, aliorum trahantur. Nam de alvina excretionis perite jam monet Hippocrates lib. III. de morb. multum humores si infra fecerit à quinta die mortem inducit. Etenim superiores partes refectantur & spiritus purgatio factum non producat. Operari igitur & inferum alvum neque valde suppressam esse, ut ne febris fiat acuta, neque valde exercere, quo salvia factum educi queat & eger quilibet valeat. Quando tamen alvus bis, vel etiam quater sua sponte ferretur, minime id est prohibendum.

## §. V.

*Analys.* Ad dolores acutos spiciculos commendantur plerumque anodyna & opiata. Sed cavendum ab his est, praesertim in febris acuta, ubi humorum spiritibus & inflammatione profundior. Fugio, sermo mones Trallianus l. c. diacodium & phelloniam. Nam maxima pericula inducunt, cum humores educti continenter reddant, & vires proferant reddantque emoritur. Ut vero impensior dolorum atroxia in aetate juvenili, ultra papaveracea, emulsionem nempe cum limine papaveris ejusdemque syrupo, vel diacodium Fracastorini, non facile ascendendum; ita tamen, ut semper ipsis admisceantur nerosa & diaphoretica. Externe autem ad nalcendos dolores ipsaeque discussionem secundandum, praeter superius commendata, uris est fons cum pinguetudine caponis calefacta, in cujus uncia, dimidia camphorae drachina soluta.

## §. VI.

*Expositio  
posita.*

Expectorantia & dulcia non nimis cito praeparari debent, primis scilicet diebus, sed tunc demum, quando materia cocta, viscida, mobilis est & ad excretionem apta; alias major ad pulmones praeiuratur effluxus. Non ulla etiam sperma ceti in copia assumum ad sanguinem dissolvendum commendant. Ego vero ob nauseam, quam parit, plus illud nocuisse, quam profuisse, observavi. Neque etiam hoc tanta dissolutionis facultate pollet, quam acetum cum cuscutharum lapideis.

## §. VII.

*Atrox de  
clinante  
typho.*

Quando die critico, uti saepius, nisi turbas faciat medicus, incidit, inflammatio per copiosum sudorem solvitur, quem liberius respiratio, corporis quies & virium incrementum subsequitur, diaphoretica & diluentia aliquantulum adhuc insistentia, sed non tam crebra. Exacta quoque victus habenda ratio, ne plus, quam par est, ventriculus debilis subigat potum, assumatur; quo morbi reliquiae penitus consumantur & recidiva arceatur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Peripneumonia  
omnis ve  
ne jectio.*

Juvenis accedens ad annum vigesimum sextum, sanguine-cholericus, habitus corporis stricioris, aetate duos annos singulis fere mensibus sibi applicari curavit cucurbitulas cum scarificatione, postea simul & simul per annum id intermittit. Aequandiu nullo notabili incommodo circa

pectus fuit afflictus, sed Februario mense, hyeme tepida, conjunxit primum horrores & rigore, corporisque lassitudine, cuius mox accessit dolor in pectore, spirandi angustia, cum postulatione appetitus, virium, calore praeternaturali, pulsu ceteris, duro & irregulari, somnoque inquieto. Adhibita remedia varia intra pneumoniam, omnia tamen sine seditione, incassum. Adhaesit enim in pectore angustia cum metu suffocationis, expectoratio fuit difficilissima, febris facta intransiens, facies rubicunda, oculi feroces & afflicti vigilia circa diem septimum delirii praebuerunt indicium, quod etiam eodem adhuc die accidit, cum ipsa morte. Aperto post mortem thoracis cavo, in conspectum venerunt pulmones mirum instans, difflens & tactu duri. Replebant hi omnem fere cavitatem & firmissime praeterca erant adnati diaphragmati, costis & dorsi vertebis, in utroque latere, ut difficillime cultro acie ponerentur separari. Externi apparuerunt admodum duri instar carnis, velsulae quasi carnea crassa rubicunda substantia erant infarsae, & quam discinderent, pauca quantitas ichoris putridi sanguinei effluxit, praesente pure nullo. Lentici imposui gravitatem, quinque ponderum exhibuerunt & aquae injecti semper ad ima descendunt. Ipsa in alvea arteria spumosa & tenax materia repleta. Arteria & vena polypoidis concretionebus, quae ex corde & auricula, quarum columnae & filis finituri erant connexae, extenuatae, plus quam duarum unciarum pondus habuerunt. Cordis ventriculi crasso & nigricante crure penitus erant conferti, & in pericardio sex maximum cochleara aquae, instar carnis loturae, fluctabant.

## Epiris.

Paret hac ex sectione, in peripneumonia, non semper adesse pus & materiam, sed potius crassam sanguinis substantiam firmissime poris & tubulis pulmonum impingi, & ita motum durum, quo omnium symptomatum succedentium causa est, effici. Innotescit deinceps hoc casu, omniam consuetam sanguinis subtractionem, in corpore phthorico sanguine-cholericis, gravissimae talis sanguineae inflammationis adsum praebere posse & occasionem. Porro admodum probabile, polyporum substantiarum ex crassiori sanguinis parte concretam & in pulmonalibus vasis haerentem, multum ad generationem huius afflicti consualle. Testatur enim *Malpighius de polyp.* peripneumoniam saepenumero induci à polypoidis concretionebus in pulmonum vasis haerentibus. Non immerito quidem mirandum, cur, posito hoc sanguinis progressu obice, non perpetua ante peripneumoniae invasionem difficultas fuerit respiratio. Sed vasa, quibus polypi inhaerent, ordinario magis ampliuntur, ut sanguis nililo minus praetervaleat. Quamdiu igitur sanguis placide circumagitur, nec quantitate nimis reduciatur, liber manet ejusdem per hos etiam tubos transire, nullumque subsequitur incommodum, ut videntur, polypis ad ulnae usque longitudinem per arteriae aortae, item venae caeve truncum superioris & inferioris tuielle elongatos, sine ulla sanitate detrimere atque periculis. Verum si sanguinis copia accrescit nimium, tubulorum violentum in ipso motu exurgit, praesertim si ab externis contractis impetu ad interna urgetur, congestus circa cor & pulmones cruor, maximeque in tubis quibus inhaeret polypoida

polypſa maſſa, ſtagnans & accumulans, inflammatorios tumores, præſertim in viſcere ſanguineo, facillime excitare poſſit. Tum vero quam maxime neceſſaria ſanguinis miſſio tempeſtiva, quo ſanguini iterum pareat circuitus, quæ noſtro in ægro peſſimo conſilio omiſſa.

## OBSERVATIO II.

*Pleuris  
ſpuria ve-  
na jeſtione  
ſeſſata.*

Quum ſynocha & catarrhales febres ſub ſinem elapſi anni miſtes noſtros præſidiarios epidemica priuſus ratione infeſtarent, Januario menſe etiam plures, præſertim ex iis, qui contagium vitæ in circumjeſtis ciuitatibus, ſub frigido valde & humido aere hinc diſceſſerunt, corripuit ſpuria pleuriſis. Ex his triginta commiſſi ſunt curæ medici, amici & auditoris olim nati, qui febres laborantibus valde graui, cum acuto dolore lateris alterutro in thorace, niſi ſicca, ſed intolerandum dolorem concitante & ſomni deſectu. Omnibus in ſtatim ſanguinem mittere juſſit in brachio, qui in pluribus cunicula glutinoſa obductus comparuit. Poſui liberaliter dare præcepit decoctum auenacæum teræ, cui incocta ſalvia. Temperatum in omnibus inſuxit regitico, & præterea niſi pulueres, ex nitro, antimonia diaphoretico, lapidibusque cancrorum, admixto non nunquam aceto vini & aliquot uncias aquæ cardui benedicti, dedit. Ex exteriori lateri dolenti calida tantum lintha admoſa. Sic morbus ſoluitur ſui largo ſudore, ſeptimo, vel etiam undecimo, aut decimo quarto die. Iuuentus non nulla & quibus non ſufficiens ſanguinis quantitas ſubtrahitur, ſeptimo, vel nono de, narta ſanguinem ſtillarunt cum euphoria, & pulſus per totum morbi decurſum magis fuit depreſſus, quam velox. Quos autem febris longius ad decimum uſque quantum diem deſinuit, his accidit purpura rubra, quæ veſiculis aquoſis albis quaſi erat obſita in omni corporis ambitu. Niſi tamen aliud uſurpatum, quam pulvis bezoardicus cum nitro, liquor noſter anodymus mineralis & decoctum hordei, nec non auenæ excoctæ, tepide largitæ potum. His conualere omnes, moruus nullus, excepto unico, qui pleuriſide cum pectehiali febre fuerat affectus.

## Epiſiſ.

Facile in pleuriſidem ſpuriam incidit, quæ veſiculis non ſans munus, in aere frigido & humido, autumno, vel hyeme, diu verſatur. Nam ego nullum morbum & inflammatoriæ febrem, tam promptè ab aëris intemperie, inæqualitate & mutatione generari, obſeruavi, quam quæ in thorace conſiſtit. Notavi quoque, ætate valde ſicca & calida, ſi admodum frigidus & ſeptentrionalis ventus ſubito excipit, non tantum deſtillationes catarrhales, ſed & rheumatismos & pleuriſides cum ſputo cruento vehemetique lateris dolores fuiſſe frequentes. Nam aer quam maxime & proxime, propter continuam inſpirationem, aſſicit pulmonum viſcus inus, & exterioris quoque thoraci & coſtis, quæ tenſionibus muſculis, membranis nerveis & vaſculis ſcriptæ ſunt, allabitur, eaque propter quam facile ſpallitas criſtallæ inferre & liberum humorum circuitum ſiſtere poſſit. Recte autem medicus ſpuria hac pleuriſide laborantibus omnibus ſecari juſſit venam, ob craſſam & copioſum qui hyeme gignitur ſanguinem, quem alias non ſemper in ſpuria, ſi corpus magis ſeroſum, ſanguinis miſſio ſit neceſſaria. Neque etiam in pleuriſide

noſta externe ita accommodata ſunt unguenta & linimenta oleoſa, vel etiam humida, eo quod perſpirationem, quæ ſtagnans humor diſſolvens & diſſilanda, impediunt. Præſtat tantum partem aſſectam in temperato & æquali calore, ſub leui calefactio lectulo, ſervare, in primis quum nec omnis cutis, eodem modo ac in arthritide & eryſipelate, ſerre poſſit topica. Demum quoque notandum, purpuram rubram veſicularem non eſſe confundendam cum alba miliarum. Illa enim longe benignior eſt naturæ, & ſero non tum putreſcente & vappido, ſed potius acri ſcorbuto omni ducit, & ob id, ſi modeſte & perite à medico excipitur, non tanti eſt periculi.

## OBSERVATIO III.

Iuuenis literarum ſtudioſus, vixit circiter annorum, ſpongioſus habitus & ſanguine plenus, in prima ætate ob id crebrius narium ſtillicidium expertus, liberatus vix ante aliquos menſes à quartana, quæ cum per unum & dimidium annum fuerat conſiſtens, Martio menſe, poſt multos in viſu errores, potum vini minus boni & corporis refrigerationem, incidit in pleuriſidem vtram, ſymptomatibus ſtipatam conueſiſ. Datum in principio purgans, quod aliquot ſedus moris, non ſine ſubſequeſe imbecillitate. Secta etiam in cubito vena, & quæ exiit ſanguis valde ſpūſus, niger, obductus materia tenaci gluſioſa. Nihil minus tam impenſa fuit ſpirandi anguſtia, ut propter ſuffocationis metum, nec ſupinus, nec in dextro latere cubare poſſet, ſed erectus ſemper ſedere neceſſum habere. Pulſus ſimul erat admodum durus parvus & celer, vigilia continua, perſeuerans niſi, & ſputum quodammodo cruentum, cum exquisito pungitivo dolore reſpiciebatur. Quinto morbi die vocor ego, & ſtatim lateri dolenti admoveſe juſſi vociferum ſpeciebus emollientibus ex lacte coctis plenam. Interius dedi pulverem hunc: recipe lapidum cancrorum, mandibularum luciæ picis præparatarum, antimonii diaphoretici ana drachmam, ſolutionis oculorum cancri, niri puri ana drachmam ſemis, cinnabaris antimonii grana XV. M. ſi pulvis, de quo tenus ſingulis horis dimidia drachma oblata, interpoſito potu uſuſi theiformis. Ter etiam vel quater quotidie poſtere juſſi hanc mixturam: recipe aquæ chareſoli, ſtorum ſambuci, cardui benedicti ana uncias duas, aceti deſtillati drachmas ſex, lapidum cancrorum drachmam, mandibularum luciæ picis, antimonii diaphoretici, ana drachmam dimidiam, ſyrupi juiubini drachmas tres. M. Cereviſie & frigidum potum interdixi omnem, ſed liberaliter præbere juſſi inſuſum herbarum veronicæ, ſtorum ſambuci, radicis liquiritiæ & ſemini foeniculi, ex aqua. Septimo die ſuperuenit hæmorrhagia narium, ſequens quoque per uniuerſum corpus ſudor & morbus ex voto ſoluitur. Sanus etiam hinc diſceſſit iuuenis, ſed audiui, eundem poſtea ſere quatuorſis eodem malo fuiſſe affectum, ac trigelimo ætatis anno pluriſi tandem extinctum.

## Epiſiſ.

Iuuenes ſanguinei, qui hæmorrhagis narium, vel hæmorrhoidum præmaturo fluxu in iuuentute obnoxii, à thoracis refrigeratione facile incidunt in pleuriſidem ſanguineam. In his vero omne præſidium in ſanguinis miſſione tempeſtiva. Quæ ſi negligitur, vel non conveniens

*Pleuris  
vera per-  
gnoſa aſa  
corrupta.*

quantitas emittitur, maxima spirandi ingruit difficultas. Quod ubi accidia, sanguinis est narium stillicidium sponse obortum egregio est levamen. Quam salutarem crisin etiam in binis pleuritidis gravidis vidi, quae semel tantum, non vero bis, aut ter, ut in graviditate necessarium, venam sibi pertundi curantur. Deinceps nunquam per totum pleuriticum, & peripneumonicon morbum iuta sunt, quae alvum ad dejectiones sollicitam, sed chylires innox in morbi principio ejusdemque progressu, in fine autem laxantia pectori amica postius admitti. Quae autem ego adhibui auxilia, a me incomparabili cum fructu semper fere sunt usurpata, inprimis quum medicum facerem ante quadraginta annos in Westphalia, ubi endemice pneumonica febres. Inprimis habeo, quod laudem crebriorem & largiorem potum insuli theiformis superius descripsi, sive decocti avenae cum saccharo & nitro conditi. Neque reticendum, me saepius circa dies criticos pulveribus diaphoretico-nitrosis unum aut alterum camphorae granum adjuaxisse, eodemque effecisse, ut morbus solvereur sudore & subsequeretur expectoratio. Denum nulla inflammatio tam facile & crebro recidit, quam pleuritica & peripneumonica, nec non ipsa pleuritis furta, ceteris praeteritis temporibus. Haec enim rheumatici est genus, quod ad aëris viâ facile incidit. Et ubi semel vel iterum pars quaedam per ipsum morbum debilitata & pristino robore privata, structura quoque visum & canaliculorum vitata, accedentibus aliis causis, aequalalem & naturalem sanguinis motum turbantibus, perquam facile praeternaturalis humorum stagnationes in minimis vasculis accidere possunt.

## OBSERVATIO IV.

Peripneumoniam  
inter  
duas  
diebus  
curavi.

Illustrissimus Consiliarius, robustus & habitus, bene appetens & duro victui a longo tempore assuetus, interdum cum ephorica haemorrhoidalem fluxum passus, mense Januario, coelo algidissimo, ex abdominis refrigeratione & esu leguminosorum, colicam incurrit, per diem & noctem graviter affligentem. Quum vero medicus alvum clausum chylires non molliet, sed potione emollienti cum calidioribus essentis propinaret, tertio die accessit ingens respiratio angustia, cum febre, inquietudine & tenso & pungente dolore, a pectore ad dorsum usque excurrente. Socabatur igitur vena in brachio, ac non ita multo post decoctum manistanum cum aliquot tartari emetici granis porrigebatur. Inde quidem & intestina & stomachus depleta laeserit, sed anxietas & spirandi difficultas laeta major. Exhibuit postea manus pectorales resolventes, sexto die iterum vena perusta & sepius denovo datum insulum manistanum. Omnia autem incassum, ut potius morbus inde ingravesceret. Exterius tum adnotae thoraci species carminativae & pectorales cum aqua calis vivae in cataplasmati formam coctae, pariter frustra. Tandem potius suavit medicus Tourdencensis acutulus, quae aeger avide per biduum frigide ingessit, donec undecimo morbi die, suffocatione & syncope superveniente, periret.

## Epicrisis.

Saeptius observavi, ex solo dolore colico praecedente, qui chylires & aliis congruis facile folvi posuisset, ortam fuisse peripneumoniam, in robustis & crasso sanguine plenis, praeteritum

senibus. Ob distensa enim a floribus inrecessa, sanguis ad cordis & pulmonum vala validius urgetur, ibique collectus & densatus, asperitiam facit spirationem cum pectoris angustia. Nam quod dolor est in partibus nervosis, id anxietas in corde & pulmonum vasis, a sanguine nimium distenta. Frustranea autem fuit evacuatio per superiora & inferiora, quippe quae subtrahit humidum sanguinis, genus morbi medicinam, coarctatione etiam abdominis sub vomitu, magis sursum ad pectus sanguis est coactus & spiratio difficilior reddita. Pona quoque acidularum frigidus in morbi vigore, canis ratione omni, ac propter frigida, non potuit non noxam inferre gravem. Fuit autem hic morbi artifex, qui singulari methodo febres pectichas curandi, in *Actu Berolinsensi* indicavit.

## OBSERVATIO V.

Vir sanguineus, facie floridus, corpore obesus & spongiosus, post aliquot diem ejus, vino & cibis saginatus, noctu & iurendu, Martio mense, Berolino Miridam Westjalonum mor facit. Peracto hoc, post aliquot dies nanciscitur pleuritica pneumoniam, febre soporata intensâ. Ego vocatus venae sectione repetita & pulveribus antipleuriticis, nervosis & canabariis, nec non potu insuli theiformis, à periculosis liberavi ipsam symptomatibus. Remansit aucta tussis quaedam cum levi febre, virium languore corporisque marcore, respiratio tamen non adeo difficilis. Hinc usque auxilia varia directiva & pharmacutica, sed nihil per octo hebdomadas nilum profectum, & tussis potius cum dolore pectoris gravativo increvit, parum autem rejecti & vesperti lena quaedam flexile vitâ scilicet. Tandem ex improvviso simul & semel, intra tres, vel quatuor horas, ulera mensuram materiae purulenta cum impetu quasi ex ore repetita, respiratio illico facta lenior & febrilis calor remittit. Duravit postea haec puris exussio per mensem, minori tamen copia, ac aeger interea bene appetit atque dormivit, successive etiam per Dei gratiam saniam redditus, solo laetia cum saccharo rosaceo cocti potu calido, quotidie ad unum cum dimidia mensuram, interposito usu balnei pectoralis, ex floribus sulphuris, oleo amygdalarum dulcium, spermate ceti, cerebinalina Veneta, croco & oleo anisi, nec non pulveris pectoralis, ex lapidibus cancerum, spermate ceti, saccharo, myrrha, radice liquiritiae in pulverem redacta & bolo Armena.

## Epicrisis.

Abcessum pleuritidem & peripneumoniam non sufficienter solutam sequi, passim praei medici tradiderunt. Confirmat id quoque experientia, & ego id praeteritum observavi in sanguineis, spongiosis & obesi habitus hominibus. In nostro autem memorabile, quod rupto abcessu, pus effluens simul & semel per os exorturum, quod si in thoracis cavum delabatur, heciliam facile inducit lethalem, nisi educatur paracentesi, de qua notabile exemplum communicavimus, in *disquisitione de perpetuo succi matris ex thorace stillicidio*. Pertinari tamen posse talem in thorace abcessum & amplam in pulmonibus cavitationem, monstrat haec histona. Non vero praeterendum, agrum hunc postea saepius de dolore quodam acuto in latere affecto tussile conqueri, post paulo

Emphysem  
et  
peripneumoniam  
curavi.

paullo fortorem corporis motum, equitationem, largum vini portum ac nuntium acidorum usum.

## OBSERVATIO VI.

*Peripneumonia gravis quæ fulens.*

Juvenis generosus, virginis amorum, sanguineo-phlegmaticus, narium hæmorrhægiis & largis de crebris ab ineunte ætate obnoxius & ante biennium gravi acutum pectoris morbum passus, Februario mense, postquam corpus saltando vehementius exagitasset, & mox postea in prandio cerevisiam frigidam bibisset, & legumina cum salita carne avidius ingessisset, obicurarum quendam in scrobiculo cordis sensit dolorem, sed magnam cephalalgiam, cum pulsi celeri, contracto, sub alvo adstricta. Datus vesperi pulvis temperans, noctem autem duxit insomnem & mane spiratio fuit laboriosa, cum pectoris angore & dolore in sinistro latere, paullo supra costas spurcia. Hinc mane vena in brachio petula, sanguis evocatus niger, cuticulam glutinosam in superficie gerens, data quoque mixtura discutientis atque resolvens pulvis descripta. Subtracto sanguine, nullus primum habere visus & dolor capitis discessit, postem tamen die & dolor lateris & pectoris angor rediit, quoniam magis adhuc increvit, cum virium debilitate, summo inquieto, appetitus prostratione, ut æger spem vitæ abiceret ipse. Ad dolorem igitur mulcendum imposta vesica decocto ex syceæbis emollientibus cum lacte plena, alvus quoque stricta chylis emolliente demulcenti mollita, flatus multos multaque crassa stercora dimisit, ægro inde aliquod levamen percipiente, imprimis quam subinde ex infuso thei formi foetillaret, & spiritum rejiceret crassum fuscæ coloris. Septimo autem die iterum potus habuit, corpus jectigavit, spiritus factus angustior de respiratio actiâ, invalescente simul febri calore & accelerante mentis turbatione, imprimis quando oculis clauderebat. Interpositi hinc nuumeræ pulveres nitrosi cum camphora, quibus pectoris quandam sensu liberationem & tædister appetente nono die sudavit, liquor semper succedente fusca, jam etiam quadammodo flavo. Post nonum diem accessit levior quidam alvi fluxus, ut quotidie ter vel quater deiceret, primam crassa foetida, postea mucosa & ut dicebant purulenta. Parum tamen levitatis inde sensa, sed debilior potius factus; donec undecimo morbi die ex improvviso subito largissimus per universum corpus prodiret sudor & per bilurium manaret, tam salutari eventu, ut æger post illum somno obtrueretur alio, exasperfactus virium incrementum & respiracionem liberiorum perciperet, ac postea, fusca & alvi fluxu cum levi madore per aliquot adhuc dies persulset, sensum cum satietate in gratiam rediret.

## Epiris.

Sic juvenem hunc generosum in artibus micis commorantem ante annum curavi. Id autem ex casu hoc in prædicum usum convenire licet: quod origo peripneumonici mali etiam esse possit ex primis viis, si fluxuâtes fluxibus & spasmus detineat, qui sanguinem nimia copia, ad partes superiores, imprimis thoracem, urgent. Tum quidem, si candide æger de scdum consistatur, occasio datur cito prævidendi gravem futurum morbum, si commodis evacuantibus, lenioribus emeticis, laxantibus, aut chlysteribus, primæ viæ a sordibus deplendantur. Et hoc in casu ratione non destitimus prædicari non nulli, ut

Rulandus atque Hermannus, qui in principio inflammationis pulmonum dare præcipiunt vomitorium, quod, si hæc causâ non succedat, alia nocentissimum. Porro hæc etiam ex bilibus apparet, non solum esse itis excretionibus, quæ in acutis pulmonum morbis fiunt per alvum. Sed penitus de saluberrimæ crises, succedunt per sudorem largum.

## CAPUT VII.

## De Febre Hepatica, sive Hepatide.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Quo frequentior quam modo exposuimus <sup>hepatide sive inflammatio</sup> inflammatio; eo rarior hepatis inflammatio vera. Quod & cur hoc sit, primus ego ante aliquot annos multis de validis rationibus & illustris peculiari dissertatione, de hepatis inflammatione vera rarissima, sparsa frequentissima. Potiora hæc redeunt. Inflammatio autem hepatis accidit quam maxime nervosis & sensu acuto præditis partibus, in quibus ille in congenitis tubula subtilissima sanguis, dolorem movet ac spasmus, qui postea universum nervorum partium systema in consensum pertrahit, exagitat sicque febrem accendit. Sanguis autem minus exquisiti sensus viscera, non tam æque ferunt sanguinis stagnationem, sed cedunt impetuosiùs affluent, nec dolor supervenit, nec spasmus, atque adeo neque etiam febris. Quia igitur hæc inter eminet imprimis hepatis, quod ex paucis arteriis, sed maximam partem venis, portæ & hepaticæ propagibus, emunguntur, & propter tunicarum nervorum absenciam, in magnam molem potest expandi sine acuto dolore; hinc in ipsius substantiam minus cadit inflammatio.

## §. II.

Illæ autem hepatis inflammatio, quam veteres fuisse describunt, merito externa tantum, superficialis, quasi erysipelacea de sparsa hepatis non focus ac pleuritis spuria, confessa, ejusdemque sedes non in ipsa interna hepatis substantia, sed potius circa convexam partem, in membranis de ligamentis viscus hoc cingentibus & quibus costas spurias ac diaphragmatis portioni adheret, continuanda videtur. Sic enim Hippocrates de interna affect. §. II. hepaticum describit morbum: dolor acutus in hepatis in situ, & sub ultimâ costâ, & in claviculâ, & sub mammâ, & suffocatio foris tenet, & aliquando lividum bilis rivum, & rigor ac febris prima dicitur debilis habet, & dicitur attingit hepatis, dicitur & color ipsius lividus est, & citi, qui prius condebant æger, suffo aut ipsam & ingiit acutus ac torquent ventrem. Hinc condecant, ubi dolorem habuerit, tum alia, tum respoctura eadem opposita, que etiam pleuritidis propria. Celsus lib. IV. cap. VII. hæc acutis pectus morbi signa esse perhibet: dextra parte sub præcordiis dolor vehementer est, idemque ad laevam dextram & ad ungulam hancemque partes, ipsam pervenit; non annuus motus quoque dextra torquet, horror validus est, bilis evomit, interdum singulus prope strangulat. Jam quicumque hæc palmarum curans expendit, facile

facile perficiet, illum, ab Hippocrate delineatum morbum, non tam in ipso hepate consistere, sed potius ad magnam & paulo profundiorum erysipelasum inflammationem parium externarum, thoracem & hepar investientium, esse referendum, eo quod non modo ultimas costas prehendit, sed & ad humerum, mammae & claviculari se extendit ac dolor tactu augeatur. Cum rigore quoque, febre & vomitu invadit, quae symptomata inflammationi parium nervosarum solennia. Dolor porro externis mollioribus & fibras laxantibus remittit. Ac respiratio ad suffocationem usque difficilis, a spatio pleurae & peritonaei, quae membranae diaphragma superne & inferne investiunt, idque in consensum trahunt, haud immerito derivanda. Qui autem à Celso describitur morbus, non etiam in ipso hepate visere, sed in externis ipsi adhaerentibus membranoso-nervosis partibus consistere videtur, quae dolore & spatio affectae, nervos diaphragmatis, intercostales & qui ad ventericulum excurrunt, per consensum simili afficiunt. Hinc recte monet *Trallianus lib. VIII. cap. 1. considerari oportet, non inflammationi ipsi coram proprie acciderit, an membra ipsius & musculi extrinsecus ambientibus.* Quin *Aetius lib. I. thes. 17. XIII. cap. IV.* diversis verbis scribit: *aliquando in pariculis hepatis fit extensio, unde sequitur dolor fortissimus, quasi insensibilis, & apparet patienti, quod hepar sit, quod dolens.*

## §. III.

*Lien hepar  
quodvisque  
inter, sunt  
afflictum.*

In corruptionem quidem sphacelofam, inprapto factore de nigrore cognoscendam, nec non in purulentam & apostheumaticam interdum abire hepar, testantur faciem observata in dissectione cadaverum, notata passim à *Forsio lib. XIX. de hep. affect. obs. X. Couera in obs. anatomico-chirurg. M. N. C. D. II. obs. II. Capreccio lib. III. c. XXIII. Bartholinus Cov. IV. hist. 18. M. N. C. Crut. III. & IV. obs. CXLIV. Dec. II. Ann. IX.* Sed tenebimus omnino, non omnem sphacelationem supponere inflammationem; nam illa etiam commode fieri potest à quiete & stasi sanguinis in ramis majoribus, & nullas omnino partes in corpore citius & frequentius sphacelo affici aut apostematari, quam pulmones, hepar, lienem, uterum & omentum, observavi. Eadem quoque corruptio ex facili in hac viscera transire potest, si coniuncta pars primam eadem fuit infecta, haud secus ac videmus in externis artuum exiguo loco ortam sphacelationem, subito latus serpere & vicinam carnem, quin integrum amplum membrum, manum & pedem, corrumpere aequo contempere.

## §. IV.

*Hepatitis  
duo symptomata  
et causa.*

Est igitur inflammatorius ille affectus, qui partes externas hepatis contiguas & confines frequentius invadit, & ut plurimum cum horrore, frigore, interdum etiam vomitu & febze incipit, ac dein dolore, insonnia, spirandi difficultate, inquietudine & alvi adstrictiore thipatur, ac vulgo pro hepatis inflammatione haberi solet, nihil aliud, quam species febris rheumaticae, sive reclusae erysipelaceae, quae fit non tam à decubitu & stasi sanguinis, quam potius feri visceris acrioris, membranarum & fibrillarum nervae laniationis. Propterea eadem quam maxime obnoxia sunt, quae articulari & rheumaticae passionibus alias patenti, qui potibus stimulis ac ira indulgent, quibus fucite sanguinis evacuationes suppressae, qui

in aëre frigido diu versantur, aut plane corpus aethans eodem incautus committitur, nec non qui diarrhoeam potu largiori spiritus vini cohibuerunt. Quod vero dextrum thoracis latus rheumaticis doloribus longe frequentius afficitur ac sinistram, hanc insuperius ab causam fieri arbitror, qui hepar magnum & ponderosum viscus ibi diaphragmati colliquo spuriis connexum, quod sub vehementiori corporis motu & respiratioe citiori, has partes jugi tensione debiliores reddit, eoque facit, ut humores ibi discutiuntur facilius subsistant & etiam in tubulos incongruos urgeantur. Atque haec etiam subtili ratio, quod per lapsum, ictum, aut emplastrum calidius admotum, nec non cucurbitulas, longe facilius dolores & inflammationes inducantur in dextro latere, quam in sinistro & abhi.

## §. V.

Perquam autem notum digna est observatio practica, quod interdum casus occurrant, uti saepe a me observatur, partes membranaceae, supra & infra costas spirantes, gravi dolore tensivo, cum febre, tussi sicca & angustia spirandi afficiuntur, eo irritatum praevidet ab acri rheumatico confluxu, non tantum pleuram supra diaphragma, verum etiam peritonaei membranam infra hoc, ut adeo morbus partim pro spuria pleuritide, partim hepatitide haberi possit. Multum enim affinitas hinc ibi morbi alit, dum si utroque dolor saepe ad jugulum & humerum sese extendit, difficultas quoque spirandi adest & tussis sicca, propter consensum non modo diaphragmatis, cui hepar firmius annexum est cum pleura & peritonaeo, sed & nervorum intercostalium, eo excurrunt. Sunt tamen notae non nullae, quibus ambo si affectus possunt distingui. In pleuritide quippe notata tanta veras costas dolor pungitivus & tensivus, cum tussi sicca, febre & doloris sub inspiratione exacerbatione percipitur; in hepatitide autem dolor magis sentitur circa spurias costas, quae ad cordis usque forniculum, cum febre, praecordiorum anxietate & quodvis vomitu atque singultu sese explicat. In hepatitide quoque, locus quam in pleuritide, decubitus in sinistro latere semper est difficilis, quia, ut recte notat *Celsus Aetianum lib. III. c. IV.* ponderis suspensae hepatitis adducuntur dextrae partes, membranae scilicet, & propterea sunt punctiores, ob tractam & tensam membranam, cui jecur annexum est, & quae cum diaphragmate colligatur.

## §. VI.

Neque minus hepatitis merito distinguenda à pleuritide dolore ardenti & fixo circa forniculum cordis versus latus dextrum, cum singultu & vomitu saepe complicato, qui fit à calculo in ductu cystico, aut cholochocho haerente, & propterea causam obinet & aliam sedem, prognosin etiam aliam requirit & medicationem. Facile etiam hepatitis permittitur cum dolore tensivo hypochondriorum, nec non qui est in musculis abdominalibus, de quo jam monuit *Forsio lib. XIX. saepe inposit tumor dextri hypochondrii medico, tanquam sit in eorum affectu, quoniam tamen fit in musculis abdominalibus.* Sed dolor ille dextri lateris, in hypochondriacis & haemorrhoidariis admodum frequens, consistit in flexura coli, sine febre est, discedit citius, saepe reperit, nec symptomatibus febris inflammatoriae, sed malo hypochondriaci solennibus, stipatur, aliam habet causam, medicationem aliam. Est inflammatio musculi-



musculorum abdominis, præsertim transversorum, qui arctissime alligati sunt peritonæo circa hepatis confusis, sensibus magis est obvia & tumor tactui ac visui secl. ostendit, cutis circumjecta sensu comparat, ut digitis atracta minime sequatur, febris sociata minor, nec tussis, nec vomitus adeit, plerumque etiam fit à violentia externa & contusione, ac nisi mature congruis præsidia succurrant, confusæ partes affici, inflammantur, in abscessum, febris lentam & hecticam transit.

## §. VII.

Interim hæc frequens hepatitis non adeo ter-  
rere debet medicum, nec agrotum, eo quod  
si medicatio recte instituitur, non multum alit  
periculi de raro jugulat, nisi viscera interna labe  
sint affecta. Ut plurimum enim morbus intra  
septem, vel undecim dies, finitur largo sudore.  
Natura quippe ipso febrili motu utitur pro  
medicina, cujus beneficio intra certum tempus  
morbus peccans & subsistens attenuatur, resol-  
vitur ac sensim sensimque discutitur. Hæc quæ  
ex inflammationibus convalescunt, hos per febrilem  
motum rite succedentem evadere, censendum  
est. Quo sensu merito accipiendus *Hippocra-  
tis aphorismus* 52. *Secl. VII. quibuscunque he-  
par circumcirca dolet, in febris accedens febris do-  
lorem.* Quando autem spuria hæc hepatis inflam-  
matio, medici, aut agroti culpa, non tempe-  
stive discutitur, sed diutius persistit, dolor perma-  
net, febris accedit, corpus tabescit, vires  
cum appetitu profectumant, os siccatum est, urina  
tenax alba, abscessus facti præbent indicium, qui  
tamen non tam in ipsa interiori hepatis compage,  
quam potius in externis tunicis, ligamentis, pe-  
ritonæo & subjacentibus musculis consistit, globum  
hepatis partem furul afficit & plerumque  
functum facit eventum, testimonio observatio-  
num & sectionum anatomico-præclarum.

## MEDENDI METHODUS.

CUM CAUTELIS ET OBSER-  
VATIONIBUS CLINICIS.

## §. I.

Quum pleuritis & hepatitis multum conveni-  
entius quod causam, originem, symptomata  
& prognosim aliam, ac non nisi loco distrahant;  
hinc modus sanandi hanc parum discrepat ab il-  
lius, quem capite antecedenti exposuimus. Quam-  
admodum vero medicus in quovis morbo sanando  
prudenter semper procedit, si ductum na-  
ture, quo morbus sponte solvi solet, comite ra-  
tione satis sequitur; ita idem hoc in medicatione  
hepatis passiones quam maxime servandum. Jam  
quia hepatis eodem modo ac pleuritæ periculo-  
rem, congruo critico tempore, dimidio nempe  
septimi & septimo ipso die, sponte solvi solet; ei-  
dem viæ merito insistentium, & usurpanda primo  
omnium ea, quæ ad liberiores perspirationes  
conferunt, vitanda vicissim, quæ cuticularis  
excretionis succellum, diarræica sint, sive phar-  
maceutica, ullo modo remorari & impedire pos-  
sunt. Quia autem secundum principem illum præ-  
dictum *Hippocratis* canonem, non cruda, sed  
concocta movere oportet; hinc principio id agen-  
dum, ut serum acre salum, nervoso-musculosis  
partibus valisque minimis impactum, temperetur,  
diluantur ac solvantur, simul atque viæ ad criti-

cam excretionem sunt perparandæ, his maxime,  
quæ fibras rigidas, tenas, ipsius confusis re-  
mittunt ac molliunt.

## §. II.

Igitur omnibus modis commendanda ponas  
diluens, decoctum bordei cum possulis, vel eam  
citratum, serum lactis dulce, cum paulillo ni-  
tri & saccharo, nec non emulsiones ex decocto  
bordei, vel cornu cervi, cum amygdalis, quæ  
liberaliter sumta & temperate & diluunt. Epi-  
dem dein & adhuc diaphoreticæ virtutis sunt in-  
fusa theiformia ex herba veronica, cardui bene-  
dicti, floribus bellidis anque sambuci, crebrius  
sorbillata. Diaphoretin movet simulque tempe-  
rant pulveres, ex annimonio diaphoretico, præ-  
sertim ex regulo parato, lapidibus cancrorum,  
cornu cervi philosophice parato, nitro & cin-  
nabari, cum aqua cardui benedicti, cerasorum  
nigrorum, cinnemomi & florum acaciæ crebrius  
assumendi. Quibus subinde ad auctiorem per-  
spirationem interponendus usus liquoris bezoar-  
dici, vel nostri, vel Bussiani, cum dupla parte  
liquoris nostri anodynî mineralis, vel spiritus ni-  
tri dulcis. Neque negligenda alvina vacuatio,  
sed si signori, clystere emolliente, aut clemena  
soluto promovenda. Exerit quoque tempe-  
rato calido fove evaporato & diffusio subsisten-  
tis humoris secundanda. Quem in firmam conda-  
cunt decocta ex herbis & floribus emollientibus,  
cum croco & lacte, vesicæ bubulæ indra & pari-  
doki adnota, nec non succuli ex speciebus  
resolventibus & discutientibus, herba absinthii,  
cardui benedicti, floribus sambuci, chamomillæ  
vulgaris & Romanæ, bacis jussup, ferine anisi  
& carvi confecti, & in vino, aut aceto vini co-  
cti, ac prævia expressione impulsii.

## §. III.

Abstinentium vero interius ab omnibus opia-  
tis, narcoticis & sopientibus, nec non a sudori-  
feris calidioribus, quæ febrem accendere, vigi-  
lia intendere & delirium fuscitare valent. Exte-  
rius fugiendum regimen nimis calidum. Neque  
oleosa & pinguis illinenda, quæ poros cutis ob-  
struant, neque emplastra sanantia, vel episte-  
mata ex aceto & lithargyrio adhiuenda, quæ  
nimis refrigerant & constringunt, neque etiam  
similia applicanda, quæ fibras rigidiores effi-  
ciunt ac dolores intendunt. Ipse adeo decantatur  
camphoratus & crocatus vini spiritus, cautissime  
adhibendus, ob excitationem nimiam, quam  
paribus artu ac incendia jam detentis, infert.  
Si tamen usurpare placeat, fiat id statim in prin-  
cipio, ante intentum febrilem aestum, vel eo val-  
de remittente, & maxime quidem in naturis so-  
grioribus.

## §. IV.

Præterea ad præscindendum inflammationis  
incrementum admodum utilis & necessaria est  
sanguinis missio inter initia, præsertim in manu  
vel pede lateris affecti instillata. Quamvis au-  
tem sanguinis mittendi, nec non repetenda quan-  
doque venæ sectio, pro ratione plenitudinis va-  
sorum, consuevissent, virium, ætatis corporisque  
habitus, dirigenda de iudicio medici morio re-  
linquenda, ne in excessu, vel defectu peccetur.  
Interim si quis hæmorrhoidarius, præstat venam  
scilicet in pede & si plethora urget, pollea cu-  
biti venam percurrere.

N

§. V.

Fisd. Hoffmanni Oper. Tom. II.

## §. V.

*Symptoma-  
rum hinc  
larium mo-  
dorum.*

Si spasmus in loco affecto tante est vehementiæ, ut etiam ventriculum, duodenum ipsaque biliana vasa in confensum trahat, & præcordiorum anxietas, vomitio, singultus & alvi adstrictio id prodar, & externis, & internis, opem ferre expedit. Tum ego sæpius non sine fructu alvo infundere jussi enemata pure oleosum, parti dolenti & præcordiis admoveere vesicam decocto emolliente plenam, & interius crebrius dare mixturas diaphoreticas & resolventes, quæ aquam cardui benedicti, florum tilie, acacie, chamomillæ vulgaris, disacordium Fracastorii, nitrum & liquorem anodynum mineralen habuerunt. Quod si autem infarctus & obstrictio hepatis, ac oriunda inde ictericia, conspicitur; ego quidem singularia virtutis deprehendi episthema ex herbis cardui benedicti, scordii, absinthii, floribus sambuci, chamomillæ Romanæ & vulgaris, semine levisitici ac cymini, in vino coctis, crebro admoveo. Idem hoc episthema egregium quoque in declinatione morbi ad interceptum abscessum cum suppuratione. Sed ubi in inflammatione, à causa potissimum violenta & externa, suppurationis, vel etiam abscessus indicium præbet materia purulenta, per urinam, aut alvum secedens, cum febre lenta; ea unique adhiberi convenit, quæ ad extinguendum ætatem febrem & suppurationem debite tractandam proficiat, de quibus tamen infra pluribus agemus.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Hæc animi  
ex lapsu in  
abscessum  
adfectum le-  
thalis.*

Vir sexagenarius, militem præfectus, sanguineo-cholericus, in Bacchi & Veneris caltris strene militans, anno albini post gravem ex caballo lapsum, per aliquot hebdomades laboravit ingenti & acuto dolore in dextro hypochondrio, cum febre, spirandi difficultate & alvo adstricta. Curatus tamen fuit, sed dolor remansit obusior & conquisit fere per annum de virum & appetitus languore, nec tamen vini potum, nec venteris exercitium intermisit. Accidit vero ut quum equo gradario veheretur, sensum quandam disrptionis interne perciperet, quo simul & semel pressioris ille dolor cessavit. In urbem delatus me vocare jussit, magnæque querelæ effudit de miro languore, summa spirandi difficultate & præcordiorum constrictione. Ego propius accedens, extrema frigida & frigidum in facie sudorem offendi, pulsum autem arteriarum vix percepi. Suasi igitur, ut ægrum in lectum transferrent calidum, & animæ medicum advocarent, meæ enim medicationi non amplius esse locum. Interim scela vena, sed nil fere effluxit, data analeptica interna & externa, sed frustra, & elapsa decem horis, è vivis discessit. Post mortem venter mirum in modum inermuit, ac in umbilicali regione de post disrupit, effluente sanie putrida & tam foeda, ut tota domus cada-verosa mephitis inficeretur.

## Epirisus.

Quemadmodum pleuritis vera & levior etiam peripneumonia, si ultra viginti diem persistit, facile in empyema, sive abscessum admodum periculosum abit; sic & hepatitis, sive inflammatio musculosarum & membranacearum

partium circa hepatis, si non discutitur, abscessum formare solet, qui ipsam hepatis substantiam la-be inficit atque corrumpit. Testatum id facit casus, quem ego Minde Welfthalorum observavi & jam enumeravi. Quia autem hæc obli-vationem egregie illustrat, similis hanc obli-vationem habet XIX. de hepatis affectu. non alia re erit, si eandem heic iterum. Vir, habet, aures triginta sex annis, dolore hypochondri dextri per integrum fere annum confectus, cui levis accessus febris, tunc confectus & plane consumus est, tota facies virrina & universum corpus flavum exaest, & dolor atrox cum torquetur in dextro hypochondrio, quod durum & valde sustinendum, musculi abdominis plane extenuati erant, urina tenuis & ignea, eris facies, alvus modo adstricta, modo liquida, cibi fastidium, suis inextinguibilia. Incisione facta, materia purulenta fetida emanavit, cum tanto fetore, ut totam domum implebat, ita ut vix quisquam apud ægrum in cubiculo persistere posset. Ager autem paulo post animam efflavit. Cadavere aperto, in tota venteris cavitate reperi-ta est ingens copia puri, peritonæum quoque dis-ruptum & peritidum conspiciebatur, hepatis durum, ingentis magnitudinis, albicans circa som-mactum, sed in gibba sua parte prope costas spurius nigrum, exustum & gangrenæ infectum. In hepate vero nullum conspiciatur pus. Præcipua autem corruptio hepatis erat in parte dextera, versus costas spurias & circa musculos intercostales, qui etiam cum costis spuris nigredinem contraxerant, instar carbonis & facillime frangi poterant.

## OBSERVATIO II.

Vir sanguineo-melancholicus, triginta circiter annos habens, diu jam vitæ sedentariæ addictus, neque cibis boni succi usus, vixit per aliquot annos hæta sanguinis missione, in ingentem per universum corpus languorem incidit, & miram quoque expertus est ad incundiam proclivitatem, ita, ut à levissima causa commoveretur, & protinus superem in lingua perciperet amarum. Post mentem correptus est insigni dolore in crure & hypochondrio dextro, tenuivo partim, partim gravativo, qui atactu fuit exacerbatum. Accessit cibi fastidium, inquietas, somnus infirmus molestus, calor præternaturalis, extrema ab aere frigidissimo mox refrigerabatur, facies color læpica mutabatur, alvus erat quidem fluida, & à pul-veribus, quos nitrum parca docti ingrediebatur, foetida & biliosa multa dimittebat, sed post alvi secessum semper fere dolor acerbior reddebatur, qui etiam sub risu & fortiori inspiratione in-gravescebat, urina crassa, rubicunda, cum sedimento secedens. Misto primis istius diebus ex mediana largietur sanguine, dabatur diaphoretica, diætura bezoardica bis quotidie ad triginta guttas cum infuso veronice, item pulvis bezoar-dicus, cum nitro & camphora mixtus, arcantum quoque duplicatum cum nitro & cinnabari, quo sedes proratæ & anxietates aducltæ. Septimo die accedens, curas, antea siccas & aridas, melle-scere primum coepit, & postea sudor erupit largissimus, per viginti quatuor horas manans, quo omnia symptomata, respiratio difficilis, anxietas, horor & excrementorum refrigeratio discussa, & somnus quoque rediit, ita ut post decimum quartum diem æger lectum relinqueret. Mensis autem Augusto idem malum rediit, non quidem cum

*Hæc animi  
ex lapsu in  
abscessum  
adfectum le-  
thalis.*

tanta symptomatum & doloris atrocitas, sed diuturnum aegrum detinuit, & lentam febrem reliquit, diæta salubri & congruis remediis post aliquod temput etiam abactum, ægro perfectam sanitatem recuperante, & expirante simul illa ad iracundiam promittebatur.

## Epicrisis.

Origo huius morbi merito à crasso & copioso sanguine repetenda, quem vita sedentaria, victus crassus & crebrior potus viscerum dulcium ingenuis, eaque propter multum simul ad infarctum & obstructionem hepatis conuulit. Accessit postea crebrior animi commotio, qua sanguis lentus in minima vascula impulsus, statim ibi conceptis inflammationibus. Id enim curatam meretur observationem, quod qui hepatis vitio laborant, ad iracundiam admodum sunt faciles, nec prius prava hæc dispositio cessat, quam hepatis labe sublata. Videtur autem hæc inflammatio levior tantum fuisse ac in ligamentis, forsan etiam superficie concava hepatis parva, constituisse, ideoque sepius die sudore diutiusa esse largissimo, quod tempus ordinariam cruentam inflammationem esse solet, si diffinitioni adhuc locus est.

## OBSERVATIO III.

Hæmaturia  
fœdore fo-  
luta.

Ante aliquot annos vocabar ad generosum virum in vicina urbe degentem, sanguineo-chorionicum, strichoris habitus & quadragenario jam majorem. Is a quaque diebus letho fuerat affixus, conquisitus de acutissimo lateris dextri sub costis spurs dolore, cum maxima præcordiorum constrictione & anxietate, spiritibus dislocuturæ summe, febre, vigilia & inquietudine. Medici primum in auxilium vocati, morbum oppido periculosum, quin capitalem fore, propinquum & aditandum dixerant. Passant enim hepar ipsum laborare & sibilaculosa tantum corruptione esse infectum, ideoque, præter interna putredinis resistens & analeptica, exterius epithema ex aceto cum lithargyrio cocto, adjecta camphora, apposuerant. Ego vero candidi ipsi edixi, non adeo periculosum esse, ut crederent, morbum, sed partes tantum externas hepatis connexas, non hepar ipsum, pati. Removere hinc pulsi primum epithema & apponere laeri dolenti, vesicam eum decocto emolliente. Interius præbui pulverem supra descriptum, nec non mxturam, pro potu præsanam, item emulsionem ex semine cardui Mariz, melonum, eucurbite & papaveris albi, eum aqua diaphoretica & analeptica, nec non infusum theiforme ex herba veronica, floribus chamomilla, fummaribus milkfolii & semine feniculi. Ufurpatis his, lenis maior in universo corpore obortus, cum symptomatum levamine, undecimo die sudor manavit largus, & alvus quoque, sub dolore stricta & vix clystere soluta, sponte aliquoties deiecit. Atque sic ager ex voto convaleuit, adhuc vivens & optime valens. Dedit autem hic casus mihi occasionem scribendi dissertationem academicam, de hepatis inflammatione vera rarissima, spuria frequentissima, quam epicrisis loquendo legendam commendavi.

## CAPUT VIII.

## De Febre Nephritica.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

ORitur nephritica febris ex renum inflammatione, juncta cum dolore ardente fixo in lumbis, mictu difficili & aliis pathematibus ipsamodici infirmi ventris.

Defectus  
reperitur.

## §. II.

Prout autem inflammatio levior est, vel gravior, sive profundior, differunt etiam symptomata aliisque morbi est eventus. Scilicet quando externa & propria renum tunica, innumeris capillaribus vasis, ex emulgentibus renum vasis procedentibus, perfusa, inflammationem patitur, levior hæc est, superficialis & erysipelatis speciem habet; siquar tamen dolere ardens fixo, acuto, eum pulsu celeri, duro, tunc, mictu ardente, urina tenui, cruda & convenienti medicina, cum regimine kist diaphoretico, citra suppurationem, brevi tempore discutitur.

simples  
non.

## §. III.

Quando vero inflammatio profundior, febris etiam vehementior, dolor in lumbis ardens durior, mictu difficilior, alvus strictior & præcordiorum anxietas atque angustia major, urina cruda alba sedecente. Quid si autem hic dolor ad decimum quartum ulque diem persistit, suppuracere incipit, tumque haud secus ac in aliis inflammationibus in pus mutatus, dolor melior fit & conquiescit, urina autem prodire solet admodum saturata cum crasso sedimento, quo larem ex purulenta materia, parum maco tartareo constatum est. Quin si inflammatio tam profunda & inde oriunda exulceratio tanta est, ut per plures annos duret, & successive totam renam substantiam consumat atque depolcat, tandemque macie & febre hectica ægri moriantur, ac post mortem, renis loco, nil quam sacculus reperitur plenus puro. Quod si pervenit de in cavitatem pelvis delabatur, incredibiles, uti notavimus, facit ante mortem dolores & urinae retentionem, ob vesicam, seu partem nervosam & exquisiti sensus, ab incumbente pure, coeruleam de vehementi ipsius afflictam.

Gravitas  
non præ-  
sentat.

## §. IV.

Deinceps datur febris nephritica brevis & quandoque tantum diaria, quæ cum horore & docti & parium extremarum rigore incipit, postea cum dolore lumborum & dorsi ardente, cardialgia ventriculi & alvi strictione decurrit, & tandem sola diaphoretici & perspiratione aucta, intra XXIV. horas, sepe solvitur, per urinam sabulo crasso sedecente. Frequens hic affectus sanguine plenis, maxime feminis post quinquagesimum annum, & à sola refrigeratione dorsi, præsertim lumborum inducitur. Ibi enim renes acrius minus integumentis & tantum muscularis transversis sunt obrecti, propterea ex facili frigus penetrat & subiacentibus hinc partibus ipsam infert strictionem. Febres igitur hæc magis est à spasma, quam inflammatione, & kisto

Brevitas  
non præ-  
sentat.

facile etiam converso ab interioribus ad exteriora sanguinis motu & perspiratione revocata, iterum dissipatur. Quod vero renes spasticis stricturis patiantur, ex eo facile concludendum, quod plexus nervorum ex pari octavo & intercostali, renalis dictus, ipsam renum substantiam ingreditur, & non modo vasis sanguiferis, sed & ductibus urinariis, tonum, sensum & motum largitur. Ex qua idem hic plexus, per ganglion connectitur cum plexu mesenterico & intestino, cum stomachi quoque nervis; hinc est, quod renibus, magis adhuc ureteribus, dolore & spasmo affectis, stricturae cardialgice etiam in ventriculo & intestinis oboriuntur, flatus in stomachum cum ructuum effusione urgeantur & alvus stringatur, quæ ob inflatum ventriculum diaphragma prematur & spirandi angustia cum anxia præcordiorum constrictione inducatur. Ne dicam tenues, limpidas & aquosas urinas, quæ sub spasmus minguntur, luculenter testari, quod sub illi, qui in renibus liquorem urinosum sequesterant, & ad pelvim ducunt, spasmo, seu motu contractis afficiantur.

## §. V.

*Calculus  
grovius.*

Aliud febris nephritice genus, vehemens & ardentem tantum non mentitur, oritur à calculo: hic quidem, quamdiu in rene quiescit, nihil incommodi affert; ubi vero loco movetur, & transitum per pelvim ac ureteres molitur, spasmos & dolores gravissimos, febrem & supra memorata inducit symptomata, quæ etiam non prius quiescunt, quam in vesicam fuerit delatus. Jungitur autem calculosa hæc nephritis sæpius non modo cum dysuria, sed & non nunquam pericolosa urinae suppressione. Neque etiam prætereundum, non facile calculosum nephritidem gigni, nisi præcesserit nephritis simplex inflammatoria, vel etiam purulenta, in vasculosa & canaliculosa renum substantia, postquam urina extravasata & stagnans, vel puri commixta, sensim dimittit terreas moleculas, & quarum coactum tandem succrescunt calculi.

## §. VI.

*Renis  
phlegmasia.*

Omnis autem nephritica febris & passio, eodem modo ac alia febris incipit cum horrore & frigore, quod maxime ex spina dorsali & primis lumborum vertebrae sumis initium, sub quo sanguinis motus ad interiora ipsumque cor convertitur, eoque à copioso sanguine læssum, systole postea sequitur celerior. Atque adeo facile innoscit ratio, quare renibus & eis, qui ad nephritidem, sive simplicem, sive calculosam, sive spasmodicam, proclives sunt, nihil sit tam inferum, quam frigus hybernus, regnante vento borealis, asperio & rigido, quo improvide admissi, passionis hæc promæ vel inducantur, vel illico recrudescunt. Ad ingenerandas vero nephriticas hæc passiones & febres multa disponunt, tanto magis quando plura simul concurrunt, atque in unum effictum conspirant. Primum inter hæc merito obinet locum plethora, præsertim in corporibus spongiosis & copiosis exilibus vasis dotatis, item in iis, qui evacuationibus sanguinis spontaneis criticis, vel artificialibus affluunt, si illæ suppressæ, vel ob ætatis rationem emanaverint, hæc autem aliquamdiu intermissæ. In his expectanda mali nephritici genesis, quando simul hæreditaria dispositio, vita seditaria, nimia stomachi repletio, cibi flagrantissimi, potus crassius non diluens, aut nimis spirituosus, nec non impensior

animi moeror concurrunt. Tanto magis & citius excluditur, quando plethorica ejusmodi crasso & copioso sanguine facta corpora, vehementi & inconsueto motu, succussante equitatione aut vectura in curru agitantur, vel etiam medicamenta calidiora, urinarum moventia, terebinthinata, juniperina, succinata, vel etiam purgantia aloëtica, liberalius assumuntur, quibus sanguis crassus cum impetu in subtiles et ultimæ renum arteriolas urgeat, ibique subsistens, inflammationem efficit.

## §. VII.

Quod autem finisset ren plus teneatur nephritici passionibus ac dexter, id tribuendum efficitur, cum quod ipse non tam bene testis & à frigore munus est, ac dexter, qui sub hepate desinit, tum quod flexura colicæ proxime adjacet, quæ, uti sæpius, quam alibi fit, à flatibus incarceratis distensa, renem & vascula ipsius sanguifera comprimis, ut difficilior fiat per vasa emulgentia sanguinis circuitus, & ab hoc dependens urinae secretio. Atque hinc etiam est, quod, qui calculi renalis doloribus frequentius obnoxii, insultum eorum illico experiantur, si citius lentos & crassos, aut alia flatus procreantia assumunt.

*Curatio  
cum cautelis  
clanicis.*

# CURATIO CUM CAUTELIS ET OBSERVATIONIBUS CLINICIS.

## §. I.

Quam veteres servarint in curanda nephritide molendi methodum, tradidit Hippocrates de interna affectu p. 217. si, inquit, urina prodit velut à carnibus bubulis affatus succus, ex renibus ulceratis, dolore lumborum & vesica, mox intensiori, & qui simul descendit ad immum ventrem, hæc insinuat curam: multa calida levata, & tes pesantiorum ad dolentem maxime locum adhibere, & fortissime utatur è serena colla, melle assuto, & reliquo victu utatur quem maxime per alvum secedere & vivum bibat albam Mendesium, melici coloris, aut aliud album jucundissimum, probe temperatum. Pro temporis opportunitate serum & lac bibat, serum quidem ad purgationem, lactis autem potum faciat in tempore per XLV. dies. Hæc si ita feceris, morbum in melius dispones. Eundem sere curandi modum proponit Celsus lib. IV. cap. X. oportet, aut, ubi renes male habent, diu, conquisitare, cubare mollior, sibiovere alvum, si aliter non respondet, etiam ducere, sæpe de sistere in aqua calida, neque cibum, necque potum frigidum assumere, abstinere ab omnibus salsis, acris, acido, pomis, liberis, ac bibere. Deinde ad dolorem levandum, immo, si renes exulcerati sunt, semina cucumeris, nucleorum pinearum, crocum cum lacte decoctum commendat.

*Præterea  
methodus  
molendi.*

## §. II.

Hæc veterum curandi ratio ita est comparata, ut nephritico morbo admodum sit accommodata, ac nil sere in eadem desiderari possit, quam omnia eo conspiciant, ut vascula & fibræ tensæ, duræ & à spasmo contractæ relaxentur & molliantur; humores stagnantes crassi diluantur, & obstructions solvantur. Nos etiam hanc methodum deprehendimus probatissimam, in eaque perficienda his potissimum usi sumus auxiliis, sero lactis dulci, vel lacte asinino acidulis Selteranis remix-

*Curatio  
proposita.*

semixto, item perfusa cum lacte confusa & poni data, emulsionibus ex amygdalis amaris, nucleis persicorum, semine cucumeris, cucurbitae cum aquis florum acaciae, ulmariae, cerasorum nigrorum; pulveribus, ex oculis cancrorum, cornu cervi philosophice preparato, lapide manati & nitro compositis, cum supra dictis, vehiculi loco, funtis. Insulam quoque herbae theae, propter blandam suam adfinitionem in omnibus renum affectibus, praeservandi & curandi scopo, egregiae est virtutis, & cui specificum olim maxime semper fuit habitum.

## §. III.

*Levis de  
ne phritide  
medicatio.*

Interim quam variae sint nephriticae hujus febris species & causae, diversi etiam gradus; hinc diversimode etiam adornanda erit cura. Itaque in levis de & diuturnae, ex solo frigore & spasmus, renum dolore, nihil aliud agendum, quam ut faeculis lateribusque calcactis, & dosi, & abdominis regio, & ipsi quoque pedes, probe fovantur externis, interius vero insulum theae, aut theaforme ex floribus chamomillae, fummarum millefolii, semine foeniculi, succellive, sed largiter, corpore simul ad sudorem disposito, bibat & alvus stricta validius expediantur chylis ex lacte, nitro, melle & oleo. Impediat ad dolores multendos & diaphoretici eliciendum spectatae virtutis liquor noster anodynus mineralis, si tres ipsius partes, cum una liquoris bezoardici Bagli parte remiscantur, & baborio quovis viginta guttae cum potu calido porrigantur.

## §. IV.

*In gravi  
ne phritide  
medicatio.*

Quando dolor ardens & fixus in lumbis diutius tenet, & indicium est, vasa renalis sanguine crasso sacra esse alicui obstruata, cito solvenda plethora per venae sectionem in pede, vel in disposito ad haemorrhoidalem fluxum hirudinum appositionem, ad anum. Postea interius danda, quae atum sanguinis temperant, & liberiores humorum circum cum diaphoretici procurant, quo nomine emulsiva, demulcentia, diluentia, antispasmodica, pulveres diaphoretici cum cinabari & nitro, omnibus alii palmam praeripiunt.

## §. V.

*Exulcerat  
ne phritide  
medicatio.*

Ubi vero inflammatio in abscessum transit, ex puris mixto & dysuria cognoscendum, medicatio eo dirigenda, ut pus acre temperetur, abstergetur & etiam fiat consolidatio. Ad hoc perficiendum laudata virtus lactis, vel siri lactis, cum herbis vulnerariis, floribus hyperici, fummarum millefolii, herbae veronicae, scabiolae, hederatae terrestri, consolida Saracenicae & fanticulae decocti. Tum quoque utiles emulsionibus ex seminibus quatuor frigidis & amygdalis, quibus adjuvandi sufficiunt quantitas seminis lycopodii, cujus magna vis est dolore leniens, exsicicans & consolidans. Sunt etiam qui in renum viis multum tribuunt gummi cerasorum in aqua, vel sero lactis soluto & crebrius assumo. In illo etiam renum cum exulceratione visio, quod plerumque in iis, qui diutius calculo laborarunt praesto est, ab omnibus acerbis, calidis, spiritibus, diureticis & lithontripicis est cavendum, quia novam facile inflammationem, vel etiam nucleum cruentum, excitare possunt. Praeflavissimum vero tum usum mei Prussicum album, praesertim cum pulvere muscae remixtum & loco sacchari in decocto veronicae sumum, vel etiam syrupus de dialthea Fernelii, qui certe, cui specificum, in renum labe

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. 11.*

merito commendari dignus. Praeterea malvaicum juniperinum, quod ex vino Malvasico & rob juniperi paratur, in antiquis renum ulceribus, à renibus praesertim, ad aliquot cochleas, post cibum, sumitur cum fructu.

## §. VI.

In nephritide tam inflammatoria, quam calculosa, primum & princeps auxilium in chylis demulcentibus ano insulis, qui sine stimulo salino & purgante parandi, ex lacte, sero lactis, vel pura aqua dulci cum floribus sambuci & chamomillae decocta, adjectis binis vel una tantum uncia syrupi de althea Fernelii & drachma una nitri. Diutius enim enemata debent retineri, quo spasmus laxetur & flatus sic exitum parent.

## §. VII.

Quam magna sit consensio & communicatio inter renes, colon intestinum ipsumque ventericolum; adeo ut unus vitium facile transeat & communicetur cum altero, atque etiam inflatio coli, circumflexae potissimum ipsius partis circa sinistram renem, comprimendo hunc, non modo ad ipsius morbes disponat, sed & eos promit atque exacerbet, hinc tam ad praeservandum, quam mitigandum quod in renibus consistit vitium, operam dare oportet medicum, ut omnia ex iis, quae flatus ciunt, & alvum stringente facultate polent, evitentur, contra quae eam lubricam servent, uti oleum amygdalarum dulcium, flatus etiam discutendis dicata sunt, usurpentur, è quibus instar omnium est semen cymisi cum saccharo obductum & frequentius dephlegum.

## §. VIII.

Ad extenuatum usum quod attinet, si ipsa febris cum dolore acuto adest, non facile ego suaserim linimenta pingua, neque etiam applicationem spiritus vini camphorati, multo minus balneum, sed sicut temperate calidos, cum vesica semirepleta decocto florum emollientium cum croco ex lacte, longe erit utilis. Si autem febris abest, & labe exulcerationis postea metuenda, vici emplastrum spermatis ranarum, sumendo uncias ipsius duas, addendo sacchari summi, camphorae ana drachmam, olei hyoscyami drachmas duas, dolorem mitigando, eximie profuisse.

## §. IX.

Uter aquarum mineralium usus in omnibus fere renum vitis operi spondeat exitum, sed tamen quam magna sit in hisce ingredientium diversitas, non omnes promiscue in usum trahere convenit, sed uniusque lectus habendus. Carolinae thermae, si in renibus ulcus, propter sal calcarium purgans & diureticum, quo pollet, minus quadant, quia nimium abstergendae, cavitatem faciunt majorem. Provide quoque & cause agendum cum acidulis efficacioribus Pyrmontanis & Egratais. Emfentes vero thermae aquae & ex acidulis Seletanae, propter sal tenerum alcali & subtilitatem aquarum, magis conducunt. Semper tamen tumor est & acidularum & thermarum usus, si cum dimidia parte lactis mixtae, usurpentur. Inprimis praestat ad abstergendas exulceratas renum partes, Seletanum, primum per quatuordecim dies solum, postea adhuc per mentem lacti nuptam caprillo, potare & traumatica, decoctum, sive effusum, interponere.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Nephritis  
enlithica  
sanata.

Serenissima princeps, sexagenaria ferme, mol-  
loris & sanguinea tectura, per aliquot annos  
nil nisi vinum, ac interdum aquam spirituosam,  
carminativam, quam vocant Aquavit, bibens,  
subinde tamen copiose infusum thee potans, ante  
aliquot annos, post præcedentem corporis exas-  
perationem per motum, incidit primum in dolo-  
rem dorsi & hypochondrii sinistri, cum horrida  
refrigeratione, febre, anxietate, inquietudine,  
stricture alvi, dolore in sinistro rene, fixo, sub-  
inde tamen de vehementer remittente, sed ver-  
sus noctem semper exacerbatus, sub quo urinae  
tenuis & albae secesserunt. Perleverant hæc  
symptomata usque ad undecimum diem, quo  
tandem minor dolor redditus & urina postea val-  
de turbida cum crasso multo sedimento & bruni  
coloris emissâ. Medicus discipline mee alimen-  
tus, non desistit per morbi decursum idoneis re-  
medis succurrere, & postissimum emulsiones de-  
mulcentes & refrigerantes, pulveres temperate  
diaphoreticos & nitrosos, nec non oleum amygdala-  
rum dulcium interne, & externe fomenta ex  
emollientibus & unguenta ex oleo amygdalarum  
dulcium cum camphora in usum vocavit. Ad  
impediendum quoque ulcerationis incrementum  
& consolidationem promovendam, fuisse postea  
infusa herbarum vulnerariarum, ut alchy mille,  
veronica, summitatum millefolii, florum hyperici,  
cum lacte per mensem & longius potanda,  
ac vere demum consilium dedit, ut acidulas Sel-  
teranas, per sex hebdomades, sub debito regimine  
biberet. Quibus per Dei gratiam perfecte  
convaleuit Serenissima agra, & etiamnum in ex-  
optata vivit incolumitate.

## Epiçrifu.

Hæc inflammatio sine dubio ab obstructione  
ratorum minimorum in renibus fuit suborta,  
quæ in plethoricis, sicut omnes inflammationes,  
quam facile fieri potest, quando sanguis per mo-  
tum, aut calidiora, in extremitatibus arteriarum,  
qui lympham vel succum nutritium vehunt, ur-  
genat & accedit lumborum refrigeratio. Non fa-  
cile autem talis inflammatio, præsertim si paulo  
profundior, discutitur, sed in suppurationem  
abit, id quod certum requirit tempus. Deinde  
etiam illud in usum prædictum hinc descendum,  
quod cito suppurationi factæ succurrendum sit  
blandioribus vulnerariis, ne scirrhusum quid,  
quod longiorem suppurationem sequitur, gignat-  
ur & ulcus postea fuit insanabile.

## OBSERVATIO II.

Nephritis  
calculosa.

Vir sanguineus, forma venustus, venericus  
vero & vini potator, natus è familia nephridia  
obnoxia, vigesimo octavo ætatis suæ anno, febre  
admodum ardente, cum vehementi dolore in re-  
gione lumbari lateris sinistri affectus est; adfue-  
runt simul cruciatus duri in regimine, alvus ad-  
stricta, ructus crebri, minguendi difficultas & uri-  
nae exit paucus, album deponens sedimentum.  
Medicus consultus febreem ardentem & colicam  
convulsivam esse putavit, ideoque venam secare  
iussit & chylitres applicare. Ego vero in auxi-  
lium vocatus, quam aeger de dolore incitatus pati

circa renum sinistram infixi & spasmotica cruris  
sinistri contractione concurreteretur, quæsi, tum  
olim laboravit calculo? respondit: non, sed ex fa-  
milia eorum esse, qui calculi cruciatis obno-  
xii. Dixi igitur, nephridiæ esse calculosam,  
cum intestinorum doloribus, & exhibui emul-  
sionem ex nucleis persicorum, cerasurum, cu-  
cuburæ, missi solis, papaveris albi, cum aqua  
graminis, perlarum matre, nitro & syrupo pa-  
paveris albi adjecto. Exterius loco dolenti admo-  
vere iussi vesicam oleo liliorum alborum & cha-  
momille cocto plenam, & ternis singulis horis  
injicere chylina ex sero lactis, oleo amygdala-  
rum dulcium, syrupo dialthæa. *Fervetis* & ni-  
tro. His alvus soluta, ructus molestissimum inter-  
cepti & ventris tormina non nihil sedata, sed cal-  
culus gravissimus doloribus descendit in ureth-  
ras, ad quas tantisper componendos & spasticam  
erispanam in urethris remittendam dedi li-  
quorem meum anodynum mineralem cum ali-  
quot guttis laudani opiatii liquidi, quibus in ve-  
sicam dimissus & inde etiam ad urethram de-  
clatus calculus, ob magnitudinem ibi obherescens  
ac instrumenti ope extendendus, sub qua opera-  
tione meatus urinaris læsus quodammodo, ut  
dein, ob cicatricem hunc angustantem, per om-  
nem vitam mælio facta fuerit difficilior. Ad præ-  
servationem igitur postea fusi primum potum  
infusi millefolii, dein acidulas Selteranas cum  
vino & usum crebriorem pulveris ex magne-  
sia & nitro. Et jam per aliquot annos calculi  
doloribus vitæ immuni.

## Epiçrifu.

I. Quoniam doloribus ex calculo non modo  
febris valde ardens, sed & dolores inclinorum,  
cum firma alvi obstructione, vomitibus & ructi-  
bus junctus; hinc in nullo morbo diagnosi  
tam fallax, quam in hoc, præsertim si ægri an-  
tea nunquam infalum ipsius experti. Novi cal-  
culosam passionem pro ardente febre, pro illica  
passione, pro colica convulsiva, hæmorrhoidali,  
vel flatulenta, fuisse habitam, donec calculi pro-  
ventus errorem argueret. Interim licet minus ex-  
quisite cognoscatur causa, in remediis tamen pro-  
piandis ea propter non multum errabit artifex,  
quam in omnibus his, non alia possint usurpari,  
quam demulcentia, sedativa, filras rigidas la-  
xantia & spasmos remittentia. Quo magis pa-  
tet, eandem methodum eademque remedia, plu-  
ribus morbis sanandis esse posse accommodata.

II. Febris vehemens inflammatoria ex cal-  
culo sine subsequente inflammatione esse potest: sed  
causa febris tum potius spasmus, quam obstruc-  
tio valculorum ab incarcerato sanguine; ipsa-  
mus enim facilius solvitur, quam obstructio dis-  
cutitur.

III. Ad arcendam calculosam nephridiæ ni-  
hil utilius infuso vulnerario, antispasmodica si-  
mul virtus, cujus generis est ex millefolio. Sel-  
terana dein pota aqua abstergit mucum viscidum,  
& prima calculi rudimenta colligat sensim ac  
evellit. Alvus autem laxa, ne ex inclinibus reni  
male afficiatur, prohibet, licet eadem nevicioum  
movenda sit pilulis, præsertim quæ aloem habent,  
quibus in sanguine, præter dolorem calculosum,  
& colicæ, & hæmorrhoidalis, fuscianus potest.

## OBSERVATIO III.

Fœmina quadraginta circiter annorum, san-  
guinea

males  
Data sunt  
ha.

guine & fuccis plena, facie florida, venae sectioni antea afflicta fuerat, quam à biennio vero omiserat, & tamen sedentariis coluerat vitam, plene ac vinoſe diutè indulſerat, neque ſufficientem uſeri purgationem habuerat. Hac corripiebatur fixo in regione ſiniſtra lumbari dolore, qui per aliquot dies cum virium proſtratione, nauſea & alui adſtrictione inſiſtebat. Ad hunc leniendum medicus praebebat pulveres ex animonio diaphoretico, lapidibus cancrum & opiato ſic dicto laudano, ita ut doſis laudani haberet granum, & oſque obinebat, ut dolor redderetur obuſor, alvus vero magis obſtriceretur, urina ſupprimeretur, ſpiritus aërius mearet, viſciſſa eſſet aſſidua, & praecordia impenſus angerebant. Nihil tamen ſecius inſiſtebat papaveracorum uſui & emulſionem non modo cum larga ſeminiſ papaveris quantitate, ſed & pilulas ex diureſis & opio praebebat. Licet autem his dolorem abigere & ſomnum inducere niteatur, necurum tamen obinebat, ſed ſymptomata potius cum ſtatione difficultate ingraveſcebant, abdomen durum reddebatur ac tenſum, & accedebat quoque febris. Alui igitur in conſilium vocabatur medicus, qui ad alvum expediendam & reſpirationem faciendam, exhibebat decoctum ex dulcibus, emulſionibus, ſolis ſemine ſine ſiſipubus atque rhabarbaro, cui ad ſum extinguerandam non nihil ſpiritus vini inſillatim. Sed omnia fruſtra. Aegra enim concipiebatur horrore frequentius cum interiorum ardore, tubaquebant ſyncopen cum levi delirio, cumque medicus ſub his cauetum ex tribus tantis emerci graus daret, operatio nulla ſequatur, & duabus ab eo aſſumpto horis, agra exſpiravit.

#### Epiſiſu.

Imprudentiſſimæ medicationis hoc eſt exemplum, qua morbus benignus, in caputalem plane converſus. Expenſis enim probe circumſpectis, facile adiciendum, malum hoc à nimia ſanguinis redundantia in ſemina alia vegeta, ejuſdemque ſtagnatione in valis majoribus circa lumbos, neſtandem faciente, orum tranſiſſe, omnemque damnum temporeſſiva liberali ſanguinis miſione & alvi aperture per chlyſtes, manare poſſiſſe praſtanti.

#### OBSERVATIO IV.

Nephritica  
febris ex  
calculo.

Vir quadragenarius, chokrico-ſanguineus, multorum ſtictorum paſſus, ac ob mercaturæ negotia, multum in iuſticiis verſatus, poſtquam autumnalem ſanguinis miſſionem poſto diutius diſtuliſſet, & noviffime curru noctu & invidiu vectus, ſporis & fluctuationem & refrigerationem fuſſet paſſus, domum dilata velleſſet conceptus eſt horrore, quem exceperit aſtus & dolor acutiſſimus in ſiniſtro latere ſupra iſchi os, prope dorſi ſpina, cum alvi adſtrictione, inquietudine, ſui, praecordiorum ſtrictura & ruſtuum cluſione, urina non quidem diſſiculis, ſed aſta & tenui ſuccedane. Medicus ordinarius ſuiſ chlyſterum oleoſorum uſum & potum olei amygdalarum dulcium cum juſculis. Delinſa inde tanſiſper dolorum atrocita, mane ob alvum ſuſtictorem ac ſponte nec ſtans, nec ſtercora diſſimentem, tormina quoque & miumura in abdomine, pilulas purgantes cum croco deglutire poſſus, quibus non ſine praegreſſis cruciatibus alvus quidem ſoluta, dolor autem fixus circa re-

nem ſiniſtrum exacerbatus, inquietudo cum calore adaucta, aeger aſſumpta illico revomuit corporuſque admodum jeſtigavit, alio ſimul denſo acutiſſime clauſa. Ego in auxilium vocatus, ex dolore fixo in renis regione & ſubinde ad ſenſus uſque excurrente cum aliquali huius rigore, nephriticam febrem eſſe conſeci, ac propterea primo nimium ſanguinem & vena brachii mittere, dein alvo chlyſterem paregoricum domeliſcum cum nitro injicere & internis liquorem meum anodynum minerali, alternatim cum pulvere temperante ſalino-nitroſo praeſtere juſſi, dato ſimul pro poti decocto avenaceo, non nunquam cum oleo amygdalarum dulcium, non nunquam brodium carnis cum citri ſucco. His aſſus reſtitutus, vomitus compoſitus, dolor quoque conſuevit, per intervalla tamen, veſperi praecipue, recurrere. Hinc locum dolentem unguento diſtillato, populeonis, cum oleo juniperi ſubinde fovere ac bis quotidie liquorem ſalino-alkalinum ac nitroſum ſuſſere juſſi, quibus etiam effectum, ut poſt ſextimum diem alvus ſponte ſolveretur, cum antea arida madefecere, pulſus molleſcere, urina, ſub dolore pellucida, cralla nunc ſecederet ac ſedimentum poſceret, ipſique dolor penitus evaneſceret. Licet autem tunc nec ſibulum, nec calculus prodiret, nephriticam tamen nocturnam fuiſſe potius poſtea luculentius. Quam eam aeger ad vernalem ſanguinis miſſionem ſiſe accingeſſet, & ob id alui prius purgandi cauſa decoctum mannaeum cum cremore de terra ſolata ſarari uſurparet, inde non modo efficaciſſime alvus eſt ſubducta, ſed & poſt toleratos veſperi leuiores in lumbari regione verſus pubem excurrentes dolores, mane cum urinum mitteret ex improviſo ſimul etiam excrevit calculum oblongum, figurae pyramidalis ſere, diametri lentis, baſi durum, ſuperius autem friabilem atque poroſum.

#### Epiſiſu.

Calculus in renem ſubſtantia occultum, paulo majorem & duriorum, febrem inflammatoriam cum acerbis doloribus & ſpaciſſis ſymptomatibus, excitare poſſe, hæc docet hiſtoria. Neque tamen id ſit, quod irritando vel diſtendendo partes nervoſas paſſus ſit, ſed quia comprimendo canaliculoſam renem ſubſtantiam, obſtaculum poſitæ liberiori ſanguinis per eorum compagem progreſſui, & quando iam ſanguis abundans cum vehementia per motum ſuccuſſatorium vehementer in curru aut equo, impetuoſe ad renes pellitur, nec tamen per venas omnes æque expedire iterum reducitur, gignitur demum inflammatio. Illa enim dorſi ſub vectura aut equitatione ſuccuſſario, ſanguinem omnino impetuofius agit ad renes; unde novi, feminas curru vectas ad crebriorem urinae urgeri miſſionem. Novi etiam validiores hoc motu calculum in renibus quieſcentem, eſſe loco truſum & in urethres cum dolore tranſilantem. In cura autem ſic excluſe nephriticae febris, optimam & praefentiſſimum auxilium à ſanguinis ſubtractione, cuius tamen quantitas merito medici iudicio relinquenda. Neque etiam ego melius novi in plethoricis renum paſſionibus obnoxiis praſervativum, quam venae ſectionem temporeſſive & cum iudicio inſtitutam. Acque hinc petenda eſt ratio, quod notante dudum Hippocrate, ab inflammatoris ejusmodi febribus, nephriticis, peripneumoniacis & phreneticis, liberi maneant, quibus hæmorrhoides recte fluant.

## OBSERVATIO V.

*Nephritis  
cum hæ-  
morrhoidi-  
bus  
et hæ-  
morrhoidi-  
bus  
et hæ-  
morrhoidi-  
bus*

Illustrissimus Comes, quadraginta circiter annos habens, optimæ & sanguineæ constitutionis, his quædam hæmorrhoidum, parviori tamen fluxui obnoxius, in intestinum dorsi & abdominis incidit dolorem, ut erectus stare non posset, sed corpus semper incurvare necessum haberet: aderat simul creber ad mingendum stimulus, & urina secedebat parvior. Medicus huc usque ordinarius ansam hujus doloris esse voluit sanguinem per æri venas eximam molientem, & in tunica intestinalibus stagnantem, eaque propter venam in pede aliquoties secari iussit, pulverem anisipalmodicum exhibuit, & ad proricandum hæmorrhoidum stillicidium, crebriorem pilularum ad exemplum Becherianum paratarum usum fualit. Sed inde nihil accessit levaminis, dolores non modo remanserunt, sed & periodice sæpe cum extremorum frigore & subsequente totius corporis aestu, præsertim in regione lumbari, recurrebant. Adit igitur Carolinus thermas, ibique me in consilium accivit. Quæcumque ex sedimentis urinae mucosa & quodammodo tartareo conspicerem, illustrissimum ægrum non esse liberum à calculo, ut temperatas tantum thermas aquas biberet consilium dedi. Poris his optime habuit, & quod mirandum, post potum plures numero, magnitudinis variæ, lapillos subcinericios leves, cum urina excrevit, ut numerus eorum intra aliquot hebdomadas, vel ad quadringentos accederet. Postea successively pauciores secesserunt ac quadriduo ante finem curæ nullus amplius prodit. Interim licet sub hoc potu dolores essent minissimi, in inerte tamen recruduerunt acerbiores, nec per annum postea penitus discesserunt, donec ultarij insula herbarum vulneraria, liquore anodyno minerali & ad roboranda sub doloribus afflicta membra, Trophicis thermis, liberaretur tam à dorsi, quam renum calculosis passionibus.

## Epiurij.

Sanguineæ & forma venulæ personæ, si corpus jam omne nactum augmentum, ex facili patenti incernis partium inflammationibus, nec non sanguinis evacuationibus, præsertim per sedas venas. Quæ sanguinis excretio, si deficit, haud raro renum inflammatio & calculosa dispositio excipit. Hinc perire Hippocrates Sect. II. ap. XI. scribit: *nephritis si hæmorrhoides fluxus essent.* In nostro illustrissimo ægro & hæmorrhoidalis intestinorum, & calculi renum dolor fuit conspectus, quod haud infrequens est. Thermarum autem Carolinarum æa virtus est aque efficacia, ut renes valide expurgent à sabulosis & tartareis foridibus. Sed causus sit earum usus, si magna in renibus exulceratio, ne irritando eandem augeant majoremque faciant cavitationem. Optimo consilio in nostro ægro post thermas aquæ potum in usum vocata decocta & insula vulneraria, cum pulveribus nitrosâ & liquore anodyno minerali. Renes enim male affecti ad consolationem optime ferunt lenem adstrictionem. Unde ab auctoribus omnes feræ herbe vulnerariæ, in morbis ex renum vitio, quam maxime celebrantur.

Plures notant dignæ observationes legantur in *Co. diss. med. Tom. II. LXXXIII. LXXXIV. item LXXXIX.*

## CAPUT IX.

## De Inflammatione Vesicæ.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Vesicæ compages, ex quatuor tunici, una à peritonæo, altera musculari, tertia nervosa, cui quarta mucosa seu villosa obducta, si spasmo & inflammatione afficitur, haud secus ac si ventriculi ejusdem texturæ corpus, aut aliæ nervosæ partes eandem patiuntur, & multis & gravibus supatur symptomatibus, licet auctores medici recentiores pacam & viæ ullam hujus passionis inciant mentionem. Pathognomonica autem & essentialia ipsius signa sunt hæc: dolor acutus, ardens & pressorius in regione pubis, cum febre, perpetuo tenefino sive desidendi stimulo, & continuo ad mingendum conatu.

## §. II.

Inflammationis hujus proxima causa sanguinis vel etiam feri impuri in extremitatibus arteriolarum flasis est, qua sanguis per vesicæ rancas discurrentia vasa, à sanguine copiosius congesto nimium replentur, dilenduntur & nervosa exquisitissime sensationis tunica, in vehementem spasmodum abeipitur, ex quo reliquorum symptomatum origo.

## §. III.

Nimirum gravis illa pathemata, quæ inflammationi vesicæ juncta, dolor ardens pressorius, aut constrictio, tenefinus, difficilis & continuus urgens mictus, borborygmi, venis tormina, summa præcordiorum anxietas, ægra spiratio, inappetentia, mala digestio, vomitus, extremorum frigus, pulsus durus, inæqualis, contractus, celer, inquietudo, quandoque etiam convulsio, unice pendunt à spasmo in vesica, qui, si vehementior, ob nervorum communionem, non modo rectum, sed & reliqua intestina, ventriculum & diaphragma, immo ipsas cerebri & spinalis medullæ membranas, cum universo nervosarum partium systemate, in similes spasmodicos & constrictorios moeus abripit. Quam ionia enim stomacho cum vesica intercedat consensio, notavit jam Celsus lib. VII. cap. XXII. ita habens: *non igitur æque, ut vesica ulcere, sapæ affici stomachum, cui cum vesica quoddam consortium est, ex quo fit, ut neque retineatur cibis, neque, si quis contentus est, concoquantur, non corpus alatur.*

## §. IV.

Non tamen semper unius ejusdemque est vehementia, sed quandoque levior, quandoque gravior. Levior illa superficialis magni est, spuria quasi & rheumaticæ, vel erysipelacæ speciei, ac propterea brevi etiam & facilius ipsa febris per diaphoresin tollitur. Oritur etiam non tam à sanguine, sed potius à sero fallo, acri, impuro inter vascula & fibrillas nervas herente. Hinc familiaria quam maxime senibus, scorbuticis, arthriticis, rheumaticis, hemorranicis, purpura scorbutica laborantibus atque cachecticis, cum maxime, quando refrigeratione inferiorum à rigi-



à rigido & boreali aëris statu, perspiratio intercipitur, ac inoffensus sanguinis & humorum per minutos tubulos circulus fibratur. Quae autem gravior, profundior est, à crasso & impuro sanguine in vesicæ vasibus uberius collecto provenit, plethorico-cacochymico hinc frequentius infestatur, atrociora habet symptomata & perquam facile in suppurationem, exulcerationem vel sphacelum funelsum plane transit.

## §. V.

Quia à  
suppressione  
sanguinis  
cruciatum  
morbus.

Ex iis quæ ad ingenerandam vesicæ inflammationem conferunt, sunt maxime criticæ sanguinis evacuationes, per menses, vel hæmorrhoidales deficientes, vel plane suppressæ. Magna enim confensio vesicæ & intestini recti, alterutra parte male & spasmo vel inflammatione affecta, propter hæmorrhoidalia tam interna, quam potissimum externa vasa, è quibus, notante Vesilio lib. III. cap. IX. de fabrica C. H. pag. 475. rami, hypogastricæ propagines, ad vesicæ cervicem abeunt, unde etiam suppuratione & exulceratione ex ruptis sanguiferis vasis in cervicis ut plurimum observatur magna. Inprimis in feminis, si, uti haud infrequens, & mensium & hæmorrhoidium fluxum experiuntur, ac ille cessat, nec hic recte succedit, sanguis imperatoque ruit ad vesicæ vasa & gravia symptomata, febrem, ulcerationem, purulentam functionem, quandoque cruentam, dysuriam & alia plura incommoda adducit.

## §. VI.

Nonnulli  
quæritur  
male tra-  
dita.

Deinceps non raro inflammationem vesicæ infert gonorrhœa, præsertim virulenta, male per adstringentia, vel etiam nimis calida & acris pellem trahens. Antenna enim observatione constat, gonorrhœam sæpius recurrentem & per-versa medicatione exceptam, abire in proflutam, vesicularum seminalium & ipsius vesicæ ulcera. Proflatae quippe glandulæ, quæ ut plurimum gonorrhœæ sedes, quando tumore, dolore, inflammatione & suppuratione afficiuntur, facile labem communicant vesicæ collo proxime adjacenti, ut virus latius serpat. Tum vero præter fluxum feminis ex utero involuntarium, urina mingitur, quæ crassum, copiosum, muciliginosum purulentum sedimentum ad fundum dimittit, quod ab urina separatim & exsiccatum flammæ si incipiat, ætorem ferocem, non secus ac sanguis combustus, spargit.

## §. VII.

Procurat  
morbus.

De successu & eventu morbi veritati & experientie omnino congruum Hippocrati effatum de prænot. pag. 464. sic habens: *vesica diu & dolente prius quædam horrenda sunt & perniciosa; perniciosa vero, quæ cum febre coniuncta sunt.* Et: *nim dolores ab ipsi vesicæ ad occidendum sufficiunt, & acri non egerunt hoc tempore, nisi diu quidam & hoc coacti.* Solvit autem urina multa purulenta, quæ albam ac levem subsidentiam habet. Si vero neque ab urina quicquam remiserit dolor, neque vesica mellior & febris continua fuerit, in primis circuibilibus morbi, ægrum moriturum esse timor est. Quando autem inflammatio non tempelive discutitur, lentius aut citius necat. Qui cito, ex sphacelo pereunt, ac uti testantur observationes anatomico-practice, vesica sphacelo affecta, vel vasa ipsius sanguifera varicosa, & nigro cruore farta reperiuntur. Tardius autem mori excipit, quan-

do exulceratio succedit, ex mielu purulento cognoscenda, quæ tandem vel hælico calore necat, vel latius serpens intestinum rectum etiam exedit, ac gangrenam inducit funelsum.

## §. VIII.

Interim non omnis urina turbida & sub mictu difficilis & ardore excreta, inflammatur, aut exulceratur vesicæ est indicium. Id enim haud raro obvium in senibus, scorbuticis & qui dyscrasia humorum laborant, & accidit sine periculo. Quandoque etiam siccæ vesicæ spasmi, ab urina acri, calculo asperiori, aut collectione feri impuri in vasis vesicalibus, inducunt, insignem muci quantitatem ex violata tunica exprimit ac urinæ infusum. Neque minus vesicæ spasmi & dyscrasia sæpe comitantur febrem, quæ plerumque est scorbutica & exanthematica, cum purpura, vel maculis scorbuticis insitit petechiarum, nec periculo vacat. Quin aliquoties in purpura scorbutica affectis observavi, quod impedita materie purpuracæ per improvidam refrigerationem excretionem, vel hac retropulsa, eadem pathemata, spasmi nempe vesicæ ac difficilis mictus, accesserint, nullam aliam ob causam, quam quod confusis à frigore tubulis subcutaneis, mora sanguinis & humorum ab exterioribus ad interiora conversus, simulque recrudescencia de acta illa materia nervosæ vesicæ illapsa.

## CURATIO.

## §. I.

Nulli morbi difficilior curantur, quam qui in vesica consistunt: est enim nervosa & exquisiti sensus pars, secundum veterem loquendi morem frigida, & paucò sanguine perfusa, ac urina perpetuo superne afflatus consolidationem impedit, præsertim in senibus. Quare vesicæ vicia, uti spasmi, inflammatio, exulceratio, difficilis & dolorosus mictus, facilius arceantur, quam persanantur. Interim quia spasmi vesicæ primam fere causam omnibus quæ ipsam infestant passionibus subministrant, præcipua utique medentia intentio, ut eundem tempelive pericindat, & modis declinet cunctis. Sed quum hic spasmi vesicalibus tunica vel à sanguine uberius ibi congesto, tendente ac premente, vel ab acri impuro sero eo decumbente, inducatur, causæ hæc probe sunt discernendæ in medicatione. Quod si signis post suppressum mensium vel hæmorrhoidium fluxum, tale vitium insinuet, optimum consilium, ut excretionem hæc vel revocetur, vel sanguis copiose congestus per venæ, præsertim in pede, sectionem, detineatur, quod auxilii genus, ut inprimis, quibus anni, aut uetres viciæ stillare amplius jam cessarunt, proficuum est. Ex hoc in casu verum omnino Hippocrati aph. XLVIII. Sect. VII. dictum: *urinae difficultatem & stillicidium solvere venæ sectionem.*

## §. II.

Quando scorbuticis & iis, quæ rheumatismis, arthritide & purpura chronica laborant, ulcera antiqua consolidata sunt, aut materia quedam exanthematica retropulsa, senibus quoque ob dyscrasiam sanguinis & humorum impuram, vesicæ passiones immincent, cito remediis diluentibus, acrimoniam temperantibus, blandis diaphoreticis sanguinemque depurantibus est succutendum. Hunc in finem utilis decocta pro potu ordi-

trina mor-  
bida &  
dysuria  
non semper  
ab inflama-  
tione vesti-  
ta.

Spasmi  
vesicæ ex  
sanguine.

Ab humore  
acri quibus  
arceantur.

ordinaria temperantia, ex radice scorzonerae, chinæ, silere, feniculi, item infusa theiformia ex summitatibus millefolii, floribus malvæ, bacis alkekengi & semine dauci parata, cum dimidia parte lactis mixta & syrupo è dialthiza. *Ferni* dulcificata. Neque minus spectata teri lactis dulcis virtus. Quibus si accedit ulus emulsionis ex feminibus quatuor frigidis, & pulverum temperantium ex pulvere Marchionis, antimonio diaphoretico, lapidibus cancrorum, manne perlarum, cum nitri tantillo & aliquot guttis olei macis, effectus est exoptatus. Quia tamen puritas humorum multum etiam debita purgamentorum alvi excretionem conservatur, videndum utque, ut hac præstetur libera, optime alimentis, fin vero minus responderet, mannæ, cum vel sine rhubarbaro, addito nitro antimonio, aut clysteribus emollientibus ducenda.

## §. III.

*In inflam-*  
*matione &*  
*spasmo pro-*  
*flato.*

Ubi vero inflammatio cum spasmo jam prælo est, præter jam dicta, commendatissimus est usus liquoris anodynæ mineralis, ad drachmam unam, remitti cum granis quinque extracti croci & granis duobus camphoræ. Tum etiam pulveres diaphoretici ac temperantes, aucta nitri dosi, cum emulsionibus ex feminibus quatuor frigidis sunt porrigendi. Et exteriori partem afflicta antispasmodicis & leniter discutientibus fovere expedire. Nobis hunc in finem usitata vesica decocto florum emollientium plena, vel loco hujus emplastrum ex emplastro de melliloto uncia, spermatis ceti drachmis tribus, croci, camphoræ ana drachena, nec non oleum anodynum camphoræ, ex olei amygdalarum dulcium uncia, hyoscyami drachmis tribus & camphoræ drachma, pubis & perinei regioni crebrius illitur. Ubi etiam squisus solus tenesmus molestus, vel difficilis, dolorosam mictionem efficit, præter balnea aquæ dulcis, omnia alia auxilia virtute superant vapores ex decocto florum melliloti, sambuci, chamomillæ officinalis, malvæ, summitatum millefolii cum lacte, in perforata scilla ad laborantes partes admitti.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ

## §. I.

*Mineralis*  
*aqua mi-*  
*lissima.*

In vesicæ vitio inveteratis, quæ cachecticis, hypochondriacis, scorbuticis, senibus & hemorrhoidariis, nunquam non sunt frequentia, ad incrementum eorum præcavendum, per longum usum efficacius deprehendi nihil, quam peritum aquarum mineralium usum. Celebres jam pridem hoc nomine Spadaneæ aquæ, de quibus sic dicitur verbis scribit *Henricus ab Heer in Spadaneæ hæ sunt Spadani, propria ac singulari facultate, ut vesicæ renunquæ dolores sopiat ac leniat, morbos vero harum partium persanet, venarum debilem roboret, & ciborum languorem appetentiam excuset.* Quin idem gravis auctor suadet, ut, si renum & vesicæ vitio afflicti liberi ab im vivere velint, per totum annum hanc medicatam aquam bibant. Neque minus *Tulpus lib. II. cap. LIII.* testis est fide dignus, deplorant vesicæ ulcus, omnibus parum aut nihil proficientibus, continuo aquæ Spadaneæ usum, tam seclitius fuisse debellatum, ut summe obstupuerint, quibus id visum certum habere desperatum. Ego vero habeo, quod maxime laudem

usum Selceranarum, quarum saluberrima ingreditur peritum insperari, quasumque virtutem in omni interna pulmonum, renum & vesicæ labe exemplis habeo confirmatam fere innumeris. Hinc fuso, ut vere semper & æquum, per mentem & longius bibantur, vel quod melius inter cibum ponas ordinari loco, cum quarta vini Mosellani parte remittat, potentur.

## §. II.

Lacticia quidem per se renum ac vesicæ lesionibus & morbis minus accommodata. Sed si lac ipsum, præsertim asinum, cum Selcerana aqua bibitur, vel quod melius adhuc, acidule hæ, ad abstergendam eo melius saniosam & mucosam materiam, per aliquot hebdomades primum solæ, ac postea vel solum lac, vel medicatæ huic aquæ confusum, usurpantur, magis quam ullam aliud remedium prædesse, experiri scribo.

## §. III.

Licet sanguinis missio utilissima sit, tam ad agenda, quam perflantia vesicæ ex sanguinis congestione vitia: multum tamen nocet frequens ipsius administratio, ubi humorum magis impurius, quam abundantia in visio est, ac ubi materia acris purpuracea alius sanguini est infusata. Nam subtrahito nimium sanguine, motus ipsius ad corporis ambitum elanguet, peripirano simul imminuitur, & morbi causa magis obfirmatur, licet in principio doloris lenitamentum inde accedat videatur.

## §. IV.

Vini potum *Hippocratis* I. superius c. in urinae difficultatibus commendat: merito tamen tenendum, quod nullum aliud ex usu sit, quam dulce, Malvasicum, Hispanicum, vel etiam Hungaricum, quod moderate & medicetum, tam ad roborandum stomachum, quam ad vires refocillandas, apprime conducit, nisi febris & calor prohibeant. Illa vero vina quæ multum acidi tartari in sinu foveat, ut Rhenana, item nostrata austera, penitus merito sunt rejicienda.

## §. V.

Quam omne frigidum nervis nervisque partibus sit inimicissimum, calidum vero amicitissimum; hinc in nervosæ vesicæ passionibus summa cum cura etiam vitanda refrigeratio, maxime inferiorum, frigidus potus, ac præsertim in senili ætate, remedia nimium refrigerantia, acida & nitrosa. Vicissim quæ corpus, abdomen ineptis & pedes, à frigore defendunt ac in perspiratione servant, ut motus corporis moderantur, potus insuli theiformis, porio calida, item pediluvia & balnea aquæ dulcis, optimum doloris procurant lenimentum. Atque etiam hanc ob causam è re est, ut aquæ medicatæ ipsæ, tam solæ, quam lacti nuptæ, tepide potius, quam frigide bibantur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Vir quadraginta annorum, viæ sedentariæ ob intemperantiam stidorum addictus, insolentia cruciata & tormento circa pubem & perineari regionem cum magna difficultate reddendi urinam diu sæpe per intervalla afflictus fuit, & propter

*Lac cum*  
*aqua præ-*  
*lo.*

*Potus lacti-*  
*cia cum aqua*  
*prælo ad-*  
*modum.*

*Potus dul-*  
*ce non ac-*  
*idum.*

*Frigidus ap-*  
*ert, calor*  
*temperant*  
*potest.*

*Dulce ves-*  
*icæ aqua*  
*prælo ad-*  
*modum.*

propter dolorum atrociam, inquietudinem, anxietatem, vigiliis viriumque defectionem, cum extremorum tremore ac frigore, tam mære decubuit, ut ad desperationem quandoque redactus, cuncto filium viæ abruptere voluerit. Affligebat hæc miseria interdum per aliquot hebdomades, postea sensim paulatimque remittebat, ut officio suo fungi posset; urina plerumque pauca & turbida profluebat, crassum sedimentum deponens. Et quam per sex fere annos hoc malo exagitatus esset, variis tandem penitus consumptis, quadragesimo ætatis anno obiit. Omnes, quos per totam civitatem in auxilium vocarant, medici, & calculus, & vesicæ exulcerationem, hujus miseræ affectionis causam judicabant; sed aliud longe partis affectæ post mortem scrutinium docuit, vesica quippe integra, sine exulceratione, inuenta fuit, nec velligum fabulæ aut calculi in ea reperiunt, ipsum vero vesicæ corpus longe crassius & densius, copiosis & valde dissensis vasibus sanguiferis, quorum nonnulla calammum scirporum crassitie arcuabant, oblitum. Ut adeo omnium horum cruciatuum nulla alia fuerit causa, quam insolita illa stagnatio & incarceration sanguinis in vasis vesicæ.

## Epirisus.

Hæc historia lacerenter docet, spasmodum vesicæ urinariæ vehementem, tantum valere, ut universum nervosorum partium systema in consortium trahere & æconomiam omnium corporis functionum perturbare queat. Dein patet: difficilem cum dolore & stillicidio mictum, urinam quoque glutinosam, juxta Hippocratem suffragram, non semper exulcerationem, vel calculum intus latentem prodere, sed a sola spastica contractione vesicæ oboriri posse, qua tunica interior mucosa foriter compressa mucosum liquidum copiose in cavitatem vesicæ eructat, quod urinae intus mixtum, postea cum ipsa excernitur, eodem modo ac notum est, dolorificum illum spasmodum, qui sæpe fit in extremitate intestini recti evocatus sensus, ita comprimere tunicam cum vasis suis villorum, ut insignis copia muci albi, inter albuminis ovi, cum renescio dimittatur, quod vulgo vocant hæmorrhoides albas. Vesicæ autem ipsius causa non tam est in cavitatem vesicæ, quam potius intra ejus substantiam. Nam, sicut à mensium vel hæmorrhoidum fluxu sufflaminato, sanguis regurgitans ad vasa venticuli & intestinorum, & intra eorum tunicas sentientes stagnans, distractione & compressione, vehementia termina, anxietates, dolores, convulsiones & spasmos concitat, ita etiam, quando vel ex viâ & emissionem fluxus hæmorrhoidalis, vel aliis ex causis, sanguis ad vesicæ corpus magna copia delatus ibi stagnat, non mirum est, quod in nervosa istius compage spasmos, & quæ ab eis proficiuntur symptomata, producat.

## OBSERVATIO II.

Vix quadraginta annorum, sanguineo-chole-ricus, ex vitæ genere valde inquieto transiens ad quietum & sedentarium, experitur brevi post hæmorrhoidalem fluxum, quem præpollere remediis adhibitis suppetit curavit. Sequuta hinc mictus cruenta, singulis fere mensibus rediens, qua cessante anxietas præcordiorum, dolores lumborum, borborygmi ventris, prava digestio & inappetentia oborta. Ad tollenda hæc mala variis usibus quidem remediis, thermis, lactis cu-

ra, sed non cum debito regimine. Accessit hinc postea funesta vesicæ inflammatio, cognoscenda satis ex magno ardore, dolore in regione pubis, mictu difficili & dolorifico, febre, præcordiorum anxietate & delirio, ac post mortem vesica inflammata & sphacelata inuenta fuit.

## Epirisus.

Hæmorrhoidalis fluxus interdum transit in mictionem cruentam, criticam quoque, quæ nullo modo cohibenda, nisi rursus provocetur hæmorrhoides, alias gravissima tubi sequuntur spasmica pathemata non modo, sed & ipsa vesica tandem inflammatione gravi cum febre afficitur, quæ facile abit in sphacelum. Nam qui morbus vesicæ moriturus, si plerumque pereunt sphacelo, qui etiam intestinum rectum sæpe afficit, ut hæmorrhoidalia vasa sanguine nigro insarta cum penis livore compareant.

## OBSERVATIO III.

Summus hujus urbis Theologus, vitæ sedentarie perpetuæque mentis per ardua multa negotia sanguisotii alienus, à purpura intus delincente scorbutica in gravem præmam per intervalla dysuriam incidit, puncta simul paralytici spuria dextra manus, quæ, quandoque peritum, remissior fuit dysuria, illa vero evanescente, atrocior vesicæ spasmus & dolor cum assiduo urinam mittendi stimulo, illico rediit. Tandem cum fastidate quidem in gratiam redire videbatur, sed quem forte languidum adhuc corpus aut frigidiore expulisset, redire intoleranda mictus tormina, quæ vesicæ inflammatio, ex parte exulceratio scirrisque acuta exanthematica exceperunt, funesto proli eventum.

## Epirisus.

Inflammatio vesicæ, à sero salso impuro & corrupto, vesicæ tunica nervis firmius inhaerente etoque lancinante, quandoque subnascent. Vidi non ita pridem in senio octogenario, qui per aliquot annos summa difficultate mittendi cum dolore urinam laborabat, ac demum, frustra adhibita omni efficacissima medicina, in pede nactus est erysipelas, quod reliquit ulcus, ichorem saniosum lat copiose quotidie fundens, tam salubri effluctu, ut ex eo, & dysuria, & dolor in pube, omnis evanuerit. Dracunculus quoque qui ante seculum jam omnium fere optime germanico idiomate de scorbutis integrum scripsit tractatum, in eo pagina 350. & seqq. phæres affert observationes de casu ægrorum, qui de doloribus savis sub urinae emissionem conquiescit, quorum causa non vesicæ labe ulla, aut calculus fuit, sed humor tantum casus scorbuticus. Memorabilis maxime infusus, quem consignavit de lanone, qui, quam nunquam antea ex calculo laborasset, subito atroces in pedibus perfensit dolores, qui hinc depulsi, uterum invaluerunt, cum intenso ardore & difficultate gutturis vix mingendi; applicatis tamen discutientibus cessante quidem, sed ad pedes redierunt, consequente eorum dolore.

## OBSERVATIO IV.

Fœmina quadraginta circiter annorum, Germanicæ constitutionis, vitæ sedis tantum indul-

De hæmorrhoidibus suppetit vesicæ inflammatione.

Vesica inflammata mictus cruentus.

gens, venæ sectioni alias fuerat afflueta, sed per beneficium eam omiserat, quo factum, ut obstructis mensibus, in summos dolores circa pubis regionem incidere, cum impensis præcordiorum anxietatibus, forti alvi adstrictione, appetitus viri-umque destructione. Sedatis quodammodo ab impetu medico per opiatâ doloribus; mox incidit in syncope et maiores quæ vehementiores circa præcordia urisunt anxietates, subsequens delirium & mors. Inspecto post mortem corpore, & vesicam & uterum inflammatio ac sphacelus occupant, cæteris omnibus partibus sanis.

### Epitaph.

Insuper axiomatis præctici hoc loco notari velim: in inflammationibus nervosarum & membranacearum partium, ut in pleuritide, pleuritide, hepaticide, item inflammatione ventriculi, intesti- norum & vesicæ, nil perniciosius esse, & quod tam facile ad mortem perducere queat opiatâ remedio interno. Stuporem enim hæc partibus facile inducit, & in minimis vasculis motum & progressum sanguinis penitus sistit, ut sphacelus ac mors inducatur. Quare cautiissime cum ejus- modi remediis, etiam exterius applicatis, huius in morbis agenda esse moneo ac mulo serio, compluribus lethiferis exemplis hanc observatio- nem confirmantibus. Conferunt potius, præter idonea diluentia, discutientia, blanda anodyna cum diaphoreticis mixta, inter quæ liquorem no- strum anodynum mineralen, cum spiritu Bullii mixtum, & reteratis vicibus, parca tamen dosi, exhibitum, cum blando regimine diætico, non satis laudare possum, si prius plethoræ, quando adest, rempeltiva sanguinis missione sine sui pro- spectum.

Præter allatos casus plures adhuc invenies in *Consul. med. Tom. II. fol. III. LXXXVIII. XC. XCIII.*

## CAPUT X.

### De Inflammatione & febre uterina.

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.

Uteri mun-  
dici dispo-  
sicio &  
consuetudo.

**P**eculiaris uteri fabrica & structura, mira sci- licet fibarum totius substantiæ elasticitas, vasorum sanguiferorum copia eorumque tortuosus & serpentinus flexus, glandulosa & nervosa textura, nec non collis & maxime orificii interni exquisitus sensus, faciunt, ut multis de variis morbis, maximeque etiam acutis & periculosis inflammationibus, oriundis inde abscessibus & mali moris ulcerationibus, hoc viscus pateat. Quin, quia non tam ob nervorum communio- nem & sensibilitatem, quam potius sanguinis progressum in fibrosa & vasculosa uteri compa- gine interceptum, ipsius in omnibus reliquis cor- poris partibus motus turbatur acque pervertitur; hinc magna etiam uteri cum nobilissimis corpo- ris partibus, capite, pectore, præcordiis, ventri- culo & omni nervorum systemate est consen- sio, & ipso gravato, aut inflammato, sæva in propinquis & remotis partibus accidit pa- themata.

##### §. II.

Ex his quæ in uterum cadunt passionibus fre- quens admodum est ipsius inflammatio, cognos- cenda ex ardore & dolore fixo in inguine, cum febre acuta, dolore lumborum & imi ventris, abdominis inflatione, stimulo ad urinam & al- vum, mictu arduo & difficili, gravibusque aliis in præcordiis, capite & pectore symptomatibus. Parum hujus morbi remissumque medici recentio- res, sed eo crebrius in monumentis suis vete- res. *Aretæus* quidem sic egregie ipsum delineat cap. LXXIV. *Inflammatio uteri*, inquit, *fit ex pluribus causis, ex plaga, ex mensium suppressio- ne, & frigidiore, & inflante, non minus etiam ab utero & partu, propter malum partus eductum.* Sequitur ad uteri inflammationem febri acuta, doloreque capitis ac ejus tendimus & bafi oculor- um juncturaque maxime & digitorum, & collis deorsum & declinatus, stomachi per consensum affectio, ostendi uteri conclusio, pulsus parvi, densi. Si totus est inflammatus, totus vehementius pul- satorio motu dolet: si posteriores ipsius partes solum inflammatae fuerint, dolor circa foveas fit, & ster- cora supprimuntur ex recti intestini compressione; si partes ejus anteriores, dolor circa pellicem fit, & urina stultidum ac emittenda difficultas ex vesicæ compressione; at lateribus inflammatis, & inguina tenduntur, & crura gravantur, si vero fundus ipsius fuerit inflammatus, circa umbilicum maxime dolor consistit cum tumoris at si circa os- culum est inflammatio, circa superum ventrem dolet, & digito immisso durum ac reitens ostendit occurrit.

##### §. III.

Hæc uteri inflammatio merito dispescenda in *Differe-  
ntia  
inter in-  
venit &  
graviorem.* levio- rem superficiale, & graviorem, seu pro- fundiorem. Illa sæpe puerperis accidit, facile gi- gniatur, potissimumque crebrius sequitur febrem lacteam, admittit etiam medicationem, si recte & prudenter insinuetur, ac facili negotio, intra paucos dies, discutitur. Gravior autem, quæ febre intensa & sævis symptomatibus de veme- mentia non remittentibus stipatur, septimo, no- no, vel etiam undecimo sæpe die necat, superveniente maxime purpura alba, quæ pessimum sem- per præbet omen, æque ex corrupto, putrido, vappescente sero ac sanguine, in uteri labulis hærente, ortum ducit, immo de corrupto jam & sphacelato utero testatur.

##### §. IV.

Causa inflammatio uteri materialis proxima est *Causa  
speci-  
alis.* inæqualis sanguinis per uterinâ vada circulus. Ob oppleta scilicet, coarctata à spasmis & obstructa minima vascula, sanguis majori cum impetu ac celeritate fertur per vascula vicina, eorumque ramos laterales, qui crurore alios non capiunt, unde tumor, rubor & ardor fit, cum pressione & iritatione tunice nervosæ. Ad hoc autem vi- tium concipiendum in genere disponunt lesiones, contusiones & vulnerationes externæ, status ple- thorici, cacochymici, mensium & lochorum sup- pressio, copiosior sanguinis ad uterum allapsus æque decubitus, partus laboriosus, animi affectus, ira maxime & error, virum enormis, vel natus impensior ad hunc, motus & labor cor- poris plethorici forior cum subsequente refrigeratione imi ventris, balnearum calidiorum ab- usus, abdominis & uteri refrigeratio externa, potus frigidus, fluentibus imprimis mensibus, lochis

lochias aut hemorrhoidibus, colica quoque convulsiva, nec non affectio spastica-hysterica gravior.

## §. V.

In puerperio  
periculis  
gravis sit.

Nunquam vero magis hæc periculosa affectio infestat feminas, quam si in puerperio sunt constitutæ. Post partum enim uterus ab onere levatur, elastica, qua pollet, virtute iterum in ætibus spasmus coit & sensim sensimque sese contrahit. Hinc diducta uteri vasa angustantur, contentus in eis sanguis per oscula aperta, secundum prius coctus, exprimitur, ac sub nomine lochiorum foras prodeit, cum sanictis emolumentis. Simul vero etiam hac angustatione motus & cursus sanguinis aliter dirigitur, & quidem ab utero & inferioribus ad superiora ipsasque mammæ, quod circa tertium plerumque diem accidit, non sine febrili commotione, & Germanis propterea audit dæ *Milch-Fieber*. Quod si igitur lochialis sanguinis exitus per stricuras uteri spasticas impeditur, non modo in ipso utero periculosa inflammatoriam flammam concitat, sed & ordinarius ille sanguinis ab inferioribus ad superiora impetus, tam ratione vehementiæ, quam motus sanguinis validius incrementis. Tamen enim spastica & dolorifica in abdomine urgent stricture, sanguinem vel mucidi humoris ex utero fluxus restitunt, alvus clausa est, pedes frigidi, ad urinam stimulus, dolorosa micilo, caput rubet, tumet, oculi fulgent, nares non nunquam guttulas quasdam stillant, anismus est inquietus, somnus nullus, vel insomniis terrificis turbatus, ac graviora illa symptomata, respiratio difficillima, lipothymia, convulsiones & delirium phreneticum, denum subito sæpius puerperis accidit funesta.

## §. VI.

Quibus  
signis  
femina.

Luculentis verbis hæc ita evenire testatur *Hippocrates lib. I. de morb. mulier.* §. 72. ita tradens: si inflammata fuerint puerpera uteri, venter ardet & magnus fit & ad præcordia suffocatio habet, & venter, ubi puerperis purgamenta intra manserint à frigore, occulte distenduntur. Nec non lib. II. de morb. mul. p. m. 489. §. iniqua, ignis facer in utero fit, etiam pelvis id percipit, venter intumescit, perfrigitur, febris habet magna & rigor supervenit, & spiritus densus, & animi delirium, & debilitas, & dolor totius corporis, & tristatur, & mente variatur, & affectu aferant ex inferno venire ad lumbos, & ad dorsum, & præcordia, & pelvis, & collum, & caput & stomachum & mortis esse videtur. Experientia autem testis, feminæ teneræ, exquisitoris sensus, in vehementes animi commotiones pronæ, pathematis spasmodicis & flammæ obnoxie, mendium inordinato successu affectæ, alvi adstrictioris, si gravidæ fuerint, post partum quam facile in lochiorum suppressionem cum febre uteri accidunt incidunt, non sine summo viæ discrimine. Interdum etiam inflammatio uteri nascitur, à secundinarum vel totali, vel tantum quoad partem retentione. Hæc enim resistente, non tantum sanguinis ex utero exclusio prohibetur, verum etiam succedens putredo febrem movet, vel si hæc jam adeit, deiectione reddidit.

## §. VII.

In sphacelo  
tam abili  
me necesse  
est.

Jam sicut in omni inflammatione, ille subsistens humor, si non dissipatur, putrescit & in corruptionem transit, vel sphacelatum, vel ulceratum, ita idem etiam accidit in ea, que utrum

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

infestat. Quæ in sphacelum abit, brevi necat & solennis maxime est puerperis, in quibus post sectionem uteris ut plurimum cum vagina durus; coloris ex atro bruni deprehenditur. Quæ autem suppuratur & ulceratur, diutius trahit, & accidit quam maxime extra puerperium. Patet inflammationi hæc suppuratorie feminæ sanguine, mollioris & spongiosioris habitus, præsertim si fluxui albo sanguinolento fuerint affectæ, ipsæ adstringentibus insensitively cohibitis. Frequenter etiam eandem incurrunt, quæ impurum & crassum in venis alunt sanguinem, diutam insalubrem sistantur, fructibus horæis, dulcibus & lacticiis indulgent, inferiora subinde refrigerant, corpore præsertim æstuant, quæ trifida angustant, veneris stimulus concubitu obundare impediuntur, suam sanguinis missionem intermittunt, aut seniores quietam & ærumnosam vitam ducunt. Ac in his quidem frequenter est inflammatio in collo de orificio interno, quod ex multis fibris nervæ spiritaliter est contextum, quam in ipso fundo, etque propter doctæ acerbis & ardens est in pube cum mctu difficili. Signa autem abscessus uteri sic in compendio *Hippocrates lib. I. de morbis mulier.* exhibet: si, ait, uteri fuerint ulcerati, sanguis & pus purgatur & fætor gravis oboritur, & dolor acutus corripit lumbos ac inguina & puerperæ, & dolor faciem procedit ad laterum multitudine, collas & scapulas, aliquando etiam ad clavellas pervenit, & caput vehementer dolet delirareque, præsertim vero imperis intumescit & debilitas ipsam corripit, & animi delirium, & febris uras, & perfrigeratio, intumescunt autem maxime crura. Morbus autem corripit ex abortu, si qua corruptio humore ac putrescente intra non fuerit expurgata & calor totum corpus tenet. Corripit etiam ex fluxibus, si in ipsa actus fuerint & blanda mordeant. Sed plerumque uteris tandem etiam in gangrenam & sphacelum abit ac interficit. Interdum tamen accidit, ut apostema in utero progenerat interne rumpatur & copiose effluat sanies alba minime foetida & ægra evadat, quæ de re legi meretur *Forestus lib. XXVIII. obs. XLIV. pag. 693.*

## §. VIII.

Quod si autem exterior uteri pars inflammata, ob frigoris extenuum, quam facile abire in scirrhum, qui ulceratus, cancer uteri recte dicitur ac est insinabilis. Neque adeo infrequens est, glandulas copiosiores circa collum uteri, & maxime orificium ejus internum confidentes, mutari in scirrhum, tandemque abire in inflammationem ulcerosam, quæ haud licet ac cancer exulceratus, medicationem admittit plane nullam. Recentiores quidem parum, hanc uteri affectionem notant; ego veto aliquoties observavi, eadem omnino ratione usqueque symptomatibus ac pridem jam exacte prodidit *Arriani lib. II. cap. LXVII.* ita perhiberi: caneri in utero, parum cum, partum sine ulceratione suam, tumor reperitur circa uteri osulum durus, inæqualis promontus, colore seculento rubicundus, quandoque etiam sublividus & dolens vehementer inguina ad suprapurum ventrem & pelvem ac lumbos, atqueque servata constanti & variagatiore medicatione. Si vero ulceratus est cancer, ad dolores, durities, & tumorem, crassa etiam & inæqualia ulcera conspiciuntur, plerumque quidem fædida oris umida albicantia, corpus crassas induritas habentia. Quæ vero pure videntur, seculenta, livida, rubicunda

Necesse est  
canerem  
inflammationem  
esse.

da & cruenta apparent. Excernitur autem afflue ab ipso sanis tenuis, aquosa, nigra, aut fulva, grævescens, aliquando etiam sanguis feritur & alia signa ad inflammationem uterum relata. Afflictio igitur ipsa incurabilis est, veluti dicunt etiam dicit Hippocrati, mitigare tamen oportet, per infusum seu suum græco, malva & per cataplasmata similia.

## C U R A T I O.

## §. I.

Uteri & præterea  
confici ac  
commoda-  
da.

Uteri inflammatio, quam nunquam frequentius occurrit, quam in puerperis & post abortum, dum vel ab improvida obsteritum in partu difficili tractatione & correptione violenta, vel à violento nisu sub partu laboribus, sanguinem præsertim impurum ad uterum pellente, vel à lochiorum per dolores & spasmos hystericos, terrorem, aut refrigerationem, fluxu impedito, inducitur, necessarium omnino est, ad præseruationem aque ac curationem, ut medicus omnes has causas probe noverat auge discernat. Quia autem facilius longe est periculum hunc morbum imminuere arce, quam præteritum persanare; hinc modis etiam prout omnium eo cuiti debet, ut eundem tempore præcavenda, ejusque incursum avertat.

## §. II.

Post partum  
si ipsi  
hinc erit.

Jam missis illis lesionibus, quæ ab externis & violentis causis inducuntur, frequentissimum in artus exercitio est, inflammatoriam hanc febrem, post partum, ob excretionem sanguinis lochialis vel plane deficientem, vel non sufficientem induci. Quare id imprimis agendum adest, ut confecto partu, primis statim diebus, lochia rite secedant. Quod ut ex voto perficiatur, ad causas fluxus lochialis intercepti removendas, medicatio petite dirigenda. Notum autem est, sub diuturnis & gravioribus partu laboribus, tam vehementem fieri partum, & solidatum, & fluidatum, commotionem & exagitationem, ut quicquid ex pulsibus celeritate, totius corporis ardore, sui & inquietudine vix alter judicare possit, quam adesse febrem, sub quo impetu partum etiam vel nihil recememorum puridorum & cruentorum utero efflueret. Igitur opera danda, ut impetuosis hic post partum motus placide componatur. Fit hoc commodissime, si puerperæ in quiete & temperato regimine diaphoretico serventur, iisque diligenter ac blande assium sedantia propinantur. Quia tamen sub partu, qui non nisi strictura spasticâ & convulsivâ ex spinali medulla absolvetur, per consensum spinali & dolorifice stricturæ ad intestina transeunt, quæ superato partu adhuc aliquandiu persistunt, atque etiam eandem ob consensum uteri fibras musculosas & nervas stringendo, liberum sanguinis cursum præcludunt; merito etiam curandum, ut eadem sedentur placide. Hunc in finem utilis pulvis, ex pulveris Marchionis, lapidum cancrorum ana drachma, antimonii diaphoretici drachma dimidia, nitrî puri grana XVI. cuius quarta pars pro doli, adjectis nonnunquam, si spasmûs hysterici simul impensius urgent, grana lex, vel quatuor pulveris caustici, cum aqua florum chamomille vulgaris, destillata cum cerevisia triticea, sumenda. Conducit quoque oleum amygdalarum dulcium, ex recentibus, sine igne paratum, quod vel solum, vel cum quarta parte ipermæis ceteri reman-

tum, quotidie ad unam vel dimidiam unciam, cum pulculo pulli facinæ, aut decocto avenæ, usurpandum. Extreme vero totum abdomen inungendum oleo ex anethini, chamameli & liliorum alborum ana uncia, olei carvi drachmis duabus, vel camphoræ drachma, superposita mapula complicata calefacta.

## §. III.

Compositio sic tumultu, ad promovendum lochiorum fluxum, vix præstabilis hæc usque innotat remedium, quam pulchram massâ, quæ ad inisationem Beckeri, ex amaris extractis, gummatibus refinosis temperatis, & aloe probe correctâ concinnata est. Secundo igitur statim die, ceteris paribus, quindecim grana pilulari forma, mane, vel vespere exhibeantur, & pro circumstantiarum ratione, per quinque vel octo dies continuemur. Est enim hoc evacuans elementum maxime infusum quoque uterum a stagnante corrupto sanguine repurgat, eoque quam optime & inflammatoriam, & febrem atque sævâ à recememotis recentis oriunda postemata, arcer. Quin eadem hæc curandi ratio aptissime ex usu est, quando secundicia, vel ipsius partus, aut aliud quoddam exarbandum concretum in utero residet.

## §. IV.

Quod si tamen medentis scopus his expediri nequit, sed febris imposita assidua, venter flatibus attollitur, uteri purgamenta retinentur, & spasmûs ad superiora vergunt infestis, alia usenda est remediis via. Scilicet sanguinis copia, sub graviditate justo plus accumulata, minuenda, per venæ sectionem, non in superioribus, sed pede instruat. Sæpe enim à nimia vasorum distensione sunt spasmûs, & sanguinis exsuperans moles uteri compingit nimiam distendendo, ejusdem systolicam & expulsiuam potentiam minuat ac impedit. Hinc venæ sectionis remedium omnino maximi, ad promovendum lochiorum fluxum & inflammationem arcedendum, est usus. Quod sicuti in Gallia hunc in finem frequentius quam par est adhibetur; ita perpetam in nostra Germania rejicitur, ut plures inflammatorie uteri febre correptæ, pereant, quæ tempeliva sanguinis missione potius secerent servari.

## §. V.

Præter venæ sectionem, ubi jam præsens est inflammatoria febris, id quam maxime agendum, ut sanguis flagrans in motum cietur, humores spissi fluxiles reddantur, & stasis discutiatur. Quod ut obtineatur, conducit mixtura hæc: recipe aque charefoli, cardui benedicti, scorchi, florum sambuci, acaciæ, aceti destillati ana unciam unam semis, lapidum cancrorum drachmam unam semis, antimonii diaphoretici, vel bezour-dici mineralis drachmam semis, spiritus nitri dulcis, sive liquoris anodynî mineralis guttas XX. syrapi card. bened. drachmas duas. M. de qua binis quibusvis horis, duo vel tria cochlearia porrigenda. Tum etiam pro potu exhibeantur tenuis jusculum ex pullo gallinæ, cum radice scorzonæ, cichorei & galiani cornu curvi confectum, addito ad gratiam succo pomorum aurantium. Præbetur quoque subinde infusum theiforme ex herba veronica, scabiosa, forchi, floribus

hormini, chamomillæ vulgaris, femine fœniculi. Nec omittantur pulveres temperantes ac resolventes, ex lapidibus cancerum, solutione oculorum cancri, nitro & sale polychresto compofiti. Quales præterea Becherianis, vel ad hanc exemplar paratis pilulis, ad lochialem fluxum promovendum & sanguinis a capite impetum divertendum, commode interponuntur. Sint denique in usu chylires ex fero lactis dulci, vel decocto florum chamomillæ vulgaris, herbe artemisise, salviæ, hormini, mercurialis, addito melle, nitro & pinguedine gallinarum.

## §. VI.

Extra  
puerperium  
non acci-  
ditur.

Quando vero extra puerperium in corporibus impuriæ variis ex causis accidit inflammatio uterina, non tam in fundo, quam potius in collo, cervicæ quæ vagina, præter jam memorata interna, simul in auxilium vocanda præsidia externa, episthema scilicet pubis regionis admota, injectiones uterinæ ex accommodis paratæ, nec non pessi, item ob loci viciniam suppositoria in anum trusa. Episthema egregium est, quod ex aquæ sic dictæ d'arquebuse, (quæ non nisi vinum Rhenanum ab herbis vulnerariis in balneo maris ad siccitatem abstractum,) uncis quatuor, essentia croci, spiritus vini camphorati ana uncia duabus, niri, in aqua florum sambuci soluti, drachma, paratur, ac pro circumstantiarum ratione cum aceto rutæco, aut scordii remixtum, linteis duplicatis sæpius applicatur. Ad injectionem vero commendo solum lac, vel asinum, vel muliebri, cum floribus sambuci, myrrhæ & croco, adjecto nitro decoctum. Molehissimum denique huius passionis symptoma retentum, præter iofessu emollientes, egregie lenit oleum amygdalarum dulcium, vel mucilago feminis psylli, aut fœnæ græci, ad uncias duas, cum duodecim extracchi croci gravis ano injecta. Et eadem hæc remedia semper etiam ex usu sunt, quando inflammatio abiit in suppurationem.

## §. VII.

Quibus  
incurandum  
si ex fluore  
alibi.

Porto non adeo infrequens est, ex fluore albo diuturno, præsertim si simul sanguinolentus, male tractato, vel imprudenter cohibito, uterum ejusque partes tumore affici cum dolore & febre inflammatoria, immo in suppurationem abire & exulcerationem. Tum vero cura admodum perplexa est atque difficilis, imprimis, quando fluor non è glandulis externis, sed interna uteri substantia venit. Ego, si passio chronica, nil præstabilius novi, quam usum thermarum Emsenarum & Carolinarum minorum, quippe quæ humores subsistentes efficaciter dissolvunt, paremque affectum simul roborant. Sed cavendum a balneis adstringentibus, ipsis etiam Carolinis fortioribus, quæ propter terram calcaream & martialem, adstringente & repellente virtute polleant. Inseffus vero ex herbis uterinis & aromaticis, cum aqua dulci decoctis, profunt utique. Sic laxatis duabus & humoribus dilatis, cum fructu postea pilulæ dantur Becherianæ, quæ inter specifica uterina locum tenent præcipuum. Neque rejicienda videntur Hippocrati uteri ulcus curandi methodus, quam lib. I. de morb. mul. §. 88. sic tradit: *si hic morbus incidit, multa calida lavato & resperforaria adhibito, qua parte fuerit dolor. Et si quidem superne fuerint dolores & mulier fertis est, totam fomentato & pharmacum dorsum pergrans bibendum dato, & ubi tempus anni fuerit, serum colatum insuper bibendum præbeto, per dies quinque, si id Frid. Hoffmann Oper. Tom. II.*

facere poterit. Si vero non adjuverit serum, lac asinum coquito, & per dies tres, aut quatuor bibendum dato. Post lactis autem potum, cum aquis ipsam resino, & cum cibi commodi, carnis ovidi, teneris recentibus, & volucrum, & bris, & cucurbita. Abstineat autem a salsis, & acris, & mariis omnibus ac capris. Et certe lactis lerum & asinum lac egregie proficit, non modo ad abundandam humorum acrimoniam, sed & contemperandum calorem heclicum, quæ agros graviter ut plurimum urit.

## §. VIII.

Quæ denique à violentia externa inducitur uteri inflammatio, cum febre, dolore inguinum, meijendi difficultate & ipsalms in rectoris etiam partibus, nec non alvi adstrictione, possit quam maxime venæ sectionem, non modo manum, sed & repetitam, primo in brachio, ac dein in pede institutam. Opus in hac etiam, ut alvus subducatur chylires, in uterinis morbis nunquam non singulari plene utilis. Et extensius imponendum emplastrum ex emplastri de molleis uncia duabus, spermati ceti uncia dimidia, gummi ammoniaci drachmis duabus, croci drachma, camphoræ drachma dimidia. Non omittis interius blandia diaphoretica & discutientibus.

Inflammatio  
uteri a  
causa uterina  
accidit.

CAUTELÆ ET OBSERVATIONES  
PRACTICÆ

## §. I.

Quam puerperæ plurimæ in puerperio ex febre inflammatoria uterina moriantur, præsertim si multum sanguinis crassi & impuri in venis alant; hic optimum certe ad præcündendas capitales ejusmodi afflictiones est consilium, quando gravidæ partim salubri dieta & vitæ regimine, partim etiam aptis & congruis præsiis, tam iulidas, quam fluidas partes, in debita temperie, quantitate & motu æquilibrio servare student. Nam qualis natura aggroentium, etiam puerperarum, talis etiam est vis medicatrix, pugna adversus morbum, quin ipsa medicatio, in qua omnino plus præstat natura, quam ipsius ministrata. Igneat ad anteverendum hoc malum quam maxime necessarium est, ut tempore graviditatis sanitati consilietur tam opportunis sanguinis missiõibus, quam debitis laxationibus, per rhabarinam potissimum, ut etiam gravidæ modicam & laudabilem dietam sectentur, animi temperantiæ studeant, & potus discretus perspirationem simul sustinentes bibant. Deinceps quam haud raro inflammatio in puerperio uteri causam præbeat, potus nimis calidorum & spirituosorum, vini aromatici, crocatis &c. ad partum facilitandum datus, præsertim in sanguine, & quæ non ultimis mensibus sanguinem multum; serio omnino monendæ sunt, & oblietices, & uterum gerentes, ut ab ejusmodi sanguinem exagitantibus remediis abstineant, ac potus venæ sectione in pede, item balneo, novissime autem parum diuibus vel tribus hebdomadiis, rite usurpatis, liberiores sanguinis per uterum commutationes & faciliem postpartum effluxum procurent.

## §. II.

In nullo morbo tam infensa & perniciosa est animi commotio, per terrorem potissimum ac iram, quam in uteri inflammatione. Nunquam

omittenda

etiam nocentior abdominis & inguinum perfrigeratio, quam post abortum & partum. Puerperæ enim, ob continui quæ ipsis accidit solutionem, fibrarum & vasorum dilacerationem humorumque extravasationem, haud aliter sunt consideranda, quam graviter vulnerata. Quam facile autem dictæ causæ læsæ de vulneris paribus, adeoque etiam utero, inflammationem inferre queant, res est nota etiam in vulgus. Quare ut puerpera, nec non quæ labem in utero gerunt, follicite sibi ab his caveant, iterum iaculamus iterumque.

## §. III.

Emula  
de pelliculis  
dum.

Ad emovendum lochiorum fluxum subsistentem, nunquam danda pelliculis fortiora, crocata, myrrha, succinata, aloetica, vel calida aromatica, nec non salina stimulantia, tanto minus, si mox post partum adhuc præsto est motuum impetus: hæc enim febrem magis accendunt, spasmus intendunt, sanguinem in laevibus uteri hærentem, humido absumto, plus densant, & ad effluxum reddunt ineptum, vias quoque & emunctoria magis siccant aque occludunt. Sed quando spasmus laxari, dolores remittere, viæ patetere incipiunt & sanguis ex utero ferri, tum demum moderate pelliculis & tonicis propinare expediat. Inter quæ solutio succinæ, myrrhæ, rhabarbari, croci, non cum spiritu vini, sed aquo lixivio mentruo parata, nec non aqua menthæ, aut artemisiz leviter spiritueosa, qualis est, quæ cum cerevisia triticea destillatur, omnibus sere palmam præcipiunt, si crebris & parvis dosibus offerantur.

## §. IV.

Pura  
fistula.

Ex præcipuis etiam lochiorum fluxum revocantibus auxiliis est venæ sectio. Nec deterreci se patiantur artefex symptomatum gravitate, neque etiam ipsa purpura efflorescente, sed confiderenter admittat, si indicationes adiunctæ, ut jam pluribus superius resti. I. cap. IX. de febre purpurata obf. VI. p. 220. motui. Quando autem provida, ut ita loquar, natura, cessantem aut insuffICIENTEM lochiorum evacuationem liberali sudore, aut alvi fluxu compensat, abstinendum ab iis, quæ lochii præstantis alias faciunt.

## §. V.

Emunctoria  
ni medicata  
sunt.

Quando autem humor ex utero fuerit viscidus, flavus & sanguinolentus, haud obscurum præbet indicium læsæ uterine substantiæ & imminens inflammationis atque ulcerationis. Ad hanc igitur arcendam, vel si jam præstata est persananda, nota quam maxime est ac necessaria crebrior purgatio ex rhabarbaro, tamarindis & manna, quæ frequenter iteranda est, quo viscosi ab utero humores diverantur. Tantum enim hæc ad curationem est momenti, ut *Forstius lib. XXIX. obf. XLVIII.* fidem faciat, quandam Amstelodamensem nobilem matronam ab ulcere uteri sanari reddidisse, cui dederat de quarto in quartum diem uncias quinque decocti sermæ, epithymi, rosarum rubrarum, myrobalanorum Indorum, scabaro dulcorati, & abslergentia decocta in uterum incipere iusserrat. Si ulcus adhuc curandum est, post lentes aliquot dierum purgationes, decoctum ex fantalo, kenisio, fariaparilla, mentha, epithymo, radice liquiritiæ & ligno Rhodio, per viginti quinque dies cum regimine sudorifero cum fructu bibitur, quæ de pluribus consuli possit *Sylvaticus Cens. IV. obf. LXVIII.*

## §. VI.

Ulcus uteri cancri ulcerati naturam emulatur, namque sanies purida & lacinie corruptæ uterinae substantiæ cum magno fetore, summo dolore gravibusque symptomatibus prodeunt, & malum fere est incurabile. Quicquid autem agendum, non nisi demulcentibus & lenientibus perficiendum. Si spes sanationis adhuc peresset, ego quidem habeo quod laudem ponam lætis, potissimum asinini, nec non alium temperatarum mineralium aquarum, Wildungenium maxime, vel Seiteranarum, interposito mane & vespere balneo aque dulcis cum fursibus triticeis, in quo per horam & longius desidendum. Vicissim abstinendum ab omnibus acerbis internis & stimulantibus calidis. Cave etiam in uteri abscessu ac ulcere adstringentibus & repellentibus utendum, quia isdem facile scierhus inducitur. Optimæ injectiones ex lacte caprillo, croco & aqua storum sambuci. *Hippocrati* brassicæ usum commendat, sed præstat betæ rubræ succus, crebrius calide injectus.

## §. VII.

Immanis sæpe dolor exulcerato uteri cancro jungitur, qui vires penitus pessandas, omnemque somnum adimit. Ad hunc leniendum opium solutum in anodynis, cuius generis sunt extractum croci & papaveris, massa pilularum de styrace, de cynoglossa, *H. idroganji, Mathie, Starckii.* Notabilis enim hunc in rem *Riverii Prax. cap. X. pag. 332.* locus: hæc tamen omnia, iniquis, aliquando non sufficientia ad immensissimum dolorem placandum, qui interdum nullum quieti & somno relinquit locum. Unde cogitur non raro ad narcotica recurrere, quæ in hoc affectu propter intensum humorum fervorem minus nocent. Et vidimus nonnullos, cancro in matrem laborantem, quæ singulis noctibus, per quatuor menses, laudari grana duæ, vel tria, innoxia, cum magno solatio sumebat.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Laboravit per aliquot menses largo sanguinis ex utero profluvio femina sexaginta sex annorum, cholericæ, macilentæ & in iram prona, multæ in consilium adfuerat medicos, & variæ etiam usæ fuerat medicamentis, sed incassum. Tandem accedens junior quidam medicus prædictus, suasit externa, parum calida & acra, parum adstringentia & aluminosa. His fluxus quidem cohibitus, sed dolores abortu atrocissimi, ac brevi post loco sanguinis materia saniosa fetidissima effluat, accessit lenta febris, corporis tabes, summaque imbecillitas. Notabile inprimis fuit, quod ægra, quando aliquid de pilulis Anglicanis Mathiæ, quas etiam Starckianis vocant, deglutivit, dolorum intolerandi sensum aliquid lenire, hoc autem omisso, illico recruduerint tormina acerbæ. Semper etiam aliquid materiæ fetidæ ex utero secessit, hæc autem retenta, accesserunt protinus borborygmi in abdomine, spasmus flautenti, hysterica pathemata, cardialgiæ & circa præcordia anxietates. Sic ægra per biennium miseram traduxit vitam, ad demum macie & febre confecta fati cessit.

Epi-ri-



## Epirisfi.

Imprudens medicatio hæmorrhagiæ uteri hoc est exemplum. Nunquam enim sanguinis profluvium, ubicunque fiat, five internis, five externis sistendum, sed potius roborantia cum discutientibus mixta exterius, si interna non suffecerint, pari affectu laboranti fuit admoveenda. Si iccus fit, & spastica constringentia in ulum vocantur, aliter fieri nequit, quam ut sanguis in conspuium abeat, in vasis subsistat, ipsamque uteri substantiam labe inficiat. Anodynus autem dolores quædam tamper sopiit, sed non in totum sublebat, quia putride corruptioni auferendæ non fuerunt idonea. Ex quod ab impeditiori materie faustæ effluxu pathemata hysterica oborta, argumentum est, non tantum à sanguinis & humorum copia atque stagnatione, verum etiam à materia acri caustica, fibras uterinas irritante, pathemata ejusmodi spasmotico-hysterica suscitari posse.

## OBSERVATIO II.

Inflammatio suppuratio uteri post abortum.

Fœmina quadragenaria, sanguinea, plethorica, quarto mense gravida, fusu maris, ut vegetior esset & infantem quoque robustum ac saluum ederet, fumsit pulverem *Morckii*, Ramoneur dictum, qui nihil aliud est, quam animonii regulus cum nitro in calcem usus. Successit autem effectus oppido infelix, ut plus quam vigesies vomeret, marasque experiretur debilitatem. Ex eo pessime semper habuit & post quatuordecim dies accidit abortus, quem præcessit dolor in iogruine atrocissimus, & sub ipso cum lochiis fecit illa materia graveolens. Passio abortus, percutus & fixus in abdomine ac inguine dolores experta est, pulsus semper fuit celer, interdum animi quoddam deflectionem incurrit, interdum etiam tussis & articulum dolore direxerat. His symptomatibus per aliquot menses graviter detenta, nacta est tumorem in abdomine, cum dolore lancinatorio jugi & alvi fluxu torminoso. Sequuta est summa corporis imbecillitas viriumque prostratio, exterritorum refrigeratio, spirandi difficultas & frequens syncope, donec tandem inter hæc vitam poneret. Dissicco post mortem cadavere, ingens puris ex albo viridescantis copia ad aliquot libras ex abdominis cavo profluxit. Ingestina utero propinqua erant erosa, eorumque tunicae comparuerunt quasi abraas. Uterus fuit spongiosus & ita amplatus, ut in longitudine ad decem, & in latitudine ad octo transversos digitos accederet. In ipso lævæ fuerunt multæ, pure replete, ex quibus ingens illa puris quantitas in abdomen fluxerat. In vasis sanguiferis majoribus, nullus repertus sanguis, sed omnis fere in puris abierat matricem.

## Epirisfi.

Quam perniciofa gravidis sint emetica & quidem validiora, ex hoc casu patet luculenter. Quæ enim uterum gerunt, sunt fere semper plethorica, eaque propter fortiori illo nisu & pressione diaphragmatis & musculorum abdominis sub vomitu, sanguis cum magno impetu in uteri vasa urgetur, ibique impuctus, inducit inflammationem in ulcus transeuntem. Hinc igitur abortus & reliqua gravis pathemata duxerunt ortum. Non tamen dubitandum, quin præ-

Frid. Hoffmanni Opus, Tom. II.

tu abæcto, gravissimum illud malum, uteri apostema, potuisset præfendi, si mature discutientia, resolutiva & roborantia in auxilium fuissent vocata. Pus autem ex utero effusum in abdominis cavum, tunicas intestinales areole ac erodit, unde obortus alvi fluxus, cum intensa abdominis torminibus.

## OBSERVATIO III.

Elapso anno vocabar ad mulierem tertium supraquadagesimum ætatis annum agentem, sanguineo-cholicam, quæ misere decumbens, conquesta potissimum de dolore in regione pubis pretorio & chlorio quasi atrocissimo, parvus dolores longe superante, stipato cum tensio, dorsi tensione, ructibus, vomitibus & alvi strictura, summi appetitusque defectu. Inquirenti in morbi causam & originem, dixit: se ante octodecim annos ultimo laborioso admodum partu esse perfunctam, tam male simul ab obstetrice tractatam, ut velligia digitorum impressa adhuc in pube gerat. Tum menses, atque semper largos & ordinatos, post puerperium primum cum dolore aliquo stillare, levasse tamen periodorum postea & sufficienter etiam fluxisse. Ante sex autem annos fe mensium tempore cecidisse in itinere in torrentem: inde mox constitisse fluxum & sequuta multa & varia pathemata spastico-hysterica, quin post aliquot menses corpus immutabile totum, cum colore plumbeo. Dissicuum tamen congruis remediis esse post aliquod tempus tumorem & mensium fluxum etiam repetisse, extremo multo coagulato crasso & quasi concreto sanguine, ac postea viscidula alba & flava matris. Ex eo, quotiescunque mensium accesserit perodus, se per triduum acerbis in abdomine afflictam esse doloribus, tamliu idistatibus, donec sanguis prodierit grumulosum primum & crassum, dein tenuior, cum aqua sanguinolenta ac denum materia viscidula flava. Sic transisse quatuor fere annos, & adhibitis interea variis medicamentis, maxime pilulis *Stahlianis*, cum pulvere salino temperante, spera valentis melioris fuisse irritam, malum potius increvisse magis. Jam à binis mensibus de dolore & fluxum sanguinis emanasse, nunc vero eo esse graviores & spasmos quasi convulsivos. Hæc audiens & atrocia pathemata videns, male statim ominari coepi, ac scitum, aut aliud immedicabile uteri vinum subesse sum suspicatus. Interim alvum valide strictam chyltere oleoso emolliente cum alia foetida subducere, interiori pulverem temperantem cum nitro, cinabari & caloreo, nec non liquorem meum anodynum mineralem dedi, & exteriori parti dolenti admoveere jussi vesicam decocto emolliente plenum. His dolorum atrociam primum frangi est visa, & elapsi nonnulli sanguinis gutti, subsequente liquore sanguinolento. Sed post aliquot dies vehementia recruderunt eadem, ut ægra lamentabili voce uterum extrorsum trahi violenter & jam vaginæ imminere clamaret. Advocata obstetrix, quæ officium uteriperium esse, eique durum quoddam corpus incumbere dixit. Data priora remedia, sed frustra. Partu infestum momentaneum levamen afferentes, imposita exterius, ex multiscularum etiam consilio, varia carnisativa, spiritibus & acris, incassum tamen, & accensis capitis dolor. Optimum fuit solum ex pilulis, quæ pilulas aleo-pharyngas ac de styrae cum croco & cinabari habebant. Sub his doloribus iterum aliquot

Causa morbi.

sanguinis grumi & postea sanguis floridus parca exiit, stillante postea liquore cruento. Sic decubuit aliquandiu, doloribus, modo gravibus, si fluxus resistebat, modo mitius, si excretis sanguinis grumosis quibuscum serum manabat sanguinolentum, afflicta, simul quoque tumorem sensit durum in latere sinistro supra inguina. Adhibita interea pro circumstantiarum ratione varia, tandem imposuit emplastrum efficacius discutientia atque resolutiva, quo admoeto, fornicationis quendam in regione tumoris percipit sensum, dolores mitiores afflixerunt, & post triduum primum iterum sanguis grumulosus, tum tenuis & serum non cruentum, sed magis flavescens ichorolum, ac post aliquot dies materia crassa febricula flavescens profuxit. Secellit hæc materia aliquandiu ac ægra tolerabilis decubuit, usque interius, infuso ex herbis vulnerariis cum lacte, balsamo quoque ad imitationem balsami *Locatelli* parati, auxungia carnis cum herbis traumaticis confecta & exterius injectionibus modo lenientibus, modo abstergentibus & balsamicis. Nihil minus tamen latius serpsit labes interna, pus & sanies foetida, quin non nunquam luctuosæ quasi corruptæ carnis prodierunt, vires morbi diuturnitate sensim colligæ, corpus contebuit, appetitus perit, calor heclicus increvit, urina per oedidum suppressa cathetere fuit evocanda, formæ interdictæ, accessit denum mentis alienatio, quam triduo post excepit mors, clapsis inter hæc tribus mensibus.

#### Epitaph.

Plurimi certe sunt morbi, etiam ipsius *Hippocratis* effatio, qui ex utero prodeunt. Hic etiam propter plane singularem valorem fibrarumque structuram, dispositionem & situm, ita à læpientissimo opifice est subreptus, ut non solum ad generationis negotium aptus sit, sed etiam, ut superflui & effluvi in corpore muliebri humores serosi, nec non ipsi singulos nuntium exundans sanguis, salutari plane modo & motu, per ipsum foras ejiciantur. Huius scopi maxime quadrat tanta valorum sanguiferorum copia & serpentina ac inflexus eorum progressus ac cursus, quo scilicet propter paulo tardorem & difficiliorem sanguinis & humorum per uterum transitum, eo melius insitibus & superfluis humoris fiat se & excretio. Interim propter eundem hunc difficilem ac segnem humorum communem, non secus ac in hepate, multæ stases & stagnationes & inde obstructions, indurationes, extravasationes, scirrhositates, succundissime morborum matrices, gignuntur. Quia imo quia in hoc viscere remota & oblitaculum sepe ponitur universo sanguini libero & æquali circulo; fit, ut in aliis partibus, propter majorem sanguinis motum & impetum, functiones sepe totius corporis labantur & vitium contrahant, ut in pathematibus sic dictis hysteriis clarum est ac manifestum. Multum itaque ad sanitatem mulierum refert, ut hæc pars salva, sarta & recta omnibus modis & officiis conservetur. Parva enim ibi consistens labes, magnas perturbaciones efficere potest. Clavissime id videmus, quando sub parva laborioso atque difficili, præsertim ab imprædicti obstetricum tractatione, labes in parte quadam uteri contracta fuit, que sanguis fixæ, ut ab eo tempore nunquam recte convalescant puerperæ. Atque etiam ea est natura visorum, que utero longius insident, ut denum post multos annos per-

nicialem suum effectum prodant, uti quidem etiam ex nostra morbi historia liquet. Morbus autem quo laboravit nostra recte pro cancro uteri, quæ ex scirrho denum ulcerato productus fuit, haberi debet. Sed uti ego nunquam exulceratum cancerum, cuiuscunque partis fuerit, medicamentorum ope curatum vidi; ita eo magis uteri cancer incurabilis est, quia minus commode externorum topicorum applicationem admittit. Neque etiam aliis symptomatibus incedit uteri cancer, neque alio modo interficit, quam febre succedente lenta, eodem modo ac it, qui in mamma consistit. Præter dolores quippe immenses & puridæ foetidæ varii coloris & consilientie emanantis fordes, cum sanguine sepe mixtas, totius corporis languor, prostratio virum, heclicus & consumens calor, hominis defectus & animi deliquia accedentia, vitales tandem motus extinguunt. Providendum igitur cum cura ac eo attendendum, quo apto consilio ejusmodi atrox & finestum malum arceatur. Jam ego certe non aptius ad roboranda uteri vasa & sanguinis cursum liberum & saluum tuendum, adeoque ad omnis generis morbos inde propulsiuit præsciendos, maximeque etiam ad hujusmodi scirrhositates valde suspectas amovendas, præstantius & certius novi auxilium, quam post abortum vel post partum, usum laxantium balsamicorum, uti nollat sunt & aliorum balsamicæ pilulæ, item balnea ex herbis roborantibus & nervinis, vel etiam potum aquarum mineralium cum accuratiori diæta & vitæ regimine. Quare ut medicus hæc remedia genera multum, imo plurimum ad averruncandas morbos, quæ ex puerperio oriuntur, affectiones, commendata sibi habeat, serio inculco.

#### OBSERVATIO IV.

Generosæ formæ triginta annorum, sanguine & succis plena, quem feliciter peperisset & secundine etiam produxisset integræ, subitice <sup>Febris utero-  
gena fœdora</sup> fœmina, mox sanguis luctuosus, ac tenuis taurini mæria profuxit ex utero. Hinc ad emovenda lochia, & à medicis, & à mulierculis, multa calida & pellentia exhibita fuerant medicamenta. Sed frustra, spasmi enim ac dolores ini venis, quin tertio die febris acuta & continua accesserunt, & ægram in magnum discrimen adduxerunt. Petio a me consilio, fusi, ut primo omnium vena pertunderetur in pede, ac chylus postea molliens injiceretur. Factum utrumque & dolores mitigati, febris tamen cum pulsu duro & celeri persistit. Quam vero septimo die sudor erumpit, & per quadratum ex universo corpore manaret tam largus, ut lectus & limenamina aliquoties effusa mutanda; vires quidem multum dejectæ, sed febris cum omnibus aliis symptomatibus sublata. Hinc sub sudore iuscula tantum pullorum cum succo citri data, post eum vires analeptici, tam pharmaceutici, quam dietetici relectæ, & sic sanitas rediit perfecta, ad quam confirmandam, elapsis quatuordecim diebus, uterum infuso laxante shabarbarino, cum aliis congruis nupto, expurgare consuevi.

#### Epitaph.

Nostris dignus ob id hic est casus, quod fere plane defecit lochiorum fluxus, puerpera tamen servata. Ego vero notavi, difficiliorum semper esse lochiorum effluxum in feminis, quæ

vala



post septimum diem, nostram affectam fuisse horripilatione quadam & frigore, intercurrente aestu, ac in sine crebriori lipodymia, quod procul dubio ab incipiente corruptione secundinae accidit. Necessarium autem, sicuti in omni post puerperium morbo, sic etiam in hoc fuit, utrum cum primis vis, ultimis hebdomadibus, quando vires redeunt, convenientibus laxantibus & roborantibus expurgare, non neglectis, pro circumstantiarum ratione, balneis ex herbis nervinis ac uterinis.

## OBSERVATIO VII.

*Febris uterina repetita vena sectione & sudoribus curata.*

Puerpera habitior, plethorica, exposuerat quintum post partum die corpus aures frigidiori, simulque gravi terrore propter exoriturum incendium fuerat percussa. Mox inde male habuit, lochiorum fluxus subsistit, dyspnoea accessit, dolor acutus sinistri lateris thoracis, cum tussi sicca, pulsus duro, ceteri & praecordiorum anxietate. Data mixtura diaphoretica & discutientis & postera die secta in talo vena est. His respiratio quidem facta liberior, sed fluxus lochialis non revocatus. Hinc exhibitum crebro insulam thioformae ex herba veronicae, cardui benedicti, floribus salviae & radice liquiritiae, recepta quoque mixtura modo laudata. Nil tamen profectum, pulsus mansit celer, dolor persistit, mox fuit inquietas, leviter etiam deliravit & nates aliquot guttas stillavit. Quare quum sanguine redandaret foemina, iterum in cubito vena percussa, & postea datus liquor anodynus, cum quarta tinctura bezoardicae parte & grano camphorae. Quo sudor per universum corpus viginti quatuor horas effluere manavit, post quem alvus clystere molliente subducta est. Demum rursus proclivius uteri purgamenta, & aegra ex ancipiti est laxata.

*Epistola.*

Puerperis nil certe perniciosius, quam frigida & terror. His enim spastica inferius strictura, sanguinis motus ad caput & pectus convertitur, lochiorum fluxus sistitur, pedes frigenti, alvus stringitur, caput rubet & tumet, somnus siturbulenus, delirium leve ingruit, ac nisi cito succurritur, aut phrenitis, aut lipodymiae graves, mortis prodromi, accidunt. Hoc si evenit, praestantissimum non est remedium venae sectione, etiam reiterata, & elyptericis lenientibus iterum, si necessitas urget, injectis. Post sanguinem autem missum conducit efficax sudoriferum cum regimine congruo datum. In hoc casu, ubi spastici & dolores symptomatum causam, liquor meus anodynus, qui nullatenus virtutis sedativa, cum sudorifero, uti spiritu cornu cervi succinato, aut spiritina bezoardica Bassii densa, ad sudorem movendum & motum humorum exterius vertendum, optimum fuit praesidium. Sola enim anodyna non sufficere, neque etiam sola sudorifera, sed ambo mixta & quasi ad temperamentum reducia. Ratio vero, quare frigida tam perniciosissima in puerperia inducat pathemata, est acutus sensus orificii ipsius uteri, quod ex multis fibris nervae & musculosis contextum, & quo à spastico gravius affecto, universa oeconomia motuum salutarium, tam secretorum, quam excretorum potest inverti. Nam vere scribit Hippocrates lib. II. epid. post partum os uteri saepe comorquetur & dolorem fieri juxta conam & crus, sed secta tali vena liberatur. Quem in lo-

cum Mercurialis *prae*. Bonon. commemoratur hunc in sensum: constrictioem uteri esse affectum, in quo os uteri discedat à propria regione. Tandem in nostra etiam commemorabile, quod secunda venae sectio in cubito plus efficeret, quam prima in talo. Est tamen hoc non perpetuum. Quod si enim lochia subsistunt, praestat semper in inferioribus sanguinem post pediluvium subtrahere. Sed quando sanguis jam cum impetu ad caput dehat, ad arcedam phrenitidem, factus est, in loco propinquiori impetum derivare. Mihi certe aliquot innovaverunt exempla, ubi lochia subsistentibus, purpurata febris oborta, cum gravissimis symptomatibus, lipodymis, praecordiorum anxietate, mortem ipsam minitantibus, quae tamen missio in brachio & derivatio à corde & appendis ipsi majoribus tubis sanguine, mox per DEI gratiam disculsa.

## OBSERVATIO VIII.

Illustissima persona triginta aliquot annorum, habitu corporis laxo & pleno, sanguinea, antehac optima valitudine usa, sed ab aliquot annis, ob praematurum conjugis discessum, impenso moretore alique crebris animi commotionibus affecta, multis quoque arduis negotiis distenta, minisque salubrem victum colens, aene quadringentum incidit in pectoris oppressionem & spasticam ventriculi inflationem, quae tamen interno & externo Carolinarum minorum usu abacta, ut postea belle valeret & mentium quoque succellus legitimus esset atque sufficiens. Anno autem abhinc, post superatam febrem continuam & perpeffis diuturnis catarrhis, primum urbani capiti mensium fluxus, modo maturus modo serius mensiumque cum exquisitis venis torminibus ac dorsi tensione prodire. Recruduerunt quoque pathemata spastica hypochondriaco-hysterica & accessit stilladium mucis rubicundi ex utero perpetuum, cum virium languore, appetitu prostrato, sermo turbato & plumbeo corporis aspectu. Quin, quum nuncio advenio admodum percelleretur inflante mensium periodo, praeter superiora pathemata, dolor acutus in hypogastrio obortus, ac si omnia ex imo venire vi quadam deorsum urgerentur, sedecente simul cum difficultate urina turbida seculenta, intermixtis mox cruoris lenti grumulis, mox fibris & filamentis cruentis. Pontifium dolor acerbissimus compunctioris comedit fixus in hypogastrio, supra os pubis, in circumscripta regione, magnitudine dimidii uncialis, ex qua anteriorum ad vesicam, reorsum ad sacrum os, inferius versus femora excurrit, superiora autem venter flatus fuit cum molestia obiculis. Interim ad hypochondriaco-hysterica pathemata & stomachi vium tollenda ad Carolinas iterum tendis, hildemque sub debito regimine interius atque exterius est usa. Quibus ventriculi & intestinorum dispositio morbofa emendata, uteri autem vitium, nec in decessu interce, nec melius mutatum. Idem potius persistit, & intersecto aliquo tempore, eo processit morbus, ut post ipsam in isoteria, semper mox sanguis sincerus, nunc spissior, nunc crassior, mox concretum quoddam coagulatum & quasi membranaceum secederet, difficultates tenesmodi sub mictione & caecutione essent perpetuae, per alvum mucositate globosae ac teretes, modo cum, modo sine excrementis, evacuantur, urina excreta turbida cum sedimento limoso, subrufo & cuticula caeruleaeque pinatola, pulsus maximam partem esset exilis, delatilis ac

*Divina filia  
lectorem  
superiorum  
cum gratia  
sua  
disponit.*

frequens, corporis & faciei habitus pallidus admodum, extenuatus, appetitus inconstans, nullius siccus, agrypnia propter dolores in hypogastrio exquisitos parum cessantes ferme habitualis, post partum philogotes affligentes, refrigerationes artuum saepe securrent, vires collaberentur & quandoque deficerent plane.

## Epirisus.

Ad oppugnandum gravem hunc morbum in consilium vocati medici multi, & plures fortan, quam expediebat, in diversum plane abeuntes. Aliqui enim calculum & nephritidem esse volebant, alii malum hypochondriacum, alii scorbutum, alii affectum hypochondriaco-spasmodicum hystericum, alii negatum furiosum. Ego vero, cum ordinario & celeberrimis binis medicis censui, vesicam, utrum & rectum intestinum arctius invicem connexa & in cavitate pelvis comprehensa, à sanguine & succis stagnantibus esse infarcta, eorumque vasa & glandulas relaxata parum esse nimiumque distensa, parum laesa, plane erosa atque exulcerata, & hinc prodire illum fluxum uteri perpetuum & pressuram illum etiam sub alvi & urinæ excretionem dolorem atrocem. Dedi etiam consilium, ut adhiberetur ea, quæ partes affectas à spasmo & inflammatione delendans; quæ nimium humorum affluxum ab usdem avertant eademque tam interius quam exterius mulceant, roborent atque consolident, pulveres scilicet temperantes nitrosos, pilulas balsamicas, infusa theiformia, ex melissa & millefolio, posum ordinarium Scleritanum cum quarta vini parte, epithemata & emplastra discutientia & roborantia, injectiones quoque in uterum circumspecte factas demulcentes & balsamicas, & postremo omnium saluberrimum lactis asini posum, aliquamdiu continuatum, interpositio subinde balneo tepido, ex aqua dulci cum lacte & furfuribus triticeis. Sed uti fieri solet in principibus personis, multi medici perdidit ipsas, ita heic etiam, & multa, & varia, quin non nunquam incongrua plane, usurpata sunt remedia, & quod præcipuum est in longa ejusmodi viciis rejectum, diu continuatus accommodorum medicamentorum leniorum usus. Hinc sensim, uti comperi, in pejus ruit malum, pathemata magis adauclia, corpus plane contabuit, vires exhaustæ, & vix alius eventus sperandus, quam quem in simili fore casu supra observasse II. accidisse meminimus.

## OBSERVATIO IX.

Illustris femina, triginta & trium annorum, sana & vegeta, post partum conquerebatur altero statim die de insigni ardore, dolore & tumore in interioribus vaginæ, à rudi contestatione obstetricis colli uteri interni, indulto. Exacerbata postea symptomata, accedente febrili astu & lochiis etiam non rite fluentibus, advocabatur Archiatra. In venam secare jussit in brachio. Quo quam nil levamen accederet, sed præcordiorum anxietates, cordis palitationes & inquietudo intendebantur, alvus quoque cum podum frigore stringeretur, decoctum mannatum cum cassia dedit, & spatio septem dierum, sexies misit, modo in brachio, modo pede, sanguinem. Sed quam postremo id fieret, agræ oculi corperunt obfuscati, ut candelam inferre juberet, quam dies esset quam lucidissima, quin brevi post lethali hypothyria correpta obit. Die post lectum cadaver, nil autem reperit, præter tumorem vaginæ, cui insidebat macula nigra dimidii uncias magnitudine,

ad internum uteri orificium, ac in toto vasorum systemate vix aliquot resistebat sanguinis cohaerentia.

## Epirisus.

De veritate hujus historici testis ego sum dixerat. Quilibet autem illico judicabit, temerarie & imprudenter tam crebro administratum esse venæ sectionem, à medico, qui in Gallia hoc artificium edoctus, & alias ob periculiorem variolas & pestificales febres curandi modum non est ignotus. Dolor enim & spasmus ac inflammatio facili negotio, applicato parti dolenti epithemate discutiente & dato interius blandis diaphoreticis, yonissent abigi. Nimia vero sanguinis liberatio, & lipothymia indulta, & spasmus contractus, licet unica non nocuisset venæ sectio. Nam ipsa inflammatio sufficiens & valido sanguinis impulsu discutienda, eodemque plus jussu subacta, necessario sequitur lipothymia. Igitur sicuti plures medici delinquant in eo, quod in inflammationis puerperarum affectibus sanguinis missionem repudient omnem; ita heic in excessu peccatum fuit gravior. Sed medium tenere beat.

## CAPUT XI.

De Inflammatione oculorum cum & sine febre.

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

FRæquentissima est inflammatio membranae oculi ophthalmia, tunice præteritum adnatæ, sive albuginæ, græco nomine dicta ophthalmia. Jungitur hæc cum dolore acuto, interitum & pressoriorum ardore, rubore, tumore & feri fultu ex oculis effluxu, nec non visu imminuto, vel plane perditio. Oritur autem, quando vasa arteriolarum lætalia, quæ secundum naturam pellucidum nulloque colore infectum liquorem vehunt, à sanguine valide ad caput congesto implentur, distendantur & visus sic offerunt. Hanc enim causam esse, patet experimento, quo injecto per siphonem in carotidis ramum liquore spirituloso rubicundo, adnatæ oculi tunica, per omnem sui ambitum rufescens & inflammata comparat.

## §. II.

Est autem ophthalmia, vel levior, vel gravior, vel etiam gravissima. Levior albuginæ tantum tunica insidet, nec tam late diffunditur, facilis discutitur, & oritur potissimum à causa externa leviori, imperio pulvere, appulso asperiora, plaga aut alio leniori, aut liberius admixta frigida & sudore subito represso, nec non ab administrata cataractæ depositione. Gravior, præter adnatam, etiam confines palpebras insidet totamque oculum exquisito ardore & dolore afficit, qui ad levem lucis accessum exacerbatur. Enascitur hæc maxime à causis internis, feri nempe impuritate & salutaribus excretionibus cohibitis, ac uti ego observavi, à supposito solentis maritimi sudore, à scabie, nec non tinea capitis intempestive ablata, à cohibitis menses, ulceribus & fistulis consolidatis, item repulsa rosacea gutta, & propterea agria, nec nisi internis & externis adhibitis, discedit. Gravissima demum profundior est, ad ita oculi & interioris tunica penetrat. Continuat hanc dolor acerbissimus cum febre, quandoque etiam cum delirio, sequitur suppuratio & humo-

Ophthalmia descripta  
p. 165.

Levior est,  
gravior,  
vel gravissima.

Dubio non  
vires nimis  
venæ in  
phalica.

rum effluxus, remanente coctura perfecta. Rarius tamen à causa interna, sed plerumque à contusione validiori inducitur. Vidi ego suppurationem excidentae lente erythralina, post ictum fortiter inter pugillandum oculo inflictum, vidi vero etiam talem casum à tinea capitis inveterata, subito externis siccata.

## §. III.

*Vire, vel nuda.* Deinceps alia ophthalmia est vera, alia notha, sive spuria. Verè causa maxime interna & symptomata graviora, à sanguinis in tubulis stasis, ægrius abegenda. Spuria à causa magis externa, uti pulviculo in oculos illapso, à vapore acris, ceptum & allis, symptomata hinc sunt mitiora & facilius cedit ipsa. Alia sicca est, alia humida. Illa fit à sanguine calido, cum dolore acuto, purgativo, ac nil ex oculo effluit. Hæc mitiori quidem figitur dolore & ardore, sed palpebre tumet & multum feri acris effluit, ut oculi noctu conglutinentur. Illa frequens sanguineo-cholesterica, juvenibus ac ætate tempore, hæc pueris & infantibus, nec non senibus & phlegmaticis.

## §. IV.

*Epidemia & periodica.* Datur quoque ophthalmia epidemica & periodica. Epidemica enascitur certis anni temporibus à diuturna humida & frigida aëris constitutione, post quam ophthalmicum morbum plures invadere sepius observavi ac idem testatur *Amatus Lusitanus Cens. VII. obs. LXXX.* Quæ autem certo quodam tempore, vel quotannis, vel citra æquinocium, vel singulis mensibus infestat, solennis est, quando suta sanguinis missio intermittitur, menses non rite fluunt, aut retinentur, quando hypochondriacus affectus subest, & sanguis in vasis hemorrhoidaliibus stagnans flatus & spasmos concitat in abdomine, quibus sanguis cum impetu ad caput & oculos urgetur.

## §. V.

*Ex causa ophthalmica.* Præter ea vero quæ jam de causis ophthalmiæ possum diximus; ad eandem maxime disposunt crapula, venus & vigilia immodica, lacerationes cum interperantia studiorum, ventus borealis, crebrior affectus ignis, solis, & colorum splendidorum. Idem faciunt fumi acres & metallici, alvus diu & multum adstricta, refrigerationes extremorum immoderate, imprimis mensium tempore, item præcedentes oculorum morbi, debilitatem quandam relinquentes, ophthalmia ipsa, nec non quam maxime variorum & morbillorum morbus, qui maximam ad oculorum affectus inducit dispositionem. Quando autem, uti hæud raro fit, hæmicranie, interdum etiam odontalgie, jungitur ophthalmia, serum acre scorbuticum subest, idque aliquoties contigisse novi, à podagra retro pulsa; ejusdemque materia non modo ad pericranium, sed & oculorum tunicas & peristitium maxillæ superioris delata.

## §. VI.

*Purpuræ.* Levem illam ophthalmiam facile dissipari, gravissimam in oculi suppurationem cum coctitate transire, etiam jam monui. Gravior autem est consumaciore, duras sepius per mensem & longius, ac hæud raro maculas in cornea relinquit, splendorem oculorum obfuscat, humores turbidos unicamque corneam crassiores, glaucam minisque pellucidam reddit. Semper etiam difficilis curatio in pueris, nec non in senibus, in illis ob succorum lymphaticorum abundantiam & partium ténacitatem; in his vero ob humorum impuritatem.

In medicacione ophthalmiæ tria hæc perficienda: I. sanguinis, vel etiam feri acris motus à capite derivandus; II. stasis inflammatoria discutienda; III. symptomata graviora arcenda & oculis à recidiva defendendus. Inter ea quæ humores à capite divertere, est maxime sanguinis missio, quam ex jugulari institutam mire laudat *Hildanus Cens. IV. obs. XIII.* Alii sublingualium commendant sectionem, sed ante hæc, si sanguis redundat, in brachio aut pede prius percutienda vena. Sunt qui cucullinulas cum scarificatione in nucha & pone aures suadent, & veteres appositis hirudinibus multum detulerunt. Dein divertere efficaciter pediluvia, quibus ter intra viginti quatuor horas utrisque, poro simul liberaliter infuso theiformi, scilicet discutiam esse ophthalmiam, aliquoties vidi. Serum porro acre salium valide ab oculis revocant vesicatoria, nec non si malum inveteratum sitacea; profutur quoque sinapismi, ex semine erace sacculis incluso, in vino cocto ac in nucha, vel sub axillis admoti. Præterea optime caput ab humorum affluu liberata laxantia, vel etiam pro circumstantiarum ratione purgantia. Sponte enim purgatione sepe solvi ophthalmiam notavi *Hippocrates Sect. VI. aph. XVII.* Ex *Galenus Meth. med. lib. XIII. cap. 2.* gravis testis est, nonnullos quibus oculi inflammati sola purgatione per alvum una die sanatos.

## §. II.

*Subst. diss. & caustica.* Divertens simulque discutiens egregia virtus inest diaphoreticis, quæ liberam perspirationem procurando, non modo ab oculis & capite ad corporis ambitum humores agunt, sed & succos ab acrimonia falsa repurgant. In ipsa autem parte affecta inflammatoria stasis & interna & externa discutienda est. Ex illis omnibus præferendum infusum theiforme ex radice valerianæ, liquiritiæ, floribus sambuci & semine fœniculi, quod largius potandum & ante ponam vapor ipsius consilio sub recto capite ad oculum adintraendum. Inter externa efficacis & securum hoc collyrium: Recipe aque florum sambuci, scelopariæ anæ unciam unam, camphoræ grana tria, sacchari saturi grana decem. M. quod cum lineo triplicato crebrius tepide oculis applicandum. Quando autem nimis mordens adest acrimonia, mucilaginem corticis mediæ florum tilia, item feminis cydoniorum, cum aqua rosarum, addito paxillo croci, sine, vel cum opio, adnovere expedit. De symptomatum medicacione dicetur in cautele.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

*Curatio præparati mali acrimonia.* Quia ophthalmia gravitate differt, diversæ etiam inveniendæ medendi methodus. Quam levem diximus, optime fert frigida & repellentia, ac solum albumen ovi, cum aqua rosarum & pauillo aluminis conquisitum, sufficit omnibusque aliis palmam præferit. Gravior non solis externis cedit, sed interna efficacia exigis remedia, quæ serum recementarium ab oculis divertere, salios & acres humores diluant aque contemperent, eosdemque successe per congrua emunctoria eliminant. Proficua hunc in finem infusa theiformia, serum lactis dulces, aquæ minerales, tam mariae

te, quam alcaline, temperantes & diaphoretici pulveres, non omnia laxantibus, pediluvia, nec non urgente plethora & suppreſſu cricis sanguinis evacuationibus, venæ ſectiōne tempeſtiva. In graviffima cum febre, & ubi periculum eſt, ne in ſappuratiōem tranſeant interiora, ē re eſt, ut recepta venæ ſectiō inſtituantur, aut liberaliter ſanguis ſubtrahatur, & hoc quidem omnium optime per venam ſectam jugularem. Interius pugnantium diaphoretici, demulcentibus & reſolventibus, inter quæ ſaluberrime anteceſſunt pulveres bezoardici, cinnabari, kienit niriſſi & camphorati, poſtea ſimul loco ordinari poſſunt. Exterius vero abſtinentium à collyriis refrigerantibus & potius aqua ſic dicta ſclerotaria, cum aqua marum & ſorum ſambuci, adjecto poſſibile croci & camphoræ, reſecta, cum linco duplicato admovenda.

## §. II.

Non in omni ophthalmia neceſſaria ſanguinis miſſio, ſed tantum ubi plethora eminent, venæ ſectiō aut ſcarificatiō omiſſa, vel etiam critica quædam humoris thagla intercepta. Interim ſi mali origo à ſanguinis redundantia, præſtat prius venam brachii, pedis, aut jugularem aperire, ac poſtea, ſi opus eſt, ſcarificare pone aures, vel in nucha. Stracca & veficatoria non facile applicanda in plethoricis, niſi ſoluta prius plethora, & alvo, præſertim in cæcchymicis, ſubducta. Neque, ſi veficatoria neceſſaria, ea ſemel tantum apponere ſufficit, ſed ſæpius, in locis ſenſibilioribus, ut nucha, olecrano, carpiſ manuum. Hiuc præſertur ſetaceus, cui tamen, quia & doloroſum, & moleſtum nimis, nos antepoſimus veficatorium temperatum minus, groſſi magnitudine, per mentem & longius in nucha geſſatum.

## §. III.

De purgantium uſu tenendum, corporum & naturarum diverſitati eundem eſſe accommodandum. Si res manna, tamarindinatis & tartareis expediti poſſent, non conſugendum ad acriora. Alias in torpidioribus & phlegmaticis, pilule efficiantur, ut tartareæ & de ſucco Crataegi, vel ruius noltræ balſamicæ, aliquoties porrigendæ. Diaphoretica egregii uſus, ſed diutius adhibenda, quando magis ſerum acre ſuſcipit, quam ſanguis in vizio eſt, tunc magis ſi ophthalmia ſymptomatica, aliſ morbo ſupervenerit, aut jungitur hæmorrhæia.

## §. IV.

Quemadmodum in diſſimilis oculorum morbis, ita maxime in eorum inflammatione, abſtinentum eſt, ab omnibus ſpiritibus, ſpiritu vini, vino, fumo tabaci, etiam ſtemmatoriis. Arcendi ſumi, ceparum & alii vapor, cum ignis, radiorum ſolis, lucis & colorum fulgidiorum aſpectu. Vitandus corporis exaltatus motus & nimis craſſuſque victus. Ponis fit aqua pura, vel piſtina, aut decoctum ex ſemine ſenſuali, raſura cornu cervi & hordeis. Colenda ſibricula, victu molli & temperato utendum, ac quiete in loco tenebreſco commorandum.

## §. V.

In adminiſtratione topicorum, ſive collyriorum, magna opus eſſe cauſione. Plures enim, norant etiam *ſepialia*, imperio horum uſu, cecitate affectos novimus. Scilicet ut pluriimum aut acia nimis ſunt, ex aqua calca vivæ, ſale ammoniaco, cum viſciolo albo, vel Cypro; aut nimis adſtringentia, cum alumine, ſanguine draconis, bolo Armeno, lapide calaminari, rutia & albumine ovi; aut nimis refrigerantia, quæ aquam

ſpermanis ranarum, roſarum, plantaginis, adjecto ſarum ſaccharo habent; aut nimis exſiccantia, ut quæ cum comu cervi uſu, lapide calaminari & rutia conſecta; aut etiam nimis laxantia, ex macilagine ſemini piſylli, cydoniorum, ſemine græci, tragacanthæ & baryro inſuſo. Omnia autem hæc, hec in aliis oculorum affectibus præſtanti non carſant uſu: in inflammatione tantum, præſertim ſanguinea, tantum abſt ut poſſint, ut potius nocant. Inde enim non modo peior & profundior redditur ſtaſis, ſed & ipſi humores oculorum pellucidi fiunt turbidi, ſequitur oculi tabes, corugatio, ſuſſidio, epiphora chronica, rubens, ſicca & aſpera, quin & palpebrarum exulceratio.

## §. VI.

Ego poſtus nuſtor ſum, ut ſepoſantur ropica omnia ante tertium diem, & antequam convenientia interna jam uſurpata, exceptis ſolis oculis ex paregoricis & demulcentibus compoſita. Poſtea vero omnium optima quæ ſupra commendata. Neque tamen etiam in chronica ophthalmia, ubi continuatur lymphæ ſtaſis, acris eſt ſtillicidium, inglorium eſt *Hachbeneri* medicamentum ophthalmicum, ex buryri recentis inſuſſi drachmis duobus & viſcioli albi ſcrupulo, de quo granum piſi majoris magnitudine in oculi cantum ſubinde indendum.

## §. VII.

Quando, quod ſæpius fit, ophthalmia tandem diſcedens reliquit ſpeciem macule & viſum immutatum, tunc nihil præſtantiuſ eſt axungia viperarum recenti ex Italia allata, & crebrius ad aliquot guttas oculo ſtitillata. Egrege etiam viſum turbatum & immutatum reſolvit ſal volatile ſalis ammoniaci ſiccum, oleo majoranæ imbutum & odore crebrius naribus ſuſceptum. Eſſedem virius vapor eſt ex decocto radicis valerianæ, ſorum ſambuci, ſemini ſenſuali, ad oculos, teſto prius linco capite, admiſſus. Sed opus eſt, ut hæc auxilia mature ac tempeſtive adhibeantur. Si enim inveteraverit & radices egit vitium, diſſimile ſaneſcit. Novi tamen, viſum ſere dependium ex ophthalmico morbo, linimento mercuriali genibus & poplitebus illito interpoſitico balneo aquæ dulcis, reddidit fuiſſe. Neque minus potenter viciſſos & coagulatos humores diſſolvit ac ſudorem movet, ſulphur noſtrum antimonii fixatum, equæ propter in oculorum viciuſ egregie conducit.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Juvenis ſanguineus, in paleſtra gladiatoria aſſuſus, acceperat forte inter pugilandum ictum cum gladio palſtrico, quem vocant *ex Rappieri*, in oculum ſiniſtrum, ſubſequentem mox rubore ac dolore. Ille tamen penſi hæc habens, veſperi largiter ingurgitavit vinum, rixas quoque acres cum ſodalibus movit. Inde die poſt magna tumor oculum eoque vicinas partes occupavit, cum dolore pulſatorio, cephalalgia, præcordiorum anxietate ac pulſu celeri. Chinurgus advocatus, non adeo magni momenti eſſe putans, applicuit collyrium frigidum, quo ſymptomata adeo exacerbat, ut ſonnum abigere emnem. Hinc medicus in conſilium vocatus, qui ſanguinem mittere & pedibus burſam palſo-

De venæ ſectiōne & ſcarificatione.

Purgantia & veficatoria.

Regimen & victus.

Topica medica.

Quæ poſt.

Reliquia ex ophthalmia, quæ quibusdam oculis.

Ophthalmia, quæ ex illa ſupponitur.

ris admoveat jussit. Sed incassum. Inflammatio potius abiit in suppurationem, & quinto ab inflicto ictu die, ingens puris quantitas ex oculo fluxit, quam ipsi humores sequuntur, & sic oculus cum omni visu perit. Quin postea summa cura emittendum fuit, ne hæc inflammatio & exulceratio in sphacelum degeneraret, quod etiam à medico applicatione spiritus vini camphorati cum essentia croci, & data interius tinctura bezoardica, præstitum est.

*Epitaph.*

Nunquam periculo vacat oculi inflammatio profundior, qualis exurgere solet à graviore contusione, vel vulneratione, quia ejusmodi inflammatio non facile discutitur, sed in suppurationem, non sine sphaceli ipsiusque vitæ discrimine, abiit. Nostro quidem judicio averti pœuissent gravia hæc symptoma, si ager non largiori vini posu sanguinem commovisset, majoremque ad partem jam affectam præcitasset affluxum; si dein statim post contusionem sanguis à brachio missus fuisset & cataplasma, sive facculus ex discutientibus, uti radice figilli Salomonis, ieros Florentina, rosarum rubrarum, anihos, lavendula, sambuci, chamomilla, camphora & croco in vino coctus, fuisset admodum, nec chirurgus infillatione frigidi collyrii inflammationem reddidisset deteriorem.

#### OBSERVATIO II.

*Ophthalmia perniciosa.*

Formina XLII. annorum, sanguinea, obesa, scorbutica & glandulas in collo tumefactas gerens, post retentum mensium fluxum, corripiebatur oculi sinistri dolore ac rubore, cum ejusdem lateris cephalalgia admodum vehementi. Liberata primum, annum postea semper, mense Octobris, hujus mali experta est recursum, sub quo appetentia erat prostrata, lucem ferre non poterat & seri ex oculis copiosum stillicidium semper experiebatur, quod per aliquot menses perfluebat. Pluribus alia remedia, sed incassum, & notabile erat, quod quoties sal volatile oleosum sumeret, toties soporem & torporem ingentem capitis patenter. Ut itaque hæc affectus, qui per triennium agram mirum afflicerat, radicibus extirparetur, acidulas Pyramontanas æstate sub debito regimine potabat, quibus etiam alvus & urina optime cessavit & ipsa postea à consummatio malo est liberata.

*Epitaph.*

Periodica hæc est ophthalmia, ex mensibus suppressis in plethorica formina oborta, mense maxime Octobris, quod alias solennes sunt sanguinis excretiones, commotiones & molimina ad excernendum, præsertim per hæmorrhoides. Quare impetibus hoc tempore sanguis regurgitavit ad caput, ac non tantum oculum, sed etiam membranas capitis ejusdem lateris male affecti, unde dolores. Sopor vero & torpor ille, qui ex usu salis volantis assumi accidit, inde derivandus, quod hoc remedio, congestus in capite sanguis magis rarefactus, sicque recursus ipsius per venas interceptus. Deinde notabile est, quod morbi, qui statas servat periodos, plerumque fundamentum habeant in abdominis visceribus, unde optimo consilio ad eradicandos eos, commendari solet usus aquarum medicatarum, theriacum & scillidarum, ad removenda viscerum vitia ciliatissima.

#### OBSERVATIO III.

Vir quadragenarius sanguineo-cholericus, subitum affectus est dolore oculi ac rubore, quem sibi accidisse putavit, à festuca minima ferri, sub ictu clavi cum malleo in oculum saliente, licet nihil omnino de ea in oculo compareret. Ipse igitur ad tollendam passionem oculo subinde infillavit collyrium frigidum, ex aquis ophthalmicis, quo quidem calor & ardor delinuit, sed bulbus turbidus & obfuscus comparuit ac omnis visus perit. Me hinc vocavit in auxilium, qui, ne cæcitas ingraderet perfecta, obviam ivi huc; sal volatile ammoniacum siccum, oleo majoranae imbutum, crebrius naribus admoveo, fronti & temporibus emplastrum ex gummi elemi, animæ, mastiches, olei nucis ana drachmis duabus, camphoræ & ballami Peruviani ana drachma, applicare & frequentius ac copiose bibere jussi infusum feminis fomiculi cum aqua. Quibus intra aliquot hebdomades oculus receptis splendorem & visus aciem.

*Epitaph.*

Si inflammatio subito oculum adoriatur, non injussa est causæ externæ suspicio, licet eadem non semper in conspectum veniat, quia interdum adeo subtilis, ut visum fugiat, ut fit, si à fumo acri membranae oculi male afficiuntur. Discimus vero etiam, quam nocens sit infillatio frigidi in oculum ardentem, nec non quo pacto quibusque remediis oculorum humoribus turbidis reddenda sit perspicuitas.

#### OBSERVATIO IV.

Juvenis litterarum studiis intemperantius tractans, indulserat à longo tempore nimium luctationibus, & inde sibi insignem contraxerat visus debilitatem. Post annum invasit oculos dolor gravatius pressorius, non sine ardore, adeo, ut nec lumen aspicere, nec citra molestiam legere posset, sed statim largum oculorum stillicidium experiretur. Medici suaserunt purganda, tabaci fumum, oculi cum ballamo Peruviano inunctionem externam, nec non fomiculum in nucha. Frustra tamen. Quin licet purgatio postea fortiora, decocta sanguinem purificantia, venæ sectionem in pede, pediluvia cum accurato in dieta & victu regimine adhiberent, nihil tamen aliud omnibus effectum, quam ut ventriculus debilitaretur insigniter. Alii de scarificatione administranda, fomiculo brachio inurendo & pinguedine viperarum infillanda oculo dederunt consilium, sed eodem frustraneo effecta. Adit etiam ager Pyramontanas acidulas, quibus lates & infirmitas oculi adaucta, & nubicula visui oblata, ut cataractæ plane minus effecti. Pariter in vacuum laboravit medicus, qui decoctis sanguinem purificantibus, vesicatoriis, sternutatoriis variisque collyriis pertinax malum abigere molitus est. Tandem vero solo uso pilularum mercurialium cum gummiis & extractu balsamici amaris, item infuso theismis, ex semine fomiculi, cum anatica lactis paræ, nec non externo cataplasmate, ex mica panis similaginei, cum cremore lactis, croco & floribus sambuci, allatum misero levamen, dolor pressorius discessit, remansit vero quedam visus imbecillitas.

*Ophthalmia perniciosa.*

*Epitaph.*



## Epiſiſt.

Hic oculorum affectus non quidem ad veram & exquisitam ophthalmiam referendus, sed magis ad notham, quæ ex stagnatione lymphaticorum humorum in oculis & sanguinis circuitu libero impedito, ortum trahit. Hæc autem causa, quia chirurgus & medicos laesit, adhibita præfolvere medicamenta nihil proferunt. Erant enim non tantum, ut valiculorum tenuissimorum obstructionem expedire possident. Illa vero postremo usurpata efficacia resolutoria, pilule mercuriales, nec non exterius cataplasma, accommodata unique fuerunt atque proficua. Ignis multatio & varietas medicamentorum, prodiit ut plurimum medici ignorantiam, qui, si causam morbi rite intelligit, nec adeo omnia, nec variis opus habet remediis, sed paucis, ulu probatis, sæpe simplicibus, diutius tamen usurpandis.

## OBSERVATIO V.

Viro triginta annorum inopinato paucillum fucci illius acris, quo capillorum concinnatores, capillos atro colore inficere solent, in oculum ceciderat. Hinc sequens rubor oculi & dolor acerbissimus, ut patiens nec cibum, nec somnum capere posset, ac ferendo cruciatu fere esset impar. Chirurgus in consilium vocatus, collyrium ex aqua rosarum, plantaginis & tuta, frigide infundendum suavit, hocque nihil plane prohibente, saccharum saturni in aqua rosarum solum crebrius cum laqueo dolenti oculo admoveat iussit. Sed nihil luis dolorum atrocitas mitigata, oculi porius bullus quasi decrevit & minor factus, humores turbati, & visus plane peritus, in cornea quoque tumor instar pili durus apparuit. Admotam quidem nuchæ vesicatoria, usurpata quoque purgantia, sed malum plus in decursum, quam melius veritum. Hinc chirurgus desperandus deseruit ægrum, omnemque adstantes de visu unquam recuperando dubitare ceperunt, imprimis quem præterea palpebra oculi afflicti elevari non posset, sed semper clausa & elevata manu sensus expertus esset, quin vesiculosa tumor in internis palpebræ compareret, aspectum oculi fere interceptis.

## Epiſiſt.

Ophthalmia hæc fuit gravissima, cum rupeura corneæ, oborta a fucco acris in oculum illabente, qui ardore effluxum sanguinis ac humorum tunicarumque distensionem fecit. Malum vero etiam ad grave malum consult collyrium frigide admotum, eo quod flasin & stagnationem humorum firmiorem reddidit & gravioerem. Nos sequentibus iuvimus obviam: spiritus vini camphoratus cum balsamo Peruviano, exhalato prius spiritu, cum linneo duplicato crebrius oculo fuit admotus. Alvus pilulis ex mercurio dulci, gummi ammoniaci, extracto panchymagogo Crollii, balsamo Peruviano & sale succini subducta. Adhibita pediluvia. Ponum copiose insulum theiforme ex veronica & semine fœniculi. Datum interius diazodorum *Fraxifloræ*, cum lapidibus cancorum & nitro. Ex exteris cataplasma, ex pomo allano, croco, mica panis simlaginei cum lacte coctum, oculo impositum. His dolor & rubor cum ardore sublassa, palpebræ quoque tumor discussus, sed visus, ob corneam ruptam & humores incraslatis, rediit nunquam. Ut adeo pateat, quantum damni ab improvida collyriorum applicatione fit faciendum.

## OBSERVATIO VI.

Juvenis generosa, virginis aliquot annorum, consuetudine teneræ & a scorbutica parentibus genitus, capitis dolores & narium hamorrhagias crebrius expertus, de fluxionibus etiam catarrhalibus de coryzæ sapius obnoxius, viqueq; sedentariæ, literarum amore ductus, nimium indulgens, incidit in cephalalgiam gravem, cum atroci oculorum dolore, alvo simul adstricta. Dolor hæc erat periodicus, ita ut matutino quotidie tempore cum rubore de feri falsi effluxu, præcedente refrigeratione & subsequente pulsu celeri accederet, per sex circiter horas infisteret, ac postea sensim discederet, die post rediretus, ægro interim nec in somno, nec appetitu vinum observante, nisi quod subinde post cibos ructus experiretur. Detinebat singularis hic affectus per niemem ægrum & frustra adhibita fuerunt præstidia varia, collyria, erethina, evacuantia, cephalica, nec non cucurbitulae, tandem vero à me abactus est hinc. Ter scilicet alternis diebus dedi pilularum harum viginti: recipe extracti panchymagogi Crollii, gummi ammoniaci, mercurii dulcis, cinnabaris nativæ præparatæ ana drachnam semis, extracti croci, calidiori ana grana sex. M. f. c. balsamo Peruviano pilule ex scrupulo no. XX. Una ante accessiorem hora pedes imminere iussi ad genua usque pediluvio ex aqua fluviali, cineribus clavellus imbuta, ac dum sic in balneo pedis versabatur, ad mensuram unam bibule insulum theiforme, ex herba melilite, floribus olibæ, radice valerianæ & semine fœniculi, quo factor prolectus copiosus. Vesperti exhibui per aliquot dies pulverem ex pulvere Marchionis drachma dimidia, succini, nitri puri, cinnabaris ammoniaci redissimatis ana grana octo. Oculo emetius applicare præcepti aquam Regiæ Hungariæ, cum dupla parte aquæ rosarum & camphoræ momento. Cinibus quoque quotidie inferius pulvis ex succino præparato, radice ieros Florentinæ, caryophyllis aromaticis & candidomio. Quibus per octiduum usurpatis, discessit malum, sed resiste nubecula quedam, visum quo dimmodo intracipiens, quæ tamen crebriori infusione piuguedinis viperinæ recentis, etiam sublata.

## Epiſiſt.

Febri hæc recte dici potest cephalico-ophthalmica, cujus causa fuit non tantum capitis debilitas a longo tempore contracta, verum etiam alvi ob vinam sedentariam adstrictio, qua suspensi in primis viis inducti, quibus ferofus sanguis ad caput impetuosus actus. Hinc primo omnium in medicatione fuit subducenda alvus, ac postea recte ante accessiorem pediluvia & pota iussu theiformis roboratus copioso sudor prolectus per universum corpus. Sudor enim & aucta perspiratio egregie serviant spasmis & doloribus periodice certis statisque temporibus redeuntibus discutiendis & abigendis. Deinde quoque in pertinacibus ejusmodi capitis oculorumque doloribus cinnabarina & ipsi mercurius dulcis, serum leucifens stagnans fundendo & obstructions expediendo, opem ferunt præsentissimam. Esthina vero & stermatoria, plus nocent quam prosunt, quin humores magis ad oculorum confusa convocant. Varii etiam generis collyria, nisi simul dicuntur virtute polleant, in ejusmodi oculorum: flectibus plus noxum, quam emolumentum afferre mækories observavi. Tandem ad macula oculorum & nubeculas delendas, piuguedine viperarum efficacius nihil,

P quam

quam etiam *Ludovici & Wedelii* passim miris omant enormis: habet enim acrimoniam subtilem, blande detergentem. Sed præstat in fine illam exhibere, non in principio, si ardor adhuc & dolor impensus urgent. Cæterum plura tum de ophthalmico, tum aliis oculorum affectibus commentatus sum in dissertatione, de morbo oculorum præcipuis vesla medendi ratione, nec non in *Medicina consiliaria Tom. II. Dec. IV. Cap. II.* de dolore & imbecillitate oculorum cum suffusione incipiente.

## OBSERVATIO V.

Ophthalmia a ferri crassa.

Generosus vir, sexagenarius, macilentus, victui duro & crasso falo assuetus, aliquot per annos singulis fere tribus mensibus, erysipelas in pede dextro cum horrore & vehementi dolore insultum expertus est, quod tandem in suppurationem & ulcus desit, ac per annum & ultra ipsam detinuit, postea vero à chirurgo perito consolidatum fuit. Ex eo tempore singulis fere mensibus, circa novilunium, incidit in hemicraniam dextræ lateris, quæ simul gravi dolore, profundius in orbita hærent, cum feri falsi effluxu stipata, quæ circa noctem exacerbata fuit, & paroxysmus semper invasit cum horripilatione & extremorum refrigeratione, pulsus postea alteratus & auctior factus. Malum autem solvebatur post quartum diem facta crisi, mensante sudore largiore, ægro alias etiam fæto. Mali peractis, nostro ex consilio usus est *Pyromontanus acidulus*, quas olim usurparat, hæcque cura absoluta fuit, ut loco potius ordinarii decoctum ex radice scorzonæ, chinæ, farfaparillæ, liquorinæ & palliis, biberet & singulis mensibus insulam ex manna, rhabarbaro & cremore tartari, assumeret, victum durum, salum, aromaticum vitaret, & fonsiculum etiam dextro brachio insari permitteret. Quibus remediis quomodo omni adhibita cura uteretur, liber non modo ab erysipate, sed & ab hemicrania ophthalmica degit; scabie tamen sicca pruriente dissecata, sicque septuagesimum ætatis annum excolit.

## EPIGRISI.

Ophthalmica hæc est hemicrania, in qua notabile, quod cessante erysipate & ulcere consolidato in pede dextro, materia scorbutica ad dextrum latus capitis & oculum fuerit conversa, & certis statisque periodis hunc exciaverit morbum. Quam vero scarigo tam erysipelas, quam hemicranie & ophthalmie, sit querenda in sanguinis & lymphæ dykrasia scorbutica, utque potius acidularum, decoctionum & congruorum laxantium usu, universam sanguinis & humorum massam perpurpare expediat, & hac ratione corpus potius ab ejusmodi vitis defendere, quam eadem, si adsint, abigere.

## CAPUT XII.

## De Febre Intestinalium, Inflammatoria ex Mesenterio.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Intestinum crassum inflammatur.

Intestina, tam tenuia, quam crassa, quæ membranosa fere tota, ex tunica prima a peritonæo, altera musculari, cum fibris longitudinalibus & circularibus, nervosa & vasculosa contexta,

innumeris nervorum & vasorum fureulis perfusa & exquisito sensu ac motu instructa, & multis, & gravibus morbis patens, è quibus hæud potest minus inflammatoria, qui ipsæ ex variis causis accidit. Nam atrocia illa & lethalia quandoque pathemata, quæ assumpta venena, emetica validiora & drastica purgantia excipiunt, ab inflammatione in sphaelorum transiente ortum ducunt. Vulnere ac læsione intestinalium, non aliter, quam inflammatione necant. Febres synochas & ardentes, maxime cholericas, dysentericas, item plurimas malignas, neque minus exanthematicas, imprimis variolas, lethalem sæpe inducere inflammationem, uberior testatur dissectio his morbis defunctorum. Convulsivam etiam coham, maximeque tam, quæ a podagra retrocedente, ac subsistente, ex cohibito, aut insufficienti hæmorrhoidali fluxu, sanguine inducitur, iliacam, quoque ex hernia incarcerationa, aut intestinalium convulsione, passionem, non alia ratione, quam intestinalium inflammatione, lethum inferre, in comperto est. Nihil quippe vitalibus motibus adeo est infensum, quam puredo, quæ excipit inflammationem, ac in nervosis, exquisito motu ac sensu potentibus partibus, consistit.

## §. II.

Sed quia de intestinalium inflammationibus symptomatice eisdemque complicatis febribus, jam supra actum & adhuc congruo loco agitur; nunc duntaxat pauca tradere libet, de inflammatoria febre illa intestinali, quæ præficitur ex mesenterio. Jam apud medicos in consensu est, plures morbosas affectiones, præsertim hecticas, lentas, erraticasque febres, nec non apoplematicas, in mesenterio sedem habere fixam; sed diarrhoeas, dysentericas, immo inflammatorias febres intestinalium, pulsatæ ex mesenterio, id non æque omnibus patet. Verum qui ex physiologicis novit, sanguinis progressum, in mesenterio de mesocolo, quibus annexa intestina, esse tardissimum, tum quod tunica nervoso-muculosa, sanguinem urgentibus destituantur, tum quod vena portæ, pulsu carens, recipiat sanguinem ex intestinis, & tardo fluxum vehat ad hepatis, in ultro facilius, promptam ibi esse generis stagnationem & stasim & amplissimum nidum ad excludendas materiales morborum causas. Quin quomodo intestina archus mesenterio sint connexa, ut ab ipso etiam fortiantur membranam, fibrarum quoque in intestinis articularum modo juxta *Willisium*, sit mesenterium, & vasa ac nervi utriusque sint communia magnam inter hæc partes esse communem, quoad morbosas affectiones, unique certum.

## §. III.

Ipsæ tamen febres, quæ ex mesenterio veniunt & nobis cum *Boerhaavo* audiunt mesentericæ, in duo merito genera sunt dividende, acutas scilicet & lentas, sive chronicas. Utrarumque materialis causa epulæque sedes in mesenterio, sed febrium & symptomatum generatio querenda in annexis intestinis membranaceis, ita quidem, ut acutæ & inflammatorie in tunica magis consistant & ibi tyrannidem suam exercent. Licet enim mesenterium, quod ex duplicata constat membrana, cui interpositi innascent arteriarum & venarum rami, vasa lymphatica & lactea, glandule quoque copiosæ magnitudinis variae, nec non nervorum propagines, non omni careat motu ac sensu: hic tamen admodum obscurus ac magis gravitatus est, quam acutus, qualis ad concipiendam inflammationem requiritur.

## §. IV.

Quæ acuta, sive chronica.

## §. IV.

Quare si in infimo ventre ardor, dolor cum præternaturali motus corporis æstu, pulsus celeri, virium prostratione, anxietate & inquietudine sese prodit, in intestinalibus hæc considerare, merito judicandum. Sed pro diversitate locorum, quæ hæc pathemata occupant, varias & certas affectus esse partes, merito concludendum. Scilicet si dolor acutus est supra umbilicum & sub ventriculo cum febre, nausea & vomendi conatu; indicium præbet, laborare eum coli tractum, qui infra thymachum a dextro ad sinistram latus porrigitur. Qui in dextro hypochondrio sub costis furiis urget doloris sensus, præter narum affectionem & inflammatum esse coli principium, ubi ileo committitur, arguit, quod etiam Spiegelus in defunctis reperit sphæclatum. Acuti cum febre cruciatus in sinistro latere sub lumbis, ubi plicæ musculas, in culo & mesocolo, præterim ubi peritonæo adheret, mali esse sedem produnt. Quando vero medium abdomen circa umbilicum cum febre gravius dolet, tenuis uique intestina inflammatione laborare, certum est indicium.

## §. V.

Febres etiam, quæ cum dolore, ardore, nec non tumore unitæ ventris juncunt, & tandem per alvi fluxus puridos & copiosos, vel etiam purulentos solvantur, cum magna intestinalium difficultate, ex melensterio proveniunt, nil dubii est. In cachectica & scorbutica corporibus, qui proveniunt diuturni alvi fluxus, cum levi febre, vires & corpus consumunt, & qui non tam facile curatorem recipiunt, ex eodem fonte scaturire, non sine ratione censendum. Febres quoque quæ epidemicæ & certis temporibus invadunt, cum diarrhoeis, immo croentis febilibus, non ex ingebitorum alimentorum vicio, sed ex præternaturali ætate, præterim nimis calidi & sicci, constitutione oriuntur, quales biennio abhinc ob insulam diuturnum, ad medium sæcæ assummi productum calorem, universam propemodum Germaniam sunt pervagata, simul etiam grassantes tunc intermittentes anomale, vix aliam habent originem, quam quod in melensterio multi acres & corrupti humores accumulati.

## §. VI.

Ad ingrigendas autem intestinas ejusmodi primis in viis inflammatorias febres, præcipuum momentum habet plethora, vel simplex, vel cachymica, à suppressis aut deficientibus salutariis excretionibus oborta. Promte etiam inducuntur ab intuentia per fortiora pellentia, hæmorrhoidum, mensium aut lochorum provocatio, ab usu copioso validiorum purgantium ad superandam communem alvi sticturam, nec non, uti observavi, a purgantium & emeticorum acriorum assumptione ad abortum provocandum. Idem facit intensior animi corporisque commotio, ad vicissim improvida abdominis & corporis, præsertim æstivantis, refrigeratio, potus perfrigens, & qui opulentioribus in mote est, glaciatus. His enim humorum ad interiora, maxime quæ primam regionem, convocatur pariter, partem ungetur affluxus, omniumque facillime ad eas ferat partes, quæ imbeciliores, quibusque ob defectum sufficientis potentie mortis insulaticæ, vel perpendicularæ vadium tractum, difficilior est humorum progressus, quarum in numero possimum sunt melensterium, mesocolon & omentum. Quando igitur his in sedibus, maximeque intestinalium tunica cum melensterio continetur, inclusus hæret sanguis, aut humor acris,

Frid Hofmanni Oper. Tom. II.

febrem ciet inflammatoriam continuam, alvi vero, cruentus etiam fluxus, vel ex nimium amplius, vel ex eis plane & dispersis vasorum oculis, succedit. Hæc enim omnia ita omnino evenire uberius testatur dissecchio ejusmodi febribus interfectorum, in quibus Spiegelus de fructu, cap. VIII. sic invenisse prodidit: venas hepatis majores sanguine vacuas, ventriculi tunica interiori leviori cryspelate inflammata, venas mesaraicas & quæ ad ventriculum atque omentum tendunt distensas & crassiori sanguine fartas, omentum consummum & semiputrum factum, durum quoque pancreas & ductum choleodochum obstruunt. Idem confirmat Chiffrieri notabilis observatio, de melensterii inflammatione cum dolore umbilici.

## §. VII.

Merito tamen consistentes his in sedibus inflammationes in leviores & graves sunt distinguendæ. Leviores exterioribus tantum intestinalium tunicis, quæ maxime membranarum melensterii productiones, insident; graves vero alius ipsam intestinalium substantiam pervadunt, eorumdemque interiora ipsique glandulas tangunt, idemque & profundiores sunt & ampliores. Quæ superficiem occupant, non tantum periculi alunt, sed adhibito laudabili regimine & congrua medicina, intra quartum, vel septimum diem, discutuntur. Quæ autem interiora profundius obident, nisi per diarrhoeam aut sanguinis fluxum solvantur, longius extrahuntur, quin in suppurationem ruunt & in hæcticam defluunt. Ex melensterio quoque ibique stagnantibus corruptis humoribus prodeunt hæmorrhagæ sic dictæ sive intermittentes febres, quæ ex continua inflammatoria & intermittente tertiana sunt compositæ, periculorum expertes. Notæ hæc jam fuerant Hippocrati & Galeno, eadem nunc ac accurate Spiegelus peculiari libello descripsit. Discrepant tamen à nostris in eo, quod quotidie circa vespertam, & alterius quoque diebus, levi accedente horrore, ingravescant, juncunt hæc autem abdominis dolorem ventriculi nausæ, & quandoque ad aliquot hebdomades protrahantur, & non nunquam in febrim lentam & hæcticam concedant. Sed quia de harum oris, defectu de curatione jam supra Sect. I. cap. V. uberius actum, hæc plura dicere non attinet.

# CURATIO CUM CAUTELIS ET OBSERVATIONIBUS CLINICIS.

## §. I.

Quum febres ventriculi & intestinalium inflammationis, propter horum summam sensibilitatem & conspirantem cum nobilissimis corporis partibus, atrocissimis symptomatibus stipatæ & labinde funestas sint; medentis cogitationem & intentionem quam maxime ad eas averendas dirigere expedit. Igitur krio & cum cura sibi committis medicus inculcet, ut vident omnia quæ superius §. VI. ad eadem ingrigendas facere diximus. Et quia præterea sæpius observavi, febribus ardentibus, item biliosis, dysentericis, nec non puerperarum acutis cum purpura, a vehementi ira, vel gravi terrore, accessisse mox gravem melensterii inflammationem & sphæclationem, ac ledium brevi tempore annullæ, inprimis necessarium, ut occasiones fevorum affectum fideli consilio & morbo prævidens artifex peritus.

## §. II.

Si vero jam adest inflammatoria stasis sanguinis, omnibus modis lenior est discutienda & gravior

Difficilis  
Aperta in  
arteria &  
gravidæ.

Multiplex  
foramen.

In cura  
sanguinis  
affluens  
dilatandum.

avertenda. Primus igitur recte medentis erit sopor, ut vehementiorem sanguinis motum ad partem affectam impediat & hac ratione gravio- rem inflammationem avertat. Obtenitur id com- modissime in plethorici sanguinis missione, ex venis in superioribus partibus, amplo facis forame- nato facto, perussis, quæ in colica convulsiva, in diarrhoea & dysenteria, in acuta dolore venarum sedis, gravior inflammatione utique potest averti. Post scilicet venam divertunt sanguinis affluxum a loco affecto pediluvia temperata, sed diutius usurpata, quæ solvendo & laxando stric- tas inferiorum partium fibras, adfluxum ad pe- des divertunt & invitant.

## §. III.

Ad discutiendam dein inflammationem istam, serviant quæ maxime, quæ dolores & spasmos sedant, anaphrodisia, humectantia & blanda clastica, clysteres ex oleosis, gelatinosis & dul- cibibus compositi, item exterius regionis abdominis applicata epithermata, facculi, vesicæ oleis expres- sis, vel pinguedinibus arimantium, aut decoctis emollientibus replete, pinguedo cati sylvestris, mixta præsertim cum camphora & paulillo olei hyoscyami. Interne vero discutiunt & inflamma- tionem arcent quæ opime diaphoretica cum anodynis mixta, pauca, sed crebriori dosi per ali- quot dies data, quæ inter eminet spiritus carmi- nativus de tribus, aut spiritus tartari, vel bezoar- dicus *Buglii*, cum liquore anodyni minerali, aut spiritui niri dulci mixtus. Item mixturæ ex aqua cardui benedicti, florum sambuci, aceto sambu- ci, rob sambuci, antimoniæ diaphoretico, nitro & syrupo papaveris rhodæo consociatæ, nec non pulveres temperantes nirosi & diaphoretici, cum momento camphoræ & paulillo laudani. Neque minus huc spectat catus pilularum *Wildeganianarum* usus. Quæ remedia, cum prudentia, certo tempore & ordine usurpata, etiam in passione illa & spastica tunicarum intestinalium corru- gatione, quam Græci chordasum vocarunt, le- nimen afferunt exoptatissimum.

## §. IV.

In dolore, spasmò & febri inflammationis in- testinorum, omnia acris stimulantia, etiam salu- na majori copia data, calida, & purgantia, ceu perniciosissima vitanda. Est culpandus hic com- munitus & detestabilis practico- rum error, qui alvo peronacius adstricta, unum post alterum purgans ingerant, eoque malum non tantum exacerbant, verum etiam reddunt mortiferum. Neque etiam clysteribus admiscenda salia acris stimulantia, ut sal gemmæ, vel purgantia, ut extractum colo- cynthis, vel catholiconis, sed ex foliis emollienti- bus sunt parandi. Sic enim balnei aut sicut in- flar, crassa eluunt intestina, & in colo tenuibus circumvoluto contenta, ceu vesica decocto emol- liente plena, eadem mulcent, fovent & laxant. Parari igitur possunt ex folio lacte, mixto cum ni- tro, vel aqua pluviali, nupta cum syrupo viola- rum, de althæa *Fernelii*, rosarum solutivo, aut melle mercuriali. Hæc tamen circa usum clyste- rum addenda observatio, ut bichoris fere quovis, si necessitas urgeat, injiciamus, & paulo diutius retineantur, quod maxime necessarium, si flatus per os eruantur, & crebre adsint vomitiones.

## §. V.

Præmissa, si vasorum plenitudo urget, venæ sectione, laxata etiam clysteribus admixtis alvo, si anxio dolor cedere nolit; optimo consilio, sine omni metu, anodynum ex opio proficit, quo tormina conquiescunt & spasmi ac sudor sequitur.

Sed quiescent & sedata dolorum & spasmorum cum febre ferocia, si summa debilitas corporis vi- rumque imbecillitas excipit, non ulterius insti- tuendum superius laudatis diluentibus, laxantibus & humectantibus, sed potius nervina & roboran- tia in usum vocanda, quorum in numero sunt ma- xime essentia aut spiritus succini, aut mastiches, extracta cum hoc essentia chaccarillæ, elixir nos- trum stomachicæ, pulvis solaris Zollessii, balsa- mum nostrum vite cum liquore anodyno mix- tum, quod balsamum etiam exterius applicatum, levamen insignè affert, tonum refuticando & ro- bur addendo.

## §. VI.

Quando vero inflammationes & dolores alvi fluxu simplici, aut cruento, maxime hæmorrhoi- dali, aut etiam, uti quandoque accidit, purulen- to solvantur, laxantia leniora, ut pallule rhubar- barinæ & clysteres, item insula theiformis, ex speciebus traumaticis & sanguinem purificantibus, scabiosa, veronica, alchymilla, agrimonia, consolida Sarsenica & summatibus millefolii confecta & cum lacte porta, nec non pulveres ro- borantes, ex cornu cervi philosophici preparato, ulso, corne calcinillæ & succino, in usum vo- cantur commodissime.

## §. VII.

Quum diarrhoea & dysenteria epidemica sæpe cum vehementi inflammatoria febre invadat pa- ventia corpora, non instructuosa est medico- practica quæstio: an conducatur venæ sectio? Com- munitis quidem medicorum, *Hippocratis* & *Galenii* auctoritate confirmata est sententia: alvo flu- ente, non esse subrahendum sanguinem, ne vi- res prosterantur. Neque etiam ego aliter sentio, quam per ipsam experientiam consistit, multos, tam hæmorrhæicos, quam dysenterico alvi fluxu la- borantes sanari, sine sanguinis missione; sed jam de illa tantum dysenteria fermo est, quæ cum febre acuta, præsertim synocha inflammatoria, con- juncta. In hac utilem & necessariam esse venæ sectionem, affirmo utique. Notum enim est, non facile quæpiam alvi fluxu, etiam dysenterico diuturno perire, nisi ex inflammatione & spheca- latione intestinorum, quam semper antecedit & comitatur vehemens acuta febris, ex pulsi magno & celeri, ardore & siccitate corporis, lingue ariditate, & ingenti inquietudine cognoscenda. Ex licet omni dysenteria lenta quardam & levis, quasi erysipelacea inflammatio, sit juncta; mul- tum tamen hæc ipsa differt a synocha inflamma- toria febre, in qua proficiam esse sanguinis sub- tractionem assevero, & confirmantes habeo vi- ros amplissima & felicissima praxi celeberrimos. Sane *Sydenhamus* in opp. cordate affirmat pag. 111. se semper fere curam dysentericæ cum venæ sectione auspiciari, quin pag. 115. seq. habet exem- plum dysentericæ rebelli, quæ nullis plene reme- diis cedere voluit, sed sola venæ sectione tandem curata. Idem hoc auxilium mire dilaudat *Riverius*, qui *Crit. II. obs. LVII.* idem facit, se in dysenteria cum febre acuta, octavo demum die, cum fructu quinque sanguinis uncias & brachii ve- næ extraxisse, & *obs. LXIV.* testatur, se venæ sectionem, in muliere dysenterica cum febre graviter decumbente, septimo & octavo die cum emolu- mento insinuisse. Amant quoque *Luftmann* *Crit. II. obs. XLVIII.* consignavit exemplum Abbatis, sanguine pleui & multo vini potui dedit dysen- terici & simul acutæ febri curantem, qui secta vena longe melius habuit, & prociis subsecutus remediis, plenarie convalescit. Maxime omnium vera mulus

alvi fluxu.  
inter spem  
virescentis  
paulatim.

synocha  
mille in  
dysenteria  
cum febre  
milla.

Et Boli  
dysenteria  
da.

Vitanda  
acris, ad-  
hibenda  
commota  
dysenteria  
da.

In di-  
verse  
opiate,  
post cum  
referantur  
propterea.

est in adstruenda hujus remedia singulari utilitate *Bovallio*, qui *cap. IV.* plus quam decem exempla narrat, ubi nil ex omni remediis censu, præter venæ sectionem, amulit levamen.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Pæssio  
inflammatoria  
iliaca  
minuta,  
curata.*

Formina, quadragenaria major, ob vinam sedentariam & tacitum animi profundum cum iracundia mororem pathematibus colicis & spasmoticis affecta, quoniam onisisset vere hoc fuerant quotannis circa æquinoctium verale & autumnale sanguinis mitionem, Martio mense vehementi commota fuerat ira ad tremorem usque omnium corporis partium, & suiferat postea vesperti pilulas confectas purgantes. Hinc noctem transiit inquietam, & die post nulla post pilulas si qua purgatio, alvus postea firmissime clausa mansit, & ipsa æstus anxietatibus circa præcordia atque etiam eructationibus continuis ex ore fuit afflicta, & vomitu fere omnia assumpta cum medicamentis, tum alimenta rejecta. Iniectus ad alvum aperientum clyster domelicus, qui per horam retentus, integer, nec fluitibus, nec fletibus stipatus rediit, etiam sine symptomatum levamento. Adhibuit decoctum mannatum cum saccharo aperitibus & rhubarbo, sed mox vomitu rejectum. Medicus etiam ordinarius, flatus in causa esse putans, dedit carminativa: irrita tamen fuerunt omnia. Perfluerunt potius symptomata, firma nempe alvi adstrictio, eructatio crebra & vomitus, magna debilitas, inappetentia & somni defectus, tantum quod circa vespertim gravius, circa auroras vero minus affligeret, cum crebrior ad urinam stimulo, quæ tamen parca & turbida eminebat. Terio die vocatus ego, mox venam pedis secare jussi, & emissis, sine ulla virium lætitudine, mox vasa sanguine valde dilata, octo uncias, mox meliuscule habuit ægra, consequenter anxietates æstus & eructationes, ut etiam extra lectum versari poterit. Nihil minus pertinet ventris adstrictio & doloris tensive abdominis in hypochondrio dextro persistit. Iniectus igitur clyster & datur pilule nostræ balsamicæ polychrestæ, sed his nihil emouit; quin quæ ad septimum usque diem alius esset obliqua, & eructationes, & anxietates nocturnæ æstus, cum febricula & dorsi doloribus redierunt. Hinc deum consilium dedi, ut singulis tribus horis clyster injiceretur, ex aquæ pluvialis uncias XII. syrupti de althæa *Fernelii* uncia semis, niri puri drachma, & abdomini vesica emolliente decocto plena admoveatur. Sic clysteres injecti semper per horam retinebantur, & postquam quartus esset infusus, flatus primum elisi, per aliquot dies coerciti, & post sextum secesserunt etiam faeces, quibus evacuatis, ructus atque anxietates in abdomine discesserunt, mictio etiam melius successit. Interius vero simul data essentia carminativa, cum liquore anodyno ad unciam dimidiam remissa, instillatis laudan liquidi guttis XV. inductus somnus, sequutus sudor ex cute ante sicca & arida, pulsus ante durus & celer mollior factus, & urinæ fluxus liber rediit. Hoc facto, ex mixtura remedium laudanum, & sola essentia cum liquore anodyno oblata, donec perfectæ convalesceret.

## EPILOGUS

Affectio hæc fuit spasmotico-inflammatoria intestinalium, illamini minitans passionem. A sanguine quippe, ob venæ sectionem consuetam emissam, nimium redundante, & vehemente ira,

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

quæ insensibilissima intestinis, nec non purgant afflamo, ortum duxit hæc passio, & inde etiam omnia quæ prægebantur symptomata derivanda. Ad discutiendam itaque inflammatoriam flammam & avertebam hujus pedissequam, pullionem mittere mei, ante omnia necessarium duxi, ut sanguinis quantitas subtraheretur, quod etiam quoddam amulit levamen. Sed quoniam spasmus intestina inferiora sustinet stringens adhuc permaneret, consilium cepi, quod me tali in casu non desitum, de clysteribus pure demulcentibus & humeflantibus, paullo frequentius injiciendis, qui quasi instillar balnei interni sunt, fibras spasmus contractas temperato humido relaxantes, cui fini etiam extarius appositæ emollientia remedium. Interius vero discutiens, sive carminativum, cum blando anodyno permiscui, & ita spasmus solvi, discussa sanguinis & humorum inflammatoria flamma, & excretiones per alvum & cutem adstrictæ, jam liberæ & largæ liqueæ.

## OBSERVATIO II.

Præfectus militum, natione Gallus, quadragenarium ætatis annum jam emens, vir constitutionis alias robustæ, vitæ genus laboriosum & agile cum quieto & sedentario permixtum, interea largiter comedens & liberaliter quoque vinum Gallicum, quod vocant Pontack, bibens, hinc primum alvi factus adstrictior & somni inquietior, post aliquod tempus vero, dolorem lancinatorium in abdomine toto atque etiam lumbari regione expertus est, cum phlogosi, eructatione, pullum celerrime & deficiente somno. Medicus paucis diebus colicum dolorem esse judicans, carminativa fortiora & spirituosiora elixiria, cum oleis destillatis remissa, una cum clysteribus usquevis, sed inde potius exasperata symptomata, & febre, & inquiete, & dolorum facibus magis accensæ. A me quam peteret opem, & conquereretur de dolore tensive circa os sacrum acuto, quævisi: an hæmorrhoidalis antea fuerit obnoxius fluxus? respondit: semel tantum ante aliquot annos, sed parciore, cum prægressu humorum & ossis sacri doloribus. Hinc quoniam venæ sectionem penitus respiceret, mutavi tantum medendi methodum, & loco calidorum, interne dedi humectantia & refrigerantia, pulveres nempe diaphoretico-nitrosos, demulcentes & lenientes clysteres, copiosius applicare jussi, largiter simul & temperate calida summa potant. Levata inde quidem fuerunt symptomata, nihil minus remansit dolor in imo ventre, ab osse sacro ad inguina scilicet extendens lancinatorius, multum incommodi faciens. Exhibui igitur essentiam carminativam, cum liquore anodyno & paucillo laudan opiato, ad mulcendos dolores, & postea dedi drachmam magnæ albe cum drachma dimidia niri in decocto mannato, inde alvus aliquoties soluta, & quod mirabile, larga portio sanguinis auri, corrupti, foridæ excreta, ita ut intra sex dies aliquot libras secederet, remittentibus inde mox doloribus & sævis pathematibus. Denique affusæ pilule nostræ balsamicæ, cum pulvere roborante, cujus basis chaccarille cortex & faccinum. Hinc perfectæ convalescit, sed verente anno, adulto jam vere, eandem in morbum cum gravissimis doloribus & intolerandis cruciatibus ad dorsum usque excurrentibus, febre & purpura rubra stipata, idem hic vir est correptus. Data iterum omnia, quæ levando huic malo antea cum fructu adhibita, admodum etiam in dorso scarricato, sed frustra. Sexta enim hebdomade, ob somnum plane

plane deficientem, viribus omnibus exutus, vivere desit.

*Epiſtola.*

Sine ullo dubio vir hic, animo & corpore fortis, intestinoorum inflammatione petiit. Causa huius morbi in flatum plethoricum, sine sanguinis missione & omnia simul consueta corporis exercitatione, & in potum copiosum vini rubri, quod astrictivum est virtutis, coniicienda, quam alias sanguine & humoribus abundantes, qui corpus nec laetis labore exercent, nec sanguinem mittunt, si alvum paulo largius laxitatem habent, liberi permanere possunt a passionibus ex plethora oriundis. Si vera haec etiam excreto deficit, grave immixtis sanatis periculum. Prior morbus fluxu sanguinis nigri & coagulati, procul dubio in vena haemorrhoidali intima congesti, feliciter suis solutus, id quod etiam in aliis similibus casibus notavi. Contra ea vidi etiam, quod febres intestinales, cum doloribus & spasmodicis abdominis, aliquot jam per hebdomadas durantes, subinde post excreta puridum & corruptum nigrum sanguinem, brevi rursu sequuta fuerit. Ceterum non possum non hoc loco hanc observationem de vini rubri Gallici, austri potissimum, nota, adicere, quod ipsius frequentiori potui causa multorum morboorum, quibus Galli inter nos degentes occumbant, merito sit adicienda.

OBSERVATIO III.

*Diarrhoea purulenta cum febre intermittenſe.*

Ruricola habitior & quadrages, prius cum ventre ceciderat in truncum acuminatum, & ex eo exquiriens in abdomine, paulo supra umbilicum, perforaverat dolorem, cum animi deliquio, accessu simul, praecedente horripilatione & refrigeratione, febrem. Post aliquot dies sanguinolentam & saniosam per superius & inferius os eiecit materiam multam, eoque facto, siliis febri, remansit tamen lingua & appetitus prostrato. Quam vero elapsa circiter quatuordecim diebus, domesticis laboribus manum admovere inciperet, denovo recruduit abdominis dolor, animi defectione, horrore & febre stipans, cum extremorum frigido sudore, ut animam agere videretur. Sequuta tamen diarrhoea cruenta & saniosa per aliquot dies, symptomata iterum mitiora facta ac remiserunt. Sed vix septem dierum fuerunt induciae, quibus circumactis, priora repeterunt symptomata cum febre, obortoque alvi fluxu, conquieverunt rursu. Imploratum igitur meum auxilium, qui crebriorem decocti avenacei usum, cum humana, vel eum axungia, butyro rubro potabili & balsamo Locatelli, huius, ac demum decocto herbarum vulnerariarum, alchymillae, agrimoniae, faniculae, pyrolae, fragariae, veronicae, florum bellidis, hyperici aliorumque, ex cerevisia, agrum hunc ad sanitatem, fortunante Deo, traieci.

*Epiſtola.*

Celebris ille halorum Medicus Benedictus Syllavius, ab actibus suis in mesenterio succedere notavit, & notatu imprimis digna, quae habet Gen. II. obs. LXXXVI. ubi ita scribit: *meretricum saepe hi frutia multorum excrementorum. At obisti sensus quoniam si, diarrhoeas tolerat assueti, & in quoniam raro subintravit suppuratione, qualis frequentissime à nos fuerunt observata, quae tandem subsidebant per delictum purulentum, iterum statim temporibus recurrebant, & oblatum de novo per similes delictum, non raro curantur, ita ut imposuerit quibusdam, illas pro dysenteria habendae. In*

nostro certe agro, lapsu illo in stuporem acuminatum, qualis forsitan fuit excurrere infra ventriculum supra umbilicum colliectus, quo inductus dolor, rapit etiam in consensum reliquis intestinis, febrem ciens, & per spasmodicam simul strictionem in mesenterii canalibus sanguinem detinens, qui in purulentam pusulae corruptionem abiit, petripit & alvo exit. Latius vero semper serpsit malum & relicta iterumque commota vicina ardens materia, mali recursum iterato induxit, donec acrimonia ipsius obstrueretur, abscessus abstergeretur, demumque post semel iterum, in robusto & agresti corpore consolidationem recipere.

OBSERVATIO IV.

*Febriſ intermittenſe.*

Adolescens quindecim annorum, constitutione tener, indole alacris, Bacchanalium tempore, quondam duas, vel tres, succas & durissimas spiras ingererat, sub pile lusu cum sodalibus admodum incaluerat, & postea, depositis vestibus, ad fluvii ripam confidens, corpus refrigerarat. Inde paulo post atrocis venenis incurrit tormina, cum alvi perinatam ad aliquot dies strictionem. Implorato nostro auxilio, causam à liberali esu spirarum & corporis refrigeratione duximus, inprimis quam in sinistro abdominis latere eminentia quadam dura tactui sese offerret. Suavissimus igitur ut alvus ocyus duceatur clystere emolliente, quo bis alvus stercore dura dimissa, postea dedimus infusum nostrum utinam manatum, cum oleo amygdalino, quo sex sedes motae, tumor subsidere & dolorum vehementia remittere visa. Sed sequenti die tormina cum duro in hypogastrio tumore redierunt, licet flatus multi eliderentur; accessit praeternaturalis aestus, cum pulsum celentate, somnus inquietus, oris siccitas & ardor, cum lenta punita. Hinc fauces gargarizantibus elae & ad aethum inflammatorum restituendum oblata emulso ex lemnibus quaerunt frigidis, cum pulvere tursio, interposito ad perspirationem secundandam, liquoris anodynii, cum momento bezoardici remissi uti. Aethus autem incrementum, ani os adeo viri oculum, ut clystera rubulum plane non admitteret & a crebriori molimine potius laderetur, circa vespere tamen calor semper fuit intensior ad mediam noctem durans. Adhibuimus pulveres nitrosos cum siliabus digestivis, quibus calor mitigatus & feybala cum flantibus multa emota. Sic decubuit ad duodecimum usque diem, quo tanta anxietas, inquietudo, aestus & virium pectura accidit, ut morti videretur proximus, conquegens maxime de atroci dolore in abdomine, ibi potissimum, ubi diutius illa consistebat. Ignem ad arrendam fanelam inflammationem potio discutiens ex aqua cardui benedicti, cum aceto, thalbarbaro, ammonio diaphoretico & cancorum lapidibus data, quae aliquoties usurpata, dolores complacuit & sudor proleceus. Imposita etiam ad emolliendum maiorem vesica decoctio emolliente plena & clysteres aliquot injecti atque retenti. Hinc ingens stercoreum copia quondam secessit cum emolumento & iussu felice ad sanitatem factus est transitus.

*Epiſtola.*

Febri hac recte dici possit iliaca inflammatoria. In illo enim confecta obstructio, ab eis spirarum flocarum contracta, quae dolorificum ipsum non tantum in abdomine, sed ad ipsam etiam vesicam excurrere fecit, ut urina per totum morbi decursum parca & rubicunda tantum cum dolore secederet. Non tam prompte autem ex tenui hoc

hoc intestino materiam terream obstruentem evertere licet, quia chylires eo non perfringunt, & nec laxantia sufficiunt, nec potius diluunt. Hinc morbus diutius protrahitur. Interea ut intestinum inflammatio asceretur, data mixtura de injuncta diaphoretis continetur. Quia tamen intestinum inflammatio quam facile retrahitur, hinc fassi demum, ut non modo exactam servaret dietam, ad omnia contrahentibus abstineret, animum tranquillum haberet, nec frigidum, sed calidum potum assumeret, verum etiam ad tempus aliquod mane insulsum accommodum thesaurum potaret in lecto, & sudorem blandum expectaret.

## CAPUT XIII.

## De Febris Lentis &amp; Hæcticis.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*Hæctica & lenta quæ dicuntur.*  
Hæctica febris apud Hippocratem, Aretæum veterisque Græcos quæ ac Latinos, ipsumque Coracium Celsum, mentio nulla. Neque lente febris nomen in primorum medicinarum paratum monumentis obviat, sed Celsus demum lentarum curationem primus tradidit. Quæ autem postea lente & hæctica appellata, prisca, longa, tabida, marasmi audiunt. Hippocrates in primis lentas febres *Scilicet P. aph. 64.* vocat febres longas, istique affectos non valde multum febrientes, hæctico more sub nomine tabis passim describit. Nostro tempore lente & hæctica febres dicuntur eæ, quæ diuturnæ sunt & continuæ, licet leniori ac remittente, æstu præternaturali, succos corporis consumendo, tabem inferunt viresque debilitant.

## §. II.

*Diffusio & differentia & symptomata.*  
Magna tamen harum est varietas & differentia, ratione vehementiæ symptomatum & periculi. Strictè nimirum lente febres appellantur illæ, quæ minora habent symptomata, æstum leniorem, sudorem sub forma largum, pulsum potius summum & ante meridiem naturalem, non tantam appetitus & virium prostrationem, corporisque acuitatem & urinam lividescens neque etiam tantum periculi. In hæctica autem æstus est continuus, pulsus semper durus, debilis, celer, licet post cibum & vesperti calor, celeritas atque durities increfant, cutis cum lingua sicca, dura & arida, genæ ruberæ, totum corpus est imbecillum flaccidum, somnus reficiens nullus, urina rubicunda, inferius cum sedimento, superius cum cuticula coerulescente pinguedinosa, corpus contabescit totum, adeo ut ossa ubique prominant. Deinceps emittens est lentarum & hæcticarum differentia respectu utriusque causæ. In illis enim vitium magis in fluidis & incipiente mala dispositione solida cupiedum parit; in his vero solida potius potantur & ipsa jam labes, aut magna corruptela, adest visceris. Hinc lente etiam accommodata medicina adhuc possunt abigi earumque causæ viaci, sed hæctica difficillime, vel plane non sanationem recipiunt. Hæctica quippe sunt magis symptomatice & gravibus ulcerationibus, vomica, abscessibus & viscerum corruptionibus superveniunt. Unde qui phthisi, abscessu, vomica aut exulceratione pulmonum, melenaria, renum, uteri, & gravibus suppurationibus in internis, musculis quoque abdominis latentibus, qui cancro genitalium, mammarum, uteri, item qui cachexia & hydropo, ex induratione, scir-

rho, corruptione & putredine hepatis, lenis, omnem, pancreatis & glandularum melenarum, monentur, hæctica febres pereunt omnes, §. III.

Causa caloris continui his in febribus, nulla alia, quam humor quidam corruptus & putridus. Hic enim temperatæ & naturali sanguinis & humorum vitalium mixtionis penitus est adversus, eandemque intestino alieno motu turbat, intrinsecus atque dissolvit. Idem hic puris succus infusus plane ac alienus est nervorum fluido nervosique partibus, & sensibiles has atque mortices partes ad intensiorem contractionem, quæ febri essentiam absolvit, extimulat. Igitur quo uberius & diuturnius putridorum & corruptorum ejusmodi succorum ex viscerum vitio infusibilis est & novellus, eo vehementior febris, eoque graviora symptomata.

## §. IV.

*Lente ex debilitata corporis.*  
Lente, five diuturnæ, minores tamen febres, sunt frequentissimæ, neque ulli ætati, aut temperamento, sexui, regioni, aut loco parcent. Ongo vero illarum & causa varia est; sæpiusque ex morbo præcedente & corpus cum viribus nimium debilitante. Experientiæ scilicet testimonio in comperto est, quæ per conuatales intermittebant, vel continuas, item variolas & morbillis, effusiora sanguinis per uterum, anum & nares profluvia, per diuturnam alvi fluxum, simplicem æque ac dysentericam, nec non nimiam salivationem, gonorrhœam & fluxorem album diuturnum vires perdidit, qui etiam moerore, curis, vigiliis, & assiduis lucubrationibus & studiorum intemperantia, nec non per famem, labores graves & continuos, veneris etiam crebris exercitiis, corporis robur attriverunt & exhauserunt, in lætantes & longas ejusmodi febres delabi facillime. Ratio hujus generationis in proclivi: corpora his persulsa benignis sanguinis & alibilis humoris succis, sufficientem etiam purissimæ & nobilissimæ nervorum liquidæ copia destituuntur, post morbum autem ciborum impensior succedit appetentia, facci tamen intus ingestorum dissolutioni servientes spiritibus, fermentescibiles & salivales, nec non biliosi, a naturali habitu descivere, nec adeo sunt efficaces, vigor quoque motus persilicet in ventriculo & canali intestinum languidus est: hinc ciborum liberalis ingestorum non exacta perficitur solutio, concoctio atque digestio, sed succos chylosus crassus, rudis minusque subtilis elaboratur, ad sanguinis massam truditur, & aliena sua natura fluidorum crasin temperatam & solidorum aequabilem naturalem motum turbat atque pervertit.

## §. V.

*Ex sup-pressionibus ex-cessibus.*  
Deinceps perperne & uberius confirmatæ observationis est, tabificas ejusmodi febres succedere quam maxime evacuationibus criticis solennibus deficientibus, aut perperam cohibitis. Nihil certe frequentius, quam ut ii, quibus vacuaciones acutos mtebros & febres solventes, sudor imprimis & aucta perspiratio, interceptæ, vel non sufficienter successerint, quibus sudor consuetus nocturnus siccatus, quibus frimiculi & ulcera antiqua consolidata, quibus catarrhi alique per uterum cæteraque organa deflusiones acres repulsi, quibus alvi fluxus cohibitus intempestive, febribus lentis postea tabescant. Sic enim vitiosi, impuri, inutilis ac superflui humores, cum salute foras excremendi, intus manent, vitales temperatos & nutritios succos inquinant, ut omnis horum massa reddatur intemperata, omnique in corpore motus ac functiones vitium capiant.

## §. VI.

*Hæmorrhæ-  
rum &  
entericæ  
aut fræ-  
guis ali-  
dus mesen-  
terium.*

Porro lentarum & hæticarum febrium nidum frequentissime esse in mesenterio, & ratione, & experientia habemus confirmatum. Recte enim jam pridem notavit *Fernelius* & ex eo *Sermertus*, in nulla universi corporis parte, tam plurimos, lætentes etiam morbos, lentas febres, errantes, diarrhæas, choleras, scorbuto, melancholiam, cachexiam, hydropem, intermittentes quoque consumaces, figure sedem, quam in mesenterio. Causa autem magna huius ad morbos concipiendos dispositionis nulla alia, quam quia tardus & impeditus admodum per viscum hoc succorum & sanguinis progressus, stagnationes & stases facillime inducens. Nam vena portæ, pulsus destituta, sanguinem ex mesenterio reducere recipit, ac vice arteriæ fungens, eundem vehit ad hepar, quod quam lentius fiat, in mæstria etiam vas potitur obex, gignunt stagnationes, infarctus, quin quandoque plane extravasationes. Dein hæmorrhoidales venæ, ob perpendicularem ductum & longius ab exitu remotum finem, tarde admodum reducere sanguinem ad portæ venam, ac facit, ut in sapia in mesocolo, crassus intestinis, maxime recto, stagnet vasque cum dolore distendat. Ipso in mesenterio propter nervosum & muscularum tunicarum defectum, sanguinis cursus plane non adiuvatur & urgetur, sed vasa potius inter duplicatam cellulosam membranam discurrentia, pinguedine recta, per ætæ relaxatione, tunc sunt remissiora, & facile cedunt sanguini in ipsis accumulato. Chylosa etiam lymphæ dum per lactiferos sic dictos canales innumeros, in capillares tubulos circa glandulas sitos, impeditius ferunt, ac in ipsis glandulis ab existimatis venulis recipiunt, his in angustis facile hæret, nec ea propter mirum, mesenterii glandulas sipe infarci, intumescere, indurari ac in scirrhus plane degenerare.

## §. VII.

*Propter  
humorem  
in eo stagnan-  
tem & impu-  
rum.*

Licet autem ipse hæc tardior succorum per mesenterii compagem meatus, hanc corporis præter utilitatem, ut humorum de mole & interperie peccantium excretioni serviat, & quidem sanguinis per hæmorrhoides internas, ac irotarum, mucidarum ac fermentescibilium sordium, per intestinorum glandulas innumeras; eandem tamen ob causam accidit, ut quævis sere humorum, tam quoad quantitatem & qualitatem, quam etiam motum vitia, in mesenterium redierint, idque male efficiant. Inprimis plethora nullam partem gravius lædit, quam mesenterium, ac nimia distensione, vasorum totum & elatere debilitando, ibi stagnat, & cum detrimento plus iusto coacervatur. Nam quo major in mesenterio sanguinis stagnatio, eo magis increfcit ipsius impuritas; quo maior vero sanguinis & lymphæ sordities, eo magis functiones in corpore labefactantur, nutritio imminuitur, vires elonguefcunt, intestinus in hæc motus augetur, arteriæ cum corde ad auctiorem & celeritorem motum extimulantur & sic febres accenduntur.

## §. VIII.

*A suppres-  
sione mens-  
trui, hæ-  
morrhoidi-  
bus, diarr-  
hæis &  
febris.*

Quæ quam ita sint, ratio est in proclivi, quare suppressio, aut deficiat mensium in feminis fluxu, notante *Hippocrate* lib. II. prædict. §. XIII. periculose tabida, id est, hætica febris, emergat, chlorosis, aut febris icterice alba nomine, passim obvia; quare puto in viris subsistente, insufficiente, aut ipsa præposita cobibito hæmorrhoidum subsistit, nota eundem *Hippocratem* Sect. VI. aph. XII. tales, id est, hætica, generetur. Cur etiam, ut supra jam meminimus, conspiciat sub-

taribus alvi profluvii, quibus sipe acuti morbi finiuntur, & quæ crebro cruce certis anni temporibus naturæ beneficio succedunt, tabida & periculose febres subsistant. Neque minus causæ pæstet, cur tam periculosum, & ad chronicas, lentas etiam & hæticas febres ingendendas nihil sit apertius, quam, si quando, in corporibus præsertim plethoricis, cacochymicis item & hypochondriacis, ubi jam admodum tarda & impedita sanguinis per mesenterium & connexa viscera progressus, intempestive adstringentibus, etiam famigeratissimo chinæ cortice sistunt febres intermittentes, quæ in his salutem ad superfluum consumptionem, vasorum obstructions experientias & librum sanguinis progressum reddendum habent facultatem, quibusque oppressis, infarctis in mesenterii tubulis, oppilationes, humorum stagnatio & impuritas increfcunt, ac postea liberale chronicis & assiduis febribus aliisque morboris passionibus pabulum præbent.

## §. IX.

Neque vero tantum ad stagnationes & obstructions dispositum admodum est mesenterium, verum etiam ad suppuraciones & abscessus concipiendos, quibus perpetuo sipe accedit interperies quædam febrilis. Sunt quidem plures, qui autumant, inflammationes, sine quibus nulla suppuratio, nullusque abscessus fieri possit, in mesenterio non habere locum, quia in eo nec dolor acutus, nec ardor, perpetui inflammationis comites, observantur. Verum essentialis inflammationis ratio non ardore & dolore continetur, sed flasi humoris sanguinei in vasis alienis facta, & stases potius productum est dolor cum ardore, si illa in parte nervosa, exquisitoria sensus consistit. Stases autem & extravasationes humorum cum oriundis inde suppuracionibus, perquam commode fieri possunt in mesenterio, ob decubitem ibi solentem, dum vel ex arteriolarum nimis ramulis sanguis sape cum impetu in laterales tubulos, & quorum numero etiam pinguedinosi, urgetur, vel eorum ipsa hæc lateralia vascula ab impetu humorum rumpuntur, & contentum liquidum effundunt. Ne dicam, nullius facilius & commodius posse gigni, quam in partibus pinguedine uberius obiectis, eo quod ipsa pinguedo, motu intestino & putredo humoris extravasati, promississime in liquamen saniosum convertitur.

## §. X.

Ignis frequentior, ut vulgo putatur, in mesenterio sunt abscessus, cognoscendi ex febre continua hætica, dolore gravato & fixo in abdomine & saniose materię per alvum cum intestinorum dolore & ardore excretionē: quæ autem ad ingigendos hos faciunt, notavi multa. Observavi frequentius, in plethorica, plethonico-cacochymica, nec non hypochondriacis, a vehementi ira, præsertim paulo ante, vel post cibum, tanto magis accedente simul refrigeratione, corpus languore fuisse affectum universali, & successisse febres tabificas cœmofas. Idem vidi in iis, quæ validioribus pellentibus abortum procurare intenderunt, quando medici mensium suppressione laborantes calidis & sordioribus emmenagogis, vel purgantibus exceperunt, nec non in viris, quando hæmorrhoidalem fluxum, natura repugnantem minusque proclivi, alicuius alicuique calidis pellentibus emovere fuerunt conati. Novi etiam, crebrius sordioris esse has ex abscessu febres, in sanguine & succis plenis, a vehementiori infusa corporis ad validum ulque sudorem exercitatione, subsequente postea improvida refrigeratione corporis

*Abscessus  
in mesen-  
terio san-  
guinis  
causa.*

*Excessus  
in eo cau-  
sa.*



poris totius, ac imprimis pedum, quorum ingens cum abdomine confusio.

XL

Nimirum tam valido & vehementi, five per animi affectus, five pharmaca, five corporis exercitacionem, motu, sanguis in minima melenferia vascula cum impetu urgetur, flagrat ibi, in alienis rubulis vadit, subfistit ibi aque corrumperitur. Hinc prima origo suppuracionis, que do- propter motum intestinum latius serpit, vicina ardet, exedit, ut ex abscellu minori fiat major, ampla cavitas magnaque apoplema. Quin ma- teria faniosa corrupta, a venis reforescit & fan- guinis infusata, sepe etiam ad alia emanatoria, glandulas tracheales, nec non retes, fertur. Unde amplo in melenferio apoplemati junctur sepe urinae fluxus purulentus, vel etiam spumum purulentum, integris renibus salvoque pulmone. Quandoque ipsum pus pondeus quo per melenferii poros defunditur ad intestina connexa, cavum ipsorum subit sicque alvo expurgatur. Quandoque etiam apoplema majus debilitat tandem, & praecedente horrore, interdum etiam rigore, cum superveniente aestu, perrupto involucri, effunditur. Quod si in loco excretionis minus idoneo contingit, atrocia quae colica tormina oboriuntur, si in cavum abdominis, interna que tangit, male afficit, rotas & gangraenam usdem inducit, si vero in intestinorum cavitatem, pus copiosum simul & felum per alvum exit. De qua puris excretionis historiam consignavit *Horslius lib. XIV. obs. XXV. & XXVI. Bartholinus Cent. II. epist. 23. Cent. VII. epist. pag. 400. Cent. IV. hist. pag. 66. nec non Tulpius lib. II. obs. XXXV.*

§. XII.

Febres autem quæ grandes ejusmodi abſceſſus in meſenterio atque ac aliis viſceribus, hepate, pancreate, renibus veſica & utero, committuntur ſequuntur, non ſunt miſes & lenes, ſed graves, quæ vires & ſuccos corpora conſumunt omnes, heſtica lethales. Quæ quomodo incipiunt, decurrant & quibus ſymptomatum ſpeciem, accurate & ex vtro proditiſt Hippocrates lib. de intern. efficit pag. 209. febris, iniquis, dubia invadere incipit & rigor, & dolent peſtera ad deſum, alijquando etiam tuſſis premixta acuta, & exſpiratio ſolivem multum liquidam & falſam. Et hæc quidam in principio morbi; in progreſſu vero corpus attenuatur, crueris exceſſus. Hæc enim intumeſcunt & pedes, & ungues contrahuntur, ex humore autem tenuis & debilis eſt, & ſaures velut lumenſe impuſit, & velut per arundinem ſibilat, & forſiter ſuis per totum morbum, & multa impotentia corpus habet. Hic quomodo ſic habuerit, in anno corruptus male perit, verum ſtudium quam maxime adhibere oportet ac reſcribere.

€ XIII.

Aliud lentæ remissionis & occultæ febris gen-  
na est infansibus familiarissimum. Jungitur cum  
inflata abdominis tumore, superius marcorum  
nulli siccæ, virium prostratione, inappetentia &  
vago æstu, post cibum fumum & circa vespe-  
ram ingravescente, alvo interdum adstricta, in-  
terdum etiam fluxa, alba multa & mucida di-  
mittente. Nascitur hæc febris quandoque a foc-  
co chylo nimis viciado, tenaci, villorum intes-  
tinorum rariacæ & minima lactæorum oscula  
obstruente, quo inflatio intestinorum & chylo-  
diarrhœa inducitur. Non nunquam ortum trahit  
à lymphæ nimis viciado, lentæ, quæ glandulas  
melenterii facit, obstruit, ac magis magniquæ  
cunctulata minam distendit. Occasionaliter auren-

ad gliscientes has febres potissimum prebent nimia infanum voracitas, cibi qui chyllum reddunt crallum, defectus tenuis potus, corporique refrigeratio. Quæ vero consueperunt, tunc detinent corpora, nec sicuti omnes, quæ ex obstructione & glandularum nervæ sublimitate nimia expansione oboriuntur febres, periculo carent, sed infanti convenienti medicina occurrat cum vivendi ratione, infantes perimunt, in ventis soli morem plerumque glandula mesenterii ingentis magnitudinis, insectis inflatis & tumidis ac pulmonibus corruptis.

#### §. XIV.

Quæ sensibus solentis atque fatalis est hæctica, græco nomine dicitur *μαρμαίσις*. In hac lente assensum corpus, appetitus perit, vires sensum consumuntur, ossa carne privantur, ut inflat sceleris pelle induti appareant, ac siccum est, saliva glutinosa, exterior cutis cortex friget, riget, atrefcit, interiora ardent, pellicula duras & frequenter est, somnus parvus & non sufficiens, spiritus ægre ducitur, vox rauca fit, lingua exulsa & salivæ lenta pituita incrustata sapre, ac omnia hæc sensumque ingravescunt, donec post dimidium circiter anni vitam ipsam eripiant. Generatio senilis hujus hæctica fit nobis concipiendi videtur: senilis ex vitæ motus expertem & excretionem in omnibus emundatoriis, præsertim subcucaneo, languescens, alvumque tardiozem, omniâ etiam ex vano metu haud raro suætam sanguinis missionem, ingenem subinde sanguinis & impurorum humorum sibi colligunt copiam; hac præsentè, tardissima fit succorum per mesenterium, omentum, per hepatis quoque, licetnæ & intestina progressus, vasa larciumur, obstruuntur, sequuntur indurationes & demum corruptiones, febrium chronicarum pernicialium generices parasitismæ.

## L. XV.

Demum lentæ febris species adhuc supersunt, parum ab auctoribus notata, quæ nobis stomachica audit et intestinalis. Ortum hæc ducit a tunicarum ventriculi et intestinorum erosione, inducta vel ab acris bilioso mordaci succo, in ipso corpore genito, vel ab assumptis acrioribus, rosi-va virtute præditis. Testatur enim experientia, post choleram, vel vchementer iracundiam, item dysentericum morbum, longas sæpe et exitiales succrescere febres. Venena assumpta stomachum cum intestinis corrodere, novit nemo non. De exulcerato stomacho a forti purgante, cum maximo post cibum dolore, testis est *Bartholinus Cent. VI. hist. 21*. Idem faciunt emetica impro-vidè data, ipsâ salâ amara purgantia, vel sili-berialius exquisitis fermentibus oblata, vel un-impudens quorundam consilium, acidulis indus-ahuc et sumta. Sed difficulter hæc febres, quoad-vas causâ et sedem, dignoscuntur, et difficulter-etiâ sanationem admittunt. Nam levis atque frigida ex parte intestinorum tunica, omne quod assu-untur, præteritum falsedine, aut severe amittunt, vel etiam mole nimium eadem male afficit, ipsamque, eructationes, tormina facit, alvus interdum laxa, interdum stricta est, corpus simul tabesit, mox horror et rigor, mox alvus, mox frigida, mox ca-liquida sudor tenet, cum ceteri pulsi ipsaque sym-ptomata certis horis periodice redeunt et ingraves-unt, quin nulli congruis remediis tempestive oc-currant. morbus hic longus et capitalis.

## 6. XVI.

Centrum lentæ hæc & tabificæ febres ex longis  
sunt morbis, qui ægros diu tenent, & pro consuetu-

Germania  
Paris &  
deserfing.

**Symptoms:**  
**Weakness**

*Lowell In-*  
*formation.*

2. *Abstract* (summary of the paper)

3. *பெரியகிழை*  
4. *காது*  
5. *பெரியகிழை*  
6. *காது*  
7. *பெரியகிழை*  
8. *காது*

**Signs In-**  
**stalling of**  
**transac-**  
**tion.**

ione corporis laborantis, modo citius, modo ferius finem fortissimum. Lenta quidem, si tempestive occurrat, medicamentum admittit, hectica autem raro & perfecta plene non. Mortis autem indicium in lethali hectica fuerit, pulsuum continuo celeres & debiles ictus, summa appetitus & virium quoque maxima prostratio, ita, ut laborantes nec corpus movere, nec in situ erecto permanere possint, facies Hippocratica, urina paucæ, tubra, vel oleaginosa, sine sibilis emissæ, capillorum desolium, alvi fluxus, sudor effusus & pedum tumor, quippe quæ de succorum partim consumptione, partim colloquativa dissolutione testimonium præbent. Qui denique moriuntur, magnam & insuperabilem viscerum labem post mortem dissecti exhibent. Quandoque enim adsunt ingentes cum amplis cavitatibus in visceribus abscessus, in pulmone, mesenterio, hepate & pancreate, quandoque etiam in utero, ventriculo, renibus, nec non membranis peritonei, abscessus deprehenduntur, vel magni tumores scirrhi, aut ingentes magnitudinis leucomata; quandoque etiam tumores glandularum in mesenterio, vel tubercula & vomice in pulmonibus, hepatis quoque lentis, vel pancreatis scirrhecentiæ, omenti & intestinorum sphacelationes & purium humorum extravasationes in intricatis offenduntur.

#### CURATIO CUM CAUTELIS ET OBSERVATIONIBUS CLINICIS.

##### §. I.

Quædam  
lenta ex  
evacuati-  
one.

Quam variaz tabularum febrium sint cause, variaz sedes, hæc primo omnium recte investigandæ & illidem medicatio accommodanda. Igaur quando ex prava digestionē & inde enatis crudis ac lentis primarum viarum succis, post morbos subris ejulmodi succrescit, cognoscenda ex languore, interno aestu, continua ad sudandum proclivitate, in volis manuum præsertim ac plantis pedum, eo dirigenda curatio, ut prima regio a lordibus, febribus somne, liberetur. Perfici possit hoc per circumstantiarum ratione leni emetico, quale præbet radix hypocistidis, in pulvere, aut infuso data, & testatur *Lindanus*, se uno vomitorio & hinc cum elixir proprietatis, intra quatuor dies, curasse hecticam. Si autem præstat materiam viciatam per os inferius educere simulque digestionē prospicere, ex usu sunt salsæ sic dicta neutra, digestiva, terra scilicet foliata tartari, nitrum ammoniacum, sal polychrestum, tartarus vitriolatus, solutio oculorum cancri, sal Sedlicense, vel sola, vel cum dimidia parte pulveris rhabarbari electi mixta, parcius, sed crebrius, cum sufficienti vehiculo obata. Eandem blande laxantem simulque egregie roborantem virtutem habent pilule balsamicæ, à *Becherio* dictæ, quæ ea propter uniter aliquoties, sed minori dosi, deglutienda. Expurgato autem alimentari canali, subiungenda postea anæpica & stomachica, inter quæ præ reliquis commendamus essentiam chucarillæ & geniane rubræ, item elixir nostrum stomachale cum spiritui salis, aut niri dulcis, paulo ante cibum quotidie sumenda, non neglecto comodo corporis motu & salubri potu, præcipuo harum scilicet prædicto.

##### §. II.

Deest enim  
huius & in  
his præ-  
paratis.

Eadem hæc medendi methodus apprimè est accommodata in principio illarum gliscientium febrium, quæ post intemperive oppressas inter-

mitentes, aut suffocatas præposuere harum tedi-divas obrepunt. Si autem hæc nolit discedere lenta febris, optimum est consilium ut ipsa prior febris resuscitetur, tanto magis si suspicio est infarctus viscerum & mesenterii, ut in cachecticis & hypochondriacis. Præca jam hæc sunt *Celsi* methodus, quam lib. III. cap. IX. describit: in hoc casu cura Medici esse debet, ut morbum moveat. Fortasse enim curatio opportunitas fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adjectum, corpus ejus pertrahendum est, quoniam interdum fit evenit, ut horror oriantur & sit innum quoddam novum morbum. At, pergit, si diu frigus est, & ideo, & jactatio corporis, non alienum est, ut ipsa febre dare mulsi teris aut quatuor cyathos, vel cum cito vinum bene delatum. Interdum enim sapere eo febris, & mox ex oris calor, sive & præca saluti mala, & spiritus remissio, neque ea curatio, ostendit. Sed, concludit, est circumspiciendum, & notare interdum, & augere morbum. & febres accendere, quia curatio, ubi id, quod est non recipit, possit recipere id, quod sumum est. Nam sicut auctor sanguinis circulus in intermissione sepius optima est medicina causæ, quæ febrem elicit: sic etiam letæ febris causam, quæ frequentissime latibulis partium solidarum, glandulis maxime & vasculis mesentericis, altius infixæ est, expedit ac tollit. Hinc si intermissionibus, præsertim quotidianæ succedit lenta febris, intermissio mox revocata, quod aliquoties à veno boreali, aspero, lumbis liberior admittit, accedisse novi, calore intensior reddens, adhibitis simul congruis incidentibus & temperantibus remediis, morbum cum tempore ex voto solvit.

##### §. III.

Quando in plethorico-cachecticis, cachecticis & scorbuticis, a mensium, vel hæmorrhoidum obstrukione, nimia voracitate, mala dieta, potuum spiritalium abusu corporisque refrigeratione, leuæscens hæc febres oboriuntur, alia medendi via ineunda, & usurpanda ea, quæ viscera sanguinea, hepar, lien, mesenterium, vasa & glandulas ab obstrukione liberant & expeditum sanguinis & humorum per abdominis, & maxime mesenterii vasa, commoneant procurant. Hunc in finem spectant virtutis aquarum mineralium, tam acidularum, quam thermalium, usus. Ipse ego longo usu & experientia edoctus scribo, quod ad eradicandos ejulmodi lentos morbos, non certius deprehenderim auxilium, fontibus medicatis, & idem proprio exemplo confirmat *Theoria obstruat. pag. 173*. Præ reliquis autem hoc nomine salubritatis laudem ferunt, ex thermis Emfensæ & Wisbadensæ, ex acidulis Schwalbacensæ & Scherzanæ. Opus tamen est, ut debito ordine, tempore ac dosi usurpentur, junctis simul idoneis remediis, quæ digestionem juvant, spurcis corporis succis temperatam balsamicam indolem reddunt, & sordium & corpore egressum fecundant. Ubi autem salubritatem harum aquarum copia non datur, surroganda alia similia virtutis prædicta. Ego quidem loco illarum sæpe cum fructu usus sum decocto ex jussulo carnis vitulinæ tenui, cum radice cichorei, foniculi, asparagi, graminis, tartaxaci & scorzonæ, ita quidem, ut quoties ejus mensuram, per aliquot hebdomades bibere jussim, & ante ponam assument medicamentum martiale probe elaboratum, cujus generis suggerit tinctura martialis, cum succo pomorum Bordeauxianorum, cydoniorum, nec non aurantium, item tinctura martis Zeyfferi, ex virgulo martis & terra foliata tartari cum liquoris vini extracta,

Ex vobis  
hypocistidis  
destruat.

nec

nec non structura florum falsa ammoniaci martijam, qui cum haemate parantur, si cum spiritu vini purissimo, vel melius corticibus aurantiorum imbuto, in tincturam auri coloris, saporia gratissimi, virtutis praestantissimae extrahantur. Sed necessarium est, ut non sub horum, tum aquarum medicamentum sit, exquisita vivendi ratio & salubris dieta accedat, simulque corporis motus imperetur.

## §. IV.

Quae ab intestinorum & ventriculi erosione accidit febris lenta tabescens, omnia acris falsa, acida, stimulantia, cum venenum experitur, ipsum Rhenanum vinum propter acorem non fert, dulcia etiam & fermentescibilia, nec non omnes difficilius solutioris cibi eandem exacerbant. Curatio vero difficillima est, nec alia poscit, quam demulcentia & roborantia. Ego aliquoties decoctum lactis cum ligno salsatis & calcariis cortice, aut floribus chamomillae & summitatibus millefolii, quotidie ad mensuram potum proficisse novi. Tum quoque radices althaeae & juncula cum oryza & lacte decocta proficiunt, tragacantha etiam cum aqua menthae soluta. Conducunt praeterea clysters ex lacte, cum vitello ovi, terebinthina de melle, aut alii emollientes cum syrupo de althaea. *Fervida*. Et quando humi simul in abdomine urgent, egregie eodem demulcent pulule nobis usitae, antispasmodice, ex extracto chamomillae, millefolii, oleo nucis, extracto croci & calorei.

## §. V.

Porro gliscens illa & tabifica febris, quae oritur in iis, qui diuturno animi affectu, moerore, cura, nimio labore, vigilia, inedia, crebro & intensivo venere exercitio, a nimia salivatione, a fluore albo & gonorrhoea diuturna, ab effusio alvi profusiva, lactatione nimia, ulceribus multum purulenta materiae plorantibus, & vires & roscidos succos perdidierunt, omnia sanguinem commoventia & alvum stimulantia, motum etiam corporis impensiores, alimenta quoque gravis materiei nimisque, ut ita dicam, substantica, interdici, & potius potius animi corporisque quietem, alimenta & medicamenta temperatiora, quae acrimoniam demulcent, calorem resingunt, blande nutriunt & vires labascentes refocillant. Horum in numero sunt emulsiones ex amygdalis dulcibus, pinea, semibus quatuor frigida majoribus, cum decocto comu cervi, aqua rosarum & cinamomi cydoniata confectae, lac asinum & muliebre solum, aut caprillum, vel vaccinum decoctum, cum succo cancerum fluviantium, jus pulli cum pefana mixtum, prafana decocta cum cancris fluviantibus, vel etiam refudibus nemoreosa consula, ex commendatione potissimum *Amari Lufiani Cent. II. curat. LIII.* qui curavit hecticum per pulorum gallinaceorum refudibus nemoralibus saginatorum usum & lactis asini potum. Sunt qui ostres commendat, si lotachus sit, & confirmat hoc notarii exemplo virginis vicium annorum ex pulmonum labe hectica, *Lindanus, supra Harvianum*, quae longo & diuturno ostrearum esu, tam perfecte convalescit, ut ostrea diu supervivere & octo liberos peperit. Vinum non nisi modice concedatur, & hoc sicut Neccarinum, aut Mosellanum, lymphatum. Accedat quoque motio corporis lenis, per gestationes & deambulationem lentam.

## §. VI.

Quando harum februm origo est à nimio abusu

liquorum inebriantium, vini, spiritus vini, aquarum sic dictarum vitæ, vini adusti, cerevisiae quoque spirituosioris, cum corporis contabescencia; tunc pariter vincunt omnia calascientia, spiritus, analeptica, incensia pinum & stonica, cum cerevisiae potu, sed usurper loco potus decoctum avenaceum, methodo Loweriana paratum, ex avena, radice cichorei, floribus pagaveris rixados & paucillo nitri ammoniaci. Tum quoque unile serum lactis, cum paucillo nitri, item lac eburyratum, quibus multum tribuant *Pieri de febr. part. II. pag. 61.* & *Barbatus de sang. & ferro pag. 110.* His etiam conducunt potus cum hordeo & cichoreo, & affirmat *Borellus Cent. IV. obs. 89.* multos hecticos, tantum non desperatos, solo frequenter hordeaceo vinum usui, fuisse resistentes. Neque minus locum habere possunt emulsionis diluiores, ac gelatinosa, cum succo citri condita.

## §. VII.

Si, uti frequenter incidit, harum februm origo in taeniosis est à subita mesium suppressione, per potum frigidum, refrigerationem, aut terrorem, oxyssime vena pedis aperienda & decoctum quoddam resolvens, ex radice cichorei, herba lanchi, floribus bellidis minoris & sambuci propianum, & omittenda omnia fortiora emmenagoga. Quod si autem progata ab hac causa lenta vel hectica febris diu jam corpus teneat & servare affixit, nevisquam fuscenda, sed potius interlicenda est sanguinis missio, quia vires nimium debiles. Ubi etiam à parvo tempore mentes plane subsisterent & vera jam adesset hectica, cum atrophis, tussi, diarrhoea, pectoris difficultate, universalis corporis languore & calore lento consensiente, non de remedia mentis pellentibus cogitandum, sed symptomata contrarium potius indicant. Idem tenendum de illa tabifica debilitante febre, quae à fluxu haemorrhoidalibus renent, ab obstructo, orum ducit. Tum quippe, si vires & succi jam consummi, imprudens plane est molimen, ad evomendum fluxum evacuantibus & pellentibus alioquin, aut sanguinis missione in pede uti. Observavi enim fluxum sanguinem valde fluidum & coccineis coloris fuisse evocatum, sed paulo post febrem accensum, vires prostratas, somnum turbatum, & citius, quam quidem fieri potuisset, ad lethalem eventum morbum promovem.

## §. VIII.

Quae sanibus solentis hectica, marasmius dicta, melius avertitur, quam curatur. Quam vero attempta observatione consistit, semper duplici ex causa tabifica febre implicari, scilicet vel ex plethora, sive potius sanguine & crasso, & copioso, abdominis viscera ipsamque mesenterium infarciens & obstruens, vel ex cacochymia, si copia feri impuri falsi, ob insufficientem ipsius, maxime per cutem, excretionem, ad binas has causas dirigenda utique cura praeservatoria. Quod si itaque senex vine quicquid & fedentatius addictus, appetitu tamen ciborum adhuc valens, omnia, vel plane neglecta fuerit alias sanguinis missione, vel emanante etiam spontanea sanguinis excretionem, & metus est, ne incurrit in lentum, continuum, debilitantem & tabeficientem calorem; id quam maxime agendum incipio, ut sanguinis plenitudinem temperativa vere sectione maneat, diluiores salubres potus largius bibere fudeat, abstinentiam à cibis nimium nutritivis ac convenientem corporis motum serin iniquat. Si vero serum succi impius & à blanda naturali indole alienis particulis scaturis; nihil aliud agendum,

dum, quam ut per clementissima laxantia, rhabarbarina, mannata & passulata, sordes, spurcietiam humorum foventes, evocentur & temperati roscidi succi rursus ingenerentur, per usum gelatinarum & lacticina, maximeque asinum lac, quod unique senili aetati, ob demulcentem, aperientem & leniter evacuantem facultatem, est saluberrimum.

## §. IX.

*Talis infansum medicatio.*

Quae infanti ac puerili aetati infesta est ac fuscella knesicna febris, relinquatur potissimum post variolas & morbillos, venire simul tumefacto, superioribus autem penis conebescensibus & in dissectis eadem defunctis, mesenterium plerumque tumoribus duris, scirrhosis & steatorum, praefertim circa venas quae ad portam excurrunt, & pulmones tuberculis ac vomicitis conspicitur obfessi. In hac consuetudine etiam mali insulsum averere, quam praesens abigere, quod nunquam non irritum esse solet atque frustraneum. Quae autem tabes in infantibus ortum trahit ex nimia voracitate, sive adhiagia & refrigeratione corporis, medicamentum admittit. Ego quidem non certius in hac novi auxilium, quam externe usum balneorum aquae dulcis temperaturae, aliquandiu continuatum, & interne, ad expedienda obstructions glandularum, venarum mesaraicarum & lactearum, ceteriorem, sed parciorem usum liquoris salini asperitivi, ex sale tartari, nitro, arcani duplicato, aequali potiore mixtis, & addita diutius parte salis ammoniaci, cervisiae potandae infillat.

## §. X.

*Lactis inf.*

In omni autem hectica haud possetra eo tendit indicatio, ut roscidum illud humidum, quod calor continuus in modo ex sanguine, sed etiam ex tubulis solidis, & una cum hoc ipsam tandem carnem atque pi. gredinem absumit, reficiatur. Huic scopo quam maxime satisfaciunt, alimenta medicinalia simul virtute instructa, inter quae palmam fert lac ipsum. Nam priscum est Hippocratis *Sect. V. aph. 64.* praecceptum: *convalescit lac exhibere tabescentibus, non valde multum febricitantibus, & in febrilibus longis, & debilibus, & praeter rationem consentit.* Optimum humanum, quod promissum consumum restituit humidum & calorem exstinguit, idque ex mamillis suctum, ne ab aere victur, quo hecticam curam esse, fidem facit *Forestus lib. V. obs. X.* Asinum minus quidem nutrit, sed magis refrigerat, calorem temperat, abstergit, & aperit, ejusque praestabilem facultatem laudat storifice *Bollani lib. I. pag. 236.* integro consilio pro illustri Principe, qui prout erat ad tabem. *Cardanus fol. 323.* dubium non est, aut, *quoniam tota sanatur tabidi consistit in additione lactis asini.* Et *Aretaeus lib. II. de cur. acut.* tabis curam ita insinuat suadet: *si quis in tabem prostratus, tunc terendum tempus non est quare & victu tenui, sed eger ad moriens tradendus, per gestationes, frictiones & lavera, quae una resistunt a morte vindicta, augere & revertere.* Proprimodum vero etiam est *lac, maxime mulieris, qui proximae peperit puerumque nutrit.* Hi namque amaro, ut nuper in lucem editi puera, egerat. Si lactis humani copia non datur, asina, quae non pridem peperit, lac accipio. *Tenuis est enim & fluxile hu infanti lac.* Efficacius nam capillum & vaccinum, sed gravior est malumque calidior substantia habet, ideoque ne ventriculum male afficiat, corrigendum.

## §. XI.

Mibi praeter reliquis placuit Hippocratis lacte *Qua methodo fit uterendi methodo, quam de interna aff. pag. 209.* sic tradidit: *dauidum est & lac asinum coctum ad suppurationem, tibus etiam crudum lac bubulum, tertia aqua melle parte admixtum, per XLV. dies, aduixio etiam origano.* Recte enim gravis hic auctor passim ad lenem purgationem commendat lac asinum coctum, quia sal ipsi inest dulce instat sacchari, abstergens leniter & laxans, quod coctione destitit humido, concentratur magis. Origano autem adiacere praecipit procul dubio ad corroborandum stomachum & genus nervosum debilitatum. Ego, si lac asinum haberi nequit, ita lactis curam adornare soleo, ut praecipiam primum, per duos, vel tres dies mane potare lac, & vacuis herbis recentibus & appropriatis passis multum, ad libram unam, in qua uncia mannae, aut sacchari rosati, vel conservae rosarum dissoluta. Dein mesuram solus lactis, quotidie bibere praecipio, addendo sacchari unciam dimidiam & rursi drachmam dimidiam. Pro circumstantiarum ratione, praefertim ubi suspicio labis in mesenterio, aut exulcerationis in viscere interno, lacti confundo ad dimidias, vel tertias, aquam, aut puram fontanam, aut longe melius Seiterianam mineralem. Hac vero deficiente, aquam communem insundere suadeo cum veronica, fencho, pulmonaria, hepatica, musco pulmonario, tussilaginis, hedera terrestris, scolopendrio, capillis vene, floribus hyperici & tolarum, & insulum hoc cum tantumdem lactis, vel capillis, vel bubuli calide bibere, adiecto saccharo, & pro meliori absterfione, aliquos guttus olei tartari per deliquium. Cura haec minimum per sex hebdomadas continuanda, ac interea vitanda omnia quae stomachum gravant, debilitant & lac coagulant. Vinum quoque ex toto circumcidendum, & non aliud ad stomachum fovendum concedendum, quam parcum Hungaricum, aut nullum ex melle Borullico confectum.

## §. XII.

Antequam tamen cura lactis insinuetur, videndum est, an venterculus illud ferre possit. Sunt enim non nulli, qui lac a natura penitus averlantur. Notavi etiam, quod qui dote vinolae dediti, cervisiam largius potant, lac commoda ferre nequeant. Neque accommodum est hypochondriaci, neque si febris vehemensissima & cephalalgia juncta. Si stomachus languidus & obstructa mesaraica vasa, corruptum, facile in vaporem abit magnaque creat incommoda. Videndum igitur, ne in ventriculo desiccat, ad quod averterendum, *Galenus lib. X. simpl. medie.* praecipit, ut coquantur & chalybis ignitus, aut sicci candentes, incantantur. Tunc si tamen alium lactis asinum, siro plus redundans, minusque calidior substantia habens, quod etiam *Galenus* in hectica praefert; cupia saluberrimam virtutem p. culari destitutione, *de mirabilis lactis asini usu in mendo excussit.* Quod si tamen alium lactis copia non est, substitui possit iterum lactis dulce, methodo a nobis decripta in distillatione de *fri lactis* vixit longe saluberrima paratum. Sunt etiam, qui lactis iterum in B. M. destillant, & proleptam distillatione aquam mirifice dilaudant, tam potum, quam loco vehiculi assumendorum medicamentorum.

## §. XIII.

Porro in hisce suspectis febrilibus providendum, ut crasis & mixto ipsius sanguinis, ab iustissima dissolutione & colloquatione elementorum, quam possint.

quam continuus calor minatur, vindicetur & equilibrium inter calidum & humidum conservetur. Hunc in finem salubria, à medicis passim laudata leniora adstringentia & roborantia. Celebres hoc nomine tincturae, sive potius solutiones coralliorum, aut maris perlarum, cum acido sublimi de naturæ auticæ, uti est succus citri, betberum, aurantium, vel pomorum Chinesium. Utiles quoque tinctura rosarum, cum aqua rosarum & phlegmate vitrioli parata. Quæ leniter adstringunt & roborant, sunt species de hyacintho, quæ cum aliquot gramin coralliorum & neri, colloquasivos fudores egregie compescunt. Magnæ etiam virtutis elixir nostrum balsamicum temperatum, ex gummatibus resinosis temperatis & extractis, sine vini spiritu paratum. Nec omittendus chaccarillæ & ipsæ quoque chinæ cortex, si cum syrupo acerosissimis citri, aut nucis Indicæ, adjecto nitro, in electuarii formam redigatur. Profectum etiam bolus rubra fabrilis, cum conserva, vel jalepo rosarum subacta. Hæc enim omnia ad levandum ejusmodi lentas febres, si prius humorum & viarum vitio profectum, eximie virtutis, eorumque reclusus usus merito commendandus. Quin novi plures, & heceticos, & phthisicos, his diu fuisse levatos.

## §. XIV.

Quæ autem à dyshymia ad heceticum calorem & adversus fudores passim laudantur saturnina, enomia minus subsistent, si d. propter metallicam, adstringentiam, nervis inimicam virtutem, toto ventriculi & intestinorum sunt contraria & certius ac plus nocent, quam profunt. Hinc rejiciendum saturni saccharum, & quæ præ omnibus celebrantur, parata ex hoc antiphrastica tinctura Grammeum. Antihæceticum vero Paterni, si rite ex stanno puro, nitro & animosio paratur & cum emulsionibus datur, non tam noxium est, ut quidam putant, sed ob blandum roborantem diaphoreticam virtutem, utile omnino. Neque enim stannum, propter blandum quod fovet luctum, nervis est inimicum, nec adstringentium, uti quidem plerumque. Gravis de salutari facultate anti-hæceticæ hujus res est. Murales discitis verbis in *M. N. C. Dec. II. An. I. obs. CIX.* ita scribitur: *diaphoreticum jovicæ, sive antihæceticum Paterni, ad demulcendam acritudinem humorum maricem, & nervos irritantium, mirum quantum valet. Idem nervum corroborat, sepe ex emaciatu & debiliu, quadratos & robustos facit.*

## §. XV.

Balnearum in heceticis & lentis frequens, præferam apud veteres, commendatio. Senarius ex Galeno methodum istam utendi pluribus exhibet. Insuper omnium vero de eorum vario usu locus est Alpini, de *Med. method. lib. VI.* dignus, qui totus huc transcribatur. *De externis, scribit, medicamentis balnea conveniunt, ex aqua dulci, aut ex aqua alterata albas, malva, violeta & aliis similibus. In Aegypto ex lacte asinus & camelino, vel equino, balnea tepida instillantur pro Magnaibus. Epibemata istam aquæ instillationem commendantur. Ex balneo tepida conveniunt æque frigida. Illa humectant solidas partes, foliisq;, fœmidique excrementa digerunt, corpusque recte transpirabile reddunt, & remissa caliditate, etiam calorem bebetant. Hæc refrigerant, curam densant, virtutem, calorem augendo, roborant. Sed non in excoriatum corporibus & valde prælanguidis, ut non eris, uti admodum frigida balnea, quando modum hæc calorem augent, sed quoniam præ-languidum eximunt. In robustis vero erant uti-*

*lissima. Robusti his in die, scilicet mane & vespere, ante cibum, hisce balnea utuntur, simul vero debiles. Nonnulli non vehementer frigida balnea, sed lenissima frigidissima, uti sunt & magis tuta esse volunt. Idemque primum ægrotos in balnea temperate calidum ducunt, & mox in leniter frigida, ita ut tepidum potius sit, sive lenius frigida. Aegyptii & Arabes uti solent balnea ex aqua Nili sumunt, ex lacte camelino, vel equino, asinico, vel caprino; item thoraci, hepatis, ventriculo, renibus, ex lacte, oleo violatæ rosarum tepida, aut ex succo lactuce, juncti, enclivia, portulacæ, polygami, lentule poliostris, nenupharis & similibus, cum modico lacte & citri, ad penetrationem, admoveant epibemata. Sed tenendum omnino in genere de balneo; eadem commodè habere locum in principio morbi & quando a viribus fractus pendet, nec non in lenta infansum febre, quia emolliunt, demulcent, rigidas fibras laxant & simul humectant; nihil autem proficiunt in progressu morbi, sique putredo, abscessus & exulceratio interna jam prælo sunt.*

## §. XVI.

Ex præcipuis veteres & molestas hæc febres expugnandi præsidia, est motus corporis exercitatio. Vettes jam, Hippocrates & Aretæus, in tabe curanda mirifica commendant varia motuum genera, deambulationem, vecturam, gestationem, peregrinationem & navigationem, quin Hippocrates lib. de *coeru. affect. §. XXXIV. pag. 238.* præcipit: *si quis validus fuerit, per irregularis dies ad ligna secunda ablegetur, & summis humeris haurietur, & interdum d. ambulet, & vespere dormiat.* Sed saluberrima & accommodatissima motus species equitatio, aut vectura in curru, quibus, perpetua corporis succulatione, sanguinis progressus per meliorem egregie adjuvant. Multi imprimis sunt in laudanda equitationis utilitate celeberrimi Angli, Sydenham & Morton. Ille quidem *opp. pag. 524. & 781.* non venter affirmare, equitationem esse in heceticis & phthisi specificum sine pari, eoque certius, quo neque meteuria in hoc venerea, neque coræx Peruvianus in febribus intermittens, efficacius aut certius. Et Morton. *exercit. de phthis. pag. 26.* ita graphice dicitur: *nullum magis convenienter remedium, quam quotidianam ad moderatum usque fudorem protralla equitatio est, in febribus lentis, heceticis, ex tunc maxime ventriculi, ex perverſa sorte febris intermittens tractatione, nimis intermissivoque signum, præcipitium & adstringentium abusu, frigida potu calenti corpori superſuso &c. quorum præternaturalis astus corporis laudabiles succos depaſit, ex ventriculo & intestinorum sabura acida, lenta simul & viscidula, mox hæc abstinent præter naturam; utque quæ viscosa tenet, sive effusæ chylis, qui valde & hanc corporis, sive resarci, a quodlibet succensione dissolviuntur, excernunt, ut appetitum utrumque restituant, novum chylum laudabili & copioso elaborent. Expetit tamen invenire, in lentis autem & frequentem apprimere utilem esse, in heceticis vero stricte sic dictum balneum sit.*

## §. XVII.

Tandem, quicquid in lentis his & tabilibus præstandum, id mature faciendum ampe. Neglecta enim hac opportunitate, accedente modera, vel laborantis errore & morbo diutius protracto, irrita prorsus atque frustranea est medicatio, & ferè semper in heceticam transiit in lethalem. Quæ autem his febribus jam detinentur, autumno semper pejus habent, ob languidorem naturæ in ad-

Non sunt enim morbi.

Morbi enim morbi.

Balnearum ista aqua dulcis.

Morbi sed morbi.

bus secretoriis & depuratoriis virtutem. Quin, quia circa æquinoctia ordinario subitè insalubres sunt aëris & coris mutationes, plerumque tum non modo gravius agrotant, sed & decedunt heclici incurabiles. Igitur necessarium est, ut circa hæc tempora exactam victus servent rationem, animum tranquillum habeant, aëris injurias vitent & à medico quoque consilium petant.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Leuco phlegma in bilis emato repleto du phlegma transito de phlegma.*

Vir quadragenario major, phlegmatico-sanguineus, à multis jam annis compositioribus in leam usque noctem indulserat, modo cerevisiam, modo vinum, modo vini spiritum bibens, parum vero appetens. A duobus autem mensibus valida affectus erat tussis, somnum omnem arcens, cum intenso æstu, vespere ingravescente, ægra spatione, vicium dejectione & corporis consumptione, nec non copioso per tussim muci siccatus. Meum per litera exquirebat consilium, sed nolui primum manum admoveere, uti non facile soles in longis ejusmodi & desperatis morbis & qui jam varia medicorum artificia expertis. Quam autem intercederet vir honoratus, mihi amicissimus, suasi ut biberet cerevisiam medicatam hæc: recipe herbe hepaticæ, pulmonariæ, hederæ terrestres, scabiosæ, canthi benedicti, veronicæ, agrimonie, ruscilaginæ, musci pulmonarii. Borum hyperici ana manipulos duos, thabarbari uncias duas. M. conc. indantur sacculo & ad fermentationem suspendantur in quinquaginta mensuris cerevisiæ recentis. Exhibui quoque pulverem ex matre perlarum, antihæclico Poterii, lapidibus caucronum & nitro, cum emulsione diluuntur ex amygdalis & pinis. Dedi porro consilium, ut largiter sorbilleret juscula tenuia, ex carne virulina, cum radice scorzonæræ & cichorei decocta. His per aliquot hebdomades usarpatis, nuntiatum mihi, egregium accessisse levamen. Hinc suasi, ut usui insisteret adhuc per mensem, quo etiam cum periculo morbo in gratiam rediit. Sed quam iuvenit vite genus bibulum nihilo secius lætaretur, multique domesticis curis afficeretur, anno circumacto, post gravem itam incidit in hæmopteyn, quam sequuta phthisis, hæctica tandemque mors.

## EPIGRIS.

Qui ex nimio potu sibi phthisicum & hæcticum morbum contraxerunt, omne lactis genus fastidiunt. Hinc in nostro concessit quidem cerevisiam, sed medicatam, per herbas leniter roborantes, balsamicas, consolidantes & sanguinem purificantes. Hac igitur labes viscerum, maximeque pulmonum aonia sublata. Sæpe enim hæcticum hoc malum in principio à sola aonia pendet, sub qua & secretiones, & excretiones tunc succedere nequeunt impurissimum, largius ab ejusmodi bibulis heroicis collectatum. Et profecto ego testari possum quod decocta ejusmodi specierum, ex aqua, vel cerevisia, addito quandoque melle, in chronicis ejusmodi lentis scorbis præstiterint mira, si modo aliquamdiu continuata, quin longe plus, quam preiosa, singulari arte & labore confecta. Sed promissa omnino mali recursum, nisi exacta vice victusque ratione utatur, & viscerum imbecillitas penitus emendetur.

## OBSERVATIO II.

Juvenis literarum studiosissimus, ob tenetam à nativitate corporis constitutionem, in casanthosæ defluxiones, diarrhæas, tussis, phthisin etiam pronus, animo quoque admodum sensibilibus, tempore vernali afflictebatur tussis ferina, tum epidemia, primum sicca, dein humida cum interno æstu, intercurrente horripilatione & accedente virium, ob somni defectum, prostratione. Dabantur leniora laxantia, manna, thabarbarina, linctus pectorales, pulveres cum & elixiria pectoralia, sed sine singulari levamine. Exactis sic & pluribus hebdomadibus, hæctica imminere visa; hinc suasi potione, ex rasura cornu cervi, radice scorzonæræ, hordeo munto ac semine feniculi, cum aequali parte lactis bubuli, potum quotidie ad mensuram, ita, ut mane dimidiam & pomeridie iterum dimidiam biberet. Sed anget, quo plus, eo melius, putans, quotidie vel duas menturas ingurgitavit, ventriculo tamen adhuc firmo, haud male. Sumit quoque subinde pulverem ex spermate ceri, lapidibus cancorum, floribus sulphuris, saccharo & pauxillo nitri. His paucis & euphoris tantum profectum, ut notabile paulo post sentiret auxilium. Sensim postea symptomata discesserunt omnia, nullis placata, æstus testinctus & appetitus cum somno rediit.

## EPIGRIS.

Non penitus, sicut in hydropeo, sic etiam in hæctico malo, deservendum est, si visum fluidarum nondum transit in labem & corruptionem ipsum viscerum, inflammationem scilicet, ulcerationem, aut scirrhum. Felix igitur est medicus, qui hæc bene cognoscit. Sic enim curationem bonis avibus percipere potest, quæ, si feliciter cedit, sanam & gloriam inde reponat. Magna adversus difficilis & longos morbos facultas in ejusmodi temperatis, cuponitis domesticis, diluentsibus & humectantibus remediis, quin longe preestabilior, quam in pharmaceuticis cunctis. Medici in eo plerumque delinquant, quod si tussis humida valida adsit, phthisin esse putant, eaque propter pectoralia multa adhibent, quam tamen sæpe sola humorum acrimonia horumque ad pulmones remissos decubitus, causa sit tussis vehementioris cum siccitate copiosa, & dulcia pinguis relaxantia ob id plus nocent, quam prosunt. Lactis autem cum aqua diu continuato usu, veteres jam, Hippocrati & Aræto, tabem persanarunt. Exstat quoque in *M. N. G. Dec. II. An. IX. obs. 189.* de viro hæctico desperato viro, solo potu aquæ frigidae curato, observatio *Borgii*, qui B. patris mei anno MDCLXIV. fuit discipulus, ipsiusque effigiem, clavi pharmaceuticæ præfixam, carmine decoravit.

## OBSERVATIO III.

Miles quidam, facile lividus, corpore macilentus & languidus, pulsam tamen celere cum quadam duritie exhibens, conquebatur de alvi fluxu per tres continuos menses ipsam adeo deventur, ut quotidie, oclis, vel decies, desiderare cogeretur, succedentibus non nunquam, ut naturaliter fieri solet, excrementis, non nunquam vero laniosa, non nunquam sanguinolenta materia, sine scybalis, appetentia ciborum simul immixta faucibusque arida. Inquirenti in tam chronicæ mali causam, respondit: se graviter aliquando in

*Hæctica phthisis in potu emato.*

*Phthisis in potu emato.*

*Phthisis in potu emato.*

sinistro dorſi & thoracis latere verberibus eſſe percuffum, ut locus enī ſugillatus comparuerit, & dolor ſuccellerit impetibus, præterlapſis autem aliquot diebus, doluſſe hypochondrium ſiniſtrum, ibique ſupra os ilei prometaſſe tumorem, aliquot hebdomades ſubſiſſentem, donec oboritur in ventre torminibus, alvus ſponte fuerit ſoluta, multaque ſanioſa, foetida, atro enī ſanguine tincta, copioſius ſocceſſerit dejectionibus. Ex eo quidem tumorem ſubſiſſiſſe & dolorem quoque evanuiſſe, ſed diarrhoeam perſiſſiſſe & adhuc ipſum mirum exercere ac vires abſumere. Dimiſſus igitur eſt conſilio, ut ſerum lactis dulce, noſtra methodo paratum quotidie ad menſuram unam, nec non infuſum, ex ſcabioſa, veronica, ſanicula, mentha, meliſſa, millefolio, floribus hyperici & papaveris erratici frequentius potaret. Quibus enī effectum, ut poſt aliquot hebdomadum decurſum rediens, gratus proſpiceretur, parces longe eſſe dejectionis, corpus vegetius, meliora omnia, nec de perfecta impetranda ſanitate dubium.

## Epiſtola.

Nullum certe eſt dubium, quin in hoc abſceſſus fuerit in meſenterii compage oboritur, qui demum rupes, effuſit in inteſtinorum cavum ſanienem & tuorem, per ani ſecellum excrevit. Qui vero factum, ut à ſuperiorum percuffione, in abdominis penetralibus inducitur apoſtoma, diſquiſitione omnino dignum. Nos quidem ab impedita ſanguinis in partibus plagis gravior conſultis circulatione, mali ducimus natales, unde factum, ut in homine plethorico ſanguis majori copia fuerit delatus ad meſenterii diverticulum, ibidemque collectus, demum putrefcere coepit, & in abſceſſum conſeſcit. In meſenterio enī ſarpius oboriri flagnationem, ſi in remotioribus partibus ſanguinis progreſſus interceptus, non novum. Iſti novimus, hoc factu, meſenterium cum omento putre & ſphacelatum fuiſſe inventum; vulnere lethali diaphragmati inſiſſe, tuorem vaſa meſenterii percuſſiſſe, & abdomen inundatſe, & in aſſumta ſpaliſmodico, à polypo in appendis cordi canaliculis, meſenterium idem ſanguine nullo oppletum, vaſa ipſius diſſeuta parim, partem plane diſrupta, conſpiciſſe.

## OBSERVATIO IV.

Vir erat macilentus & cholericæ conſtitutionis, qui ex hæreditaria quadam & nativa diſpoſitione pulmonem aſſeſſat virium, ac præterea ob nimias lubricationes vitamque nimis ſedentariam variæque animi ex ira commotiones, corporis & ſtomachi ſibi contraxerat imbecillitatem. Hic ab aliquot jam annis magnam pueritæ viſcidæ copiam ſecreto eiecerat, hæcque exſectio mirum demum copia increvit, & per duos ſere menſes, cum lenta febre, ſpirandi difficultate, viriumque jactura, nec non exquiliſ ſub urina emissionē ardore, duravit. Tum quidem ager emulſionibus, juleulis medicatis & decoctis demulcentibus, interpoſitis clementer alvum laxantibus, cum ſanitate in gratiam rediit; exaſto vero circiter anno, eidem malo demum implicatus eſt. Alium igitur in conſilium adſeſſit medicum, qui hæc ſemper adjuſſit anxia teſpiratio, nullum tamen non phthiſicam, ſed ex ſtomacho aſtutante & hypochondriacum ſymptoma eſſe judicavit, putavitque, cellatura omnia, ſi tempeſtivus prodiret hæmorrhoidum fluxus. Variis demum incallum ad-

hibitis, de vera ſecunda conſilium dedit, floridamque è pede extraxit ſanguinem. Sed eodem adhuc die veſperi ægerum horror per univerſum corpus inceſſit, ſubſequentē intendo aſtu, nocte inſimul, virium ſublata gravi & perfecta acceſſit hectica, qua enī è vira menſe Mario diſceſſit.

## Epiſtola.

Qui ex parentibus phthiſicis geniti ſunt, in per totam ſere vitam ſemper debilis corporis conſtitutio, ut languetas venericuli digeſtio, & ipſi in catarrhos, ex levi aëria viſio, leito cum calore, prout ſunt, quin facillime, niſi reſtem circa non naturalium rerum uſum exquiſite obſervent, in phthiſin & hecticam incidunt. Hic æger, Collega & amicus noſter, valentudinariam diu duxit vitam & aliquoties circa æquinoctia phthiſica tuſſi cum febre laboravit; DEI tamen auxilio, danorum à nobis remediorum ope, convaleſcit. Tandem vero ſe commiſit medico, qui perfectam morbi curationem brevi pollicetur eſt. Et quum à plethora & hæmorrhoidum fluxu impedito omnia pathemata pullulare putaret, à venæ ſectiōe cepit initium, ſed male hæc ceſſit. Inde enim mox peſſime habuit, & in phthiſicam hecticamque incidit tuſſim lethalem, fruſtra omnibus datis remediis. Diſcant igitur, qui plethoram ubique creant: in debili & hectico corpore nunquam utilem eſſe venæ ſectiōnem & ſalutarem, quia per continuū calorem ſanguis jam conſumtus, & ſucci potius incipiendi ſunt, quam ſubſtandis. Sed plura in ſimilibus caſibus notavi de hæta. Obſervatur adhuc animo exemplum ſerenciſſimæ perſonæ, vix vixiſſimum ætatis annum egreſſe, quæ à matre phthiſica genita & ipſa phthiſi periit. Nihil enim quum ex puerperio novitiſſime ſuperſito admodum debilis, in curſu aperto, incutus equorum curſu per aliquot horas veſta, aërem valde frigidum, veno agitatam, ad pectus admiſſit, mox de catarrhis, tuſſi anhelis, ſicca, ſalivæ ſine corporis & ſudore nocturno conqueſta eſt. Medicus catarrhalem febrem eſſe autumans, pediatralia oppoſuit dulcia, indices vero hæc ſymptomata & calor conſumens vires, creverunt. Hiſce quia menſis nondum incram prodierant, venam incidere ſuſcit, quo longe debilior facta, & placide hæc ita multo poſt ex hac vita deceſſit. Erant igitur medici vehementer, qui nullam diſcrimen faciunt inter menſium obſtructionem, quæ à copia ſanguinis & inſarctu viſcerum eſt, ubi venæ ſectiō juvat, & inter eam, quæ ex ſanguinis defectu venit, ut ſit in phthiſi & hectica, ubi utique ſanguinem detrahare, qui ordinarie deficit in hectica, nil aliud eſt, ac mortem promovere.

## OBSERVATIO V.

Vir illuſtris, Regi à conſiliis, quadragenarius major, ſtatura longus & macilentus, hypochondriaci pathematis & parviori hæmorrhoidum fluxui obnoxius, poſtquam vehementer, perſenſit totius corporis languorem, cum dolore preſſorio, circa primam lumborum venteram, abdominis torminibus, aſtu interno, veſperi invaleſcente, inappetentia, alvo ſimul clauſo & flatibus ruſſibulque ad ſuperiora regurgitantibus. Secta fuit vena & dati pulveres digeſſivi, abſorbentes atque nitroſi: nihil tamen opis allatum. Ventris potius dolores cum aſtu interno increverunt, carnes ac vires conſumerunt, interdum abdomen mirum inſumit à flatibus, & præcor-

Hæctica  
phthiſica  
lethalis.

Hæctica  
in  
macilentis  
aſtu  
diſturbans  
periculis  
ſalutis.

dia tenuis anxietas summa. Sic duos exegit menses, multique medicis & medicamentis usus, hecibus visus fuit, tantum non conclamatus. Ipsa tamen natura tandem curationis aperuit viam, sed cedente per alvum materia fuscula multa, quae etiam apparuit in urina. Hoc facto, calor quidem & dolor factus minor, appetitus quoque restauratus. Sed quia purulenter hic alvi fluxus, longius quam per tres menses successit, cum insigni virium debilitate corporisque marcore, indicium praebebat haud fallax grandis in mesenterio abscessus. Interim eum aget exquisitam diutam ferveret, jucula gelatinosa, lac asinum, bubulum cum herbis vulnerariis coctum, & caprillum cum Scleranis mixtum, potaret, simulque pulverem ex semine lycopodii, mulco pulmonario, urtica morrua, rufiflagine, semine cymii, nucella & saccharo, in emulsione ex amygdalis & pineis subinde fuheret, factum est, ut sensim vires redirent, ex quo materiae per alvum ac tussim minueretur, & ipse, praeter spem omnium, convalesceret, iniquis postmodum victu exacto & regimine congruo.

## Epicrisis.

Hypochondriaci & haemorrhoidarii in mesenterii morbos, inflammationes & abscessus delibuntur facile. In his enim jam tum meliora vasa sanguine sacra & humoribus sunt dilenta, tardissimisque per eadem committuntur. Nostro sine dubio, a gravi ira, accidit sanguinis extravasatio, inflammatio & inde suppuratio. Parva autem suppuratio, brevi potuit ampliori & latius progredi in mesenterii compage, largiter obfusa pinguedine, quae in liquorem laniolem facile liquecit. Quod vero purulenta materia alvo expurgata, tribuendum naturae beneficio; & quod in urina comparuit pus, a venis resorptione & per renale cribrum excreto, eodemque modo etiam successit puris creatus, integris pulmonibus renibulque. Quam novi, utero ulcerato, per asperam arteriam rejectum fuisse pus, illis plane pulmonibus. Soli etiam naturae debetur sanitas recuperata; nec minus providentiae divinae, si tam periculose laborans invenit medicum, qui morbum perire & leniter tractare novit. Sed quia ejusmodi abscessus perquam facile recrudescunt, exacte ad sanitatis regulas vita instituenda, & vitanda cum cura cuncta, quae ad mali recursum facere possunt.

## OBSERVATIO VI.

*Interfectio  
hinc post  
antrum  
curata.*

Femina triginta annorum, tenera, victum tenuem, mollem, per multos annos fectum, cum crasso & duro permixtum, & carnes infumatas piscisque salinis liberaliter ingesserat. Incidit hinc primum in tertianam notham, a qua post mensem liberata, ad stomachum sulciendum usa est tinctura aperitiva *Maclei*, ex spiritui salis, cum sale tartari, formolis tincta: hac adeo ducta appetentia, ut vix satiem sedare posset. Paulo post perierat vinum lapsum appetitumque prostrationem, cum athu interno ac phlogosi, pulsi vespere ac post cibum semper multum increbescere, successit tandem languor universi corporis pedumque tumor ac dolor contritus. Medicum igitur acciv: qui, quam primam regionem saburra acidorum humorum obfusa esse recte concluderet, lenes dedit emeticum, ex tartari emetici uno & dimidio grano, aquae menthae uncia & julepi rosarum drachma. Assumpto hoc, ingens copia

viscida amara viridissima, instar aeruginis aeris, vomitu rejecta, quae infillaro oleo tartari per deliquium, flavum induit colorem, laculemo indicio, ex bile & acido corrosivo tandem esse constata. Minor inde redditus calor & molestus offensum dolor complicatus, vires quoque reparatae. Nihilominus, ad reliquum exortandum, tertio die iterato danum hoc pharmacum, & evocata tam per superius, quam inferius os, similis indolis recrementa. Postea vero danum efflorum nostrum balsamicum stomachale & pulvetes precipitantes cum duplicato arcano, tam salutaris effectu, ut brevi post febris haec cum omnibus symptomatibus discederet, & agra cum valetudine in gratiam rediret.

## Epicrisis.

Ortum duxit lenta haec febris ex primae regionis cruditatibus, quae ingenuis voracitas, post febres superatas solentis de usu spiritus salis adacta. Licet enim aperitiva *Maclei* tinctura stomachi vires appetitum excitando & digestionem faciliando, egregie opituleretur, ubi tamen ventriculus plus appetit, quam coquere potest, noxam porius affert, quam emolumentum. Recte igitur datum vomitorium, quae saburra acido-biliosa, morbi causa exturbata, & sicque simul sublata symptomatica cuncta.

## OBSERVATIO VII.

Novi senem octuagenarium, robuste naturae *Marsilius*, & ob nimiam sanguinis redundantiam singulis *senilis* mensibus haemorrhoidium fluxus obnoxium, ceterum bene valentem & bene appetentem, inprimis quum quotidie vini liberam haustum biberet cum oblectamento. Hae tandem autumnio, confuso inire & pota cerevisia minus delectata, ingessit quoque aliis fermentescensibus, digestionis turbos & flatulentias expertus est; subitit paulo post haemorrhoidium stillicidium, appetitus perit, vires succellive conciderunt, ructus facti continui, cum conatu ad vomendum, os siccum, alvus obstrata, pulsus celer redditis ac debilis. Haec durarunt per duos menses, & graves indies facta, tandem frustra adhibitis omnibus, vitae artulerunt finem.

## Epicrisis.

Senes levi ex causa & errore commisso, in graves, immo funestas, ni manare succurratur, incidere possunt affectiones. Quando etiam sanguis haemorrhoidalis, evacuari solitus, retinetur, neque per tempestivam venae sectionem ad liberum circuitum traditur, stagnat in visceribus & ad corruptionem vergens, puridam talem febrem, quae in senibus marsili nomine venit, ingignit.

## OBSERVATIO VIII.

Vir quadragenarius, tenet constitutione, post *Hoffman* longum animi mororem & vitam sedentariam, incidit in languorem virum, corporis marcorem, appetitus prostrationem, calorem praeternaturalem, cum pulsu debili & frequenti, sortito parco & interrupto, facie plumbea, oris siccitate perpetua & fuscis maximo. Quum his per sex septimanas fuisset detentus, ob alvum adstradam sumit purgans, ex diagrydi sulphurati gr. II. cum tartaro vitriolato, quo multum deiecit & diu



diutius quam per os diutius. Inde vires adeo con-  
ciderunt, ut animus facile deficeret in sinu ere-  
bri, calor etiam increbuit & accessit tandem  
fumma praecordiorum anxietas, ad quam levandam  
vena aperta & aliquot unciae emisse sangui-  
nis fluidi & floridi. Licet autem anxietates hoc  
facto levarentur, aeger tamen, ob virum pleni-  
tatem lapsum, animum haud ita multo post effla-  
vit.

## Epirisus.

Hectica haec febris est, enata procul dubio, à  
sphacelosa visceris cujdam, ac uti videtur hepa-  
tis, corruptione. Non enim novum est, quod in  
languidioribus & diuturno morore affectis, vis-  
cera ob sanguinem stagnantem abeant in putre-  
dinem, ac ite cadaverum sectione compareant  
nigra, tanto magis, si vita accessit sedentaria. Signa  
ejusmodi corruptionis intense sunt, plenaria  
appetitus de virum prostratio, somnus nunquam  
reiciens, facies livida plumbea, carnes flaccidae,  
contus ad vomendum & colligativus sicut. In  
nostro notum imprimis dignum, quod ab unica  
exigua purgantis dosi incomplectibilis alvi fluxus  
inductus. Nequaquam effectus hic tam purgan-  
tis virtuti, quam potius immolens inflammationis  
& humorum accrediti tribendus. Caveat  
ignar medicus circumpectus, ne, ubi motu in-  
testino continuo vires consiluisse & massa sangui-  
nis recrementis humoribus gravis, quipiam  
draclici purgantis praebat & perveria in-  
cogitat judicia.

## OBSERVATIO IX.

Formina sexaginta & trium annorum, tenera  
admodum, ante quinque menses terrore fuerat  
perculsa gravi, & confestim molestem tractio-  
nem & tensionem in artubus perleserat. Ante  
tres menses supra clavicularum sub musculo mastoi-  
ideo in utroque latere exoritur tumor, qui rebel-  
lis fuit, nec ullis cedere voluit remediis. Interea  
lenta & vires consumens febricula, ab aliquot  
jam mensibus agram incellit, cum ardore, in vo-  
lens marium & pluvius pedum, praesentim circa  
mediam noctem affligens. Accesserunt per inter-  
vallia capitis pulsantes & tendivi dolores, qui sub  
cute, modo hac, modo illuc discurrerunt, ad cer-  
vicem, quin ad gingivas usque. In artubus saepe  
tractiones fibrarum musculosarum, oculis con-  
spiciendae, cum dolore lancinante adfuerunt.  
Nausea quoque cum anxietate, nec non tormina  
ventris obicuta, non nunquam affligerunt, alvi  
secessu ut plurimum soluta. Appetitus fuit pro-  
stratus, urina crassa, turbida, rubra, cum sedi-  
mento & cuticula oleaginosa, praesentim paro-  
xysmo finito fecellit. Omnia autem haec symp-  
tomata, mox secundo, mox terti o die invalue-  
runt, cum pulsu celeriori, qui tamen frequens  
semper fuit, sed exiguus.

## Epirisus.

Affectus hic merito lenta consumens febris di-  
cendus. Originem dubio procul traxit à vehe-  
menti terrore, causa tanta vis est, ut, praesentim  
in cacochymico corpore, tam e congruam mor-  
nem, tam vitalium, quam secretoriorum & ex-  
cretoriorum, pervertat, nervosarum quoque &  
fibrosarum partium syllena valde debilitet, &  
ad spasmos, contractions & dolores disponat.  
Eidem terrore etiam debetur glandularum colla-

tumor, qui ad lentae febris generationem multum  
consulit. Hippocrati enim jam eas febres, quae  
glandularum tumoribus accedunt, lentas & peri-  
culi non expertes judicavit, tum quod sub muscu-  
lo crasso siti sint intractabiles, tum quod nervos  
vicinos distendendo, febrilibus spasmus submini-  
stret occasionem. In curando hoc morbo pri-  
mum fuit, ut prime viæ à febrilibus repurgarentur.  
Hinc magnesia cum sale Epistemoni ad drach-  
mam dimidiam data, cum lacte amygdaloso  
mannato, & clyster injechtis ex decocto avena-  
ceo, manna & chamomille floribus. Mane jeju-  
no venicula potum caponis brodium, cui inco-  
ctae radices peroclini, foniculi, cichorii, herba  
nasturii aquarici, ad lico cancerorum fluviantium  
succo. Oblatus tum quoque pulvis ex cancerorum  
lapillis, nigro & solusione oculorum cancri. Ponit  
ordinario fervit prisa. Exterius glandulas tumi-  
dis & dolentibus imposuit emplastrum diachy-  
lon simplex, cum spermate ceti, oleo hyoscyami,  
croco & camphora. Ex ad artuum dolores com-  
plicandos, immensum discutiens & antispasmo-  
dicum inunctum. His agra per De I granima-  
tra meridem, ex ancipiti levata & letis perlanata.

## OBSERVATIO X.

Juvenis melancholico-cholericus, vigesimum  
annum egressus, compositionibus & ebrietati in-  
temperantissime deditus, aliquoties haemorrhoyin  
passus fuerat, cum pectoris angustis & quasi ebul-  
lientis sanguinis sensu circa praecordia, temper-  
tamen liberatus tempestiva venae sectione, pedi-  
lucis & congruis temperantibus atque nitrosis.  
Accidit vero, ut vehementi ira aliquoties com-  
moveretur, quam sequuta notabilis virum & ap-  
petitus prostratio, spirandi difficultas, somnus in-  
quietus, sudor marinus, tussis vehemens, cum  
copioso ad libram minimum quotidie secretis, pul-  
sa celer, à meridie postillium ad medium no-  
ctis, cum calore in plantis pedum & volis ma-  
nuum, urina turbida rubra, interdum cum se li-  
mento, interdum tenui, corpore simul contabef-  
cente. Sic per duos menses, varia Medicorum  
consilia expertus est & artificia ex pectoralibus,  
antifebrilibus & refrigerantibus, sed frustra. Tandem  
nostrum petiit consilium; vix tamen dubiam,  
rebus sic comparatis, salutis spem facere posuimus.  
Interim lactis suavi potum, quod quotidie bis cum  
decocto sabbatum. Cofite hauserit, loco potus bibi  
decoctum ex radice scorzonerae, cichorii & rasura  
cornu cervi, cum passulis minoribus, potavit quo-  
que Selteranas cum lacte ad mensuram quotidie,  
sumsit subinde gelatinam cornu cervi, & usura-  
vit pulverem ex radice ireos Florentinae, liquiri-  
tae, lapidibus cancerorum, nigro & saccharo. His  
per mensem alternatim usurpatis, melius habere  
coepit, aestus minor factus, & appetitus rediit.  
Hanc continuavit lactis potum & pulveris usum,  
subinde quoque jacula ex carne viridina sumisit,  
sumulque appetentior placenterum, ex iis, quae  
minus graves & viscidæ, liberaliter quotidie co-  
medit. Sic tandem praeter omnium spem facere sym-  
ptoma complicata, & aeger tantum non despera-  
tus, bis mensibus exactis, surrexit sensim-  
que convalescit, ac biennium supervixit sa-  
nus & integer. Sed quum postea antiquum ob-  
tineret & liquores spirituosos, cereviam, vi-  
num, maximeque spiritus ardenres, ingurgitaret  
effusius, nocte inmensa perquam frigida &  
compositione ebrius dormit tendens, in plesta  
subito concidit, ac domum portatus, morie ex-  
tinctus est subita.

## Epicrisis.

Ex raris hecticæ durationibus est hæc: aderant enim omnia hecticæ febris signa. Sed quia primum accitæ medicæ adversus phibiticum malum percloribus & dulcibus tantum pugnant, nec humidum deficientem refarcire, nec humorum acrimoniæ demulcere laborant, parum posuerunt proficere. Ipse enim eventus per remedia percurat docuit, causam hujus febris magis in humorum visio eorumque viscositate & acrimonia suis se positam, quam in labe, corruptione, aut exulceratione viceris. Patet igitur: in hectica febre non semper speciem esse abijciendam, si in juvenili ætate, subito, ex prægressa mala dieta incidit, uti quidem heic factum est.

Cæterum de febribus, genis & hecticis plures jam prodidi observationes in *Medicina consultatoria Tom. II. Sect. IV. cap. CLXXXII.* utque ad CXC. quas evolvendas commendo.

## CAPUT XIV.

## De Febribus Symptomaticis.

## §. I.

*Symptomaticæ febres dicuntur.*

Symptomaticæ febres dicuntur eæ, quæ aliis morbis primariis, vel fonticis externis læsionibus, seu symptomaticis, ob systema nervorum inde male affectum & gravius irritatum, accedunt, nec typum exquisitum servant. Sicut enim omnis generis febres nervosi maxime generis affectiones sunt, & a variis generis causis, hoc impensius affligentibus, stimulantibus & commoventibus, originem ducunt; sic etiam eodem ex fonte derivandæ symptomaticæ, quibus inducendis causæ vellicantur pariter multæ.

## §. II.

*Morbis acutis primariis dicuntur.*

Ex iis, quæ aliis morbis adjunguntur, notabilis maxime illa symptomatica, seu secundaria febris, quæ in variolis observatur. Nimirum quando post quartum diem primaria febris, expulsa ad corporis habitum exanthematica materia, deseruit, nono ut plurimum die, quo pustule suppurari & manurescere incipiunt, ob impensum qui inde fulsit ardorem atque dolorem, nova accenditur febris, cum pulsum celeritate, æstu interno, siti, vigilia, inquietudine, quin delirio, quæ undecimo die haud raro laborantes necesse, præsertim si adulescentis & consuetudinibus obfessi. Dein dolores arthritici, rheumatici, podagra, chiroagra, ichthiæ, nec non erysipelas inprimis capitis, semper incipiunt cum insultu febrili, frigore & æstu, sub quo ad cutem & articulos agitur ex interanea acris recrementitia materia, ibique acerbus suscitatur dolor, qui novam ciens febrem, eo graviores, quo graviores ipsi. In dentium quoque gravi dolore, maximeque difficili infans dentitione, jungitur, ob cruciatum, frequentissime febris symptomatica, quæ periculi non expers, quin in tenera sæpe epileptice convulsionibus sequitur. Haemorrhoidibus porro coctis impensius dolentibus, sæpe febris, cum horripilatione, vigilia & tremore parvum complicatur. Neque minus glandulis induratis, tumenibus & dolentibus febrile symptoma accedere solet. Nullum etiam dubium, quin in pestilentia, si anthrax, seu carbunculus, qui tumor est ardens & acutissime dolens in musculosis partibus, febris accendatur maxque interitum periculum.

## §. III.

In puerperis præterea, tertio ut plurimum à partu die, febris supervenit symptomatica, lactes dicta, cujus origo nulla alia, quam quod ob uterum, enixum parum, iterum contractum, magna sanguinis ad mammas fit appulsus, quo corporibus glandulosis & fibræ nervis male affectis, dolor inducitur sensus, febrilem insultum ciens. Si abscessus & apostemata fiunt in partibus, præsertim nervosis & glandulosis, in jugo bubones, aut in axillaribus & mammariis tumores apostematodes, complicantur febres, sæpe gravissimæ & cum dolore junctæ. Idem accidit, quando pars exquisitor sensus ambulationem graviores & amporem patitur. Neque minus ex symptomaticis febribus sunt illæ sic dictæ vulnerariæ, quæ læsionibus ac vulneribus, manuum præsertim & pedum, nec non aliarum nervosarum partium, pericranii possimum & meningum, accedunt, quæ etiam fiunt, quando tendines vel nervi, sub venæ sectione improvide puniuntur, vel aliis acutis instrumentis læduntur, eodem modo ac evenire solet, si pleura, peritonæum, aut intestina lacerantur. Quin si vulnera & læsiones partium acutius sentiantur, acris & caustici medicamenti, injectis aut inspersis, trahantur, intenduntur non modo dolores, sed & haud raro febres ardentes & continuæ ingignuntur. Tanto certius autem tantoque majori cum periculo hoc accidit, quando nervosis partibus communicatur plane venenum, uti fit in morbo canis rabidi, nec non quando mercurius sublimatus, aut arsenicum, carcinomatibus induntur. Denique non prætereunda illa febris, supra omnia, quæ venibus & calculo accedit. Non enim adeo insolens in verminantibus febres, putrida dicenda merito, quæ irregulari admodum, cum nausea, abdominis torminibus, urina limosa, alvo ut plurimum laxa. Quæ autem calculo jungitur, oritur à doloribus acutis, tum maxime, quando per urethres nervosæ molitur transitum.

## §. IV.

Ita autem omnes hæc symptomaticæ & continuæ febres sunt comparatæ, ut universam economiam functionum, vitalium inprimis & naturalium, pervertant, vires frangant, multaque exitalia symptomatica, deliria, convulsiones & epilepsias, inducere possint. Plane omni tamen destinantur utilitate, nec sicuti aliæ febres, removendæ & vincendæ causæ servant, multo minus sufficiunt. Hinc utique peritus Medicus eo dirigere debet in earum curatione medicationem, ut cito anomalos hos febriles motus compescat, eorumque vehementiam occissime remittat. Longe facilius enim & melius hoc in symptomaticis hisce perfici potest febribus, quam quidem primariis; eo quod illæ tanquam modo a tensione & ipsa strictura nervosarum partium, tanquam a causa immediata, proficiuntur; hæc vero a causa materiali, non cito transeunte, sed permanente, ortum ducunt.

## §. V.

Curatio ipsa sic influenda, ut causis amolendis sit opposita. Quod si igitur læsione, aut vulneratione partium nervosarum & tendinosarum, tam internarum, quam externarum, maximeque ipsius capitis, insultus accitit febris, nullum præsentis & securus auxilium, sanguinis missione, & quidem in parte propinqua inflata. Vulnerariæ enim hæc sic dictæ febres, oriuntur possimum à sanguine effuso, in partibus fuscis decumbente. Expedi vero ut manere id fiat, præsertim in

*Febris nervosa læsionibus.*

*Sunt cito evanescentes.*

*Quid nullo modo a læsione partis nervosæ accitit.*

is, qui sanguine abundare. Post venam sectam, discutientium, resolventium & diaphoreticorum usus longe efficacior, quam haec neglecta. Nos commendamus porrones ex aqua foecidis, cardui benedicti, charefolii, scabiosae, acem destillato, aqua theriacali, lapidibus cancorum, antimonio diaphoretico, mixtura simpliciter cum syrupo acemotici citri, adjecto interdum pulvere lumbricorum terribilium, interdum sanguine hirci. Melius adhuc visum bonae notae Rhenanum, cum succo cancorum fluviatilis mixtum, addita lapidum cancorum drachma & theriacae drachma dimidia. Sic enim constat potio, ad inflammationem & fistulacionem arcedam, virtutis praestantissima.

## §. VI.

Quando symptomatica febris ab atroci dolore, partium praeteritum nervosorum & sensibilibus, accidit; omnia quae sine noxa dolorem levare & sedant ex usu sunt, id est, ea quae blanda virtute vaporosa anodyna pollent. Horum classem ducunt flores aquarum fragrantium, uti tiliæ, primulae veris, acaciae, liborum convallium, alborum, sambuci, rosarum, papaveris rhoeas, peoniae, nymphæ, nec non blanda papaveracea, emulsi scilicet ex feminibus quatuor frigidis majoribus, cum semine & syrupo papaveris albi, & maxime omnium liquor noster anodyna mineralia. Laudatissimi cum haec in deratione difficili, calculo & colica cum febre sunt usui. Neque etiam, nisi iis his, si necessitas urget, confugiendum ad opiora & narcotica, massam pilularum de cynoglossa, Heliconiam monachum, laudanum cydoniarum, *Heliconii*, *Sydenhami* & quae plures huius farinae compositiones. Quando dolor ex inflammatione supervenit symptoma febris; interne diaphoretica cum nictosis mixta, omnia sece reliqua virtute antecellunt, quia nihil magis inflammationem discutit, quam nitrum, praeteritum cum fixis diaphoreticis & camphora mixtum, & quae discussa, & dolor cessat, & febris.

## §. VII.

Quae à causa exteriorum topicorum usum admittente, inducitur ipsa symptomatica febris, praeter interna, exterius etiam pollicetur demulcentia, dolorem mitigantia & fibras duras strictas mollientia & relaxantia. Sunt haec maxime necessaria in tumoribus venarum haemorrhoidalium, in tumoribus & doloribus artuum, glandularum inguinalium tumore venereo, in tumore mammae, colli glandulis, nec non si subinfelici venae sectione punctus nervus aut tendo, si animal rabidum, aut infectum inulit lesionem. His in perharmatibus eximie conducunt cataplasmata ex ficibus, radice & solis siliorum alborum, melle, farina foenu graeci, cepis tostis, vitello ovi, lacte & cremore lactis, cum croco; deinde nobili pollet virtute emplastrum diachylon simplex, mixtum cum sufficienti quantitate croci, vel cum spermate ceti & oleo hyoscyami; porro dolores egregie mullent & spasmus laxant vesicae, decocto emolliente plene, & pari efficitur crebrius calide impostum; neque ad temperandum ardorem & stricturam remittendum inutilis est mixtilago lininis psyllii, cydoniorum, aut lini, cum aqua rosarum facta & crebrius illita.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Virgo tenerioris constitutionis, quatuordecim annorum, in febrem fluxum parcellis experta,

incidit in febrem, continuam, lento calore per duas hebdomadas affligentem, cum tussi siccâ, & alvi fluxu, quo multa foecida cinerici coloris exercebantur, languor occupabat totum corpus & facies pallida fovebatur colore, accedebant quoque crebrius dolores acuti circa spurias costas, urina erat pauca & crassum sedimentum deponens. Indicabatur lenta febris, à mensibus obstruente prognata; ideoque ad emovendum mensis varia à mulierculis ingeriebantur. Vocatus ego, quatuordecim forsan ante veribus laboravit? discessit: ipsam dulcibus & placentis admodum oblectari, atque etiam ante aliquot menses lumbricos quosdam per alvum excrevisse. Exhibui igitur potionem ex rhubarbo drachma, feminis jannici drachma dimidia, tartari scrupulo, aquae florum acaciae uncia sex, spiritus viridii quatuor xx, infusis in calido toto, de qua dimidiatum partem pro dosi sumpsi. Purgatis sic leniter primis viis, primum pro potu ordinario destillato: recipe borderi mundi manipulos duos, radicis scorzonerae, rasilae cornu cervi, radicis cichorii ana unciam, herbarum foecidis manipulum unum, coque in aquae fontanae mensuris quatuor per horam, colaturae adde syngii acetosissimi citri uncias duas. M. Interpositis quoque interdum suis usus pulvis, ex pulvere feminis jannici, cornu cervi ulli, rhubarbi ana drachma una, nitri purificati, salis polychrestii ana scrupulis duobus, qui ad scrupulum una vice summus. His per mensem & ultra usurpatis, egregie convalescit, licet nulla amplius lumbricorum succederet excretio.

## EPICRIS.

Febris verminosa à lentis & heclicis differunt in eo, quod haec post cibum sumtum & vesperi ingravescit, in illa vero hoc non observatur. Deinde quoque febris ex verminibus junctum plenumque habere alvi fluxum, quo foecida & cinerea recrementa secedunt, urina turbida cum limoso sedimento mingitur, in lentis autem & heclicis haec non praesto sunt. Differunt tamen haec febres inter se debent ex causis antecedentibus, victu maxime, ex dulebus, heclicis, aliis viscosis & fermentescensibus, optime vero si jam ante fecerant lumbrici. In medicatione autem, si febris complicatur cum alvi fluxu, abstinendum ab antehelminicis, validioribus purgantibus, à mercurialibus, à sagapeno, aliis foecidis, tanacetis, quae alias specifica adversus vermes, sed utendum acidulis cum amaris mixtis. Acida enim non modo calori, sed & putredini verminosa egregie resistunt. Plerumque tamen vermes non excremuntur, si febris juncta, quia aestu febrili dissolvuntur in putridum magma. Ego etiam tali in casu cum fructu usus sum potu acidularum Seheratarum, correctarum prius spiritu viridii, infusilis mentisuræ trigina istius guttis, quo laxatum acquirunt virtutem. Quae per diversâ ratione aetatis & corporis, majore, vel minori dosi quotidie offerri possunt.

## OBSERVATIO II.

Juveni virgini circiter aetatis, macilentæ & sensu exquisitoris, forte scalpellum librarum è manu exciderat in pedis dorsum, paremque hanc tendinosam cuspide acuta pupugerat & lauciarat. Postero die, aenea persicula sanis, incurrit acutum parvis lade dolorem, cum febre, siti, praecordiorum anxietate, vigilia, quin mentis quadam alienatione. Missa nam, quia plethoricus erat, illico

Febris est  
pustulosa  
tendinosae  
pedis.

Si à dolore  
partium  
sensibilibus  
proveniat.

Ex inflammatione  
supervenit  
symptomatica.

Externa  
causa  
inducit.

sanguis à brachii vena, & data emulsiō ex amygdalis dulcibus & semine papaveris albi, cum aqua florum sambuci, tiliæ & acaciæ parata, quam tam solam, quam cum pulvere ex mane persilurum, lapidibus cancrorum & niro fursit. Oblata etiam mixtura diaphoretica & discutientia, cum diachordeo *Fracastori*. Ex exteriori vulnuscūlo partique dolenti impostum emplastrum nostrum discutientia & anodynum. Quibus per aliquot dies usurpatis, febris cum omnibus symptomatibus discessit.

*Epigrifi.*

Quotidiana testatur experiētia, quam periculosa sint nervolorum partium læsiones, & quam perniciose invehant symptomata, quæ autem alia horum omnium reddi possit, & quæ quod universa nervorum compages, & totum nervosa parte gravius læsa, consentiat, & motus inordinati vehementes in hac excitati, per totum nervorum systema facile propagentur, uti fusius deduxi in *remo III. Med. ration. systemat. Sect. I. pag. V.* Discimus vero etiam ex hac observatiōe, morborum causas, non tantum in materie nocentis quantitate, aut qualitate, consistere, verum sæpius etiam motu vicioso & inordinato niri. Atque adeo perperam agunt medici, qui in ejusmodi morbis ad humorum correctionem, aut evacuationem, animum & medicationem dirigunt. Præcipuum potius tum in curando sibi vindicant locum, quæ motibus hæc turbulentis complacendis serviunt, quorum in numero cum reliquis anodynis sunt potissimum opiata correctæ, quæ alias minus quadrant, ubi perniciose quantitas sola, vel qualitas noxiæ nupta, in causa est.

OBSERVATIO III.

*Febris intermittens accedens.*

Juvenis viginē aliquot annorum, sanguineocholericus, in Academiâ solertius Veneri & Baccho, quam Musis litat, & ante biennium fere conflictu cum sodali vulnus acceperat in thorace, quod consolidatum, peccioris quandam gravitatem & difficilem sub ascensu acclivium, aut ambulatione incitiorē, spirationem reliquerat. Hic vere incitante conquiri corpis de virium languore, capitis dolore, inappetentia, somni defe-

ctu, calore febrili, modo vesperi, modo noctu, post levem horripilationem, ipsam infestante, subsequente mane sudore largo, admodum debilitante, cum majori respirationis difficultate & dolore in loco veteris circa mammillam vulnertia. Medicum igitur in consilium vocavit, qui maxime discutientibus & diaphoreticis, emulsiōibus demulcentibus & refrigerantibus, pulveribus quoque temperantibus cum succo citri, febrem oppugnavit, interpositis subinde laxantibus blandis manatis & rhabarbarinis & data pro pona pūsana. Sed frustra. Licet enim & capitis dolor evanesceret, sudores manantini & febris vehementia tantisper minuerentur, respiratio quoque liberior redderetur & appetitus melior, insulsa tamen febris persistit semper, post mediam noctem accedens & sudore discedens, elicto miro corporis languore & debilitate, se læto etiam affligentur. Hinc Medicus, dissolutioris ægri vitæ rationis non ignarus, forsitan occultarū causam subesse suspicari cepit & in eam serio inquirere. Consessus igitur tandem est æger, in inguine dextro, durum quid protuberare, sed levem admodum ex eo se sentire dolorem, & credere, esse forsitan ejusmodi tumorem, quem dicunt *chor Wachs-Besle*. Erat autem veneris bubo, qui impositis emollientibus, manavit, & apertus magnam fudit puris copiam, quo evacuato, febris sensim magis magisque remissa, omniaque symptomata discesserunt, donec æger, traducto intra tres hebdomades ad consolidationem abscessu, penitus ad sanitatem rediit.

*Epigrifi.*

Ex hac historia id tantum occurrit notandum, quod febris ex glandularum tumoribus ortæ, teste ipso *Hippocrate*, perniciose sint, maxime omnium autem, quando causa tumoris materia virulenta indolis, uti in bubonibus veneris, ubi in curando, non modo ad febris impetum compescendum, sed & ad venenum è corpore eliminandum, respicere decet medicum. Dein mereatur & illud notari, quod partes omnes à vulnere quodam læsæ interne, a contracto postea morbo, vel febre, rursus præ aliis pejus afficiantur, & parthenata ibi affligere soleant extraordinaria, manifestissimo indicio, idu latere posse partis imbecillitatem & labem, facile exacerbandam.



FRIDERICI  
HOFFMANNI  
MEDICINÆ  
RATIONALIS SYSTEMATICÆ  
TOMI QUARTI,  
QUO  
SPECIALIS MORBORUM PATHOLOGIA  
& huic superstructa solida Therapia cum  
medendi methodo,  
CAUTELIS CLINICIS ET MORBORUM  
ENARRATIONIBUS ADJUNCTA EPICRISI EXHIBENTUR,  
PARS SECUNDA,  
DOCTRINAM HÆMORRHAGIARUM ET DOLORUM  
*perspicua & demonstrativa methodo tradens.*

DOCTISSIMIS  
MEDICIS JUNIORIBUS,

QUI EX SELECTIS IN FIRMA EXPERIENTIA,  
FUNDATIS OBSERVATIONIBUS ET MORBORUM HISTORIIS,  
NEQUE MINUS

EX THEORIA VERA ET RATIONALI  
IN SIMPLICISSIMIS NATURÆ MICROCOSMICÆ LEGIBUS  
ET MOTIBUS FUNDATA,

CIRCUMSPECTAM ET NON SINE AUSPICATO,  
PER DIVINAM GRATIAM SUCCESSU, SALUBREM  
ARTEM EXERCERE CUPIUNT.

HUNC LIBRUM

SINCERO ANIMO  
DICAT ATQUE COMMENDAT  
AUCTOR.

## P R Æ F A T I O.



Secundam therapie rationalis partem, veritatis Medicæ cupide Lector! Tibi jam exhibeo: cujus maturiorem editionem, occupationum & consulationum, quæ me in senio plurimum urgent, allidua multitudo, quodammodo retardavit. In præsentî hoc libro, difficilem & perplexam admodum maximique in praxi medica momenti materiam, de hæmorrhagiis & doloribus, paulo curatius evolvendam atque observationibus clinicis illustrandam mihi summi. Nam primo ex omnibus, quæ in genus humanum incidunt, morborum afflictionibus, febres si exceperis, vix ullæ dantur, quæ frequentius invadunt, quæ nulli ætati, nulli temperamento, nulli sexui parcent, quam spontaneæ à natura per varia corporis loca excitatæ sanguinis eruptiones. Hæ, probe consideratæ phænomenis & paulo penitius subductis rationibus, iisdem propemodum utut non satis completis motibus, quibus febres oriuntur, progignuntur. Nam sicut duo principales motus ad febrem constituendam necessarij sunt; alter qui præcedit & qui ab extrema corporis humani superficie ad interiora sanguinem & reliqua fluida urget atque propellit; alter qui sequitur, & ab interioribus versus exteriora rursus, eundem cum aucta cordis & arteriarum celeritate protrudit: ita similes etiam motuum species in hæmorrhagicis excretionibus concurrere animadvertimus. Etenim à nulla causâ interna suscitatur hæmorrhagia præsertim paulo gravior, quæ non extremorum refrigerationem & spasticam habitus corporis constrictionem, cum alvo plerumque stricta, urina tenui, & parciore per cutis cribrum perspiratione, comitem habeat, sanguinem ad interiora & cor pellendo: quem motum postea celerior & vehementior, non secus ac in febre fit, arteriarum motus & ad certam partem directus sanguinis impetus consequitur. Præterea, quemadmodum motus febriles in se & sua natura motibus vitalibus alieni, per sapientissimam autem DEI providentiam, quam in fabrica corporis humani dilucide demonstravit, subinde salutarem effectum exerunt, causamque ipsam à qua originem habuerunt expugnando, hominem sanitati restitunt: ita etiam sanguinis quæ præter naturam sunt excretiones, ipsam causam quæ eas excitavit quando subtrahunt, à gravissimis malis & periculo corpus sæpe vindicant. Cujus rei periodicæ menstruales in sexu sequiori sanguinis profusiones, atque per venas ani in sæxu nobiliori institutæ à natura sanguineæ evacuationes, testimonio esse possunt luculentissimo. Quando autem febrium vel hæmorrhagarum causæ ita sunt comparatæ, ut neque motibus istis iusto intensioribus, neque evacuatoriis tolli possint, quemadmodum fit, si vitium non tam in materiæ mole, quam in perversa & maligna humorum indole, aut visceris cujusdam corruptela vel obstructione, aut in motu animi immoderatiore consistit, nunquam tales motus salutes censendi sunt, eo quod in detrimentum & prætentissimum sæpe exitum convertantur. Et quia ejusmodi motus excretoriû hæmorrhagici, incompleti febriles, non rationali & intentionali quodam actu, multo minus ad salutarem finem destinato, sed ex causis physicis necessitatem effectus quæ inferunt peraguntur; fit utique, ut non modo vel in excessu vel in defectu sanguinis emittendi peccetur, verum etiam, quod sæpenumero evenit, per partes nobiliores & vias plane inconvenientes & alienas, conservationi vitali proxime inservientes, ut sunt cerebrum, pulmones, ventriculus, intestina tenuia, vesica, renes, plane perverse & erronee, cum ingenti harum partium corruptela nec non cum summo vitæ discrimine, sanguinis subinde valde copiosi exclusio suscipiatur. Ceterum etiam doctrina hæmorrhagarum ea de re multum difficultatis in usu artis habet, quod aliis iisque gravissimis tam acutis quam chronicis affectionibus sapissime conjungantur, & supervenientes quandoque, sed rarius, morbum solvant, sapissime vero in extremum exitum terminentur. Ex quibus omnibus adductis & paulo penitius consideratis facile intelligi posse arbitror, quam difficilis, ardua & intricata res sit, prudenter motus hos sanguinis excretorios tractandi, nec non, ut in salutem & conservationem corporis humani cedant, eos convertendi & dirigendi: atque hæc ipsa difficultas non parum succrescit & augetur, quod nullum in tota rerum natura divina sapientia constituitur remedium, quod tanta polleat efficacia, ut Medicus, pro suo arbitrio & rei exigentia, sanguinis fluxum si deficit, provocare vel restituere cum certo effectu possit. Enimvero Medicus, pro variis indicationibus & præservandi & curandi morbos, multi generis evacuantia possidet, ut pro lubitu ex-

cretionem per alvum, per urinam, per sudorem, per nares, per salivam, per expectorationem movere possit; sed ejusmodi medicamina, quæ sanguinem per certa loca pro Medici arbitrio evacuandi certa potentia instructa sint, plane non reperiuntur. Inter ceteras insuper difficultates non minima est, quod neque ullum certum detur remedium, quod sine majore detrimento enormem sanguinis profusionem expedite compescere possit. Quæ cum ita sint, intelligere quisque poterit facillime, quare post doctrinam febrium, quæ in priori tomo paulo penitus agitata & excussa est, intricatam & plane difficilem hanc in praxi frequentissime occurrentem materiam, paulo curatius præ ceteris evolvendam & illustrandam utilissimum imo summe necessarium judicaverim. Præter hæc placuit quoque in hoc Tom. II. dolorum pathologiam & theoriam paulo accuratiori scrutinio committere, & hæmorrhagarum tractationi subnectere, eo quod inter hæmorrhagias & dolores magnus sit nexus, magna consensio, & inter causas quoque & curationem conspiratio. Dolores præsertim acerbiores certis paroxysmis certisque periodis invadere, ac semper fere cum febriculosa quadam partium solidarum & fluidarum commotione, quam extremorum contractio, excretionum per alvum, per sudorem quæ sunt retardatio, pulsuumque postea celeritas & durities subsequitur febribus communis, fieri nunquam non observatur. Et si cui febrium paroxysmi, per motum sanguinis versus corporis superficiem restitutum & subsequenter sudorem salutariter finiuntur: ita etiam observamus dolorum tormenta non facile conquiescere vel sopiri, multo minus ex toto abigi, nisi prius sanguinis circulus uberior cum calore & madore subsequente ad partes extremas fuerit conversus. Neque iis qui assidue in artis exercitio versantur obscurum esse potest, omnis generis dolores, sive internas sive externas partes infestent, potissimum à sanguinis consuetis excretionibus retardatis vel plane cessantibus aut suppressis originem suam trahere, & vix aliter citius, nisi in ordinem iis prius reductis, perfectam sanationem recipere. Testimonio possunt esse cardialgici, colici, nephritici & podagrici dolores, qui, in feminis, fluxu mensium, in viris consueto hæmorrhoidum fluxu restituto, insigni allevamentum accipiunt. Denique conspiratio & harmonia inter hæmorrhagias & dolores vel exinde elucescit, quod in utroque affectu, non tam sanguinis puri, consistentis & fibrosi, sed potius vitiosi feri intra vasa collecti redundantia magis peccat atque delinquat. Et quemadmodum porro hæmorrhagiæ in iisdem locis, ubi semel vel iterum proruperunt, reverti solent, ob debilitatem relictam: ita etiam res cum doloribus comparata est, qui, ubi semel radicem egerunt in nervosis quibusdam partibus, quam facile has rursus occupant atque invadunt. Postremo quantum difficultatis atque negotii, hæmorrhagarum atque dolorum opportuna cura medentibus facessat & quod plurimorum remediorum efficaciam eludant, ita ut ab anodynis sæpius exacerbentur, in praxi notissimum est. Prægnantes itaque & justæ causæ hæc fuerunt, quare præ ceteris morbis, maxime præsertim hoc in secundo tomo, de hisce affectibus paulo curatius agere proposuerim. Et quoniam casus clinici & completæ de morbis historiæ unicum & verum pathologiæ & therapiæ rationalis fundamentum constituunt, sine quarum sufficiente apparatu nihil solidi Medicus in theoria statuere, neque in praxi præstare & efficere potest; cuius morbo notabiliores quæ mihi ad manus fuere adjecti observationes, in quibus fideliter & candidè morbi cujusvis historiam & progressum, quæ remedia, quo ordine usurpata & qualis effectus consecutus fuerit, exposui, atque simul in subnexa epicrisi inlignem usum & fructum observationum ad circumspectam & auspiciorem praxin exercendam demonstravi. Ego nihil magis in votis habeo, quam ut etiam alii qui ingenio pollent & in ampla praxi versantur publicumque bonum promovendi ardorem habent, me hac in parte sequantur. Ceterum nullus dubito, fore, ut plures ex Medicis, si scripta mea practica usque eo in lucem edita, quæ non præcipitavi quinquaginta annorum per DEI gratiam experientia innixus, cum attentione legant & perlegant, non modicum fructum in misere afflictos redundaturum abundanter percepturi sint. Sin autem invidi quidam aut in praxi rationali minus versati, hæc vel quacunque alia mea scripta vilipendere velint, id certe parum curabo.



# CONSPECTUS PARTIS SECUNDÆ

## SECTIO I.

De Hæmorrhagiis partium tam externarum quam  
internarum.

### PROLEGOMENA.

De Hæmorrhagiis in genere.

- CAPUT I. *De Hæmorrhagia narium.*  
 II. *De sanguinis fluxu ex pulmonibus.*  
 III. *De vomitu cruento, sine & cum secessu nigro, sive morbo nigro Hippocratis.*  
 IV. *De hæmorrhoidali fluxu nimio.*  
 V. *De ateri hæmorrhagia immoderata.*  
 VI. *De hæmorrhagia ex urinario viis.*  
 VII. *De hæmorrhagia cerebri.*

## SECTIO II.

De Doloribus & spasmis varii generis internis & ex-  
ternis nec non arthriticis & rheumaticis.

- CAPUT I. *De dolore cephalico.*  
 II. *De dolore cardialgico spasmodico & flatulento.*  
 III. *De doloribus & spasmis præcordiorum, à calculo felleo ortis, & de ejus generatione.*  
 IV. *De dolore & spasmo iliaco.*  
 V. *De intestinorum doloribus, atque in specie, de colica flatulenta & spasmodica.*  
 VI. *De acuto dolore & spasmo ex calculo renali.*  
 VII. *De spasmo & dolore vificæ & adjacentium partium.*  
 VIII. *De doloribus & spasmis externarum partium rheumaticis & arthriticis.*  
 IX. *De rheumatismo odontalgico.*  
 X. *De dolore & spasmo otalgico.*  
 XI. *De dolore podagrico & arthritico vero & inveterato.*



## SECTIO PRIMA.

D E

*HÆMORRHAGIIS PARTIUM TAM  
internarum quam externarum.*

## PROLEGOMENA

*De Haemorrhagiis in genere.*

## 6. L.

En quibus  
locis conti-  
nueris ha-  
ueris agis  
Sunt :



**R**IMO commemorandum est, quod sanguinis, quae sponte a natura sunt, excretiones, ordinario ex illis locis sunt, quae textura gaudens tenerior ac rariore, non quam raris tenuissimam

undiquaque difperfa ferpunt, neque firmis mem-  
bris circumscripta latitant, sed potius in superfi-  
cie morantur: ut privilegio quatuor maxime  
gaudent interior narium pars, pulmonum bron-  
chia, caro gingivarum, venericuli pars amplior  
similis, intestinum ileum, recti intestini extre-  
mitas, exterior ureth. & vaginæ subdantia; ex  
quarum partium nimium dilatare & aperta  
arteriolas cum impetu saepe sanguis prorumpit.  
Verum extraordinarie quandoque fit, ut per alias  
vias place inluctas, & in quibus paulo profun-  
dus vasa latent, sanguis sese exoneret. Ita per  
minimum digitum sanguinem excrementum vidit  
SALMUTHUS cent. III. obs. 36. i. HENR.  
AB HEER obs. 36. Ex genit. & manu profli-  
entem sanguinem mentium BARTHOLI-  
NUS observ. anat. cent. I. hist. 30. & ex mam-  
mis salu eundem prodeuntem PANAROL-  
US Penter. IV. obs. 15. i. AMATUS cent.  
II. obs. 24. & cent. VII. curat. 48. memorant:  
mentium vero in viris per penem profluvii ob-  
servations numero plures in STALPARIUS  
VAN DER WIEL cent. I. observ. 82. conspici-  
cimus.

§. II.

10-10-10  
 10-10-10  
 10-10-10

Sanguinis eruptiones perquam familiares solent esse iis, qui habitus corporis mollioris, spongiosioris, atque ætate tenerioris sunt, quorum vas copiosius sanguine de se ferro surgit, qui secundum veterum denominationem dicuntur sanguinei; his enim hæmorrhagie per omnem ferè ætatem solennes esse solent. Qui vero sunt

cholericis temperamenti, & vasa ampliora, stri-  
ctioremque corpora habuim possident, per quo-  
rum vasa sanguis celerius ferret & circulat;  
ii in juvenilibus annis hæmoptyl maxime sunt  
obnoxii. Sanguineo-melancholicis fluxus hæmor-  
rhoidum frequentior; & sanguineo-phlegmaticis  
formidius cruentus vomitus familiarior esse solent.

### 6. III.

Memorata quoque dignum est, diversas excretionum sanguinearum species in diversis aetatibus contingere; quæmadmodum id etiam jam olim eccle notatum fuit ab HIPPOCRATE *Secd. III. aphor. 27. 29. 30.* Videlicet pueri & adolescentēs sanguinis profluvium è naribus possitillimum patiuntur : in juvenibus quoque eximium suum per pulmonem vasa magis molitur, unde hæmoptysis & inde octa phthisis huic ætati familiarissima; in viris & qui in consistente ætate sunt constituti, sanguis per sedas venas, in decrepita autem ætate per vias urinarias plerumque eximium effluat.

6. IV.

Annotationem deinceps meretur haec observatio, quod vere de autumno, praeterit circa tempora aequinoctialia, Languis nimium reducens plus quam alio tempore ex alveis suis effundit solet, atque maxime per nares, in viris per haemorrhoides, si alias ad hunc fluxum dispositi fuerint, fluat. Sanguine quoque apoplexie, quae non nisi eruptione sanguinis in cerebri medulla sine, circa haec tempora et potissimum vere contingunt: Vomitiones vero et mictiones cruentas plus autumno quam vere incidisse, à nobis annotatum est. Aequae enim circa haec anni tempora solentur ejusmodi sanguinis excretiones et periodicè redire aequè reveri solent.

 $\xi, \nu,$ 

Observamus porro, omnes fere eos, quibus sanguis copiosius & frequentius in primis annis per nates erumpit, natura valde imbecilles, animo quoque sensibilibiores, varisque morborum afflictionibus, ipsius & doloribus per omnem fere aetatem subjectos esse, rarius etiam vitium

*Salvia*  
*lignaria*  
*plum.*

dixi protrahere: quippe in juventute in phibitione inclinari, in consuetudine ætate in malum flatulento-spasmodicum five hypochondriacum dolores incidunt, atque ætate proveciori ad faciles nephriticos & podagricos multum proclives sunt.

## §. VI.

Quæ præ-  
cipue hæ-  
morrhagie  
vix sunt,  
atque ab  
extrinsecis  
suscitantur.

Dispositio ad hæmorrhagias est plerumque nativa, quæ à parentibus in liberos transferatur; promittunt vero, per causas externas, quæ motum validiorem sanguinis inferunt, aut ejus intestinum partium agitationem intendunt, in actum deducitur: inter quas omnes animi & corporis motus solito intensiores, atque interna ex alimentis vel medicamentis assumpta valde calida acris & spiritusosa, intempestivus quoque balnearum, sudoriferorum, vel purgantium usus, principem sibi locum vindicant.

## §. VII.

Quando fa-  
liscitur?

quando  
extrinsecis?

Quemadmodum sanguineæ excretiones, quando à nimia valorum repletione & sanguinis ac feri redundancia fiunt, multum corpori salutis afferunt & promittunt: ita, quando à maligna acris materia, ut fit in febribus malignis exanthematicis, suscitantur, periculi sunt plenissima; & quodcumque ad viderum, præsertim hepatis, lenis aut etiam pulmonum obstructione, induratione & corruptela proficiuntur, lethum plerumque post se trahunt; quandoquidem facile in cachexiam, hydropsim, morbum sic dictum nigrum Hippocraticum, vel in hæticam lethalem terminantur.

## §. VIII.

Sanguinis  
lenis diutius  
durare non  
est causa  
perniciosa?

si forum  
expoluitur.

Qui sanguinis boni, & consilientis, fibrosi, purpureo colore præditi abundantiam, pro causa hæmorrhagiarum præcipua & proxima materiali agnoscunt, hi multum errare videntur. Nam, qui sanguine valde crasso, denso abundant, quales sunt, qui corpus fibrosum & robustum possident, atque illud ipsum labore strenue exercent, victusque duro utuntur, rarius sanguinis excretionem patiuntur: ubi vero major & ultra proportionem feri copia in vasis continetur, sicut fit in corporibus molliora texture vitæ otiose addictis & quæ serosioris nature sunt, sanguinemque copiosius quam par est vena emittunt, transpirationem impeditiorem habent, atque plus appetunt quam digerere & excernere possunt; ii quam maxime hisce præternaturalibus excretionibus & ex his provenientibus incommodis & morbofis affectionibus subjecti & exposti sunt. Excessiva quoque & incredibilis propemodum sanguinis, quæ non raro per naves vel per uterum excernitur, copia, plethoræ magis serosæ quam sanguineæ testimonium satis firmum exhibet: quod vero per pauca sæpe fit massæ rubicundæ porrio, respectu serosæ; id ex eo, quando è vena secta in ejusmodi enormibus hæmorrhagiis emissus sanguis in vasculo colligitur, luculentè demonstrari potest.

## §. IX.

In casibus  
quibus hæ-  
morrhagie  
spontanea  
quædam  
sunt præ-  
sentia.

Notabile insuper est, ubicunque in quadam parte plus solito sanguis erumpere gessit, in hac singularia prius quadam phenomena observari: ita totius faciei plus jussor rubedo ac calor, tumor quoque cum arteriarum majori pulsatione & distentione sanguinis è naribus profusivum pronuntiant. Antè sanguinis per uterum fluxio-

nem, lassitudo corporis, dolor dorsi & lumborum, sensio circa hypochondria, facies pallida, cuius horripilatio pororumque cutis contractio, contingunt. In hæmoptica præcordiorum anxietas, spirandi angustia, dolor gravatius undulatorius circa diaphragma, flatulentia in abdomine, exterminorum refrigeratio, ante eruptionem percipiuntur. Cruoris vomitum frequentissime dolor tenivus ac pressorius in hypochondrio sinistro antecedit: quin imò hæmorrhoidum eruptionem, spasmodicam quandam stricturam, flatulentiam abdominis, in osse sacro tenivus & pressorius dolor, corporis languor & excimerum partium refrigeratio indicare solent.

## §. X.

Ex quibus jam adductis & probe invicem expensis, liquido constare arbitror, hæmorrhagias, quibuscunque etiam in locis prodeant, neque à sanguinis copia, neque ab ejus nimia turgescencia exitum per vasa ascedant, neque ex lisi & sanguinis acrimonia, diatesin producente, aut ab ejus nimia tenuitate per valorum poros transudante, ut veterum fuit sententia, proxime & directè proficisci; sed potius ab extra ad imus conversio motu atque inæqualitate circulationis sanguinis oriri: id quod efficiatur, quando ceteræ partes, præsertim extremitates & de corde valde remotæ, intensiori filtrarum strictura ac contractione ita angustantur, ut sanguis per venas fluere nequeat, sed, harum aucta fistula, majori copia & impetu, ad alia loca easque inconvenientia transferatur; unde lateralia arteriolarum vasa, quæ ordinario non sanguinem strictè sic dictum, sed tantum tenuem lymphaticum humorem vehunt, plus jussu distendantur & tandem aperiantur necesse est.

## §. XI.

Ceterum causa quoque hæmorrhagiarum, præsertim enormium & symptomaticarum, quæ aliis morbis præcipue longis accedunt & superveniunt, in valorum & valcerum infarctu, obstructione, induratione, quæ liberiori cursui obicem ponunt, querenda erit. Videmus id in hydroaëticis machinis, ubi obstructis quibusdam canalibus, fluidum per reliquos apertos majori impetu & celeritate erumpit. Atque idem fit in corpore nostro: nam quando per venas ceteræ partium ipsarum contractas vel obstructas non libere transire & versus cor circulari potest sanguis, via & impetus cum impellens crescit in ramis & ramusculis atreosis, qui humore purpureo repleti & nurgidi in extremitate aperiantur. Declarant id maxime sectiones cadaverum, quarum leviter quidam attingisse sufficiat. Sic in hæmoptico dissecito, latus sinistrum pulmonis à tumore obfessum vidit WILLISTUS in *Pharmacia* p. 90. Itætiā in hæmoptico repeti fuerunt partium morbosissima materia argillacea per totum obtusi, & ventriculi dexteri auricula insignis magnitudinis. vid. M. N. C. *Dec. II. an. VI. obs. 217.* BLANCARDUS in *anat. præli. obs. 46.* lientem tumorem & vasa mesenterii atque omnia sanguine infarcta invenit. In vomitu cruento demortuo hepar durum & scirrhosum, lien quoque tumidus & sanguine impletus repertus fuit ab eodem Auctore *l. c. obs. 23. it. 32. conf. B. WEDELIUS in anat. met. met. BARTHOLINUS in hist. anat. p. 249. it. M. N. C. Dec. II. an. 4. obs. 86.* Recubitu hinc scribit FERNELIUS *meth. med. p. 14.*

quibus vitæ et levis imbecillitas et stultitia evadit, illis sepius sanguis e naribus fluit, non sicut ac Hydrops: id quod confirmat HEURNIUS apud Hippocr. p. 191. his verbis: *quibus facies colore subviridi suffusa est, hepate laborant; et signum est, an adjuvari hydrops frequent in iis curari per nares effluat.*

## §. XII.

Quæ hy-  
drops com-  
muni et hu-  
moribus

Quoniam autem, ex spasticis partium contractionibus & venarum angustationibus, sanguinis præternaturales erupiones plerumque suam originem & causam mutantur; liquido tunc intelligitur, quare hypochondriaci, in quibus ventriculus & universus intestinorum canalis nervosus, ob morbi peristaltici perversionem, flautentis dilationibus, spasticas quoque stricture afflicte affliguntur, ad motum & fluxum hæmorrhoidales valde sint proclives, atque, si sanguis ibi non exitum inveniat, hypochondriacorum pathemata plurimum exasperentur.

## §. XIII.

Quæ hy-  
drops com-  
muni et hu-  
moribus

In genere circa curationem omnis generis hæmorrhagiarum id velim notare, inconvenientissimum esse eorum medendi methodum, qui, dum sanguinis rubicundi & sæpius sic dicti abundantiam pro causa unica materiali & occasionali nunquam non agnoscunt, crebro insinuat sanguinis missionibus ausaciter utuntur; unit, præsertim inter initia & præservationis gratia, in sanguinis præcipue, tempestivum venæ sectionis usum plurimi faciunt. Recte autem medendi ratio unice in eo reposita est, ut primo impetu sanguinis à parte laborante, opportunitate remediis, ut sunt pediluvia, clysteres, externarum partium frictiones ac ligaturæ, calida tegumenta, foveæ, balnea, deridemus; deinceps ut spasticam nervosorum partium stricture relaxemus; & demum lenioribus per episcrasin laxantibus, & moderatis diaphoreticis, item inedia sive abstinentia à victu pleno sanguinem ingenerare, nimiam sensæ collicuius abundantiam subtrahamus & præcaveamus.

## §. XIV.

Epilogus.

Hæc de doctrina hæmorrhagiarum in genere dicta sufficiant: specialior & fatis in praxi utilissima argumenti evoluto & disculo in sequentibus capitulis conspicienda erit.

## CAPUT I.

## De Hemorrhagia varium.

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

Narum hæ-  
morrhagia  
com-  
muni et hu-  
moribus

Sanguinis per nares profuso debetur copiosiori eundem per validiorem cordis motum ad caput appellui, quo arteriole in punitaria tunica plus pulso implentur, earumque extrema nimium dilata tandem dehiscunt & sanguinem effundunt.

## §. II.

Narum hæ-  
morrhagia  
com-  
muni et hu-  
moribus

Narum ea fabrica, ut erupcióni sanguinis facile obsecundent. Etenim in earum interioribus sanguifera vasa in minutissima capillamenta di-

remata, per tunicam, quæ vomeris os, spæginosa ac edematoidia ossa involvit, copiose distribuantur, ac tenui admodum membrana exterior obteguntur. Unde facta validiori sanguinis eo affluxu, is difficulter admodum per venulas refluit, sed ex facili in arterioli resistit, harum extremitates ultra modum diducit, pertingit ac effluit, quoniam haud raro eadem in exigua aneurismata elevat, quæ postea stillacidum faciunt effusum.

## §. III.

Ad nares ipsamque caput validiorem sub hæmorrhagia fieri sanguinis & humorum confluxum, cordis & arteriarum vehementior motus, arteriarum in collo ac temporibus postillum intensio pulsatio, gravitatis in capite sensus, faciei rubor eundemque cum capite toto innascentia, narsque interioris siccat & calida, luculenter faciunt testium.

## §. IV.

Hujus congestiois palmaria causa inæqualitas sanguinis, per istam, maxime parium extremarum tubulos, progressum, tantum per venas non reducere, quantum per artérias adductum. Quo deinde fit, ut ad quasdam partes sanguis iusto parcius volutus sitque deficiat, ad alias vicissim copiosius cum impetu ruat, ibidemque canales ad creparum ulque faciundo, extendet.

## §. V.

Igitur quodcumque inæqualem sanguinis per inæqualem canales in corpore committum facit; id etiam ad excludenda hæmorrhagias confert. Jam pal-

latur sanguinis profluvium, maximeque omnium hæc per nares succedens, unquam facile sine cuius partiumque extremarum stricture, vasorum detumescencia, horripilatione, refrigeratione, sine alvi adstrictione, flatuum retentione, borborygmis in ventre, membrorum lassitudine, doloribusque in ventre coniungere solet, ut potius hæc phenomena ipsam profusionem ordinario vel comitari, vel antecedere soleant. Ex quo fit planum: spasticam quandam fibrarum & vasorum in externis maxime partibus minimorum stricturem, inæqualem sanguinis circuitus esse causam. Nimirum, quando per crispaturam hanc spasticam vascula sanguinem potissimum, tum etiam lympham, aut alios succos revchentia, nec non excretori illi in cute tubuli, per quos juxta naturæ legem serosa sanguinis portio expurgatur, comprimuntur, sanguis ad vasa interna majora regurgiat, quo major citatioque cordis & arteriarum proritatur contractio, & ipse sanguis ad partes, præsertim debiliores, validius appellatur, ubi eundem congestio, aut decubitus, demum causam erupcionis sanguinis, vel aliorum gravium affectionum præbet.

## §. VI.

Quæ quum ita sint, expedita nunc est disquisitio, quo pacto aliæ adhuc causæ concurrant ad excludendum sanguinolentum hoc stillacidum. Jam scilicet ex facili reddenda ratio, cur, qui succis & sanguine redundant, quieti ac sedentariæ vitæ indulgent, voraces sunt & laute vivunt, corpus tamen, præsertim pedes, frigori incautus exponunt, accedente impetiori corporis vel animi motu incerto, aut

Erup-  
tionem an-  
tecedit  
etiam ex-  
cessus  
sanguinis.

Con-  
gestio  
sanguinis  
in capite  
circum-

Erup-  
tionem  
antece-  
dit etiam  
excessus  
sanguinis.

In plethor-  
ico est ex-  
cessus  
sanguinis.

afflu-

affumit is, quae sanguinem plus exagitant, aromaticis, spiritibus, cerevisiis, vinis, pharmacis calidis volatilibus, nec non admittis balneis fervidis, sanguis per nares fluxum crebre de promte incurrit; eo quod his liber ubique de aequilibris sanguinis commotus interceptur, ut is per minima vasa farsa ad omnia loca aequaliter distribui nequeat, sed dispositas partes nimium obtundat. ita erumant.

## 6. VII

உதல் அரங்கம்,  
கொழும்பு  
இந்த நகரம், நம்  
புதிய நகரம்.

Haec difficulter quoque reperienda sic causa, et ad certam aëris atmosphæricæ constitutionem, cur hæc hæmorrhagia erumpat? Per observationem enim in composito est, plures, vere positivum de ætate circa æquinoctia, in prædictæ etiam ætate narium incurere stillicidium, non sine leviore. Tum quippe inæqualia admodum esse solent aëris habundæ & frequens ex calido in frigidum, ex sicco in humidum, ac vice versa mutatio. Qua vicissitudine crebriori, quia infiltratum corpori nervo-vascularium cunctis emanatorium male afficitur & tonus ipsius cum transpirationis succellu labefactur; mirum non est, sanguinis cursum ordinatum turbare & ad sanguinis eruptionem animare trahere.

## Ε. VIII.

Ex en frigidis  
de ac. long.  
melleo in  
glaciarum  
et vici  
sa montan-

Eidem causæ tribuendum, quod narium profluvium quandoque populus habeat circius, tum scilicet, quando nimis frigidum & humidum aeris ex aulro & septentrione confluentem, subito excipit in elasticam habitudinem mutato, vel etiam versa vice vicissimè succedit. Sic enim illa per cutis poros succedens copia humidi exhalato turbatur, ferofior sanguis pars augetur, majori copia ad vasa ampliora implumque coarctetur, quo validior in his systole & validior quoque flumidum impulsus, sed inaequaliter procedenda, inducitur.

## 6. IX.

*In his quod  
marchis spe-  
ficiat am-  
ma*

Neque minus in prono est iudicare, qui fiat, ut sanguinis per naturam excretionem saepe incurant viri, qui rheumaticis, nephriticis, arthriticis et ichthiadicis doloribus sunt obnoxii. Absolutum enim iam morbi motibus et fluctibus stasificum, quibus reddido inaequali sanguinis meatu, ejusdem collectiones et erupciones in aliis locis praeter naturam contingunt. Unde eximium utique Hippocrati lib. de prodig. II. monitum, praecipuum, ut ex aegris provectae aetatis ichthiadicis et rheumaticis doloribus affectis quaeratur: num ipsi adolefcentibus vel juvenibus ex naribus sanguis fluat.

§. X.

Quibus re-  
fi sunt  
alio for-  
gano ad-  
ministrat.

Non adeo infolens porro est, ut resistant in foemina praeteritum iunioribus, gravidis quoque, mensibus, & in puerperis lochiorum, nec non in viris haemorrhoidum fluxu, fanguis palindrome, narium haemorrhoidum exsurgat, sanguinolentum. Nulla tamen alia pariter subest causa, quam quod spissatis, quibus omnes haemorrhagiae spissae solent, aequilibrium motus sanguinis progressivi tollatur, siquae ad loca excretionis dicata cum impetu agatur, nisi vero ex his praefatis, rursus ubi congruum invenit locum ibidemque egrediendi sibi patet viam.

§. XL.

Frequenter præterea incidit, ut, in hi potissimum, qui tænerum, spongiosum & ad hæmorrhagias dispositum corpus habent, febribus, præsertim synochæ exiguæ, sese afficiet, nec non quartanæ superveniat, atque etiam in exanthematicis morbillosis de variolosis, ante eruptionem accedat sanguinis per nares profusus. Cupus hæmorrhæia tantis non nisi spæcificis nervosarum partium vehementibus stricturis tribuatur. Hæc enim nunquam fere non his in morbis prælo esse, quæ antecedere solent luculenter indicant, urina scilicet tenuis, albus strictus, cutis ad levem aurum admixta horripilatio, refrigeratio, inquietudines & anxietates, donec accedente faciei rubore de inflatione capicque dolore, erumpat sanguis.

## §. XII.

Nec praetereundum, Medicorum observata. Quibus  
subinde fidem facere, quod his, quibus grandia  
passio ex corporis membris nascitur, ut ampu-  
tatione, frequens esse solent sanguinis et narium  
hillicidium. Extremis eadem postica adhuc elique  
manetque sanguinis et chyli quantitas, spiritum  
vero, quo distendendi succi, minus quam antea,  
unde crues flagrant in minimis, et ut aliorum  
vergete motus eluctatorii, facit.

€ XIII.

Accedit alia inaequalium sanguinis motuum præter ipsam inducens causa, vicerum si licet sanguineorum, hepatis & fientis, infarctus autque obliteratio. Hic enim dum obex ponitur sanguinis per valvula cum visceribus continuata committitur, aliorum convertitur epi motus ac impetus, ac non raro superiora ipsiusque caput petit. Atque hinc accedit, ut inveterato scorbuto, hydrogæ & cachexiæ demum, accedat hemorrhagia sæpe funesta. De quo præsum jam Hippocrate de præditi, testimonium, magnos limes comitari hemorrhagias.

€ XIV.

Ipsum autem sic concurrentibus variis causis exclusum sanguinis (siccitatem, vel ex dextra, vel ex sinistra nare, raro ex utroque simul), succedit, ac praeterea, pro uberiori, vel parviori sanguinis ad caput afflusu, epistemicum ibi facto decubitu, ratione quantitati multum differt. Interdum enim abque tantum illant guttulae, quandoque effusum aliquot unciae, non nunquam vero tam effuse per abque horas maneat sanguis, ut quinque vel sex librarum pondus

§. XV.

Dein hæc tarius hæmorrhagia, ratione suc-  
cessus, quibusdam longius, quibusdam brevius  
accidit. Quoddam etiam læpius, quoddam rarius,  
infestat. Pueris scilicet & adolescentibus famili-  
rior est, rarius viris ac senibus. Lucide quoque  
frequentius in yirilis, quam in femininum sexum,  
qui exundans sanguis folet inter expurgatur per  
uterina vasa. Neque minus ut plurimum & cre-  
brius observatur in iis, qui spongiosis, copiosis  
atque exilibus dotati corpori habui præditi, non  
vero ita in macilentis & amplius vasis pollentibus,  
quibus tamen si accidit hæc hæmorrhagia, esse  
levis effluor.

## §. XVI

## §. XVI.

Falsa re-  
da.

Præterea attentior docet observatio, eos, quibus inuenit ætate copiosa mucida & serosa per aures, nares oculoque exierunt, superatisq; uber-  
tatis annis, narium hæmorrhagiæ fieri obnoxios. Hæreditariam etiam sæpius esse hanc sanguinis  
evacuacionem & à parentibus transire in libe-  
ros experientia constat. Et nullam hæmorrhagi-  
am tam facile reperire, quam quæ per nares  
contingit, est pariter certum; ita ut elapso diei,  
aut tantum aliquot horarum spatio, sæpe recrude-  
scat.

## §. XVII.

Quando-  
que salma-  
ru est plu-  
rima.

Jam omnes quidem solite & frequentes san-  
guinis fluxiones, debiliorem naturam, hoc est,  
talem partium corporis structuram, quæ impedi-  
tori minulque æqualib; sanguinis progressui  
faver, indicant. Interim tamen salutares omni-  
no sunt, quando à nimia sanguinis mole, in  
spongioso maxime corpore, stagnationum pesti-  
marumque passionum metus est. Nec defuit nu-  
merosissima apud observatores medicos exempla,  
quibus vertiginem, scotomiam, gravativos cap-  
itis dolores, phrenitidem, convulsiones quo-  
que & epilepsiam, per narium hæmorrhagiam  
soluta annotantur. Vicissim quam gravia damna  
à præpotente hujus excretionis suppessione infe-  
quantur, vertigines, apoplexie, epilepsie, con-  
vulsiones, aurium cum auditus difficultate tinnus,  
nec non serena gutta, vel solus primus artis  
parentis Hippocratis passim confirmat, maxime  
prædict. & in cæcis.

## §. XVIII.

non nun in  
synocha.

Criticæ quoque & salutares sunt ut pluri-  
mum narium hæmorrhagiæ, quæ in synocha fe-  
bre, semicritico die, inter tertium scilicet & quartum,  
vel etiam critico pleno, septimo erumpunt,  
& hæc febres, à pichthora ut plurimum or-  
tas, solvunt.

## §. XIX.

Frequentia  
narium  
puris, juveni-  
bus & ad-  
ulti mor-  
bis indica-  
tio.

Attenta in artis exercitio observatio docet, &  
ab Hippocrate jam notatum, eos, quibus in pueri-  
tia frequenter fuerunt narium stillicidia, acce-  
dente juventute, facile incurrisse pectoris morbos  
graves, hæmoptey facili, pleuritides, peripneumoni-  
am ipsamque phthisin; in proventu autem æ-  
tate virili, hæmorrhoidali fluxui, affectibus rheu-  
maticis, arthriticis, ischiadicis, nephriticis & co-  
licis factos fuisse obnoxios.

## §. XX.

Enormis ac  
diuturna  
morbus.

Enormes ac diuturnæ sanguinis per nares pro-  
fusions, quando ex vehementioribus interna-  
rum partium spasmus pendunt, præcedentibus æ-  
xtremorum refrigerationibus & lipothymiis, tandem  
in mortem terminari solent. Vidimus id ante  
quadraginta annos in foemina generosa, in qua  
post mortem caroides mirum distensæ & duplo  
capacioris, inferior autem coli portio artius stric-  
ta, comparuerunt.

## §. XXI.

Quædam  
sunt in ex-  
anthesi  
morbus, maxime  
in phthisi  
morbus.

Quæ febribus exanthematicis, vel etiam ma-  
lignis, ubi summa virium prostratio, accedere so-  
let narium hæmorrhagiæ, monstrat aliquid aliud semper,  
viresque magis adhuc deiciendo & sanguinis  
ad corporis superficiem cursum una cum materie  
peccantia expulsiõe minuendo, periculum ad-

ducit gravissimum. Quæ etiam in chronicis mor-  
bis, ubi viscera destructa, erumpit, ad mortem  
ducit, & quæ propter cachecticæ & hydropicæ  
funelia ut plurimum obliuvar sanguinis per na-  
res evacuatio.

## CURATIO.

## §. I.

Si enorme sanguinis profluvium præsens est & *Remedia  
periculosa  
appropin-  
quanda  
causa.*  
periculum minatur & nimium destruit vires, uti-  
que auxilio medici opus est. Versantur autem  
medendi rationes potissimum in eo, ut perspectis  
geminis causis, ea opponamus, quæ illis tollen-  
dis sufficere possunt.

## §. II.

Quando itaque nimia humorum & sanguinis *Redundantia  
in sanguine  
exagge-  
rata.*  
redundantia atque expansiva ejus vis & turgescen-  
tia liberiores & æquales per minima vasa ma-  
transitum impediens, inmodicam talem fluxionem  
causatur, quod præsertim fit in corpore ju-  
venili, verno tempore & à motu corporis paulo  
fortiori, vel etiam ab ingesta spirituosius san-  
guinem exagitantibus, præter venæ sectionem,  
quæ etiam sanal diverter motum sanguinis à ca-  
pite, nitrosa omnibus aliis, ad nimium orgas-  
mum compescendum & relaxandas etiam ip-  
sificas partium stricuras, palmam præcipiunt.  
Osm jam ipse Paracelsus, nec non Helmsius,  
hoc sile tæorum purificatio, in omnibus hæmo-  
rragiis cum fructu usi sunt. Et Riverius in præ-  
xi & observacionibus suis, hujus remedia effica-  
ciam in sistendis fluxibus sanguineis non satis  
dilatate potest. Similis tamen effectus, ut *adde.*  
paulo inferiora, sunt ipsa acida, tam tempera-  
tiora ex vegetabilium familia, ut ciori succus,  
berberum, aqua & succus acetosellæ, quam po-  
tentiora ex mineralibus, ut phlegma, seu spiritus  
vitrioli dilutus, vel tinctura rosarum & thorum  
belliis, cum aqua acetosellæ & spiritus vitrioli  
preparata, & cum aquæ fontaneæ ponæ, cujus  
etiam magna vis est, intestinam illam sanguinis  
elasticam vim componendi, propinata.

## §. III.

Quia vero in effrenibus ejusmodi & periculo-  
sis sanguinis profluviiis spasica quedam nervo-  
sarum partium stricтура plerumque subest, quam  
presso, ut dicunt pede, inæqualis fluidorum se-  
quitur progressus, præter jam laudatæ nitrosæ, ad  
blandam anodyna solvendi est confugiendum, quo-  
rum in numero papaveracea, ut aqua, vel etiam  
extractum, aut syrupus papaveris rhæados, sy-  
rupus papaveris albi, emulsiones, quæ semina  
quatuor frigida & fœnem papaveris albi habent,  
& ex aquis florum acacie, sambuci, tilie, ul-  
marie, chaniomillæ vulgaris, prunelle veris con-  
fectæ sunt. Persistente vero perniciaciore validiore  
solidorum impetu, descendendum ad efficaciora,  
& aliquot grana massæ pilularum de cynoglossi  
offensenda. Camphora quoque, propter sulphu-  
reos, quas copiose spargit, exhalationes, sedati-  
vum præstat effectum, præsertim si cum nitro,  
animumo diaphoretico, pariter & refractorius ejus  
dosis permixta fuerit. Qualis pulvis insignem  
imprimis locum invenit, si exanthematica que-  
dam materia, ut sæpius evenit, ejusmodi san-  
guinis profusionis causa fuerit. Ex omnibus vero  
ad moderandas sanguinis tam per narium, quam  
alia loca profusiones, vix tutius & certius datur  
ullum

illum remedium, liquore meo anodyno minerali, qui sulphure viridiori anodyno fixus & penitus satur est, & sive solus, sive adhuc melius, pulveri nitroso nupca & cum aqua tantum fontana data, organum sanguinis illum effrenem protinus compescit.

## §. IV.

Præterea urgente gravius malo, ut sanguinis impetus à superioribus divertatur & alio dirigatur, curandum hunc in finem plura sunt proficua. Palmarium venæ sectio in parte inferiori instituta. Dein egregia pediluvia temperata, vel immisiones manuum in aquam tepidam, quibus laxantur fibræ, partiumque vasculorum tonus remittitur, & sic quodammodo nimius sanguinis ad superiora affluxus impeditur.

## §. V.

Cum porro materia acris biliosa, flavaum & spissiorum generis sapius, & præsertim in hypochondriacis immodicæ sanguinis fluxionis causa sit; derivandi scopo certe egregia vius eorum, quæ canalem intestinorum blande expurgant. Quæ interius dantur, sint temperatiora roborandique simul facultate donata, cujus generis sunt rhubarbarina, thabarbari pulvis, in substantia cum aliquot salis polychrædi & neri gravia permixtus, vel passule rhubarbarina. Exterioris idem præstant chylitres ex emollientibus, carminativis temperatis & oleosis parati, qui latentia in intestinali canale spissos & status mulcent ac evellunt.

## §. VI.

Divertant demum etiam nimium sanguinis affluxum simul atque imbecilliores partem roborant exterioris applicata fronti, naribus & collo refrigerantia, cum discurrentibus mixta, ex quibus probatissime virtutis epithema, quod ex aceto rosaceo, rutaceo, nigro, camphora, oleo ligni Rhodii paratur, atque etiam naribus intrahi possit.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ

## §. I.

Qui impetuosis & frequentioribus narium hæmorrhagiis obnoxii sunt, ad has præcavendas, corpus, maxime pedes, ipsumque caput, à frigore probe defendere debent, ne perspiratio impediatur, quæ sicuti ad omnes hæmorrhagias, sic etiam hanc, multum confert, dum abundantia sanguinis & humorum etiam impurorum inde progignitur. Consulendum igitur est, præter abstinentiam à largo victu, hanc excretionem corporis moeu, & infusus theiformibus, ex herba veronica, sumenitibus misceoli &c. servare ac promovere.

## §. II.

Qui hæmorrhagiis in juventute frequentius fuere tentati, postea in celsantibus & oeglecta etiam sanguinis missione, cavere maxime debent ab omni vehementiori corporis motu, etiam intenso clamore, sermone ac voce. Observavi enim in aliquot literatis docentibus capitis morbos fere inmedicabiles, aurium tinnium perpetuum, capitis dolorem, paralyfin quoque supervenisse.

## §. III.

Maxime omnium vero post enormes hæmorrhagias cavendum est a refrigeratione corporis, etiam capitis, nec non à ætore. Hoc enim neglecto, ingentem torporem, stuporem, dolorem gravatum capitis, cum dolore oculorum, visus imbecillitate, vertigine subortum observavimus, quin summam totius corporis debilitatem ipsiusque apoplexiæ metum. Nam quo plus exhaustum sanguine corpus, eo magis cavenda sunt ea, quæ sanguinem ab exterioribus partibus ad interiores repellunt.

## §. IV.

Eandem ob causam in profusa hæmorrhagia cause, & quidem statim ab initio, mercandum est cum frigidis & adstringentibus, tam per nares strahendis, quam episthematis forma exterioris applicandis. His enim incautus admodum, sanguinis impetus, obstructis naribus, vel ad alpe ram arteriam & pulmones, suffocationis metum, vel ad interiora cerebri conversus, apoplexiæ periculum infert. Tutius ponis est de consiliis, præmissa pediluvia, & alvo per clysteres soluta, ac venæ sectione, si opus fuerit, in pede administrare, exterioris hæc demum uti.

## §. V.

Illæ sanguinis fluxiones, quæ à sanguine nimium redundante, omnia contacta venæ sectione & deficiente in feminis menstrualis purgatione, vel emanante lochiorum in puerpera, aut in viris hæmorrhoidum fluxu, oboriuntur de plus salutis quam periculi asserunt, nullo modo sistendæ sunt cum vi. Si vero modum excellerent, præter derivantia jam dicta, corallia cum specibus de hyacintho & nitro mixta, ac sacco citri imbuta, propinare sufficit.

## §. VI.

Neque minus maximopere est cavendum, ne contacta per periodum recurrentes epistimodi hæmorrhagiæ subito cohibeantur exterioris, aut internis. Inde enim in sensibus lethargum, imo apoplexiæ obortum, non letel observamus.

## §. VII.

Solo frigido aque fontanæ in & extra paroxysmum potu, modo externa corporis superficies convenienti foveatur calore, succellive ad duas vel tres mensuras singulis diebus hausto, narium hæmorrhagiæ compositæ esse novimus, præsertim in cholericis, biliosis & aliis intensiorum partium sulphurearum organus est, qui hac ratione optime complacatur & blandus plerumque sudor optimo effectu suscitatur. Quare non improbandum consilium, ut, qui inmodica de crebrioribus vexantur hæmorrhagiis, aquam fontanæ, sed puram, ordinariis potus loco bibant.

## §. VIII.

In symptomatice & raro cum bonis agnatum rebus cunctantibus epistimodi profluvius, qualia febres exanthematicas, variolas, morbillos, purpuram floribaciam, imo ipsas petechias comitantur, non alia convenit exhibere remedia, quam quæ nimium æstum moderando, concutientem perspirationem blande promovere, inquit quæ frequentis & probati usus mihi est mixtura ex aquæ storum sambuci uncis quatuor, aceti de-

*Refrigerantia & adstringentia.*

*Externa quæ cohibent fluxum arterialem.*

*De plethoricis hæmorrhagiis non visibilibus.*

*Negus enim si per videri esse.*

*De cholericis & frigidis partibus prædispositis.*

*De symptomaticis hæmorrhagiis.*

destillati uncia una, lapidum cancrorum, diaphorici Fracastorii, ana drachma una; niri scrupulo uno, addita syrupi popaveris rhodaei sufficienti quantitate; de qua biborio quovis æger duo cochlearia capiat & temperato lecti calori se committat. Ac si quippiam malignitatis subest, pulvis ex antimonio diaphoretico, nitro depurato & camphora propinquandus.

## §. IX.

*Amens  
quibus pro-  
pandis.*

Quibus in pueritia & adolescentia sanguis frequenter à naribus stillavit, non haud raro, cessante postea hac fluxione, capitis, oculorum & aurium vitia, nec non tumore parotidum vexantur, vel etiam gravioribus malis, epilepsia, phrenia, idiopathia, vel symptomatice, affliguntur. Quod ubi incidit, tum utique commode, si caput ejusque vasa sanguine turgent, nares ad sanguinem fundendum externo artificio irriandæ & aperiendæ sunt, idque plerumque penna, vel stramine in nares foras intruso, vel instrumento scarificatorio perficitur. Idem cum fructu admodum, si in febrili synochis & sanguinis ingens sanguinis impetus ad caput prælo est, & gravis symptomata sine ejus effusione efficit.

## §. X.

*At animi  
afflictibus  
promotis  
inducenda.*

Hæmorrhagiæ impetuosa, quæ sunt à gravibus animi afflictibus, peculiarem tractationem postulant. Quod si enim ab animi exacercentia sunt, pulveres antispasmodici, nitrosi, cum pura aqua frigida succellive dati, eximie profunt; si vero à gravi morore oriuntur, diaphoretica cum antispasmodicis mixta, liquor noster anodynus mineralis, cum quarta parte spiritus Bussi, cum regimine blande diaphoretico, omne curationis abolens punctum.

## §. XI.

*Hæc non in  
cachectici  
de fœdore  
sunt.*

Cachectica si fuerint corpora hæmorrhagiam hanc incurrentia, rhabarbarina, variis modis crebriusque oblata, sine sola, sive cum salibus digestivis permixta, omnibus aliis id genus remediis præferenda esse experientia didicimus; si vero scorbutica viscerum labe subest, feri latius cura, interpositis rhabarbarinis, erit omnium optima.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Hæmorrhagia in  
cachectico de  
stilla.*

Vir sanguineo-phlegmaticus, quadragesimum ætatis annum egressus, à multis jam annis, tam cerevisiæ, quam vini potui nimium indulgens & cachecticus redditus, incidit in icterum, qui congruis remediis rhabarbarinis & aperientibus item discutientibus extenuis aliquoties sublatu, sæpius rediit, ac tandem cutis nigrore prorsus fuit tincta, simul narium erupit hæmorrhagia, quæ remedia compesci potuit nullis, sed diu notuque sanguis tenuis, lividus, coagulatum profusa respuens exstillavit, subsequuta virium jactura summa, & extremis semper frigidantibus, mente constanti obiit.

## Epiirisi.

Omnes sanguinis profusiones in cachecticis corporibus, si modum excedunt, atque ex vicio & obstrucone hepatis vel lienis sunt, multum periculi sunt, nec facile admittunt sanationem,

duplicem potissimum ob causam. Scilicet propter obstrucone alicubi vasa æqualis sanguinis cursus turbatur, & ad aliam partem plus, quam secundum naturam debebat, sanguinis convahitur, cui postea facile supervenit eruptio igitur. Dein si vicia nobis, quod, uti hepar, sanguinis repurgationi, sulphureas acris partes fecerendo, dicantur, est obstrucone, remanentibus in his recementis, succi in corpore sunt falsi, acres, impuri ac intemperati, qui postea partem spasmus concitando intendos, partem renera vascula erodendo, plane hæmorrhagias faciunt incompescibiles. Id quod sæpius evenisse vidi ictero nigro laborantibus, inter quos etiam fuit, cui ex gingivis sanguis tam effuse profluxit, ut nullo modo posset reprimi. Narium quoque hæmorrhagiam ex ictero nigro lethalem auvaturus M. N. C. *Dec. II. ann. II. obs. 144. pag. 318.* Et maxime omnium hæc in re non novandum *Heurnii* testimonium, quod notis in *J. III. aph. XX.* ita habet: *vidi non nullo, quom à vitiis liberaliori usu affluente & in hæmorrhagiam transirent, tandem evasisse ictericos morque in hydrope abisse calamitosum hoc malum.* Nec non illud, quod *epid. L. VI.* consignavit: *qui vito lenis laborat, & quibus viridis atque colore facies, nares sanguinem fundunt, malum.*

## OBSERVATIO II.

A triginta, & quod excurrit, annis animo adhuc obervatur memoratu dignum de hæmorrhagia narium lethali exemplum in femina illustri, tum hec degente. Erat hæc circiter trigennaria, macilenta & natura alvi signioris, & cum utero gereret, perperuas, ultimis præsertim mensibus habuerat querelas, de calore leno continuo, virus mirum amenece, cum intercurrente cordis palpitatione & quandoque tanta pulsuum debilitate, ut vix perstiterentur, & ægra vernacula asseveraret: *Et voire sûr, ah vœu des Herrz gar keuse Kraft biste und in W. affer lige.* Post superas parvus labores, lochia manarunt non sufficienter, & succellit à naribus fluxus satis largus sanguinis tenuis non coagulatum affluente. Subsilente hæmorrhagia hac interjecto aliquot horarum spatio, inceserunt perperam pathemata spasmodica eruculenta, cum extremitum frigore summisque anxietatibus, sub quibus mens ipsa sibi non constabat animusque desperans erat de salute, donec erumpente rursus à naribus sanguine, pathemata lenim remitterent & mens ad se rediret. Discessit postea hoc sanguinis profluvium iterumque accessit per paroxysmos, ita, ut per duas vel tres horas succederet, postea ad duodecim vel octodecim horas inducias daret, tum prævis anxietatibus, inquietudine, extremitum frigore, & faciei rubore rediret, inter quæ antecedentia pathemata mens semper erat aliena, de desperatis cogitationibus adeo turbata, ut nec divini verbi solaria eidem erigendo sufficeret, quæ tamen extra paroxysmum avidè sibi applicabat decumbens. In hoc tam gravi malo, consilia de auxiliis adhibita multa; venæ sectionem natura horruit ægra, laxantia autem, clysters, pediluvia, frictions, nitrosa omniæque alias præstantissima fuerunt infructuosa. Unde per continuas sanguinis profluvium vires prorsus exhauriæ atque dejectæ, pulsuum ictus facti inæquales, inquietudo perpetua, donec exactis inter hæc quatuordecim diebus, lipothymia tandem sub ipso paroxysmo spasmodico occumberet lethali.

*Hæmorrhagia narium in puera  
lethali.*

*Epiirisi.*



## Epicrisis.

Quamvis narium profluvium hoc in casu speciem præbuerit critici & salutaria in locum lothiorum minus sufficienter fluentium succedentis; tamen propter pathematata in tenera & debili puerpera supervenientia spastica hysterica, uniusque exiit fuit plenissimum. Tanto certius autem fuit periculum ac damnum, in persona, cuius vires propter æstum, diutius jam corpori tempore, quo unco gessit, inherenter, crasin sanguinis & temperiem naturalem destruentem, unde etiam sanguis sine coagulo prodit, jam ætate, & postea per ipsum profluvium penitus quonidie magis prostrata sunt atque dejecta. Nam spastici semper in corpore viribus destituto graviores sunt & pernicioses, & vel hæmorrhagias, vel inflammationes, aut congestiones sanguinis, in capite relinquunt. Unde, quando gravidæ, ultimis præsertim mensibus, cum æstu interno de virium debilitate valde queruntur, vidi sæpe & prædicti in puerperio prævos evenisse. Liqueat etiam ex hac morbi historia, in paroxysmis spasticis redeuntibus, desperabundam illas & melancholicas anxias mentis alienate cogitationes originem suam in femina alias eximie potatis, a congestione & stagnatione sanguinis in cerebri valis traxisse, minime vero, ut vulgus autumat, a malo demone fuisse obortas, quam fluente sanguine per nares & spasmus remittentibus, omnia pathematata desperabunda simul quoque & semel expirante.

## OBSERVATIO III.

Hæmorrhagia spastica in capite jam puerpera frigida.

Juvenis perillustis, sanguineæ constitutionis & facie floridus, in pueritia & adolescentia crebro jam fuerat expertus narium stillicidium, & postquam in nostram hanc ante aliquot annos concessisset Academiam, tantam sanguinis & naribus profudit successively copiam, ut sex, vel octo mensuras completeret. Quo inducta ingens virium dejectio, cum appetitus languore visusque hebetudine. Data quidem plura congrua alius remedia, sed frustra. Tandem & ego in consilium vocatus sum, ut ordinari potius loco aquam fontanam frigidam, cum tinctura rosarum, spiritu vinolii aciculata & syrupo berberum remissa bibere, corpusque exterius, præsertim pedes, probe à frigore defenderet. Quæ cum aliquandiu per quatuordecim circiter dies servasset, sublevis sanguinis fluxus, ac posteaquam iussu nutriendi gelatinosis ex carnis sanguis exhaustus nimis reparatus, convalescit æper ex voto & ipsa quoque visus hebetudo cessavit.

## Epicrisis.

Hæmorrhagia fuit maxime obnoxii junioris, sanguinei & sanguineo-cholerici, habitus corporis spongiosi, iktemque miram sic sæpe quantantem sanguinis, circa vitæ periculum, profundum. Conspicuae sunt ejusmodi largi profluvii historie à Zacuto Lusitano, Vallersola, nec non Foresto. Et nuper admodum tenuit mihi Theologus, se per multos jam annos obnoxium esse tam largo narium stillicidio, ut non nunquam uno die vel quicquid mensuras perdat, facie tamen semper rubicunda, pulsatque auctiori manente, nec quoquam proficere adhibita media, quin cohibito per spiritum vini naribus attractum fluxu, spirandi accedere anxietatem. Sed modo viscera salva sunt, nec sanguis impurus foetebat; Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

reflutionis tamen spes est, licet vires haud leviter per nimiam sanguinis profluvium attrahantur. Ex omnibus vero ejusmodi in casibus præstantior virtus frigidus potus, ex aqua tantum simpliciter, sine additione acidorum, eaque sæpius cohibita & naribus hæmorrhagiam vidi. Id tamen monendum, hoc remedium in eis tantum obtinere locum, qui non ex viciorum obstructionibus & inestruarum partium spasticis fluctibus, sed ex nimia elasticitate & expansione partium in sanguine fulphurearum, atoniam valorum inducentem, hoc malum incurant. Frigus enim sic cum potu intro admissum, compellit organum fibratum nimium remissas adducit, eoque facit, ut sanguinis impetus ab affectis locis discedat & ad exteriora ab interioribus diveratur, ac haud raro sudor erumpat, boni in hæmorrhagiæ semper ominis. Eadem hæc medicatio etiam locum habere potest, ubi à fortiori corporis motu, calida tempestas, potu spirituosissimo quoque etiam ardenti veneris maxime deficiat, sanguis valide exagitatione prorumpit. Quo casu præterea Hildanus non sine ratione intransiitionem in balneum frigidum suadet.

## OBSERVATIO IV.

Generosa femina, quinquagesimum sextum ætatis annum ingressa, vegete alias constitutionis, per quinquennium admittere soluit factam alias venæ sectionem, sed interea aliquoties hæmorrhoidalium venarum stillicidium fuerat experta. Hæc ante mensum, eo tempore, quo propter aeris constitutionem insalubrem vari generis febres circumbant, etiam paroxysmo correptebatur febri, accedente tertio die delirio levi & narium stillicidio parco, quo tamen delirium non remittit, sed perfertur potius cum leni quodam & continuo cutis madore. Medicus in consilium vocatus dedit nitrosos & cinnabarinos pulveres & quædam aliquot mensuras aquæ frigide ebibere jussit. Accedente sexto die graviora facta sunt cum delirio pathematata, unde medicus, quod primis diebus faciendum fuisset, venam secare jubet in pede & decem circiter sanguinis uncias emittere. Inde quidem æstus & pulsus sedatior factus, delirium quoque remittere visum, remansit tamen languor maximus, quin octavo die sedierunt pristina pathematata, si non majori acerbitate, tamen eadem. Tandem quoque per uterum & anum excreta fuit ingens non tam sanguinis, quam feri sanguinolenti quantitas. Hinc iterum temittere viâ primum morbi atonia, sed exacerbata paulo post denovo. Accessit præterea singulus, quem medicus frigida aqua clystere ano insula compreffit. Post hunc rursum per uterum magna rici colluvies evacuata, ac postremo sanis cessit ægra.

## Epicrisis.

Ad hanc ægram accesserat die septimo & ego; sed malui spectatorem agere tantum, quam medicationem suscipere. Expectavi potius tantam, quam prædicti, brevi factum, tanto magis, quum de evacuatione feri sanguinolenti per uterum & anum redderet certus. Interim testimonio est hæc morbi historia, venæ sectione non inestpiendum, aut anticipandum esse criticum sanguinis fluxum, qui in synocha febre septimo die solet erumpere. Haud dubia & fallacia enim fuerunt indicia, naturam ejusmodi criticum fluxum fuisse fulcrum, eaque propter venæ sectionem

Hæmorrhagia in synocha venæ sectione non curanda.

fectio primis, non postremis diebus, fuisse insti-  
tuenda, naturae negotium certo turbatura. Vi-  
cissim nunquam ego cum bonis agrarum rebus  
accidisse novi feculum non sanguinis, sed feri  
sanguinolenti per utrum. Etenim putrida talis  
haemorrhagia labem in utero haud obicere inuit  
inflammationem, tanto certius, quo magis deli-  
rium & synsymptomata inde oriendorum nullum  
levamentum ferunt testimonium.

## OBSERVATIO V.

*Haem-  
orrhagia  
morbilli  
accedens  
sanguis.*

Juvenis Hebraeus, constitutione sanguineus,  
decimo octavo aetatis anno morbillis correptus,  
experiebatur simul narium haemorrhagiam copio-  
sissimam, cum anxietate praecordiorum pectorif-  
que oppressione eximia. Vocatus ego dedi mix-  
turam, ex decocti cornu cervi aquae florum sambu-  
ci uncias quatuor, succi citri uncia dimidia,  
coralliorum drachma, nixi puri, discoordii Fra-  
castorii scrupulis duobus, syrapi acetosissimi ci-  
tri uncia semis. Quae per vices cochlearum assu-  
pta, eruperunt nocte una morbilli, sedata sym-  
ptomata, compressa haemorrhagia.

## Epirisus.

Morbilli complicari narium stillicidium non  
adeo rarum est, praesertim in plethoricis. Quia  
in sequiori sexu non modo per nares, sed vomini-  
um etiam ac uterum sanguinem effusum esse  
novi, imprimis in iis, quae exquisitis sentientia  
& ad iram prone naturae. Sed si in exanthematis  
eiusmodi morbis incidit haec haemorrhagia, eadem  
nequaquam sedanda per frigida, sed illa,  
quae materiam illam acrem causticam nerveis  
membris insidentem easdemque ad spasmodicam  
stricturam sollicitam conservant simulque  
blande expellere juvant. Et hunc utique effec-  
tum adhibita mixtura praestat egregie, de quo  
praeterea multiplicia experientiae sunt multa tes-  
timonia.

## OBSERVATIO VI.

*Memor-  
rhagia  
non quan-  
tum sa-  
napa.*

Puer generosus tener, octennis, ipso hoc an-  
no, quo febres admodum frequentes, incidit in  
quartanam, quae licet aliquoties depelleretur,  
semper tamen rediit, ut aeger demum abdomen  
inflatum & faciem lividam circumferret, quibus  
crebriores accesserunt haemorrhagiae narium. Mi-  
nus fausti haec videbantur omnis; nihilo minus  
adjuvante DEO, infuso rhubarbarino, cum li-  
xivio alcalino & nitroso, admixtis extractis ama-  
ris, inter potum dato, febres ex toto quiever-  
unt, atque passim cum haemorrhagia discussa.

## Epirisus.

Mala utique fuerunt haec indicia. Sed in infan-  
tibus, non tam facile obstructions & induratio-  
nes viscerum accidunt, quam in adultis. Ex si  
etiam adhaerens primordia eiusmodi labis, faci-  
lius tamen haec amaricantibus & salinis iterum  
dissipiuntur ac tolluntur. Atque eidem causae tri-  
buendum, quod in nostro feliciter cesserit medi-  
cario, quum, si in adultis eadem occurrunt phaenomena,  
ex quarum facili, quin certius, in ca-  
chexiam & hydropem sit transitus.

## OBSERVATIO VII.

*Demum ad  
milia le-  
porena.*

Virum novi triginta circiter annos natum,  
spongiosi corporis habitu & temperamento, ut

vocant, sanguineo, qui à primis aetatis annis fre-  
quens expertus fuerat, circa æquinoctia postis-  
simum, narium stillicidium. Adultior postea fac-  
tus, sanguinis missionem vere & avarum admi-  
sit liberalem, quo narium haemorrhagia quidem  
emanavit, sed solennes facti circa id tempus ca-  
pitis dolores, sponte tamen iterum discedentes.  
Quum vero aliorum concedens, ex consilio me-  
dici, suam omitteret venae sectionem, vere  
intuente gravatum capitis incurrit dolorem, cum  
faciei tumore ac rubore. Nihilo fecius docentes,  
quod gerebat, munere stentus alta & elata voce  
fungens, aurium tinnitum & auditus gravitatem  
passus est cum torpore pedis & manus in laere  
dextro, quae ipsam per multos annos ad mor-  
tem usque afflixerat.

## Epirisus.

Patet ex hac relatione, consuetas fieri pletho-  
ricis, circa æquinoctia praesertim, narium ha-  
emorrhagias, eademque instituta sanguinis mis-  
sione posse intercepti. Quia igitur omnia postea ve-  
nae sectione sanguis pristinam ad caput viam le-  
git, mirum non est, subsequutas ibi stagnationes  
ipsius & gravatum sensum. Quin, quum per  
fermentum crebrum elatum magis augeretur ad  
caput affluxus, factum utique, ut a cruce stagnan-  
te secederet serosa portio, ad inferiora descenderet,  
ibique aurium tinnitum aque etiam torporem pe-  
dis manusque induceret. Ex quo id in usum prac-  
ticum tenendum: pessima esse modesteque consi-  
lia, quae contra experientiam suadent, ut sueta  
sanguinis missio, propter vanum decrementi viri-  
um metum, omittatur.

## CAPUT II.

## De Sanguinis Fluxu ex Pulmonibus.

## THESES PATHOLOGICAE.

## §. I.

Illa haemorrhagia, qua sanguis floridus & spu-  
rius mediante tussi ex pulmone fertur, recepto in  
scholis medica nomine, origine Graeco, haemoptysis  
appellatur.

## §. II.

Non omnis sanguinis & faucibus rejectio ha-  
emoptyleos nomine insigniri debet. Nam saepe &  
narium ut fauces & pulmonis sanguis descendit,  
ac inde postea ferens gruenosus per os rejicitur,  
praecedente in pulso titillatione, in capite dolore,  
aut gravitate. Interdum quoque per acrem re-  
nuem destillantem humorem, ab erosis & fra-  
ctis faucibus, vel etiam ipsius asperae arteriae in-  
terioribus ramulis, spiritum sanguine, vel sangui-  
nis stris imbutum, educitur cum ipsa tussi; pro-  
prie tamen haemoptysis dici nequit, nisi spiritum  
eam vocare velimus.

## §. III.

Neque etiam nostrae considerationis hic est  
spiritum illud subcurrentem, quod inflammatum  
in pleuride vera pulmonem, circa quantum, aut  
quantum ut plurimum distat, sequitur; neque  
etiam illud, quod à causa externa violenta, vul-  
nere, contusione, vel graviore casu in pulmonem  
subacti confusit, sed quod à causa interna ex-  
citantur, & à laesa vasculari pulmonum sustinuitur.

eritur, sitque proprie & stricte hæmorrhagia pulmonum dici potest.

## §. IV.

*Differe-  
ntiam quan-  
tita- &  
lesioni va-  
forum.*

Pro differente vasorum pulmonalium læsione & ejus quoque causa, varie, tam raritate modi, quam periculi & curationis, hic se habet affectus. Scilicet ubi sanguis spumans, floridus ac tenuis per intervalla, cum tussi, sine dolore, non adeo multus educitur, lateralium vasorum apertionem id denotat; ubi vero ubertim & magno impetu, quasi vomitu quodam, prorumpit, adeo, ut interdum magna inde pelvis impleatur, grandiorum venarum ramum vel in varicem expansum, vel in aneurisma arterie, quod sæpius accidit, abeuntem & ab Hippocrate jam animadvertum, disruptum fuisse, est indicium. Qui casus, quo frequentius incidit, eo plus habet periculi, & repente non nunquam tam gravis sanguinis effusio hominem exanimat, dum vel intra tracheam cohibitus cruce, ob defectum vinum, pulmones obruendo suffocatur, vel vacuato nimium sinistro cordis ventriculo à sanguine, lethalem excitat syncope.

## §. V.

*Causæ hæ-  
moptoe  
proxima in-  
æqualis  
circulatio.*

Ut vero ipsa hæc erupcio fiat, alie varie causæ concurrant necesse est. Immediata quidem, sive proxima, est inæqualis & impetuosior sanguinis per pulmonum vasa transitus, seu circulatio, dum majori copia & impetu in arteriam pulmonalem ejusque ramulos affluit & appellatur, quam venæ eum recipere & reddere possunt, quo deinde successive fit magna tenuium ramorum, qui subflantiam cellularem & vesicularem ipsaque bronchia perperant, expansio, tandemque varicosa, seu aneurismatica potius intumescencia, & denique violenta ruptio.

## §. VI.

*Quod sig-  
na.*

Confirmant hoc ubertius signa & symptomata, quæ malum hoc solum antecedere ac comitari. Scilicet invadit illud per vicos insidubus, & quasi per paroxysmos reveritur sic, ut æger antea percipiat horripilationem in cute atque extremis maximeque pedibus refrigerationem, vasa in manibus dissipant, dolor in dorso, lassitudo & gravitas æneum affligat, horborygmi in imo ventre sint & alvus adstricta, in pectore gravissimus sensus cum didiciliori spiritu observetur, donec sequente in faucibus unilatorio & secundum aspectu arterie tractum quasi peruriente sensu, sub calida ebullitione & undulatorio in dextro latere motu, ipsa erupcio sanguinis accidat. Hæc enim omnia indicant spasticam quandam externarum & internarum partium stricturem, sanguinalique motum non modo esse inæqualem, sed & à peripheria introverti, ad pectus vasaque majora cogi, ibi plus jussu conservari, impedito libero per pulmones ad cor transitu, regurgitate versus dexterum latius itaque calidi ebullientis sanguinis undulatorium sensum concitare.

## §. VII.

*Inque-  
ritur circula-  
tum facti  
sanguinis  
regressum.*

Sunt autem plura, quæ æquabilem illum & liberum sanguinis progressum, in quo maxime integritas functionis in quacunque parte consistat, per pulmones turbant, perveniunt & sic ad generationem hujus mali conferunt. Nimirum quandoque nimia tantum & simplex sanguinis intra canales, ob auctum intestinum partium sulphurearum aëreo-aëtherarum expansivum mo-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

rum, turgescencia, seu organina subest, quo systolica & elastica in valis potentia minuitur ac demitur; unde stagnatio & nimia sanguinis ibi fit collectio, accumulatio, tandemque rami arterie pulmonalis apertio, vel ruptura.

## §. VIII.

*Partium  
arteriarum  
rami stric-  
ta sunt.*

Alia dein ratione per spasticas, tam internarum, quam externarum partium stricturem, variter æquabilis & liber sanguinis per minima motus impediatur, ejusdemque impetuosis curfus & appulsi ad alia loca, maximeque pulmones, inducitur. Unde frequens admodum in pectus est observatio, hypochondriaca passione laborantes, nec non pathematicis hysterica obnoxias foeminas, in quibus ut plurimum mensium fluxus sub multis & atrocibus spasmodicis difficulter succedit, incidere in hunc sanguinis à pulmonibus fluxum, non sine periculo.

## §. IX.

*Pleura  
sanguinea  
rami, nec  
non pulmo-  
nis obstruc-  
ta.*

Haud dispar est ratio & effectus, quando obstructio, vel infarctio visceris sanguineo, pectus liene, & inde afflicto ventriculo, quod ex dolore tensivo in hypochondrio sinistro concludendum, incidit hæmoptysia. Etenim intercepto alicubi sanguinis libero per vasa transitu, vi legum hydraulicarum, impetus ejus fit incrementum, ut, ubi minorem resistitiam invenit, copiose confluat, vasa diducat tandemque perumpat. Tanto vero certius tantoque gravius hoc malum excluditur, quando ipsis in pulmonibus magna consistit labe, ac vel vomica, aut tubercula in ipsis substantia, vel polyposæ concretiones in ramis vasorum majoribus hærent, quibus, dum obex ponitur sanguini transeunti, si unique qua datur via ruit, aut ubi subsistere cogitur, perumpit & hæmorrhagiam facit admodum effusam.

## §. X.

*Diffinitio  
ad hæmopto-  
ysiam, tum  
interius can-  
perat.*

Porro de his, quæ remotius ad inducendum sanguinis à pulmonibus eruptionem faciunt, per ipsam experientiam constat: corpora graciliora, tenerioribus fibris & vasis prædicta, quæ collo instructa longo, pectore angusto simulque quadantenus depresso, in quibus pulvis celerius micat, cor etiam subinde palpant, una cum his, qui à parentibus phibitici progeniei, in iram atque impatientiam sunt proclives, ac in juventute fluxum sanguinis per nates frequenter experti, desinente corporis augmento & in longum incrementum, intra spatium anni viginti quinti ad trigedimum quinquem usque, accedentibus aliis causis externis, perquam facile in hunc anticipem morbum prolapsi.

## §. XI.

*Sanguis  
abundantius  
in can-  
alibus con-*

Non minus per observationem medico-practicam in comperto est, ut plurimum & omnium facillime, hoc sanguinis profusum accidere facilius corporibus & juvenilibus, nec non cessante sanguine, sive per nates in adolescentibus, sive per menes in foeminas, sive etiam per acri venas in provecioris ætatis hominibus spontanea evacuatione, vel etiam omisso artificiali subtrahitione. Qui effectus tanto certius subsequitur, quando accedit vehementior corporis & animi motus, aut calidiorum in cibis, potusque spirituosissimi abusus, intensus clamor, natus vehementior, inflatio diuturna & violenta tubarum, nec non

S a nitius

nitius in facibus vel partu edendo conatus.

## §. XIII.

*Autum-  
nus quo-  
que regnat.*

Autumno præterea, quando tempestas regnat inaequalis maximaque frigoris & teporis est vicissitudo, tum non modo frequentiores esse solent defluxiones catarrhales, sed maxime etiam subinde sanguinis fluxiones immodice variae, atque etiam in dispositione illa, quæ fit per pulmones. Idem accidit, quando hyeme sub intensissimo gelu corporis superficies stringitur & sanguis ad interiora magis compulsiis inque pulmonum canalibus accumulatus nimium, facile perumpit. Unde haud raro accidit, ut hæmoptysis sit æmuliaria, quæ Februarii mensis, nec non ante æquinoctium erumpere atque redire solet, utque etiam circa hæc tempora idem hic morbus plures attinet & quasi popularis sit.

## §. XIII.

*Non in  
omnibus  
est dæmon  
periculosa.*

Ceterum de hoc sanguinis profluvio recte utique scribit Hippocrates *Sect. V. pag. 10. edit. Foesii. qui spiritus cruentus deveniunt, ex his quidam brevi tempore pereunt, quidam vero diutius trahunt; præstat enim corpus corpori, aut avari, & affectu affectioni, & cavi tempestas insensit in qua agitant: quidam enim morbo suo illos tolerant, quidam vero omnino tolerare nequeunt. Ex animo non omnibus idem hic morbus eodem modo observatur esse, aut exitialis, aut transitorius. His scilicet, quibus hæmoptysis ob solam abundantiam, aut ebullitionem sanguinis accidit, si recta medicatio de vitæ victusque ratione excipiantur, nec periculosa est, nec capitalis. Ego certe vidi cessantibus in gravidis mensibus sanguinis expulsiorem singulis mensibus redeuntem, partu vero excluso & redeunte menstruo fluxu sponte sine periculo emanentem. Vixissim notavi hæmoptysin tempore graviditatis cessantem & exiitæ foris utroque vacuo procedentem & sine periculo per aliquot annos insistentem. Vidi quoque sanguinis spatum periculis expertum in his, quæ parcius iusto tributum solvebant lunare.*

## §. XIV.

*Quoniam  
tamen hæ-  
moptysis  
est non so-  
le pericu-  
losissima.*

Id vero omnino certum, ex omnibus, quæ præter naturam accidunt hæmorrhagiis, vix ullum esse frequentiores non modo & sæpius redeuntem, sed etiam magis ancipitem & periculosam, quam hæmoptysin. Nam haud facile secundam valetudinem perfecte recuperant hoc malo semel gravius correpti, nisi qui magna cura vitam possent colere & sanitatis regulas observant, neque etiam tum sperant semper consequitur sanitatis effectus. Pulmo quippe ex viscibus est nobilissimis, qui, dum sanguinem ex uno cordis ventriculo ad alterum transmittit, vitæ servit insigniter, quia vero ea propter, dum vita est, in continui expansione & compressionem versatur, vas in ipso rubeum vel sauciatum sanguiferum difficile admodum coalescere & consolidari potest. Accedit, quod extravasatum in pulmone sanguis, non facile penitus per bronchia & asperam arteriam evahatur, sed in vesicula substantia resistens, putrescat de tunc jam Hippocrate in pus, ulcus ac denique in hælicam & tubum lethalem transiit. Quare veritas omnino respondet *Trallacii Lib. VII. Cap. I.* testimonium, ita habens: *ipsi quidem sanguinis excreta per se, dummodo non immoderatum vacuum induant, tamen non admodum consuevit, sed pessimorum mor-*

*borum longorum magna ex parte causa redditur.*

## §. XV.

Possimum magis vel minus est discrimen quod inter hæmoptysin ratione causarum & illorum, in quæ incidit, corporum. Scilicet si senilibus accidit, debilius quantumvis & non tam vehemens quam juvenilibus sanguinis evacuationi, major tamen visum sequitur dejectio & facilius putrida pulmonum corruptio, quam excipit hecticus calor, qui corpus & vires tandem cum vita penitus consumit. Gravior quoque ac certius subest periculum, quando diuturnum profundum mororem insequitur hæc sanguinis evacuatio, quando infimi ventris vitæ una obstructa, atque humores dyscrasia scorbutica acri biliosa simul infecti.

## §. XVI.

Denique nec sanationi spes, nec medicine locus est, si ipsum pulmonum viscus non amplius est integrum, sed vel vomica resolutionem eludentibus obducitur, vel vasa polypofa concretiones recondunt, vel etiam varices, vel potius aneurysmata in canalibus præsto sunt, quibus crebra & profusissima sanguinis fit effusio, tandem funesta. Has enim plerumque in hæmoptysia subesse mortis causas, edocet cadaverum sectio, quæ patet, non modo pulmones maxima ex parte ut plurimum esse corruptos a sanguine ibi effuso putrescente & ipsam substantiam membranaceam solidam depascere, sed & hospitari sæpius polypofas concretiones in vasis pulmonalibus, & quidem magis in his, quæ plus cum sinistris, quam dextro cordis ventriculo communicant; in his autem, qui rupto sanguine tumore pereunt, pulmona a sanguine effuso multo spumoso obrutos & nigros inventiri, resistent adhuc exigua in vasis sanguinis quantitate.

## CURATIO.

## §. I.

Quum, ut dictum, causæ hujus mali admodum differant, diversæ quoque curandi indicationes sint necesse est; præcipue tamen illarum redeunt huc: primo, ut sanguinis organica nimis vasa plus iusto venosa expandens compellatur; secundo, ut ejusdem affluus copiosior & impetuosior à pectore ad exteriores corporis partes derivetur; tertio, ut spastica illæ stricturæ, quæ sanguinem ad pulmones validius converunt, laxentur, & sic liberius reddatur per totum corpus sanguinis circuitus; quarto, ut læsa pulmonum substantia vasculosa in integrum restituatur, & sic tam mali recursus, quam oriendi ex læsione alii morbi arceantur.

## §. II.

Primum ut perficiatur, & sanguinis ebullitio componatur, apprimè conducunt refrigerantia. Inter hæc potissimum commendanda æque potius frigida, paulatim quidem, sed sufficienter quotidie hausta, recto probe corpore. Navium aliquot exempla, solo hoc medio, debita cum cautione & præmissa venæ sectione adhibito, periculolum hæc sanguinis fluxum sublinisse. Idque tanto felicius succedit, si corpus juvenile calore interno æstuat; quem potius frigida reprimendo madoremque tepidum in peripheria corporis eliciendo, partes simul sulphureas calidus sanguis

sanguinis exaltationem inducentes evadit. Non minus præstans pariter ac probatissima est in reprimendo calido sanguinis partium aëreo-arteriarum æstu virtus niri tunc tantum depurati & crystallisati, impingis si cum aquis refrigerantibus, ut plantaginibus, portulacæ, aut etiam sero lactis, convenienti, parca tenet, sed sæpius repetita dosi, assuescit. Spiritum quoque virgoli, vel etiam ejus phlegma acidulum, præ omnibus aliis mineralibus, imo vegetalibus acidis, peculiarem ad organum sanguinis compescendum possidere virtutem, experiri noramus, tam certum, si cum his loci mentis ex rosis extrahatur tinctura.

## §. III.

Ad obtinendum secundæ indicationis scopum & divergendum sanguinis a pulmonibus nimium impetum, præcipuum certe momentum repositum est in venæ sectione, in brachio, vel etiam in pede infusa. Præstans etiam hoc nomine virtus pediluviorum temperaturarum, nec non immisionis inunatum in aquam tepidam. Neque minus ad derivandum proficua ea, quæ alvum expurgandi facultate possent, imò quæ ex internis præcipuum locum inveniunt tamarindinata, pullulana, thubarbarina, & inter externas, clysters enollascentes, stimulo quodam acuti.

## §. IV.

Tertium medendi momentum in eo versatur, ut spasticæ stricturæ, prædictæ quæ in minimis vasa sanguiferis & partibus nervosis consistunt, relaxentur. Huic egregie fausticiam oleosa demulcentia, ut oleum amygdalarum dulcium, vel eam lici, sine igne coacerant parant, coalescent assuescunt. Spectatæ quoque virtutis emulsiones ex seminibus cucurbitæ, pincis, feminæ papaveris albi & aquis quas vocant hyponicas, ut rosarum, papaveris rhæodas, nymphææ, liliorum convallium, storum tiliæ, nec non cerastorum nigrorum poratis, quibus niri & syrapi papaveris albi parum adhibendum. Vel etiam loco harum aquarum ad emulsionem parandas adhiberi possit decoctum cornu cervi, eboris, nec non dentis hippopotami; quia in his duris animalium partibus singulari quadam spasticis moribus resistendi facultas inest. Si vero adeo rebellis hæc strictura est, ut minoribus hisce cedere & sanguinis profluvium subsistere nolis, ad paulo valentiora recurrere licet; inter quæ semen hyoscyami albi ad drachmam dimidiam, cum æquali pondere lapidum cancerorum, duodecim niri grani & uno camphoræ grano mixtum, omnibus aliis, etiam opusis, palmam præcipit. Scurioris tamen, ac nihil minus egregii effectus est mixtura nostra tonica, quæ ex stricturæ antimonij acris, sive tincturæ tartari, liquoris anodynij mineralis una unciâ ferri, liquoris nostrij bezoardici Bussiani drachmis duabus & olei macis guttis sex est composita; quippe quæ spasticas non modo stricturas moluit, sed & diuresin & diaphoresin lenius movendo, sanguinis ad pecus affluxum diverit efficaciter.

## §. V.

Quantum in hæmoptycos cursione est, ut disrupta vasa consolidentur, utinas acres humores affluxum eo poritantes attempereur & inefficaciter ac parvis affectibus totius roborentur. Hoc autem non obtinendum uno eodemque modo ac medio. Quare quæ ego inter plura proficua de-

prehendi, candide dicam, cernas, si cum debito judicio & congruo tempore adhibeantur, eadem, si medicus adhuc locus, non fore frustranea. Est autem ex his primum mixtura, cujus formula hæc: recipe aque plantaginis, scorzonæ, veronicæ, scabiosæ, aceti destillati ana unciam, coralliorum rubroren præparatorum, specierum de hyacintho ana drachmam dimidiam, syrapi papaveris rhæodas drachmas duas, M. Quæ mixtura tribus vicibus assumenda, & si vehementius sanguinis profluvium, addenda adhuc pulveris hæmatis drachma dimidia. Alterum remedium, quod tam in hæmoptysi simplici, quam etiam in ea, cui complicata est plebitis, conducit, est decoctum, cujus hæc est compositio: Recipe sturum bellidia, rosarum rubrarum, chamomillæ vulgaris, summitum millefolii ana pugillos quatuor, herbes consideæ faracnicæ, hederæ terrestris, urticæ moruæ, veronicæ, faniculæ, pyrolæ ana manipulum, feminis fructu, nucis ana drachmas duas. Mixta concisa, coacta demar, signetur species, datus 3. Loth in 2. mat. Bier zu kochen. Tertium quod mihi probati usus fuit auxilium, sunt pilule ex massæ pilularum de cynoglossa drachma dimidia & massæ pilularum balsamicarum Becheri drachmis duabus concinnatæ, ad scrupulum unum circa 1200 iunctum sumende. Quartum & ultimum quod in hoc gravi morbo commendandum habeo pulverem hunc: Recipe lapidum cancerorum, antimonij diaphoretici, cornu cervi sine igne, dentis hippopotami, lapidis mariani ana drachmam, niri depurati drachmam unam cum dimidia, misce his pulvis, omeis sic uti uti, ad scrupulum unum ipsius viginti guttis liquoris nostrij mineralis anodynij imbutur & cum aqua antispasmodica propinetur.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

IN gravi illa & vera hæmoptysi, quæ, ob rupturam majorem arteriæ pulmonalis ramum, magna sanguinis copia per brevia intervalla erumpit, si casus in gravi hæmoptysi, caveat medicus, ne promissa de restituenda sanitate sit dives, nisi fluxus sanguinis intra triduum convenientius remediis compescatur. Interim tamen minime vilius laborantem gravi metu mortis in percellat, ut indico magno periculo, omnibus viribus, ut sæpe vidi, eum prævet & morsem acceleret.

## §. II.

Si sanguinis abundantia urget, & manifesta adest valorum plenitudo, statim inter iuncta instituenda est, sive in manu, sive etiam in pede, sanguinis missio, & quidem largior, ad octo, vel plures uncias, ex amplo foramine; quo sanguinis impetus eo efficacius a loco affecto diveratur, & rupi ac lacerati canales eo melius iterum coire & coalescere possint.

## §. III.

Illæ quoque anniversaria hæmoptysis, nec non quæ ex hæmorrhoidal fluxu emanante proficitur, inferre solet circa tempus anni recursus rheumaticos in pectore dolores, junctos cum sanguinis spatu. Hæbetur hinc a minus peritis morbus haud raro pro pleuritico; sed siela in pede vena, & provocata sic hæmorrhoidal fluxu, non modo

Sanguis a pulmonibus  
esse quidem  
dicitur.

spasticæ  
stricturæ  
gravi in  
sanitate

Reliquia  
quædam  
sunt.

Progræssu  
si casus  
in gravi  
hæmoptysi.

Si plethora  
adest (san-  
guinis)  
missio.

Nec non si  
hæmorrhoidal  
fluxus emanat  
proficitur.

sanguinis effusio, sed & reliqua parhæmata simul & semel solent conquerere.

## §. IV.

Ubi ab acri catarrhali deflusione excitatur cum titillatione in faucibus profundo tussis acer-  
tissima, qua simul per vices floridis & spumosis sanguis cum mucro excreatur, apparentibus nullis plethoræ signis manifestis, emulsiō tantum amygdalarum dulcium seminisque papaveris albi pro potu operam locat præstabilem; ac præterea pituitis nostris balsamicis aliquot grana massæ pilularum de styrace aut de cynoglossa admiscere expediat. Neutquam vero in usum vocanda consolida-  
ria & adstringentia, quia rursus tantum vascula arteriæ bronchialis non vero pulmonalis, sunt lauciata.

## §. V.

Quando effusus sanguinis fluxus præfens mi-  
natur periculum atque interna auxilia non suffi-  
ciunt, confugiendum unique est ad remedium à  
veteribus frequentius usurpatum, nempe ligatu-  
ram artuum. Hac enim sanguis in extremis tan-  
tisper retentus, non tam cito ad cor & ex hoc  
ad pulmones redit, atque adeo imminuit ad pul-  
mones sic fluxus, rupti ramuli non ita sanguine  
implentur, sed conei sunt faciliusque coeunt. Ne  
tamen ex stasi sanguinis paribus Jigatis inferatur  
periculum, hæc adhibenda est cautio, ut se-  
data hæmorrhagia, ligaturæ non omnes simul,  
sed succedive una post alteram solvantur.

## §. VI.

Quum hæmoptysis sæpius ex primarum  
viarum & hypochondriorum vitio, intestinis fla-  
tibus ac spasmodicis distensis accedat, maxime in ado-  
lescentia & juvenili ætate, ob sedentariam nimis  
vitam, studiorum intemperantiam, vel etiam af-  
fectuum impetum; ad hanc usque causam diri-  
genda etiam est in curatione meditatio, ita tamen,  
ut exquisita temperamentorum servetur distinctio.  
Quodsi enim juvenes sunt cholericæ constitutio-  
nis, exquisitoris sensus, ad iram prompti, palpi-  
tatione cordis subinde afficiuntur, & pulsus exhi-  
bent magnus, tum abstinendum est ab omni-  
bus aliis egregiis carminativis, stomachicis, salu-  
tibus volatilibus oleosis, nec non purgantibus acro-  
ribus, ac potius pulveres temperantes nitrosi, ad  
alvum laxandam mannæ, passulæ, tamarin-  
dinatæ & ad corrigendam sanguinis intemperiem  
dilatantia, serum lactis caprilli, decocta borde-  
acæ, avenacæ & id genus plura, cum fructu ad-  
hibentur. Contra ea, ubi peccant humores visci-  
di, ubi infarctus viscerum, intemperies frigida  
& humida, & habitus corporis spongiosus, tunc  
pituitæ balsamicæ polychrestæ, nec non spiritus  
salis ammoniaci, vel volantis oleosis Sylvii, cum  
unctura tartari mixturæ, item essentia tempera-  
tioris carminativæ, unctura martialibus mixturæ,  
utiliter exhibentur.

## §. VII.

Sicuti remedia quæ validioris adstringendi fa-  
cultate polent, nunquam ullo in morbo, ita nec  
in hæmorrhagis securam operam præstant; om-  
nium vero maxime in hæmoptysi, præsertim illa  
quasi critica, nec non ab initio & in paroxysmo  
ex usu sunt. Etenim, licet fluxum ad tempus  
sistant, relinquunt tamen in pulmonalibus vesiculis  
sanguinis grumulos, qui in corruptionem abeunt,  
inflammationem, putredinem, pituitum

& hæcnam expedito & facili modo inferre pos-  
sunt. Interim tamen, neutquam ex toto repudian-  
da sunt leniora adstringentia & roborantia, op-  
portunum extra paroxysmum & in fine fluxus, ad  
tollendas reliquias & præcavendum recidivam.  
Inter hæc laudem meretur citissimum solutio cor-  
talliorum cum succo citri vel aurantium facta  
& in syrapi formam reducta, confectio de hya-  
cintho, conserva rosarum rubrarum cum terra si-  
gillata, aut hæmatitis pulvere mixta. Chinæ cor-  
ticem mixtice commendat *Morion in phlegmo-  
gia*, in electuarium cum syrupo rosarum redigun-  
dum, cui extractum castoreæ aquosum, succi-  
num & pulvis nucisæ commodè adijciuntur. Hæc  
enim, dum paribus morcibus a robore defectis  
debium tonum blande reddunt, ut sanguis per  
totum corpus promptius & expectius cum omni-  
bus succis circumest simulque cuticulari excreto  
liberius succedat, faciunt & sic utilitatem præ-  
stant. Nec minus eximia est efficacia infusum  
theiformium, item decoctio roborantis pro potu  
ordinario. Insula quædam opime ex vegetabili-  
bus supra memoratis traumaticis, cum herba po-  
hygoni, millefolii summitatibus & feniculi semi-  
ne concinnari & quotidie sorbillari possunt. De-  
coctum vero ex radice salsaparillæ, chinæ, radiora  
ligni fantalis rubri, cinnei quoque, ligni lenicis,  
vel loco hujus malliches, una cum passula possunt  
confici.

## §. VIII.

Lactis & lacticionum usus omnino præstans  
est in hoc morbo. Novi, folio lacte capillo cum  
floribus papaveris rhœodæ cocto, admixta di-  
midia aquæ parte & adjecta portione mellis, quo-  
tidie largius assumto, immo diem etiam ex pul-  
monibus sanguinis profusione opime conque-  
visse primum, ac postea usurpatam simul multo  
inter cibos confectis ex amylo, ex quo fuisse san-  
tatem. Id tamen de usu lacticionum omni tene-  
dum: ut non modo ventriculi, an es ferre pos-  
sit, habeatur ratio, sed & ne simul & semel, sed  
parcis & repetitis vicibus, ingerantur.

## §. IX.

Si seniores hunc morbum incurrunt, haud le-  
ve ipsis imminet periculum, licet sanguis non  
adeo largiter profundatur. Penitus vero in his  
abstinendum est tam à fortiter adstringentibus ad  
sistendam hæmoptysin, quam ab opiatu ad pro-  
curandum somnum, ne vires magis deiciantur  
& corruptio, in quam senilis corpora ipsorum-  
que sanguis pronus, præcaveatur.

## §. X.

Caveant sibi hæmoptyci omnes, præsertim ubi  
profusio gravior est & copiosior, ab aquarum  
mineralium, theriacalium & acedularum usu, ma-  
ximè omnium illarum, quæ sale quodam copioso  
acri & principio calcareo alcalino imbutæ sunt,  
Carolinæ, Pyrmontaniæ, Egraniæ, Sedlicensi-  
bus. Ubi enim partis aut visceris cuiusdam in-  
terni substantia læsa est aut corrupta, labem hæc  
aque augere & exacerbare, adeoque nunquam  
prostant. Vicissim acedule temperiores, ut Sel-  
teranæ, quæ purum sal alcali recondunt, præser-  
tim si cum lacte asinino vel caprillo miscentur,  
usus sunt saluberrimi, eo quod sanguinis & hu-  
morum salsum & acrem dyscrasiam contempe-  
rant non modo, sed & obstructions & infarctus  
pulmonum referant, simulque acres particulas  
per urinarias vias, ne demum noceant, evehunt.

EIT

Est autem sic infirmus acidularum potus nunc quam maxime utilis, quando à scorbutica & icterica sanguinis & humorum intemperie malum hoc & inducitur & fovetur.

## §. XI.

De vitiis  
vulgaribus  
reg. mor.  
sanguinis.

Ultimo loco addendum eximium *Crisi Libr. 10. Cap. 4.* consilium, de iis, quae servanda in vita vituque habet haemoptica, dum moriet: ipsa utilis esse quietem, securitatem, silegium; ut caput sublimis cubet, & facies sanguis aqua frigida foveatur: inimica autem ipsis esse, vinum, balneum, venerem, acriora omnia, item calida fomenta, conclavia calida & conclava, multa vestimenta corpori injecta, etiam frictones, nisi ubi sanguis bene conquiescit. *Hippocrates autem Libr. de internis affectionibus* commendat haemoptici affectus aquae potum, item lac bubulum tertio parte aquae mulae remanens de copiosius assumtum, item lac caprillum, coctum cum semine lini & semine ficulni; porro farinam cum lacte coctam. Quae omnia proficua esse, experientia & ratio testatur, eo quod tali diata humores tenues incrassantur, acres mollescent & laetorum partium conglutinationi promovetur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

De haemoptica  
mensura in  
Lunari.

Petcula fuerat nobilis femina, triginta annorum, ipso illo quo mensis fluctant tempore, terrore ingenti, quo illico sublevis sanguis, & inducta pectoris gravitas, praecordiorum anxietas & cordis palpitatio impensae. Recurrens dein mensura periodo, rediit quidem sanguinis stillicidium, sed admodum parvum, praecedente puerilio & venisio dorsi ac hypochondriorum dolore, pectoris angustia & gravitate in praecordia sensu. Accessit vero etiam sanguinis è pectore per nullum exetio, post quadriduum sponte iterum cessavit. Quinque quocunque postea utero purgata, toties, per quinque vel sex dies, sanguinis plus vel minus è pulmonibus eiecit, idque per novem annos continuos; ita tamen, ut quam impraegnatione facta menses reciderent, haemoptis etiam quiesceret, post partum autem mox rediret, atque etiam sub ipsa lactatione facta periodo succederet. Interim nihil inde decedens redundavit in sanietatem, neque quicquam incommodi sensit foemina, frustra tamen ad compescendam hanc pulmonum haemorrhagiam variorum medicorum conquisivit & consilia, & auxilia.

## Epigris.

Singulare hoc est haemopticos menstruae, diuturnae quidem, sed periculis expertis exemplum, quo aperte confusae falsae non nullorum opinio, quae haemoptis sin omnem phusis habere, aut contemni, aut pedissequam putare. Duxit autem originem ex sanguinis ab utero ad pectus, propter terrore vehementiam, facta reurgitatione, quae vasa pulmonalia ducta tandem aperta sanguinem emulserunt, sed remittente sanguinis ad interiora mensum tempore solenni restrictione & evacuato superfluo, liberior iterum factus progressus, vasa oclusa & sic sponte cessavit haemoptis ac damni intulit nihil. Interim per quas semel iterumque sanguis elatus est vias, ex facili postea reiegit, & accedit quasi quaedam naturae consuetudo, certa scilicet solida-

rum parvum dispositio, quae appulso validius sanguini, prompte viam concedunt ac diverticulum, aere possent, ac tunc statim in principio, medicamentis iterum tollenda.

## OBSERVATIO II.

Juvenis viginti annorum, corpore tener, animo ad iracundiam admodum proclivis, per aliquot jam annos circa veris & autumnal ingressum tussis ex pulmonibus eiecit sanguinem; novissime autem accidit, ut circa idem tempus ira excandesceret vehementius, eoque haemoptis incurreret largissimam, certis quoties periodo accedentem, hora scilicet matutina quarta & vespertina nona. Erupitionem semper ingens praecordiorum anxietas, frigoris notabilis in pedibus ac praecordia & senioris in hypochondrio sinistro sensus praecedebant; postea successit scruentus sanguinis, qui per quatuordecim dies perstitit & oculo minimum libras sanguinis eiecit, non sine magna virium pericula. Medicus in consilium vocatus, neglecta sanguinis missione, decocta adstringentia, incrassantia & pectoralia, ipsum quoque haematis pulverem oculis, sed frustra prius, ac potius sanguinis evacuatio statas suas semper servavit periodos. Advocatus & ego in auxilium quateris singulis horis propinavi salis volentis oleosissimi XX. guttas ex aqua cerularum nigrorum; circa sonni tempus pulveris antispasmodici, ex dente hippopotami, uricorum vero, lapidibus cancerum, uayula albis, nigro, diaphoretico antimonio, pulvere lumbricorum terrestrium & cinnabari, dosin, cum tantillo massae pilularum de cynoglossa, sumere iussi; alvum liberam servare emollientibus clysteribus nitro largius conovis, ac pecta non modo aquae tepidae subinde immittere, sed & calidis integumentis à frigoris accessu solcite defendere, iussi. Quibus, fortunante DEO, curationem ex voto confeci.

## Epigris.

Periodica fuit hac haemoptis tam ratione recursum venalis & autumnalis, quam etiam eruptionis ipsius mane & vesperti factae, simulatque testimonio est, quantum valeat iracundiae affectus ad provocanda sanguinis profluvia. Quia autem periodos servantes morbi fomitem ut plurimum habent sordium in prima corporis regione colluvem, in promptu est iudicare, vulgaria illa pectoralia, incrassantia, adstringentia, efficere posse nihil, ac praeter leniora evacuantia, recte in usum vocata fuisse ea, quae spasticas stricturas, in consuetudinem & habitum quasi transeunt, laxant, antispasmodica scilicet, maximeque illam cum cynoglossa coactam pilularum massam. Sed minus obvium erit non nullis id, quod fal volente oleosum, cuius vis sanguinem exaltans & humores commovens abas passim decantata, usumque cum fructu. Verum candide probehemur ac consideremus, nos ipso hoc remedio saepe saepius fuisse cito ac secure nimis sanguinis profluvia, per quaecunque loca facta. Id tamen monendum, nequaquam exhibendum esse efficac hoc auxilium, in, aut ante paroxysmum, sed cessante ac remittente fluxu. Etenim quia impetuosos spasmos, eruptionis auctores, excipere solet debiles & relaxatio, ad signationem oovam adeoque inducendum denuo spasmus postea ansam praebens, haec utique non melius potest praticandi, quam robo-

rando partes aeternae affectas, quod per ejusmodi volatilia oleosa perficitur commodissime.

## OBSERVATIO III.

De haemoptysi  
et fluxu  
sanguinis  
ex pulmone.

Theologus, vigesimum quintum aetatis annum egreſſus, facies & sanguine plenus, incidit, postquam à suggestis verbis fecisset voce insensibilis, in haemoptysin largam, quae tantum sanguinis evacuationem, quantum replendae pelvis integræ sufficiebat. Hinc debilitatus admodum à medicinae studio peti consilium, qui tuncuram sulphuris vitrioli cum laudano opiato mixtam propinquit, eo cum effectu, ut aeger post aliquot dies suffocationem cum maxima praecordiorum anxietate incurreret. Ad hanc itaque levandam sanguinis abstrachus de mixtura data discutiens ex aqua chareſſoli, scabiae, florum sambuci, destillam acetum, lapideis cancerum cum nino de discordio Fracastorii. Quibus quidem urgens malum discussum, sed interpositis aliquot diebus reſiſit sanguinis fluxus non mediocri copia, cujus accessum aliquoties postea factum, aeger ex horripilatione & refrigeratione parium extenuatur, faciei pallor & sensu à dextra pectoris latere calidi sanguinis adhaerentis, praenunciavit. Licet autem huic malo complura praestantissima opponeretur auxilia, & aeger etiam aliquod inde acciperet levamen, penitus tamen succedere noluit sanguis, sed subside aliquot sanguinis floridi cocture eruperunt. Interim accidit, ut aeger cibum caperet flantulum ex pomis terræ, radicis cyclaminis vulgaris, vulgo *Erd-aepfel*, & stomacho admodum debili exiſtente, in se tormentis in ventre atrocibus afficeretur, quibus in copiosum alvi fluxum solutus, id commodi tulit, ut sanguinis & pulmonum fluxus prius ex eo subsisteret, nec unquam postea relinquit, inprimis quam decoctis vulnerariis, admixtis balsamicis temperatis, novum accessum declinare sanaret. Inter cibos commendavi pulcem crebris assumendum ex farina faris *Rocken mehl*, aqua & butyro.

## Epirisus.

Cautè mercandum est cum stipticis adstringentibus, cujus generis est nictana sulphuris vitrioli, anaphthalica Grammi, in hoc sanguinis profluvio maximeque ejusdem principio, uberius confirmat hæc historia, nisi suffocationem, vel etiam ipsam phthisin accessere velimus. Patet quoque, tormina de cruciatu imi ventris cum alvi copiosa dejectionibus, sanguinis à paribus superioribus ad inferiores impetum derivasse, & sic malè perniciam expugnasse. Quo egregie confirmatur insignis eorum utilitas, quæ alvum subducunt de bistulium serum educunt in rebellibus ejusmodi pectoris morbis. Simul vero innotescit, per accidens quandoque salubritatem per se nociva asserre, uti in nostro cibus incongruus flantulum, tormina impensè suscitans. Cæterum hæc observatio docetur, decocta ex herbis vulnerariis, quæ temperata amarine de adstringente nimis relaxata vasa firmant & roborant, ad perfectam hujus mali sanationem, ut non amplius redeat, modo viscera adhuc sunt integra, utilisſimam exhibere efficaciam.

## OBSERVATIO IV.

De haemoptysi  
et fluxu  
sanguinis  
ex pulmone.

Theologiae studio addictus juvenis, temperamento melancholicus, corpore procerus & ma-

cilentus, primis quidem aetatis annis sanus fuerat ac vegetus, sed ante sex annos in schola desudans, repente correptus est totius corporis refrigeratione, maxime pedum manuumque, cum virum languore, inapetentia, & nauſabundo anxio circa praecordia sensu, quem nostri vocant *Uebel-seyn*, nec non pectoris angustia ac stimulo ad tussim. Nocte insequentis praeter opinionem sanguinem expuſit sincerum, idque postea successit per biduum de priora pathemata infestatum per hebdomades sex, donec Medici ope iterum convalesceret, & per sexennium ab haemoptysico recurſu degeret liber. Sed quum in Academiam concedens erudiendis liberis operam suam addiceret saepiusque ob id animo commoveretur, accidit, ut idem morbus, insensum quem aeterea symptomatibus rediret, extremorum frigore, praecordiorum anxietate, signatione difficili, virum & appetitus dejectione formique defectu. Dato nam pulvere antispasmodico, morbus paulisper inducias dare visus est, sed remansit languor, ac cum ad praesidium docendi manus rediret aeger, rediit & morbus, ita ut per quinque hebdomades quotidie succellere sex vel septem sanguinis floridi cochlearia, ac intermedio tempore viscidum pinuitum pure rorantem, sciretur redderet. Adhibita igitur venæ sectio in pede, dati pulveris antispasmodici, quin dolus essentia de solari pulvis, verum frustra, morbus potius perſiſtit idem, pulsus praeterea fuit inaequalis, celer ac debilis, extrema frigida & tanta virium prostratio, ut vix loqui & corpus loco movere valeret, macilentus simul ob appetitus defectum rediit. Sic rebus fere conſtatam me accessit & meum auxilium imploravit, ego vero renui primum medicationem, parentis tamen precibus demum inductus bina ipsi suasi auxilia, quorum solo frequenti per octo hebdomades continuo usu divina gratia convaleuit, ac non modo ab haemoptysi & omnibus symptomatibus liberatus est, sed & somnum, appetentiam, vires & carnem recepit. Scilicet praeter ponum ordinatum ex decocto avenae cum semine fenniculi, suasi, ut quotidie minimum mensuram decocti temperantis, mane cum tertina parte lactis capillis de vesperi sine hæc tepide biberet, quod consuevit ex rasura cornu cervi uncias tribus, radicis scorzonerae uncias duabus, herbae veronicae manipulo, summitatum millefolii, florum papaveris rhoeas tantundem, cornu cervi usi uncia, coquendo binas harum specierum uncias in tribus aequis libris. Circa somni autem tempus drachmam sumere jussi ex aqua cerasorum nigrorum hujus pulveris: recipe lapidem cancerorum unciam, corallorum rubrum preparatorum, maris perlarum, nisi depurati, calcissile, singulorum drachmas duas, olei de cedro, tussile destillati ana guttas sex. M. f. pulvis  $\mathcal{D}$ .

## Epirisus.

Ex hac morbi historia id utique notandum, hoc sanguinis excretionem petus, quod per pulmones fit, si primis annis infestus & conſueſcit dein per aliquot annos, postea ex facili, nimio corporis, vel animi motu, maximeque vociferatione & inſensione sermonis excitari posse. In ejusmodi autem debilibus & ad spasticas turbulenta solidorum ac fluidorum motiones praeſens corporis, plus unque valet simplicia ac temperata domestica quasi auxilia continuo usu, quam validiora chymica, concisa doſi danda, ipsa etiam

phar-



pharmaceutica artificiosa & sic dicta pectoralia. Illa enim agunt minimè, nec adeo moleste afficiunt sensus nervos partes, simul blande acrimoniam diluendo temperant, humores crassos attenuant, nutriunt & sic infirmo corpori præstant robur. Ex quoniam non frigida, sed calida sumuntur decocta hæc domestica, id præterea ferunt utilitatis, ut sanguinis motus ab interioribus ad exteriora ipsorum cutis emulsiotum dirigant. Pulvis autem ille absorbens nitrosus temperat acidam & biliosam acrimoniam, quæ in prima corporis regione hospitans, occasionalem materialem plerumque causam præbet, simulando & irritando nervos corporis partes, irregularem sanguinis motum inducendo.

## OBSERVATIO V.

*Hæmoptoe  
sic habetur  
epileptica  
sub  
la.*

Generosa virgo triginta sex annorum, sanguineæ complexionis & animi in hilaritatem proci, per quatuordecim & ultra annos inmoderatam in aula, ratione victus, formi & animi moniam agens vitam, incidit sæpius in anormalem mensium successum, dum illo tempore humores quandoque nimis, quandoque parvi, quandoque plane deficientes erant. Inde male usus habuit in ventriculi regione, ac de anno pressorio dolore, nausea, vomitione, virium collapsu edidit *Ubel seyn*, conquerens, potu aquarum spirituosarum, usu electuorum stomachicorum, neque minus frequentem esu potuum citreorum, per integros fere quatuor annos hæc symptomatibus succurrere laboravit, sed penitus in cassum. Accedente demum gravi diuturno tristitie affectu viribus orbiata, ante anni dimidium in epilepticum incidit indultum, qui idoneis remediis usurpatis eadem emansit, inflationes tamen circa præcordia, cum sensu anxietatis, eructationibus, conatu ad vomitum, alvi stricture persistenter. Postea per quatuor fere mensium spatium ex toto mentes subsisterunt, neque ter celebrata venæ sectione in pede, neque moderate sumis balsamicis & emmenagogis revocari potuerunt. Inde factum est, ut denovo ex fratre subita morte superveniente tristitia, non ita multo post in gravem sanguinis per pulmonem rejectionem incidere, adeo, ut aliquot libræ intra triduum floridi & spumosi sanguinis cum tussi & stratu ejicerentur. Sanguis tunc in pede missus quædam, sed ex improvise succellit paroxysmus epilepticus tam gravis & continuus, ut omni sensum & rationis usu extincto, vitam tolleret.

## Epilepsia.

Gravis & lethalis hæc hæmoptoe non ut morbus principalis, sed ut symptomatikus considerari debet, qualis, si cachecticus, spleneticus superveniat, ut plurimum funesta est. Ego bis in simili casu, facta dissectione corporis, lienem magnum corrupto sanguine purgidum invenit, vasque brevia ventriculi atro sanguine valde distenta, ipsamque ventriculi nimis expansum. Neque dubium est, quin in nostra sedes infulsum epilepticorum, etiam hæmopteos, in vitio & corrupto liene ac ventriculi ob suam aetiam inflationem constituta fuerit; siquidem intercepto libero sanguinis per vasculosum lienis viscus transitu, per congestum vasorum non modo ventriculus patitur, sed & facile regurgitat sanguis ad ramos superiores magnæ arteriæ & versus cordis sinistram sinum, unde obice hoc posito, sanguinis impetus per arteriam pulmonalem in ipsam substantiam

pulmonum vesicularem increfcit, vasa minima a sanguine nimium dilatantur, tandem rupæ excretionem sanguinis per bronchia & alperam arteriam efficiunt. Ad hujus mali nec non epileptici generationem, unque nimis usus acetoniarum citri & aquarum spirituosarum, ingens quoque tristitia mensiumque defectus plurimum valuerunt. Præterea nobis documentum hæc historia morbi præbet, quod sanguinis missio crebris infestis, neque ad menses in oculum redigendis, neque ad hæmoptysin sistendam per se efficax & propterea satis sit remedium, item, quod spasticæ stricture ventriculi, præsertim si lien obstructus fuerit, gravia mala, ut hæmoptysin, epilepsiam, facillime causari possint. Epilepsia vero superveniens hæmoptysi, effata *Hippocratis* lethalis est, præsertim quando per venæ sectionem multum sanguinis simul amissum fuit.

## OBSERVATIO VI.

Prædictæ generosæ virginis fater ante sex menses eodem morbo eodemque fere modo occubuit. Is ante duodecim annos a lapsu equi in terram in spumum incidit sanguinem, quod tamen sanatum. Jam erat ætatis XXX. & aliquot annorum, statum macilentæ, tristioris animi, faciei pallidæ, & conquerebatur sæpius de anæstetibus & perfusionibus præcordiorum sub costis fissis, præsertim sinistri lateris, cum ardore ventriculi impensissimo. Passionum harum originem rejecit in potum frigidum forsan calidum, post venationem, cui deditus erat, corpori ingestum. Accedente postea conjugio & insigni animi tristis afflictione valde est debilitatus, in festivitate vero quadam aule silemi, præter morem & consuetudinem corpus vehementer salatione exercuit, quo factum est, ut elapsis circiter XIV. diebus, anxietatem & constrictionem senserit circa præcordia dolorem, cum vomendi conatu, postea ex improviso sequuta vehementer admodum sanguinis per pulmones ejectio cum suffocationis metu, sequatur paulo brevi convulsionem epilepticam satis fortes, quæ intra biduum vitam abstulerunt.

## Epilepsia.

Viscera abdominis sanguinea, ut hepar, lien, si insolite magnitudinis sunt sanguine & humore infarcta & obstructa, dum æquabilem sanguinem circum, obice quasi posito, impediunt, ad immodicam de subinde exitales sanguinis tam per vomitum & secessum, quam per vasculosum pulmonum substantiam profusiones, disponunt. Quia vero tanto impetu & copia erupit e pulmonibus sanguis, nullum dubium est, quin ipso in pulmone jam vitiosa quedam adfuerit dispositio, quæ & *Hippocratis* de nostra sententia in eo cordis, quod rami arteriæ pulmonalis, dispersi per vesicularem & cellulodum substantiam, nimium distendi in tenera ætate infirmata ducantur, quæ tandem rupta tantum sanguinis copiam fundunt, ut hærens in trachea mentem incipit suffocationis. Venam vero secare in tali paroxysmo, subtrahendo plus sanguinis adhuc magis nocet, quam prodest, & ad movendam magis epilepticam convulsionem, quam ad eam minuendam, confert.

## OBSERVATIO VII.

Theologie Studiosus, vigesimum quartum ætatis annum agens, Pomeranus robustus, biennio abhinc febre correptus est, autumali, tam epidemica, post quam insequentis anni mense Fe-

*Hæmoptoe  
sic habetur  
epileptica  
sub  
la.*

*Hæmoptoe  
sic habetur  
epileptica  
sub  
la.*



ibi efficiunt; quibus demum subiungenda pectoralia & remissum pulmonum tonum firmania. Hac methode ego complures plethoricos, maxime juvenes, ex corporis exaltatione hæmoptysi affectos, facili & explicita curatione ad sanitatem reduxi. Sed si dilatur medicatio, neque adhibentur remedia sanguinem in pulmones effusum dissolvenda, & debrupta vasa consolidantia, pudentia gignitur materia ipsaque phibita.

## OBSERVATIO IX.

*Hæmoptysi ex lahe viscerum summa.*

Vir literatissimus, quinquagenario major, cuius fata ob merita illustria adhuc lugeat nostra hæc academia, nunquam antea hæmopticus aut phibitica, vixit maxime sedentarie addictus, quem studii intemperantiam aliquandiu invigilasset ac præterea animo sæpe multumque ira ac sollicitudine fuisse commotus, neglecta sanguinis per venam subtractione, corpus exagitantem valide & æstus adhuc frigidum ingessit haustum liberalem. Quo illico sensit virium corporisque languorem, & quam voce clara doceret audientes, incidit in hæmoptysin, eaque successively rejecit aliquoties uncias aliquas. Ipse autem periculi ex hoc malo probe gnarus, gravi inde mortis percussus est metu, quo vires conciderunt penitus; erectus tamen pusilliter animo melius habere corpore, sed variis viis medicamentis, aqua frigida, vino lactis cum vino cocto, nitrois, pectoralibus absque pluribus, parviorem quidem habuit sanguinis excretionem, nullis autem cum raucedine restitit, appetentia perit, somnus absuit, vires indices magis collapsæ, caro confusa, & febres gliscere corpore ex pulsi celeri cum æstu cognoscenda, qua succi roscidi præterius abstant, & mens ad ultima usque alacri, mora exceptis impetrata, licet nec pua, neque etiam spiritum copiosum antecessisset.

## Epiris.

Mortis causa principalis in erudito hoc viro nequaquam fuit sanguinis exsiccatio, sed procul dubio tabescentia ac corruptio nobilioris cuiusdam visceris, pulmonis, vel forte lienis. Hanc enim corruptivam labem semper fere prodixit appetitus viriumque prostratio enormis, quæ, si in viscere stomacho propinquo, omnem ipsius appetentem & digerentem vim pestundat. Causa vero fatalis huius morbi, nimis curis, labori erudito impensori, ac potui frigido corpori calenti ingesto, tribuenda videtur, quo sanguis & omnes corporis succi lahe infecti, & in progressu impediti flagrantur, ac putrescentes, suavitatem induxerunt catastrophem.

## OBSERVATIO X.

*Hæmoptysi pleuritica cum lahe in thorace.*

Locum tenens generosus, viginti quatuor annorum, sanguineo-cholestericus, corporis constitutione debilis, & ab ineunte ætate morbis, præsertim acutis, crebro affectus, decimo quarto ætatis anno, ex terrore sub somno, incidit in grave delirium periodicum, quod per biennium fere persistit, ac tandem incitata sæpius alternis diebus sanguinis missione est abactum. Ex eo natura ita venæ sectioni affluenda, ut quotannis minimum ter vel quater eandem administrare cogerebatur, simul pectori inducta morbidæ ejusmodi dispositio, ut sæpius ex eo laboraret, & pleuritide vera, nec non vehementi spasmica

angustiantæ stricture subinde afficeretur. Quoniam ipsi ex collato interita militari officio inter longinquum sub frigido & humido coelo Lucens di necessitas imponeretur, illico post reditum correptus est tussis vehementi, qua subinde non nihil sanguinis floridi eiecit, & post obdolum, admisso adhuc diæterico deficiente, succellit ipsi hæmoptysis larga, intra quatuordecim minimum duas sanguinis spurcosi rubicundi libras evicens. Licet autem adhibitis remediis sanguinis fœcibus remitteret, remansit tamen tussis molesta, pectoris gravitas, spiratio difficilis & nocturnus sudor admodum infirmans. Tussis per totum morbi decursum valida admodum erat, plus sicca quam humida, paucam quidem materiam flavescenem evicens, fed quia dies noctesque vires & corpus nullis cedens remediis convellatur, nihil boni præstegibat. Nilil vero magis afflicti ætrogatum, ac diutius & intolerantius fere sub ossis humeri sinistri confisens dolore purgine & tendivus, qui per vices totius pectus spasmum adeo contringebatur, ut omnem fere respirationem ad suffocationem usque polleret. Quam dolor hic postea se extendit ad regionem lumbarem, sub tussis semper vehementior, adeo, ut arcer vix per conclave pedibus incedere posset. Vesperti & maxime post cornam, frigus cum horripilatione quadam extrema occupabat, quod non vehementer æstus, sed effusus per noctem sudor sequebatur, cum pulsi duro & frequenti, urina rubicunda, cum copioso albo sedimento. Lateri sinistro acriter incumbere posuit, ac validior semper infestata tussis. Ceterum tor passionibus indices vires cum carne consuebantur, ac præterea phlogosis interitum cum dolore & subinde in fronte caput occupabant, ac licet medicis nihil ovisset, tam ex diæterica, quam pharmaceuticis remediis, quod curationi huius affectus, vel mitigatori symptomatum idoneum, omnia tamen erant frustranea. Demum meum etiam exquisitum anno duas mensis consilium, qui pariter nillem exitum ominatus, nisi nisi usum feri lactis dulcis commendavi. Invalescens itaque hectica febre & perleverantibus spasmis ac doloribus in dorso acerbissimis, æger in delirium tribus ante obitum hebdomadibus incidit, & sic etiam rationis usu privatus obiit. Facta ex decumbentis voluntate post mortem sectione, roca pulmonum substantia, præsertim vero lobi sinistri, scirrhosa, multis vomitibus, pure crasso, glutinoso referens, plena fuit inventa, ac præterea in arteria pulmonum polypus instar minimi digiti longus & latus. Ipse pulmo non tantum cum pleura, sed & cum pericardio & diaphragmate tam firmiter concretus & quasi conglutinator erat, ut vix commodè cultro separari posuerit. Tam pertinacis vero & molestillimæ in regione lumbari doloris causa nulla alia reperta fuit, quam quod ob firmam cohesionem pulmonis cum diaphragmate, sub vehementi & pectus concutiente tussis, processus & tendines diaphragmatis lumborum vertebis annexi nimis vehementer tensi ac distorti.

## Epiris.

Hæc morbi historia paulo curatius inspecta, haud exigua in usum theoriæ & praxeos medicæ præstat argumenta. Scilicet innovecit: quod delirium decimo quarto ætatis anno per duas fere annos integros durans, crebrius & fere æternis diebus repetita venæ sectione quidem conquiescit, sed quod eo natura ita affluenda eidem, quin debilitata fuerit, ut ter, vel quater singulis

gula annis, sanguinem mittere fuerit coctus, neque tamen sub nova sanguinis immixtione, à rheumatismo in pectore & pleuritide cum febre, congestioibus etiam sanguinis ad parus superiores, ponitur liberari. Deinde id quoque in usum medicum cedere potest, quod post morbum pleuriticum, quam debiles adhuc sunt pulmones, nihil sit deterius, ac corpus diu atmosphaera frigida & humida exponere, & quod hoc modo hæmoptica ac phthisis, magna pulmonibus laze & obstructione indoles, ingenerari possit. De-terior porro semper est post hæmoptysin tussis sicca & vehemens, quam humida parulenta & copiosa, quam ego aliquoties in juvenibus sanavi lacte incocto cum speciebus vulnerariis, usurpato balsamo pectorali Meibomii & ordinario feri lactis pom. Præterea patet: quod dolor in lumbis fixus & intolerabilis a tensione nimia processuum diaphragmatis oriri possit, id quod etiam in Principe juvene Ciceridi, ante viginti aliquot annos hic mortuo, a copia extravalari puris processus diaphragmatis comprimentis, observatum. Tandem notabile est, quod delirium in febre hectica & phthisi supervenire possit in corpore disposito.

## OBSERVATIO XI.

De hæmoptys cum inflammatione vena-riæ.

Studiosus quinque supra viginti annos habens, constitutionis suis robustæ, ante anni dimidium a motu & exercitatione corporis vehementiori, sub hyeme frigida incurrit in ejectionem sputi cruenti, ita ut per vices aliquot cochlearia excreearet. Admiristrata in talo sanguinis mollitione sponte cessavit malum, quam vero post aliquot menses, in aere frigido & humido pedibus iter faciens, potus spiritus vini repletus, cum sodali graves moveret traxas, & ira candens frigidam cereviciam copiose superbibebat; ingentem quantitatem sanguinis spumosi tussi excrevit, ut intra diem & noctem libris minimum quatuor fuerint rejectæ. Conqueriebatur autem simul de vehementi incendio circa præcordia & pectus, paribus extremis penitus refrigeratis; aderat continua sitis, pulsus duras & vehemens, nullus somnus, & quando sanguinem non expuebat, miram quantitatem pinatæ viscidæ ore rejectæ. Nihil levaminis à lecta vena, ab usu feri lactis, à pediluvio, à lacte amygdalato cum nitro mixto, nec ab aliis medicamentis inflammationi resistentibus expertus est, sed potius ab omnibus ingessis major oborta est anxietas & dolor, donec tandem persistens huic symptomatibus & faucientibus omnibus viribus, decimo quarto ab invasione morbi die, periret.

## Epirisus.

Videmus ex hac morbi historia, quomodo & a quibus causis simul concurrentibus, in homine plethorico & qui jam non levem hæmoptysin expertus est, gravis hæmoptys sine una cum inflammatione ventriculi lethali progigni possit. Nam atmosphaera frigida humida existente, fortior motus, potus copiosus spiritus vini, ira, vociferatio, in homine plethorico sanguinem in tantam ebullitionem, organum, congestionem & impetum a paribus exterioribus ad interiora urgere & pellere valent, ut ruptis vasculis pulmonalibus, hæmorrhagia periculosa, ventriculi vero à potu ingesto frigido inflammato, nullis levanda auxiliis, accedat. Post excretionem autem cruentam magna phlegmatina ejectio successit in nostro, propter majorem humorum ad pectus affluxum,

& nimiam membranarum in bronchiis glandulosis relaxationem.

## OBSERVATIO XII.

Fœmina generosi stemmatis, valde teneri corporis animique mobilioris, annorum quinquaginta, per decem fere annos menstrua caruit purgatione, & hinc etiam subinde flantentis, præcordiorum anxietatibus, animi perturbationibus, phlogosis cum strictione alvo junctis, a longo tempore fuit obnoxia. Antec annum & quod excedit, circa os sacrum & in imo ventre dolorem pressuræ cum ardore & pruritu ani perensit, & paucis diebus elapsis, portionem sanguinis fecellisse per alvum, quam eam deposuisset, observavit, itque aliquoties. Sed ab hoc tempore protinus omnis evanuit dolor & imi ventris molestia, brevi tamen post cum abdominis veneris alvique strictione percepit dolorem pungiivum in sinistro thoracis latere, cum titillatione in epiglotide tussique valida & sicca, qua demum aliquot sanguinis floridi & coctineo tincti colore extraxit per intervalla cochlearia, & sic iterum cunctæ molestiæ remiserunt. Quam vero talem accessiorem per quatuor menses circa plenilunii tempus, cum aliis antecedentibus symptomatibus, simili etiam eventu & solutione mali, generosissima fœmina experiretur, metu majoris periculi postulatui meum consilium. Ego igitur res ante accessiorem hæcenus confectum tempus dies venam tali candenda curavi, & minimum ut tres vel quatuor sanguinis uncie emitterentur iussi, pulverem etiam rhabarbari cum lapidibus cancorum & nitro bis in septimana cum haustu aque frigide circa lecti immontem & insulam theiforme mane fumendum suavi, quorum remedium ope ab omni accessione hæmopticea postea libera permansit.

## Epirisus.

Rectius hæc hæmoptys pectoralis rheumatice appellari potest, quæ ex paludrone, live translatione sanguinis affectans exoritur per venas hæmorrhoidales ad pectus, ubi etiam in masculis thoracis pleuritidem spuriam intervenit, fuit profecta, & soluta per aperturam valvorum sanguineorum, quæ interna bronchiorum tunica involvant. Tenuis enim, floridus & spumosus sanguis rarius immediate ex pulmonum substantia, frequentius ex bronchiis & alijæ arteriæ vasculis faciens venit. Quam autem venæ sectio validum sit sanguinem a paribus superioribus ad inferiores revellens medium, non sine levamine circa tempus accessiorem influita fuit.

Plures memorabiles observationes legas in Consult. Medic. Tom. I. Sect. II. cap. LXXIX-LXXXIII.

## CAPUT III.

De Vomitu Cruento sine & cum secessu nigro sive morbo nigro Hippocratico.

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

Sicut in hæmoptys sanguis subinde spumosus, Stenius & floridus cum tussi ejicitur; ita ex ventriculo cruor concretus, ex atro-rufescente colore unctus,

Hæmoptys pectoralis rheumatice.

Pomina cruenta quid?

inctus, multo cum phlegmate infipido, acido, aut viscido mixta per vomitum exoritur.

## §. II.

*Ex his symp-  
tomata &  
signa.*

Antecedit hunc sanguinis vomitum ut plurimum punctioris & tenuis hypochondrii fissi-  
fari dolor, & ipsa erupitio nunquam fere non cum  
præcordiorum anxietate & dolore compressorio,  
nec non constrictione in hoc laere jungitur; at-  
que etiam nullum sanguinis profluvium tam fa-  
cile ac siæpe lipothymiam habet comitem, quam  
hoc, præsertim, quando cruor graveolens, cor-  
ruptus erit.

## §. III.

*Sedes in  
ventriculo  
& vena.*

Sedes morbi & scarugo unde sanguis venit,  
est in ventriculo, ita tamen, ut in consorcium ma-  
li, seu sedes causæ morbi, veniat & ipse lien. Id  
enim aperte monstrant sectiones cadaverum hoc  
morbo defunctorum. De liene quidem, quod is  
semper fere sanguine tumidus, infarctus & quan-  
doque plane induratus deprehendatur. De ven-  
triculo autem, qui copiosis ubique vasculis distin-  
ctus est, quod brevius potissimum sic dicta arterio-  
la & venosa, quæ in suprema & sinistra tenuiori  
parte excurrunt, ibique admodum teneta mem-  
brana teguntur, si aperiantur, vel dirumpuntur,  
sanguinem qui vomitu ejicitur, fundant & fude-  
runt, eaque propter varicositatem & nigro sanguine dis-  
tincta deprehenduntur, corrupta simul ibi ipsius  
ventriculi substantia. Sic *Riolanus anthropolog.*  
*Lib. II. Cap. 17.* vas brevius minimo digito latum  
deprehendit in rejectione sanguinis per superiora  
& inferiora. Idem testatur *Columus rerum ana-  
tomie. Lib. XI. de Cardinali Cibo*, nec non *Ri-  
delius in Physiolog. reformat. Placitum Observat.*  
*Lib. II. de Benigniæ medicis. septentrional. Lib.*  
*III. Sect. 5. Cap. 4.*

## §. IV.

*Non sem-  
per ex ven-  
triculo.*

Interim non adeo videtur impossibile, licet  
rarius contingat, quod ex aliis etiam stomachi vas-  
culis, si à succo acido-corrosivo, vel etiam à ven-  
enis, fuerint erosa, vomitus cruentus succedat.  
Quod tanto magis factum fuisse concludendum,  
si dolor stomachi præcessit acutus, atque mæcia,  
quæ vomitum rejicitur cruentus, nigra simul  
est & acida, dentes stupescit, fauces ac os  
adurit, & pavimento injecta ebullit, qualem  
descriptionem *Hippocrati L. II. de morbu §. 71.*  
tradit.

## §. V.

*Quæ ad  
venam dispo-  
sitæ corpora.*

Jam sicut corpora graciliora & teneriora om-  
nium facillime hæmorrhagias, quæ sunt in par-  
tibus internis, incurant; ita etiam idem fieri in  
ea, quæ succedunt in ventriculo, testatur experientia,  
præsertim si subiecta sensibiliore & mobiliora  
simul sunt animi. Ejusmodi enim corpora va-  
sa ut plurimum gerunt subtiliora & quoad sub-  
stantiam teneriora, quæ & facile dissolutionem &  
rupturam, atque hunc sanguinis effusionem, ad-  
mittunt.

## §. VI.

*Superveni-  
t frequentius  
male curantur.*

Potissimum atroci huic malo observantur ob-  
noxie femellæ, imprimis quæ alvi sunt adstrictio-  
nis, pubertatis tempore, quo menses primo im-  
minent, nec non quando postea suppressi sunt,  
aut parcius succedunt. Tum enim, quando gra-  
vi ita, vel terrore commovetur, & inferiorum  
partium accedit refrigeratio, vel etiam medicus

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

parietata à regurgitante abutro ad stomachum  
linguine orta per emetin excitatam perperam tol-  
lere contendit, per quam facile sanguinis eructa-  
tio procuratur.

## §. VII.

*Post inter-  
missionem  
male curantur.*

Pari ratione post intermittentem pervertit me-  
thodo à medico tractatam & justo citius cohibi-  
tam, in teneriora texture foemina novi subitiffi-  
ci menses. Quos si postea validi & calidius em-  
menagogis iterum emovere ausus fuit morbi ar-  
sefex, eorum & kohalem cruentam vomitionem  
succedisse bis observavi.

## §. VIII.

*Menstrui  
menstrui.*

Annosiores quoque foeminas, deficiente men-  
strui fluxu, graviore & diuturniori morore con-  
fectas, de doloribus pressuris in sinistro hypo-  
chondrio, cum inappetentia & virium debilitate,  
diu conquestas notavi; quibus tandem subito im-  
periosa sanguinis per vomitum morifera eructa-  
tio accidit.

## §. IX.

*Gravidæ  
plethorice.*

Neque minus gravidas, si sanguine nimis re-  
dundant, epuldenque missionem intermittunt,  
cruentum vomitu tentari in experientia est funda-  
tum; præsertim, quando circa medium gestano-  
nis tempus stomachus ipsa crebrius fuit subver-  
sus. Quia tamen is, quem vomitum rejicitur san-  
guis, parvus est ac tenuis, magis videtur recto si-  
mile, eundem ex arteriolarum in oesophago &  
fascium fucalis, non vero ex ipsius stomachi va-  
sa venire, eaque propter minus periculi akre.

## §. X.

*Potentius  
ritus aff-  
citur.*

Contra ea capitale sanguinis observavi cum  
vomitum profluvium, in feminis, quæ partu dis-  
cillimo ex pravo foetus seu laborant, & im-  
mensam sanguinis molem cum vita eructant.  
Vidi tamen etiam, vomitionem cruentam in par-  
turiensibus non fuisse; sed in his parvus fœ-  
cillus sanguinis quantitas & purpureæ admodum  
fuerunt plethorice, ac ultimus temporis venæ  
sectio male fuit intermissa.

## §. XI.

*Hæm-  
orrhoidalis  
vixit.*

In virili etiam sexu occurrunt subinde valedi-  
narii & hæmorrhoidarii, quæ succedente par-  
cia, vel cessante penitus hæmorrhoidali fluxu, de  
præcordiorum anxietatibus, constrictionibus car-  
dialgicis, cum sudore frigido, alternante calore &  
frigore, conqueruntur. Quibus, si tandem eva-  
cuatio sanguinis forculem & cadaver olem per  
superiora & inferiora accedit, recurrente aliquo-  
bus paroxysmo, brevi post sub animi defectu  
ipsi perire solent.

## §. XII.

*Ex aliis  
vixit non  
adeo peri-  
culosius.*

Minoris periculi fuit ille cruentus vomitus,  
quem superiori anno Septembri mens. Mariburgi  
frequenter observavi. Licet enim cruor bru-  
no-nigricans, ad aliquot mensuras, in plebeis  
maxime foeminis ac viris, eructaretur, præter vi-  
rium debilitatem, vix tamen fuit superflua. Quin,  
eodem tempore, occurrerunt in plethoricis ma-  
xime hæmoptyses, quæ pariet sine singulari ar-  
tificio iterum discesserunt. Circa æquinoctiale  
enim tum tempus, ob subtilitatem & multiplices aeris  
ex calido in frigidum, & ex frigido in cali-  
dum vicissitudines, sanguinis æqualis ac liber cer-  
culus barbarus, ut hic, maxime ubi redundat, ad

T hanc

hanc vel illam partem cum impetu ruat, & ubi exitum invenit, perrumpat, effuso autem nimio, iterum cesset.

## §. XIII.

*Ab inflama-  
tione  
gastricæ  
dilatatio  
dilatatio  
dilatatio*

De ipsius morbi de cursu porro tenendum, spasticum illius & gravatum ventriculi dolorem, qui ut plurimum cum ardore sanguinis vomitui jungetur, non pro stomachi inflammatione esse habendum. Inflammationem enim nunquam non ex timentorum frigore, vehementi circa pæcordia anxia, sin, febri, pulsu contracto, debili & celeri fligatur, quæ tamen in cruento vomitu non sic adiunt. Neque ventriculus inflammatus ferre possit calidum potum, nec non extrinsecus applicato- rum regularem calidarum, vel calidorum pannorum, quæ tamen vomitu cruento laborantes exi- mie solantur.

## §. XIV.

*Facile  
dilatatio*

Sicuti autem omnes hæmorrhagiæ facile re- crudescunt & post hebdomadam non modo, sed mensium citius, quin annorum decursum, rever- tuntur; sic etiam idem in hac ventriculi hæmor- rhagia accidit. Nam quia per effusioem parti- bus inducitur debilitas, minus postea resistere possunt sanguini copiosius & validius affluenti, sed in præstas servat vias, subdit ita tandemque etiam erumpit. Quia ea quandoque observatur naturæ quasi consuetudo, ut locum pristinum exa- cte replet, & maxime in natum hæmorrhagiæ, ex tunc illius lateris, quo primum succellit, post- ea semper fere succedere solet sanguinis illaci- dum.

## §. XV.

*Que ma-  
gnæ  
dilatatio*

Periculum quidem, quod morbus hic inducit, non in omnibus idem, id vero certum, vix ullam hæmorrhagiæ periculositatem esse hac. Interim non tamum discrimini subest, si febris abest, si a supprellis evacuationibus ex plethora oriunda erit. Contra ea, si febris jungetur, si sanguis corruptus, graveolens & niger prodia, si ex mag- no & corrupto sine, vel insulato hepate proficiat, animique tandem jungetur desolio, sum- mum adest periculum & morum proximam jam portendit. *Hippocrat. aphor. 37. Sect. VI. nec non in prognostico.*

## §. XVI.

*Periculo-  
sum  
est  
periculo-  
sum  
est*

Longe gravior longeque certius est periculum, si, uti subinde accidit, vomini cruento, nigra & pici similis eaque graveolens alvi dejectione junc- tur. Hæc enim subitum ut plurimum denun- ciat interitum, ipsius *Hippocrati* testimonio, qui sub morbi nigri nomine hanc passionem de- scribit.

## §. XVII.

*Quæ ma-  
gnæ  
dilatatio*

Proficitur cruenta hæc, tam per inferius, quam per superius ex oculo, non immediat ex ventriculi valis, nec a sanguine in stomachi ca- vo extravasato, sed potius ex alio viscere, vel insensibili renibus, maximeque ileo, & rupes in ipso mæstiacis, quæ tenuissima testæ sunt tui- ca, valis. Hæc cum in defunctis sepe adhuc nigro sanguine valde diffusa deprehendi, simulque totum ventriculum cruenta ejusmodi materia re- fertum.

## §. XVIII.

*Quæ ma-  
gnæ  
dilatatio*

Qui autem funellis ejusmodi nigra alvi de- jectione

tionibus, cum vel sine vomitu cruento, affi- ciuntur, vel hypochondriaci sunt, aut hæmor- rhoidiaci; in quibus sanguinis cursus per mæ- raica vala non recte, sed impeditus succedit, unde dolorifica valorum sub membranis excurrit- tium distensiones, spasmi, congestiones & tandem effusiones periclitæ sequuntur. Quibus optime distingui potest a fluxu sanguinis hæmorrhoidali, qui licet interdum etiam subnigrificans sit; tamen- quam tamen tam inmensio dolore insensibilium spasmodico stipatur, neque etiam præsentem in- teritum, sed potius magnum levamen, affert.

## §. XIX.

Materia illa nigricans, quæ sic per alvum exit, solet esse foetidissima, quia sanguis effusus, cum stercorebus in cavo intestinorum quasi conser- ventur, exalto principio sulphureo alcalino, in foetidissimum abot putrilagine. Quæ, quia insensibilis fluidi nervorum naturæ, hinc mo- cito vires deprimit & vitales in corpore meos destruit. Atque adeo summa, quæ fere mor- bo huic perpetuo jungetur virium dejectione, non adeo ex nimia sanguinis profusione ejusque na- tura, sed potius ex ipsius corruptione putrida est derivanda.

## THESES THERAPEUTICÆ CUM CAUTELIS CLINICIS.

## §. I.

In hujus tam horrendi & gravis morbi cura- tione Medicus unque pro diversitate corporum, causarum & temporis, prudenter & circumspice- re se habere debet. Extrema aliæ medendi ratio est in paroxysmo, alia extra eundem; alia, ubi à sola sanguinis abundantia & organo malum suscitatur atque excreto quasi critica est, alia, quando à doloribus & spasmi sanguinem ad in- teriora urgentibus oritur; rursus vero alia, quan- do a corrupto aut obstructo viscere, aut a causa externa, veneno vel corrosiva materia, morbus inducitur.

## §. II.

Ipso in paroxysmo, si corpus est plethoricum, ipseque sanguis motus ab exterioribus ad in- teriora præter naturam conversus est, commodissi- mum locum habet venæ sectio in brachio. Te- nendum vero est, sanguinis mensuram millioni- que repetitionem à primo & circumspice de medi- co pro corporis, valorum repletionis, virium ætatis ratione esse præcipiendam.

## §. III.

Quandocunque sanguis nimium astuat atque in organo continetur, & pulsus impetuosis ac validus est, aquæ fontaneæ, vel plantaginis po- tus, in cujus libra niri puri drachma & syrapi papaveris thoracis uncia dimidia soluta, succe- ssive & temperate sumatur, egregie conducit. Re- frigerata etiam hæc potio temperat simul humo- rum acrimoniam, elasticam purium sulphurea- rum exaltationem intera vasa componit, & rela- xata vasculorum apertorum orificia ita firmat & roborat, ut postea eo facilius coacti iterumque coalescant.

## §. IV.

Porro nunquam non egregiam opem præ- stant emulsiões, imprimis, quando pæcordialis regio,

*Ab inflama-  
tione  
gastricæ  
dilatatio  
dilatatio  
dilatatio*

*Ab inflama-  
tione  
gastricæ  
dilatatio  
dilatatio  
dilatatio*

*Medicatio  
causæ  
causæ  
causæ*

*In parox-  
ysmo  
venæ  
plethorici*

*Sanguis  
astuat  
potio  
temperata*

*Quæ ma-  
gnæ  
dilatatio*

*clauda  
emulsiōe.*

regio, circa finistram potissimum laeva, pungitiva & vellicatoria doloribus spasticisque stricture affligitur ac suis cum seba urget. Possunt autem coacti ex feminibus quatuor frigidis & papaveris albi, cum aquis anisipimpinidis, florum tiliae, hiorum convallium, primulae veris, acaciae, papaveris theodori, paeonae, cerastium nigrorum, admixto nitri momento & convenienti syrupo papaveris albi quantitate.

## §. V.

*Et insinua  
di clysteris  
emulsiōe.  
seu.*

Præterea ad laxandas spasticas intestinorum stricture & divertendum ingenuosum humorum ad partem affectam affusum, desideratum subinde levamen affertur clysteres emollientes ac demulcentes, simul tamen quondam leniori armati, nitro conditi & frequentius injecti.

## §. VI.

*Exterius  
adhibenda  
affusiva  
et rubra.*

Neque minus inter externa huius mali remedia consummandi ea, quæ squinos silendo, venterculum roborando, nec non discutiendo, virtutem suam exerunt. Hoc nomine ego nihil præstantius deprehendi ipso oleo camphoræ, quod paratur, si drachma una camphoræ solvitur in uncia una olei amygdalarum dulcium & postea viginti guttæ olei ligni Rhodii insiliantur. Inungatur hoc oleo tota præcordialis regio cum toto hypochondrio sinistro, & postea facculus, cui species ex floribus chamomillæ Romanæ, sambuci, herba menthae & abysynthii indite, in aceto rosato, vel vino rubro coctus, subcalide applicatur.

## §. VII.

*Ligatura  
laxa, et la-  
vis utro  
manuum  
pedumque*

Quodsi jam enormis cruoris copia profusa cum summa visum jactura, injicienda sunt ad compensandum nimium fluxum atrovum ligaturæ, quæ postea, ut capite antecedente monitum, circumspecte iterum solvenda. Novi etiam non sine successu fuisse consilium, ut manus & pedes ad malleolos usque, aquæ immittantur frigida, quo frigui sanguinem in minimis vasis diutius detineat, & sic ejusdem ad cor refluxus aliquantisper retardetur.

## §. VIII.

*Apertus  
gravis or-  
catus.*

Extra paroxysmum ad arcendum mali recurrit eximie conducit rhabarbari electi pulvis, ad dimidium drachmam, vel sola, vel cum cantharum lapidibus, aut duodecim trochiscorum de casabe granis & dimidio camphoræ grano, bis singulis septimanis, acutæ lecti introitus, cum haustu aquæ fontanæ sumens. Est enim rhabarbarum quasi specificum ad referandas paulatim obstructions. Egregia quoque virtus est insula theiformis ex herba veronica, centummodii, summitatibus melleis, radice glycyrrhizæ & semine fœniculi, ad aliquot panellas quotidie poni. Potui ordinario intersit commodè aqua fontana pura & levis, in qua serum extinctum, vel etiam serup lactis acidularum.

## §. IX.

*Seu men-  
strua sub-  
missa qua  
solvenda.*

Peculiaris ratio huius mali occurrendum, si ex menstruis suppresis, vel obstructis oritur. Tum scilicet vena secunda est in pede, & præterea clysteribus ex menstruis provocandis idoneis confectis, ut aremetia, pulegio, floribus cheiri, bacis lauri & janiperi, alvus frequentius eluenda, vel etiam temperatæ ejusmodi species emmenagogæ, in infuso, aut decocto, simul sunt propinanda.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

## §. X.

Alia quoque ratione medicatio insinuanda, quando ab allumeis acerbis & acidis liquoribus stomachi vasa erosa & sanguis sic effusus vomitur. Tum scilicet ad compestandam acrimoniam & cicurandam rodenentem facultatem, eximie conducunt pulveres asborbentes terreo alcalini, ad consolidanda autem vascula fauciatia optimum remedium lac cum amylo coctum.

## §. XI.

In omni, à quacunque causa fuerit producta, stomachi hæmorrhagia, caute mercandum est cum opiatīs & narcoticis, eo, quod virium dejectionem, quæ nunquam non in hoc morbo præsto est, magis adhuc cum summo detrimento augeat. Summo etiam studio cavendum est à validis spicis, adstringentibus & visiolaceis pharmaci. Has enim sanguinis eruptio quidem sistitur, sed cruor in vasis stagnans putrefcit & gravis inflammatio cum sphacelo metuenda, aut minimum, si cachecticum corpus est, expeditius fit in hydroperem transitus.

## §. XII.

Superato vomitu cruento, abstinendum postea omni cura ab emeticis, nec non ab aloeticis, quibus sanguinis ingratissimus, ejusdem inordinatus progressus & ad stomachum confluxus induitur, ac sic facillime malum revocatur. Recte etiam monet Hippocrates: fugienda esse oleosa & pinguis, quibus addenda etiam dulcia. Nam licet hæc inter alimenta sint præstantissima, recursus tamen & generationis huius mali favent, quia vascula dilacerata nimium relaxando, sanguinis affluxum potius invitant, quam arcunt.

## §. XIII.

Ceterum digna videntur, quæ subjungantur Hippocrati de morbo nigro monita practica, quæ libro II. de morbis Sect. V. consignavit & sic habent: Morbo atro laboranti medicamentum purgans crebro propinato, & serum & lac, si autem tempus ferat, & citius abstinere dulcium, oleosi & pinguis, matur potius frigidi & alvum subducitibus, & nisi debili fuerit, sanguinem ex brachio detrabit. Quod si alvus non deiciat, melli iusculi sublati, & crapula & venere abstinere, neque multum exercitatur, neque decumbat, calidi non lavet, acris non edat, neque salsa, quæ cum fierit, cum atque etiam morbus fugit.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Virgo, decimum octavum ætatis annum agens, corpore procera, macilentæ ac teneræ, facie pallida, anno ætatis decimo quarto, post vehementissimam iracundiam, tantam cruoris copiam vomuit, ut mensuram fere compleret. Subsequens tum febris affidua, quæ difficilis, mensium fluxus erupit & in hunc usque diem satis ordinatè successit. Interim haud raro emicuit sensus doloris pungitivi in sinistro latere & pectori in venterculo, quo medicus consultus inductus, cruditates in stomacho subesse suspicatus est, & ob id potterit vomitorium satis validum anemionale. Sed inde dolores & preditiones venterculi mirum exacerbare & accellere præterea stricture præcordiorum anxie, cum intenso

T 2 capi-

capitis dolore, quin triduo post, sanguis magno cum impetu per os erupit, sub extremorum algore, agonia, animi profunda defectione alvique adstrictione, quae insequens aestus ingens, cum magna siti; postero tamen die per vomitum nihil amplius sanguinis, sed tantum ingesta rejecta, & ante meridiem semper aegra melius, post meridiem pejus habuit. Cum demum ego in consilium adficeret, sui usus sum magno cum fructu remediis. Banis scilicet singulis horis porrexi paulatim fortibendum haustum aquae fontanae frigidae, cum pulvere nigrolo absorbente & quindecim liquoris anodynii mineralis guttis. Deinde ter succellive injicere julli clysterem emollientem domesticum, quo alvus ingentem viscidorum recrementorum colluviem dimisit. His levata quidem aegra, conquievit etiam aestus nimis & urgens praecordiorum anxietas, nihilo minus mansit semper conatus ad vomendum, junctus interdum, non cum sanguinis, sed pieuitate vomitu, neque capitis dolores, neque anxietates praecordiorum prorsus cessarunt, sed interjecto aliquo tempore redierunt & vitae praeterea multum fuerunt defectae. Quare emollientem parare julli ex decocto comu cervi & scorzonerae, aqua mellis & menthae sine vino, cum semilibris quatuor frigidis, papaveris albi & syrupo papaveris, quam aegra indigni suscipit cum euphoria. Praecordiali vero regioni, sacculum herbae menthae, styribus sambuci & chamomillae Romanae plenum inque vino coctum saepius applicare julli. Et ad levandum capitis dolorem liquoris anodynii mineralis guttas quinque, vel sex, frustulo sacchari Canariensis insullatas, saepius ori indere suavi. Sic demum effectum est, ut & vomitus cruentus, & omnia reliqua pathemata discederent, & aegra pristinum perfectam recuperaret valetudinem.

## Epirisfa.

Quando menses primum infant, decimum tercio, vel quarto aetatis anno, & juvenulae ob id habent male, fortior animi, per macrotem, aut iram commotio superveniens, sanguinis est stomacho eruptionem perquam facile suscitare potest, idque tanto certius, quando exhibetur emeticum, cum certe venerit vim habens. Quod si etiam semel hac adfuit haemorrhagia, post longum annorum decursum, eadem, quavis data occasione, facile redit, uti quidem in nostra soletum est per vomitorium validum, quo sanguinis impetus non modo ad ventriculum, sed & ad caput translatum, in illo cruentum vomitum, in hoc autem gravia pathemata induxit.

## OBSERVATIO II.

*Primus de-  
fessus vi-  
gus dicitur  
incubare.*

Laborat per longum tempus quartana febre juvenis, & tandem ab empirico, nescio quibus, curatus, primum inde corporis contraxit habitum, cum livido ac plumbeo faciei colore, aliquali etiam circa palpebras tumore & virium languore continuo. Praeterea saepius conquectus est, imprimis post usum flandulentorum, vel animi commotionem, de dolore sinistri lateris, alvo simul dura & tunda. Tandem cum pedibus iter aliquot miliarium conficiens corporis valide exagitaasset, & rixas etiam cum sodalibus habuisset, incidit inopinato in vomitum nigrum, largius & aliquoties erumpentem; simul cefferunt per alvum faeces instar picis nigrae ac foetidissime. Sub his aeger saepius animi deliquit, si erigeret corpus, in-

curret & intra viginti quatuor horas plane exspiravit. Dissiecto alio statim die cadavere, tam infacetus nares ferit foetor, ut non ferre possent adstantes. In ventriculo vasa brevia nigro colore confusca & disrupta apparuerunt, & tam in ejus cavo, quam etiam ileo intestino, liquorem nigrum foetidum comparuit, vasis ibi simul nigricantibus. Hepar, naturalis aliquanto durius visum fuit, sed huius adeo duras, ut pene cartilaginis speciem praebetet, atque exterior ejus substantia albescens vix acuto eukro discindi posset; mollior autem interior exigua compages superstes, auro sanguine etat plena.

## Epirisfa.

Subitaneae hoc est exemplum mortis, ex sola sanguinis effusione, memorant utique dignum. Nam in aliis sanguinis profluvium, licet in majori copia effundatur; non tamen tam subito mors, vel etiam animi deliquitio accedunt. Quare alia utique subesse debet hujus eventus causa, quam ego quidem putarini cum intolerabili foetore tribuendam esse censio. Quae quia intus ad cerebrum nervosaeque partes admissionis, subito fluidum illud inficit, quod vires praestat, eodem modo ac in iis, qui sphyacelo partium tantum externarum afficiuntur, nec non qui cancerum exulceratum gerunt, & ea propter vitam cum viribus subito perdit. Quoad causam vero hujus mali, febri quartana diuturna & fortis male etiam curata, reliqua indigne vitium in huius visceris, quo obstructo, accedente spastica sub ira strictura, sanguis in propectu magis adhuc impeditur, nec ea propter mirum est, eundem tam brevia vasa, quam quae sunt in ileo, disruptis & effluxisse.

## OBSERVATIO III.

Formina sexagenaria, plethorica, sedentariae vitae & crassiori victui addicta, post perperam diuturnam morbosam, conquecta est aliquandiu de lassitudine corporis & dolore in sinistro latere. Quam veto curru aliquando venteretur & simul vento frigidiori corpus exponeret, vomitu eiecit magnam materiam nigricantis copiam, mox etiam similis coloris per alvum secessit cum foetore ingenti, ipsa autem sub his dejectionibus aliquoties redeuntibus animi semper passa est deliquitum. Datae fuerunt interea analgeticae mixturae, cum aceto destillato & cancerorum lapidibus. Exteriori ventriculi regioni applicatum balsamum nostrum vitae, ac praeterea, ledato post vomitum, rhabarbarum in substantia cum manna datum. Videbatur malum huiusce modis aliquantisper inducias dare, & spatio triginta horarum, neque per superiora, neque inferiora, coniegit ejectione; nihilo tamen secius rediit postea aliquoties anorexia & caetera dejectione cum animi deliquio, appetitus fuit simul prostratus, somnus turbulens, paucus & nihil reficiens; quibus tandem, elapsis duabus hebdomadibus, consumta femina occubuit. Tradito ad balsamum cadavere, infeximus mortis & morbi causam ac invenimus, vasa ventriculi brevia tumida & sanguine atro facta ac in intestino ileo albidum cruentum atrum. Hepar magnum erat valdeque induratum, huius non quidem duras, sed naturalis duplo major, adeo mollis, ut ipsius substantia digito pressa mox difficeret & sanguis foetidus, obducere nigricans quaque versum diffunderet.

Epirisfa.



## Epicrisis.

Ortus fuit funestus hic morbus procul dubio ex emanante sanguinis per uterum purgatione, quæ testante, in femina plethorica, neglecta præterea venæ sectione, necesse unque fuit, ut sanguis in vucaribus stagnaret, ea infarctis, & subiecto tandem per animi morientium coram robore, morbum morientemque hac ratione inferret. Quid autem diutius malo hoc afflicta traxit ægra, neque etiam tam ingens adfuit factor, tribuendum videtur, tum, quod sanguis non simul & semel, sed successive effusus, tum etiam, quod sanguis in ætate scilicet non adeo particulis sulphureis scatur, quam quidem in ætate juvenili.

## OBSERVATIO IV.

*Sanguis vis-  
per cu-  
m m. h. h.  
chii m. h.  
dehali.*

Prodierat in dextro brachio infantis mensis unius unica nocte tumor insignis, qui mox lividus ac durus cum venis inflatis redditis, tumello, postquam per tres dies & noctes continuo ejularet de per alvum materiam instar picis nigram effluisse, vitam eripuit. Dissecto mali moris tumore, cuncti sublati muscoli, una cum vasis, cuncti, corrupti, puncti, sanguine fetido infarcti comparuerunt, & exigua admodum sanguinis quantitas in reliquis corporis canalibus. Illam vero nigricantem materiam per alvum ejulantem, partim ex ventriculo, partim ex intestinis venisse, arguebat, quod adhuc ibi non nihil ejus supererat & valè inclinatorum nigricante sanguine turgida apparebant.

## Epicrisis.

Nutricem hujus tam misere perentis infantis fuisse impuram & huc gallica ante annum laborante, fuit post fata conspersum. Interim non dubium est, quam ob mortem sanguinis in parte inflammata & corrupta interceptum, is alias via quædaverit ac demum tenuia ventriculi & intestinorum vasa petierit, eodem modo ac subinde evenit, à gravibus partium externarum contusionibus sanguinem & naribus, vel etiam per alvum, aut alias vias protrahere. Quam in rem concinne periclitissimus Placius, qui in *præxi pag. 726.* scribit: à corruptione aliqua facta circa viscera ventriculi vicina sanguis non unquam emanatur. Nigredo autem sanguinis intemam omnino corruptionem ejus indicat, quæ sine omni dubio à corrupta illa purida tumore materia profecta & communicata. Neque etiam alia ex causa, nigri & picis coloris cruorem, qui per anum in ejusmodi afflicto fuit, quam ex valde corrupto in viscere quodam sanguine, totius massæ instar fermenti texturam invadente, pendendam esse arbitror.

## OBSERVATIO V.

*Vomitus  
cruentus  
medicinis  
omnibus  
auxiliis.*

Nonita pridem femina Hebræa Amstelædamo meum exquisivit consilium. Agit hæc quinquagesimum annum, & ante octo jam fere annos, tribus, vel quatuor, ante mensium fluxum diebus, sanguinis & naribus per intervalla notabilem quantitatem profudit, donec prodiret uterina purgatio & narium illudicium tolleret. Successe hoc per sexennium, postea vero non amplius è naribus mensibus periodo sanguis protu-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

pit, sed præcedente leviori nullo, è faucibus aliquot successive coclearia ferream evacuat. Tum semeltri albine sparis, circa medium tempus perferit, vomitu, sine tamen singuli conatu, è ventriculo sanguinem ad aliquot per intervalla, cochlearia protrudit; idque adhuc, quotiescunque redit tribus lunaris periodus, accidit. Ceterum femina est succi plena, vix sedentaria, lauto victu & potu vini addicta, & ex eo quo vomitu egessit mensuram sanguinem, ob periculum vitium experta est languorem, cum appetitu prostrato & exiguo somno, quæ tamen post mensium fluxum & exacto octo dierum spatio, inducias dederunt. Accepit & conquiritur hic usque multa & varia medicamenta, sed frustra. Neque venæ sectio, quæ tantum circa æquinoctium fuit celebrata, ullam amulit opem. Ego igitur consilium dedi, ut ante imminens mensium tempus, venam pedis apertendam curaret, & tres tantum uncias sanguinis effluere permitteret; deum ut singulis hebdomadibus bis thabebatari pulvrem, cum lapidibus cancrorum & nigro pernixum, mase, vel vespri, circa lecti introitum cum haustula aquæ frigide fumeret, frequenter infusum theiæmæ, ex veronica, scabiosa ac summis mellefolii mane bibet, a vino & carnibus penitus abstineret, pro potu vero pristinæ uretur, usque ad tempus verum, quo somis Sclerati cum quarta parte Lactis mixti prout per quatuor vel quinque hebdomadas insinueret & ipsam cæterum hilaris animo esse pulsi.

## Epicrisis.

Pater manifeste: hanc sanguinis eruptionem, non symptoma, vel effectum morbi cujuscumque in vixere vasculolo obstruente consistens, sed laborare opus naturæ esse. Etenim in femina hac valde plethorica, per sparsus, solentius mensium fluxum præcedentes, pars sanguinis ad superiora, & primis annis ad caput, postea ad pulmones & denique ad ventriculi vasa translata fuit, quam translationem veteres paludetromen, vel metastasin appellare consueverunt. Quia vero jam tempus adfuit, ut plenarie moris emanaret mensis; hinc fusi singulis mensibus sanguinis nissionem & abstinentiam ab eis quæ multum sanguinis ingenerant. Et quia præterea cruentis vomitio nunquam non valde suspecta, menendus omnino est gravior, & viscera abdominis sanguine forte oppleantur & infarctantur, progressu temporis, effectus; quem potius aquæ Scleratanæ, cum victu tenui & moderata diæta unque avertere & præcavere vult.

## OBSERVATIO VI.

q. Tricennio albine peregre vocatus fui ad generosissimam feminam, delicatæ & teneræ constitutionis, vomitu languinolento enormi correptam. Accedens illico obvium habui marium, monstrantem bias argenteas pelvis, liquamine ex cruento concreto & phlegmate plenas, quod vomitu fuerat excurbatum. In ægra offendi pulsum valde debilem, & vires iam dejectas, ut erecto capite animi incidere desiquium. Quare ingens periculum subsistere dixi. Dedit quidem analeptica & roborantia, sed altero die, post aliquot adhuc instar knære carnis, intermixtus sanguinis fuscæ coloris grumulos, vomitus, placide occubuit. Quamvis causam morbi mortisque inquirere,

*similis  
cruentus  
ab omni  
negligi ca-  
lida rebo-  
dit.*

T 3

rem, refecti: defunctam, post puerperium laborale trienna, tunc tempora grassante genii valde anomali; hunc post quinque accessiones à medico vicini oppidi, missis pulveribus fuisse sublatam, ex eo vero per tres menses restitisse fluxum uterinum & succedisse dolorem hypochondrii sinistri gravatimum. Hinc matrem permotam fuisse, ut ab extraneo medico petierit de filiae miseria medicamenta, elixirum scilicet, quod, quam explorarem gustu, proprietatis sine acido, cum effluvia zedoariae de succini erat, de quo requiritur gummata quinquaginta cum vino Rhenano veteri & generoso, sumerit ac pro ordinario potu cerevisiam valde lapularam habuerit. Sed elapso vix trium hebdomadarum spatio, incidisse ipsam in funestum hunc morbum.

## Epiris.

Tragicus hic casus docet juniores praedictos: quam perniciosum sit, emmenagogis, ad cientes menses, paulo validioribus uti in subiecta emenioribus, in quibus post puerperium de febrem magis defecit, quam abundat sanguis; tanto magis, si ex dolore gravatio hypochondrii sinistri, labis in visceribus, post febrem, sine dubio adstringentibus cohibeam, & imprimis lieinis, iusta est suspicio. Nam ubi oblaculum ponitur in interaneis transcurrit sanguini, in calidioribus medicamentis valde exagitantur & expansus, venas ventriculi remotiores facile vi percurrere & exitum affectare, atque etiam sibi parare valet.

## OBSERVATIO VII.

Abusus vi-  
gere ex ho-  
pau vito  
lithalu.

Causiliculus clarus, quadragenario major, corporis habitus gracilis & inter labores fori assiduus sedentariam admodum vitam colens, a pluribus jam annis cerevisiam parvam, partim vinum in seram usque noctem bibere consueverat, tam largiter, ut quotidie vix tres, vel quatuor vini mensuras sufficerent. Dum vero ponit sic indulgit, ciborum appetentia cum viribus languescere coepit, corpora quoque marcescere & saepius gravatius dexteri hypochondrii dolor affligere, facie simul existente plumbea & coloris ad sctericum vergentis. Venae scilicet natura quasi horruit, tandemque vix semel, vel bis, per totam vitam delinquerat, in juvenute tamen narium stillicidium expertus fuerat frequentius. Quam diu in convivio plus quam tres potentes Hungarici vini mensuras ingurgitasset, saltando quoque corpus valide exagasset, domum delatus, summam praecordiorum anxietatem percussit ac paulo post iterato per intervalia sanguinis fusi, ex parte concreti, colluviem evomit ingentem. Injuncto ex jure galli, oleo amygdalarum dulcium, nigro & sale aliquoties chylis, ejusdem indolis etiam per alvum secessit liquamen, ut adeo intra viginti quatuor horas plus quam tres sanguinis mensuras per superius & inferius exirent. Vocatus ego, portexi interius mixturam analepticam leniter adstringentem, ex aqua menthae, melissa, theriacali, cinnamomi sine vino, succo citri, cum corallis, specibus de hyacintho & synopo papaveris albi. Exterius praecordiorum regionem inungere jussi linimento ex oleo amygdalarum dulcium, nucis & camphora, & superimponere sacculum herbae menthae, absinthii, floris rosarum rubrarum, chamomillae Rumanae plenum, ex vino rubro

coctum. Quibus quidem sensim sanguinis per superius eructatio cessavit, sed remansit magna virium dejectio, cum ciborum plenaria inappetentia, successit tandem ventris, cum superiorum tace, tumor, de intra bimense spautum mox ipsa.

## Epiris.

Cruentam vomitionem ex liene & hepate proficisci, praesca jam fuit Galei sententia, & ego idem aliquoties experientia habeo confirmatum in iis, qui postquam aliquandiu de dolore hypochondrii dexteri pressorio diuturno conquesti, accedente gravi iracundia, motu corporis impetu, vini potentia abusu, aut refrigeratione externa, vomitus, nec non secessus alvinos sanguinolentos incurrerunt, tam largos, ut intra exiguum tempus, ejecta plus quam tres vel quatuor mensuras aequarent. Quare mihi omnino videtur verosimile, non tantum ex brevibus ventriculi vasculis, ut in sola vomitione cruoris accidit sine secessu per alvum, verum etiam per hepaticos ductus nimium amplius, vel plane disruptos venae porae ramulis, ad duodecimum perturbare sanguinem ibique effusum, non modo vomitus, sed & dejectiones alvinas sanguinolentas facere. Discant vero etiam ex hac observatione strenui illi spirituosorum imprimis potatores, quam male consulant suis vice-ribus. Ego enim inde obstructions, indurations & rupturas in mesaraicis vasculis sanguinis & lymphaticis vidi, unde postea ater funestus morbus, cruentus vomitus, hydrops, lenae & haeclicae febres.

## OBSERVATIO VIII.

Percelebatur ingenti terrore foemina trigemina ipso illo tempore quo mensura purgatio succedebat, & tremens adhuc ingerebat aquae frigidae haustum libralem, coque in artuum tremorem validum de inappetentiam ciborum delabebatur. Rediunt menstrua periodo, sanguis quidem comperuit, sed pulso parior, ac maximae praecordiorum anxietates, cum nausea, vomitu, extremorum frigore & faciei rubore ipsam infestabant. Tertio mense priora redierunt pathemata cuncta, & praeterea accessit per triduum vomitus largus sanguinis, vires summo tempore profluentes.

## Epiris.

Nihil certe deterius & formidius sanitatem magis laedit, quam gravis animi ex iracundia, aut terrore commotio, incidens in illud tempus, quo uterina purgatio succedit. Salutares enim illi motus sicut excretionis sic fluxum inveniunt, ad interiora vergunt, ac facile postea in habitum transibunt, nisi cito iterum emendentur. Quare si incidit quomodolibet noxa, quam fieri potest cunctissime succurrendum congruis auxiliis, inter quae praeter venae sectionem & chyliferas demulcentes, quam maxime proficua theiformis insula, cum us quoque sanguinis ad exteriora motum rursus revocant, blanda scilicet diaphoretica.

## CAPUT IV.

*De Haemorrhoidali fluxu nimio.*

## THESES PATHOLOGICÆ

## 6. L

*Nimbor*  
*hamorbul*  
*daromfla-*  
*rosa, quid*  
*et mola.*

**N**on omnis liberalior sanguinis per felis venas fecit, pro eo, qui praeferat & extraneatur legem fit ac nimis est, habendus; fed consideranda vasa, corporis habitus, vires, aetas ac temperamentum. Non enim infrequens, quod ea sanguinis effusi quantitas, quae certis corporibus legitima est ac salutaris, aliis vicissim fit nimia ac perniciofa. Neque etiam omnis folito laetior, a mole sanguinis valde aucta eaque paulo impensius commota, fufcitans haemorrhoidales fluxus, concidens est morbofus, fed is demum, qui diutius infillit, qui vires proferm, quo appetitus, laetabilis alimentorum digestio, nutritio atque functiones laeduntur, ac metus tandem est, ne via ad graves & chronicas paffiones pandatur.

## 6. 11.

*Erythronium*  
*hyemum*

Nimium hæmorrhoidum fluxum anteceditur ut plurimum & comitantur hæc: dorsi & lumborum gravativus pressurificus dolor, interdum crurum stupor, exterimarum partium cum levi horripilatione confectio, valorem in his leidennia, pulvis durior & confectior, oris fauciuntque ficitas, urina parcius & frequentius pallida, sensus ponderis in pedice ad perineum se extendens, venericuli imbecillitas, flauescit in imo ventre, frequens ad merendum & desidendum stimulus, subinde cum muci albi & biliosi exsolutione, ac seniores magisque imbecilles accidunt præterea anni prociocritia.

6. III.

Que San-  
guine ex-  
creta qua-  
litas et  
quantitas.

#### §. IV.

En la guerra, el ejército de los Estados Unidos se enfrentó a una gran resistencia por parte de los japoneses.

Sanguinis per intestinum rectum excretio nemis fit per valva sic dicta haemorrhoidalia. Externae tamen haemorrhoides rarius fluunt, sed in va- rices dolorificas facile abeunt, quae apertae san- guinem plorant, neque tamen crebro nimium fundunt. At internae haemorrhoides, quae propa- gines sunt splenici rami, & ad intestini recti in- teriorem substantiam, quam ad usque rectoscle- rem porrigunt, una cum arteriis ex melaera- ca infusum produciunt, non modo fluxum effluviu- fionem trahunt, sed & suppurant, morbos, qui

ex labe hepatis, lienis, pancreatis, mesenterii & intestinoꝝ sunt, ingenerant.

6. V.

Ipfæ fluxus immediate & proxime per arteriarum ramos sanguine nimium difticit tandemque difrupto contigit. Neque tamen ex toto negandum, è vena etiam hæmorrhoidali, propter laxam, quæ ipfi cum arteria eft, anastomofin, multum fanguinis ipi collecti & fere vifiofi prodire. Paucifera eorum fic via, valvulæ egressum hi impediunt defurg, & fi vel maxime effent, varicofa tamen ventrum habundum multum & valvularum firum immutat necesse eft.

## §. VI.

Salutarem illam per sedis venas sanguinis evacuationem, difficultati per hemorrhoidales venas, ob situm earundem perpendicularem, progressui & ad portam venam isfurmque hauri finitum, in acceptis referendum esse, & quanto visum in testis extrema ab accumulato ibi sanguine nimis diutela aperturam tandem atque debilitat, contingere, inter omnes constat. Unde qui exacerdens etiam & perniciosis hemorrhoidum fluxus causam atque originem ab impedio sanguinis per hemorrhoidales & metastasi venas isfurum hepatis vias motu progressivo repeti, si minime a vero aberrat. Tetatium id sane facit observationes anatomico-prædictæ, quibus confirmatur, illum vix hæmorrhoidalis ramum, qui iuxta colli tractum excurrere ad anam, multo quam quidem secundum naturam esse sue, ac vel triplo amplioris, in istis qui hæmorrhoidum excelsu perierunt, obditi. Item quo major sanguinis per artenas id affluxus & signis per venas refluxus, eo magis a collecto feci & iugante fibre laxatur, videretur alio deducuntur & labefactis fide magis magisque parum tunc ac robore profluvium diutius durat, facilius itaque recurrere.

§. VII.

Quaecunque igitur sanguinem inguntur nimium, eundemque per porae ramos commota tunc remanentur, aut etiam copiosiores ad loca haemorrhoidalia affluxum invitant, ad haemorrhoidalem tam moderatum, quam etiam immoderatum fluxum disponent. Hinc est, quod qui laxum, spongiosum, obetum, plurimis valis sanguine turgidis diffusiohem corporis obtinent habitum, qui laum fruuntur victu, vitæ genus calidum sedentarium monitus experti, & a majoribus hoc morbo affectis prognant, haemorrhoidalem excelsus quam maxime sint obnoxii. Eandem quoque ob causam accitit, quod actiora purgantia, aloetica crebrius usurpata, calidorum ciborumque aromaticorum, nec non potus vini dulcis atque potentes liberator usus, omnis fæte sanguinis lubricationes, animi atque, ira possitimum & tristitia diutina, & corporis quoque, maxime per equitationem, commotio impenfior, atque id genus plura, ut impetiat hic sanguinis fluxus praeternaturalis, faciant.

## 6. VIII.

Ceterum periculofum unigue est effufus hoc fauguinis haemorrhoidalis profluviu. Inde enim vires convelluntur, corpus marcefcit, fœnora gravantur, fomous fit laboriofus, præcordia gravativo fenfu anguntur. vixit enim boibore.

nis tumer, ac pulsus micat debilis. Urgente postea diutius fluxu, pedes circa malleolos immisimus, facies item & oculi, color illius fit lardus ac plumbeus, spiritus arctus mori, & postremo in cachexiam, hydropem, letam & hecticam febrem traiecit. Ut adeo patet: ex defectu etiam sanguinis graves subiacet aggritudines, ac utique viæ vitæque thesaurum esse sanguinem, nec quantitate, nec qualitate peccatum.

## §. IX.

*Diutius ad  
bellum.*

Extimalis hamorrhoidum excedentium eventus certius imminet, si tumor hepatis, vel lienis, hypochondriorum inflatio, cum alvo adstringente, incipiens cachexia & hydrops, morbosam hanc sanguinis effusionem induxerunt. Sic enim sub ipsa prius afluxu ingravescunt, obstructions incrementum & obstruantur, ac vitiosa quoque sanguinis & succorum constitutio augetur. Unde profusivum fit chronicum, tandemque in atrophiam letantemque hecticam febrem, cum extrema vitium iactura terminatur.

## §. X.

*De hydropem.*

Frequentioris obstruptionis est, nimias sanguinis per ieda venas profusiones ducere ad hydropem, idque præsertim in phlegmaticis, & qui rarum corporis obiectum habuit. Si autem hydropi ex hepate indurato supervenit, quoniam ex cellentia hamorrhoidum, certum multæ sequentis morbis præbet indicium.

## CURATIO.

Varie & differentia indolis sunt causæ, quæ ad excitandum nimium hamorrhoidum profusivum faciunt atque concurrunt; adeo varie etiam medendi sunt indicationes, & varia quoque ac diversæ naturæ ac ardens illud ac perianandum remedia.

## §. I.

*Sanguinis  
apria mi-  
noranda.*

Non adeo infolens est, ut in corpore plethorico, restitente aliquando facto alius fluxu, a vehementiori corporis, vel etiam animi commotione, a potu spirituosiori liberalius assumto, balneo nimis calido, aut medicamento intestinum sanguinis motum nimium intendente, non modo subito & conferens fiat, sed & solito diutius insisteret sanguis, cum pulsu magno & vehementi, per hamorrhoides profusio. Quod ubi accidit, prout omnium divergendus ac derivandus sanguinis impetus, eumque in finem sanguinis missio in brachio, vel brachiarum in liquorem aquosissimum tepidum immisio, apprimere ex usu est. Dein usurpanda ea, quæ excedentem intestinum partem in sanguine sustinere motum componant, diluentia maxime & refrigerantia, potus aque frigide, præsertim chalybeate, vel mineralis temperate, seri lactis cum succo citri coacti, aqua plantaginis, fragorum, acetosæ, acetosæ, detotum curus cervi citræ, mellea rosarum cum spiritu vitæ præparata, & coacta ex his cum syrupo rosarum pulvis. Eundem in finem præstans est virus nitrosum, niri tantum purissimum, vel artificiale, ex spiritu vini & sale tartari parati, vel in pulvere cum absorbentibus & roborantibus, vel etiam in potu dati. Porro operam locant egregiam, quæ impetuosum solidorum & fluidorum motum placuit tumque dolores & spasmos le-

*Infusum  
argemone  
reparan-  
dum.*

vare, anodyna, inter quæ spectant virtutis est liquor noster anodynus mineralis, spiritus etiam niri dulcis rite paratus, aqua item florum chamomille vulgaris & summorum millefolii, nec non ex papaveraceis, semen papaveris albi, syrupus papaveris utriusque, aqua & coactum papaveris, aut si fortioribus utendum, semen hyoscyami albi.

## §. II.

Quando cum vitium iactura & nobiliorum functionum lesione effusus fluxus diu persistit, incipienteque vitærum labor subest, & magis feroci acri, quam consistentis fibrosi sanguinis copia delinquit, conferunt quam maxime ea, quæ succos vitiosis ac biliosos clementer paulatimque per alvum educunt, simul atque humorum motum a recto intestino ad tunica & glandulas reliquorum intestinorum alliciunt, eoque nomine merentur laudem rhubarbarina, cum passulis minoribus & tamarindis, vel quod idem, cum cremore tartari, si corpus est biliosum, in potione electuaculo citri condita. Tum quoque temperantia diaphoretica, corrigendo & expellendo acres humores, officium faciunt opportunum, ibi maxime, ubi scorbutici, vel purpuræ aliquid, aut alius exanthematicæ materis, sanguinis & feri contentus alius inhaeret. Horum in numero sunt cornu cervi usum, vel, ut vocant, philosophice præparatum, unicornis foetile, diaphoreticum antiscorbuticum, acetum vitæ cum lapidibus cancerum mixtum, aqua gallegæ, florum sambuci, cardui benedicti, thymæalis, simplex mistura, disensorium Fracastorii, quæ in potione lege artis possunt redigi. Nec proletaria virtus est liquoris anodyni mineralis, cum quatuor liquoris bezoardici Bussiani parte nupti; infusi item thesformis ex nallidolis, veronica, pilosella aliisque conmixti, & cum dispositione in lecto aut corclavi ad blandum si dorem, poti. Atque etiam non possimus non hoc loco merito commendare refractam camphoræ dosim, ad granum dimidium, præsertim quando nitrosa & bezoardica pulveribus commiscetur. Hac enim ratione acris & caustica materia, quæ sæpe ipsorum æqualem sanguinis commotionem turbantem & hamorrhagiam largam inducunt causam est, obviandæ & feræ excutitur, simul adstringentium & anodynorum viâ, transierit ne nocens, refrenatur. Itaque non ineptus censendus ille veterum mos, quo camphoram præcipuis ad sistendæ etiam hamorrhagias medicinis, commiserunt, ut ex aqua admodum dosi, cuius generis sunt species de hyacintho, disensori tantali, diastiron Abbatis, trochisci de carabe, sfermola Crolii, nec non famigeratissimus *Hæmori* ad sistendum sanguinis fluxum pulvis.

*Humoris  
impetu per  
acutum*

*De vitæ  
crasamento.*

## §. III.

In graviore illo & difficillime medicutionis fluxu, qui obstruptione, vel infarctu moleque aduclta vikeris cujusdam, huius, feris, aut in fixationis uteri, nimia; eligenda, si medicinæ adhuc locus, ejusmodi auxilia, quæ dum obstruptionum repagula solvunt, humores non nimium commoveant. Intra hæc a præcis jam temporibus usu & securitate celebres pilule de bellis Mese, à *Forsytho*, *Salenandra* & *Rivieri* laudantur. Nec contemnendæ pilule Becherianæ methodo ex amara extractis & gummatibus temperantibus conmixtæ, ita tamen ut alois in locum,

*Obstruptionem  
reparandum.*

cum, rhabarbari extractum, largius paullo commixtum surrogetur, si hinc nitrosi pulvres pro re nata interponantur. Nil vero ad expedienda obstruenda aquas & diluentibus est præstabilis. Unde quam optime in usum trahuntur minérales aquæ, subtilitate atque temperie nobiles, quarum classem ducunt Antonianæ, Wildungensis & Selterianæ, vel cum, vel sine lacte potæ. Ex certe prudens ac moderatus harum aquarum, ad aliquot hebdomades, sub debito regimine & interpositis pilulis dictis, nec non elixiri balsamici temperati martialis pharmaci mixtura acutius usu continuatur potius, palmam præripit reliquis cunctis. *Montanum* præterea in *consolis*, pus pulci copiose tribus ante prandium hors bibere jubet, eoque plures hoc malo se libtasse testantur. Majoris tamen adhuc efficacis erit, si juleculum incoquantur acetosæ, cichorii & scorzonæ radices, aut etiam medicamentum martiale temperatum, cujus generis est illa cum pomorum succo parata martis tinctura, cum extracto calcæritillæ aquoso, primo mane sumatur, ac postea supra laudatum jus copiose bibatur.

## §. IV.

Denum inter præcipuas copiosæ sanguinis affluxus & effusus causas referenda merito recti intestini, ejus membranarumque de valorum atonia. Quare adhibenda etiam unice ea, quæ relaxatis nimium & à tono dejectis partibus fœnerant iterum robur. Interius laude sua hoc nomine non defraudandæ sunt speciei de hyacintho, trochisci de carabe Melicæ. Ex martialibus est maxime ipse hæmatis in subtilissimum pollinem reductus, tinctura martis Zvvölferi, crocus martis antimonialis subtilissimus cum conserva rosarum antiqua exhibitus, tinctura item flosum salis ammoniaci martialium, cum rectificatissimo vini spiritu parata & cum æquali portione elixiri amari temperati mixta. Inter resinosæ & balsamicæ nobilis est virtus succini præparati vel alcalisati, extracti calcæritillæ & funerali rubri. Et hæc omnia cum prudentia convenienti ordie ac dosi usurpata, fructu non desinuntur, si modo malum recipit adhuc sanationem.

## §. V.

Adhibenda præterea etiam sunt topica constringentia, ad obtinendum effectum speratum. Si igitur venæ in ani limbo varicosæ, circa alvi depositionem, magnam sanguinis, non sine syncope, vel mortis metu, fundunt copiam, colocothar virioli, vel etiam lupi crepini, sine noxa admovere licet. Tanto magis, si leniora prius adhibita profecerunt nihil, cujus generis est decoctum ex floribus balsamiorum, rosarum rubrarum, myrrha, plantagine, malicorio & chinæ cortice cum vino rubro præparatum & cum sponsia recto intestino post dejectionem alvinam applicatum. Ubi autem impetus sanguinis effluens jamjam compositus, oili sacro cum perisæo & pube apponendum crebrius epithema ex herba mentha, sumach, floribus rosarum rubrarum, hyperici, rasura ligni funerali rubri, massiche, cardamomo & chaccarillæ cortice, in vino rubro coctis. Neque minus ad firmandum intestini recti tonum ex usa est, idem hoc decoctum ano injicere syringa.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

In medicatione effusi hæmorrhoidum ac morbosæ profluvii hæc servanda methodus: ut præmitantur sanguinis missin & primarum viarum cum recenti cassia, vel rhabarbaro electio in decocto resurgatio; postea vero roborantia & leniora adstringentia, in & externa, tutius adhibere licet. Ex nimia enim sanguinis profusione tanta nititur imbecillitas, ut medicamenta efficaciora rarius felici cum successu applicare sit integrum. Generalis quippe mendendi est regula: quo major naturæ est imbecillitas, eo leniora & diætetica magis remedia, minus vero validiora pharmaceutica usurpare decet.

## §. II.

Nitrosa, acidula & refrigerantia, uti in principio, & uti ingens æstus & organus sanguinis præsto est, usurpantur cum euphoria: ita minus tutus eorundem est usus, sanguine cum viribus jam nimium profuso & ventriculo debilitato, præsertim, ubi ex viscerum obstruktionibus fluxus est symptomaticus.

## §. III.

De phlebotomia usi tenendum, eandem non facile in ægro absente esse admodandam; eo quod multum refert, ut jussa & convenientes sanguinis quantitas emittatur. Excusum in principio, si corpus sanguine valde turget, major ipsius, ad derivandum, è brachii vena, copia, poterit subtrahi. At ubi jam multum cruentis liquoris effusum, parcius & parvis potius vicibus, cum prudenti & causa ratione, influenda est missio.

## §. IV.

Optime jam monuit Hippocrati: hæmorrhoidibus nimium-fluentibus, oculis reliquis venis, unam servandam esse apertam, ne hydropsis, vel tabis fiat metus. facta scilicet sanguinis ad pulmones, vel hepar, palindrome. Unus vero effatus hoc proxime intelligendum sit de externis venis nimium fundentibus, & per unctionem, vel silepica oculis; recte tamen etiam applicari potest, ubi ex internis, uti in nostris solemus est regionibus, effusus sanguinis sit profluvium. Tanto magis, quia has occludere, sive potius fluxum sistere, non ita proman est ac expeditum, nec nisi per validiora interna periclitandum, quod, si non perite & valde circumspicere adnotatur, dumtaxat redudat, effatu Hippocrati, ceratissime.

## §. V.

Quæ quam ita sint, valide adstringentium usus unice sit cautissimus. Neque enim in principio, multo minus, quando vires cum sanguine jam exhaustæ, unam locant operam, ac potius in corporibus imbecillis & exquisitis sentiens naturæ, spasmodica pathemata, convulsiva, animi deliquia, summas præcordiorum anxietates, cum tremore & palpitatione cordis cunctant. Quod si itaque fluxum compescitibus uti necesse, consultum est, non vi & magnitudine id perficere, ne noxam inferant. Oportet quoque subungere diluenda, temperantia & leniora laxantia, inter quæ præstantissimum est alini.

asinum lac vel serum lactis dulce. Potissimum vero præstat marisalia liquida cum ipsis diluentibus assumere.

## §. VI.

*Cæcilius  
quærit re-  
suscitanda.*

Quando tamen sanguis ex hæmorrhoidali-  
bus locis fluxum subito subitum summæ præcor-  
dium anxietate, inflatione, cum inquietudine  
& angustia excipiunt; revocandus est leniori-  
bus elicientibus & laxantibus, clysteribus quoque  
emollientibus ac suppositoriis.

## §. VII.

*Andreas  
nam causa-  
la.*

Pari ratione cum hypnoticis, opiatæ & nar-  
cotici mercandum est cautissime, quippe quæ,  
tanto magis intempestive data, insaniam plane  
inducere apta sunt. Ex optimis, si locus, est illa  
massa pilularum, a Wilegansio nomen gerens,  
quæ etiam cum fructu exhibetur, quando atrox  
dolor & Natusus sub prima lumborum vertebra,  
nimiam sanguinis effusionem mover, eaque pro-  
pter est placandus.

## §. VIII.

*Quæ in vi-  
cta præstan-  
da.*

Si ullo in morbo exquisita vitæ victusquæra-  
tione opus est; in hoc certe id quam maxime ne-  
cessarium, eaque neglecta, auxilium, vel præstan-  
tissimum. obtineundum nihil. Quocirca agriis com-  
mendanda serin abstinentia a fructibus horæis,  
leguminibus, acetariis, lacticiis, carnibus ve-  
tullis, induratis fumo atque siliis, ab aromati-  
bus, alio, cepis, vino potius spirituosisque cun-  
ctis. Dissuadendæ etiam venationes, omnes im-  
pendiores corporis commotiones, per equitationem  
maxime & vecturam, in locis præsertim la-  
pidosis & inæqualibus, & placidum potius motus  
genus, supernam magnam, quam inferiorem  
corporis regionem afficiens, sub celo ætæno,  
sereno, concedendum. Nihil vero sic laboranti-  
bus perniciosius animi commotione, ira imprimis  
ac terrore, unde occasio ad eas studiose præcin-  
denda omnia. Neque minus multum interest, ut  
congruo potu utatur hæmorrhoidibus effusus ob-  
noxius. Nos quidem potum aque, vel feri lactis,  
item decoctum fanuli rubri cum malliche & cin-  
namomo, nec non julepos, ex decocto cortis cer-  
vi, si supposito acetosatis citri, additis aliquot gut-  
tulis olei de cedro, vel uncis aliquot aque florum  
citri, maxime commendare solemus, nam præser-  
vandi, nam curandi scopo.

## §. IX.

*Præstan-  
da.*

Composito morbo hæmorrhoidum proflu-  
vio, ne iterum erumpat, danda est opera. Obti-  
nendum id exacta vivendi, modo commendata,  
ratione, sanguinis missione, ter, vel quater quot-  
annis instituta, primæ regionis quovis mente per  
epuratum purgatione, ac dextro asquarum mine-  
ralium, vel solo lactis chalybeati usu. Sedulo de-  
nique cuncta ex alimentis & laxantibus vitanda,  
quæ dolorem excitant, quia hæc sequitur desi-  
derandi cupiditas.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Hæmor-  
rhoidum  
causæ  
quærit  
Andreas  
nam causa-  
la.*

Celceberrini nominis vir, corpore plenus at-  
que robustus, sexagesimum tertium ætatis annum  
egressus, a multis jam annis librali sanguinis  
per venâ sedis passus est stillicidium, fere men-  
struum, eodemque rite succedente, valentudinis

incommoda sensu nulla. Sed posteaquam diu-  
turno affectus fuerat cum tacita iracundia mo-  
rore, restitit hæmorrhoidum fluxus, & facies an-  
tea florida, lactea flavescens & flaccida, cum oculo-  
rum intumescencia. Ob metum igitur cachexie  
Pyrmontanas adit acidulas easque ingenti  
copia hausit, neque tamen in, neque potu earum  
usum, conveniens coluit in vitæ victuque regi-  
men. Inde effusissimus sanguis puri per anum  
sequebatur fluxus, non compescibilis, licet nitro-  
sis pulveribus Becherianisque pilulis uteretur.  
Pedes potius facti oedematosi, venter intumuit,  
vires collapsæ, anhelitus factus difficilis, superio-  
ra contabuerunt tandemque excepit mors.

## Epirisus.

Nihil certe ex animi etiam commotionibus  
hæmorrhoidariis est perniciosius, quam angor &  
moestia diutius extracta, quæ vires, totum ac  
robur partium labefactando, efficiunt primam  
stagnationem, quæ postea obstruendo in abdomi-  
nis visceribus infarctus, excessivus inducunt hæ-  
morrhagias atque funestas. Pyrmontanas au-  
tem acidule, si quis illis uni vellet cum fructu,  
exquisitum postulat regimen, tam sub, quam  
alioque hebdomadæ post usum, tanto magis, si  
potius jam tum vicerum affectus est labe. Quod  
quia in nostro non factum, sed potius pro lubitu,  
sine observatione debita institutum, malum exa-  
cerbatum & ad exitum tristem tractatum esse  
non est mirandum, nec ea propter dextro usui  
quicquam detrahendum.

## OBSERVATIO II.

Judeus annorum quinquaginta, natus piere hæmorrhoidario, & ipse à prima statim ætate  
sanguinis stillicidia, in variolarum quidem &  
morbillorum morbo è naribus, ac postea hæmo-  
ptysi obnoxius, quadragesimo anno coepit pri-  
mum poti hæmorrhoidalem fluxum, qui postea  
singulis fere mensibus, ac non nunquam sub for-  
tiori in itinere maxime corporis commotione,  
redit effusor. Quod quam sine finitatis deri-  
mento contingeret, tulit patienter; sed quam ali-  
quot abhinc annis insisteret profluvium diutius,  
idque largum, inde admodum fuit debilitans,  
& appetentia cum digestionis labefactata. Quæ-  
re ut auxilium quaereret fuit coactus ad mode-  
randum fluxum. Ex variis autem multisque re-  
mediis obtinuit nullum. Optimum tamen tulit  
animatorum tinctura, ex sale tartari & regulo anti-  
monii parata, & non tam acris, quam quæ cum  
nitro conditur, in cuius unguis saluta camphoræ  
drachma dimidia, & mane vesperique cum aque  
frigidaë haustu sumas ad guttas viginti.

## Epirisus.

Perperam utique putant præiudiciis toti in-  
herentes & præiudiciis toti in-  
concitare sanguinis æstusum organum eaque  
propter esse reformidandum, multo minus in  
immodicis sanguinis fluxionibus in usum trahen-  
dam. Alia enim omnino docet experientia, quæ  
camphora, quandoque etiam in maiori paullo  
dosi, ad scrupulum unum sumta, plus refrigerii  
sentit, quam incalcantia. Veteres sine non  
adeo alium fuerunt a camphoræ usu, sed eandem  
præstantissimarum medicinarum compositioni-  
bus commiscuerunt multis, ut quidem ex Augu-  
stina

flana potest pharmacopœa. Ne dicam, *Reveriam* & nos quoque eadem in inflammationibus, in malignis, magno cum emolumento in dosi non exigua fuisse usus. Atque etiam in nimis hæmorrhæis, roborans simul atque anodyna camphoræ virtus utilis est maxima, imprimis si aliis medicamentis sociatur & parva dosi exhibetur. Cum antimoni præfissum tinctura mixta camphora, diutius, neque minus diaphoresin augendo, ac imbecilles partes roborando, sanguinis & feri affluxum a recto intestino diverit aliorum, ac ob id exitum prodest.

## OBSERVATIO III.

*Hæmorrhoides nimis exacerbatæ sunt.*  
Virgo novem ac decem annos habens, venæ sectionem nunquam passâ, sed nimio mensium fluxui subinde rheoxia, cruentas experta est sedes, sine molestia tamen æque dolore, idque per dies aliquot. At cum gravi periretur iracundia, ingentem sanguinis puri ac sinceri alvo exclusit copiam, non sine summa virium lætura. Substitit tamen rursus effusus hoc profluvium, quin hausto frigido potu, fluxus restitit penitus. Sed inde ingentes incurrat præcordiorum anxietates & constrictiones, quasi convelleretur cor ipsum, *als wenn ihr der Herz abgehen wolle*, extrema facta frigida, facies rubicunda, venæ in capite inflatæ, aræritæ pulsant valide ac celeriter cum quadam duritie. Dana ipsi pulvis ex diaphoretico antimoni, cancorum lapideis, nigro & cinnabari, cum infuso summatum millefolii, data quoque simplici mixtura cum croco, & habuit melius.

## Epiris.

Forminas etiam hæmorrhoides pati, non novum est; neque etiam rarum, ita affectum fluxum earum reddere immoderatum; id vero non adeo obvium, solum frigidum haustum sub ipso fluxu tam gravia concitare posse pathemata. At frigus nervosus parulas spasmus jamjam affectis, ut fit sub iracundia, est inimicillimum, & intensiores spasmicas constrictiones augendo, tam gravia pathemata inducere valet ungue.

## OBSERVATIO IV.

*Nimis hæmorrhoides exacerbatae.*  
Præfectus milium quadragenarius major, natura sanguineus atque robustus, a multis jam annis expertus fuerat hæmorrhoidum fluxum cum euphonia. Sed quem a fuso vini Rhemani potu transiret ad vini Gallici Pontack potum, elapso aliquo mensium spatio, hæmorrhoides præter morem sunt retentæ, & successerunt dolores atrocissimi in lumbis & abdomine, cum virium dejectione, inappetentia, vigiliæ palluque celeri & frequenti. Exhibita vero ter laxante potione ex tamarindis, rhabarbato & pallulis minoribus, non modo soluta est alvus, sed & ingens nigri & congruanti sanguinis copia excreta, summo cum levamine. Diutius tamen quam par erat perduravit fluxus sanguinolentus; quo quia vires nimium attenuabantur, datum est electuarium ex roborantia conlecta, speciebus de hyacintho, succino, croco maris tenuis & granatorum syrupo, cujus usu ad hebdomadem continuato, ad sanitatem traductus est æger.

## Epiris.

Vina illa Gallica coloris saturate rubicundi, uni est Pontack atque Vin de Gray, si sine aqua & liberaliter bibuntur, propter adstrictiorem quam alio præstant, utilis fuit minime, sed experientia teste, admodum noxia. Unde omnibus etiam modis in periodicis & criticis sanguinis evacuationibus sunt vitanda, atque etiam in ipsis exacerbatibus hæmorrhagiis provide adhibenda. In omnibus autem hæmorrhoidalibus affectibus, si ve sanguis fuerit supprellus, si ve fluxerit immoderatus, præstantia non datur atque accommodatus purgans, quam quod nostro danum, quo diuturnum etiam fluxum, à copia feroci ac biliosi sanguinis oriundum, feliciter sanatum fuisse, ego vidi multoties.

## OBSERVATIO V.

Ante triginta circiter annos Secretarius Regiminis quinquagenarius, corpore spongiosus & carnosus, ob assiduos muneris labores vitæ sedentariæ deditus, ab aliquot jam annis anxius cardiacis doloribus & circa præcordia constrictionibus, noctu præsertim, subdite fuerat afflictus, alvique ordinario erat strictior, flatulentis ac ructibus obnoxius, dolores quoque lumbarem superius obidebant regionem, virum cum difficultate & sæpe arenosa procedente. Hinc calculum subesse realem judicavit & varia ad eum proposuerunt amici domestica remedia, inter quæ etiam fuit spiritus baccarum juniperi, cum earum rob probe subactis, saccharoque edulcoratis. Ab horum vero usu potius ingravescebant symptomata. Mox enim truculentis spasms & doloribus insularis circa hypochondria & abdomen torquabantur, cum partium externarum frigore & inquietudine, quæ emollientes & discutienti facultate pollentes chyliferæ etiam eludebant. Tandem accedente cum pulsuum celeritate internarum partium æstu, miscebant quidem dolores, remansit tamen inflatus abdomen, quod nec ædum minus tolerare poterat ob dolorem, inappetentia cum viribus, persistente per quatuor septimanas affectu, concidebant. Celeris nam Medicus vocatus, causam horum symptomatum hepatis judicans obstruccionem, pilulas Becherianæ & mercurii dulcis aliquot doses præbuit. Sed his omnibus irritis, præter omnem expectationem, alvi fluxus, sine terminibus tamen, feride corrupte ex atro-gryscæ materie erumpere, quem animi intercurrentis defectum cum extrema virium lætura tandemque mors excipiebat.

## Epiris.

Ex vitæ sedentaria cum arduis mentis laboribus, ob difficultiorem redundantiæ in venis mælaris regressum per hepatis hypochondriacæ pathemata, si ve spasmico-flatulentia, quæ calidiorum & sanguinem exagitantium immodico usu exacerbantur, accedere, non novum est. Hæc autem tempestiva venæ sectione corporisque motu de exercitatione omnino posse averi, experientia confirmat, quæ etiam in confecto est, dolores hypochondriacorum diutius perdurantes demum fluxu sanguinis per venas fedales corrupti hæmorrhoidali solvi salutariter. Noxavit id jam Soleusader, & memoratu digni ungue sunt ipsius de hoc observato verba, quæ *conf. VII. Sect. II. p. 121.*

121. sic habent: *Obseruimus hypochondriacos aliquos, quibus ista corporis regiones, & potissimum sinistram hypochondrium, multo nigro sucto, tanquam auro iure distincta ac repleta erant. Notum, quibus fundis ex iis locis humor supra infraque abscissi, quod licet cum periculo coniunctum esset, tamen euasisse plures scio, & honesto viro, Johanni Philippo Sledano, fratri, bis illud intra annum accidisse memini, & ante mensem huiusmodi & nobili matrona de Lutersdorff, istius atri sucti, & quod mirum est fere insipidi, & dextero hypochondrio, ad libras sex, vel septem, vomitu reiecit, sed hi plerumque a sepe moriuntur. Alia vero ratio & difficultas euadendi modus est, quando periculis & modis in hypochondriaci debentibus aliis lena febri jungitur, quae ab interna viscerum corruptione putrida depascens vires, nunquam non periculosa est.*

## OBSERVATIO VI.

*Esse haemorrhoides  
fuerunt  
deficiunt.*

Non ita pridem generosissima in comitatu Mansfeldensi formica vidua, quinquagesimum annum egressa me accivit, quae ob lautam & motus expertem vitam rationem, sanguine, succis & pinguedine plena, semel tamen tantum ab eo tempore quo menses profus cessauerunt admitti venae sectionem, & ante octo annos cum mensium fluxu simul apertas fluentes haemorrhoides passa fuit. Haec diu iam de lassitudine corporis & viribus languentibus conuessa, incidit circa equinoctium autumnale in gravem morbum soporosum, adeo ut excitari omni sensu penitus privata nullo modo ab eo poterit. Medicus hujus urbis famigeratus in auxilium vocatus, venam in pede secundam fudit, & postea porum fontane frigida praebuit sat largiter, ita ut singulis horis uncias aliquot caperet. Abscissis sic intra badium quinquae vel sex mensibus, post chylisrem flammulentem admissum, ingens sanguinis copia, primum crassa, postea tenuior, per alvum exiit, ita urina viginti quatuor horas, plus quam quinque mensurae profufluxerunt. Ex eo illico agra rediit ad se, sopor discussus, collectae sensim paulatimque vires, dantique anaesthetici leniter adstringentibus, injecto etiam chylisre ex pura aqua frigida, pauca tamen, confecto, bello convaluit.

## Epitaph.

In aqua communi pura fontana & pluviati, eaque frigida, sursum adversus plures & magnos morbos reposum esse praesidium, antiqui Medicorum Graecorum & Arabum satis agnovērunt; recentiorum vero plurimi, qui vulgaris & simpliciaspernere & exotica pretiola magna arte parata tantum in usum vocare solent, tam praestantissimum medicamentum, quae fere universalis est, si cautus & peritus Medicus ea uni scia, huc usque & neglexerunt & propemodum rejecerunt. Ego vero ante viginti jam annos scripti dissertationem de aqua medicata universali, nec non de simplicissimis dolori podagrico remedia & haud ita pridem de salubritate frigidi potus; quin propria experientia, & Medici, qui haec in curationibus suis aqua frigida utitur fere semper, convictus testor, quod potus aquae frigidae generosum & valde efficax sit remedium, quo nimia redundans & ebulliens sanguinis expansio, motibus vitalibus nunquam non adversa, efficaciter componitur, humores viscosi diluuntur & acres mordaces demulcentur, & quod praecipuum, ipso frigore,

partibus à tono & robore defectis, conveniens elastica systolica virus restituitur, adeo ut magnam roborata sit remedium. In nostra aegrotante valde plethorica, praemissa venae sectione in pede, potus aquae frigidae immodicam sanguinis ebullientis & vasa dilatantis, quae etiam causam morbi soporosi dedit, vim compellit, & robur systolicum adducendo ac firmando fibras, sanguinis ad venas antextimas majorem appulsus earumque aperturem concitavit. Quas sanguinis effusione, revulsio magna feri stagnantis à capite facta de tota symptomatum depulsa fuit syndrome. Ex quo intelligitur: aere etiam inductum, immoderatum alias & nimium haemorrhoidum fluxum, sub certis, quod bene notandum, circumstantiis, corporis & causae morbosae remedium saluberrimum quandoque esse posse.

## CAPUT V.

## De uteri haemorrhagia immoderata.

## THESES PATHOLOGICAE

## §. I.

Non omnis larga sanguinis per uterum fluxio, quae in foeminas sanguines subinde ob nimiam redundantiā accidet, ac si nimia & noxia esset, censenda, sed ea demum, quae virium imbecillitate stipatur, quam postea alicuius functionum laesiones conipicuae, ut inappetentia, cruditas ex mala digestionē, gravatius circa ventericuli regionem laesus, sordus faciei color, pallus languidus & frequens cum leno arthi, pedum oedematosis tumor, turbatus & minus reficiens somnus, insequuntur.

## §. II.

Haec nimia sanguinis ex utero effusio, ratione temporis quo impetu multum variae. Nimirum quandoque statim quo erumpere solent menses tempore, languis copiose & cum impetu effertur; quandoque extra illam lunarem periodum, bis vel pluries in mense, redit fluxus; quandoque ipsa menstrua purgatio solito diutius per complures dies liberaliter succedit. Quae etiam parturientibus & abortientibus haud raro accidet haemorrhagia, aliquando aetate, aliquando post abortum vel partum, erumpit.

## §. III.

Sanguis qui utero sic effunditur, tam ratione quantitatis, quam qualitate, item odoris, & coloris, à medico probe debet considerari. Interdum cum impetu exit tenuis & satis floridus sanguis, quem vulgo dicunt *das berr-Gebir*, idque frequentius in abortu, vel post eum, à reventis secundinarum frustis, quibus orificia vāborum aperta tenentur. Quandoque cum sanguine copioso coagulate & carnem referentes massae, ovi minoris magnitudine, excluduntur, quod fit, ubi uterina purgatio ad duos vel tres menses subleat. Non nunquam valde grumulosi, aere & coagulatus sanguis ruginatus erumpit, idque subinde primis puerperii diebus, in gracilioribus & sanguine plenis. In cachecticis siquē diutius jam duravit profluvium, sanguis effunditur aut valde aquosus & tenuis, aut mucidus. In scorbutica

*Haemorrhagia uteri  
quasi &  
gula.*

*Differt ratione  
temporis.*

*Quantitas  
& qualitas  
sanguinis.*



# De Uteri hæmorrhagia immoderata.

225

buticis corruptis, foetidus cum acrimonia & dolore. Frequentius etiam, præterit in junioribus, vel quæ nondum pepererunt, immoderatam sanguinis vacationem, fluor albus, five stillicidium materie mucidæ albicantis impuræ sequitur.

## §. IV.

*Causa sanguinis profluus per intervallum postum.*

Causa immoderate & roræ ejusmodi hæmorrhagiæ, in copiosiori & impetuosiore sanguinis ad uterum per arterias affluxu, & inæquali ac impedito per venas refluxu querenda. Hoc enim si contingat à sanguinis turbato motu, vasa uterina nimium distensa, aut relaxata, debilius tandem, vel disrumpuntur, aut eroduntur, ut sanguis liberaliter effluat.

## §. V.

*In partu.*

Sola sanguis pleniora adeo exuberat, ut non solum vasa uterina ducatur, sed & interdum plane disrumpat. Id vero his se accidit, quibus menses diu suppressi, postea confertim ac citatius erumpunt; nec non iis, quibus abortus, aut veri aut spurii foetus, quavis ex causa contingunt. A partu quoque laborioso evenit, vel difficili, quam scilicet vel grandior foetus, vel oblique situs, nimio conatu excludendus, sub quo vasa vel rumpuntur, vel nimis debiliunt.

## §. VI.

*Emenationes & sanguinis profluus.*

Ordinario fere contingit, feminas circa illud tempus, quo menses purgatio sua sponte definit, ante annum videlicet quinquagesimum, inordinatam durantiam admodum, neque omnia periculi expertem, ex utero sanguinis fluxionem pati, qua cessante, cessat etiam penitus dein per uterum sanguinis menstrualis excretio. Interdum etiam, quod aliquoties observavimus, accidit, feminas annosiores, sexagenarias circiter, subito & ex improviso, immensam cum malo odore sanguinis utero excernere copiam, quæ, juncta tandem febre lenta, inseritur.

## §. VII.

*Purpureæ sanguinis profluus, ut postea est signum.*

Immoderatus sanguinis ex utero profluus, eo tempore, quo incipit, vel per intervalla revertitur, ut plurimum procedit de comitante hac: tensio & inflatio hypochondriorum, circa lumbos dolor gravissimus & pressorius, quandoque cum sensu refrigerii junctus, extremitatum prædium refrigeratio, vasorum detumescencia, color faciei pallidus, pulsus citior, cum interior ardore, alvi strictura, urinæ parcius fluxus. Hæc omnia autem facia abundeque testantur, non à causa solum passiva, id est, nimia debilitate & laxitate uteri, sed ab activa etiam, spasmodica partium vasculorum & nervorum strictura, sanguinem ad uterum nimium urgentibus, hoc vitium proficiat. Unde etiam ratio repetenda, quod feminæ hypochondriacæ, hystericae, & quæ utericae sunt ad animi commotiones procliviores naturæ, hoc molesto malo frequentius afficiantur.

## §. VIII.

*Agonia in utero carnisque magis.*

Nil frequentius est, quam si in puerperio salutare negligitur regimen, neque in eo, neque post illud, uteris à foribus probe expurgatur, clauso à liquor mensem spatio, impetuosa hæmorrhagiæ cum animi sæpius deliquio subsequantur, quæ etiam per intervalla repetunt, & non prius desinunt, quam epæta foras una vel altera massa carnea, pugni interdum magnitudine, quam semel Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

la molam dicunt. Et hæc maxime procul dubio ex laciniis placente relictis, & succo nutritio in eis per calorem condensato, non secus ac calnes luxuriantes in faucibus paribus, gignuntur. Dum vero postea mole sua comprimit venas uteri, sanguinis circuitum per eas retardant & ad impetum ejusmodi hæmorrhagicos ac motus uteri spatio, quibus illæ concretiones carnosæ eliduntur, causam præbent sufficientem.

## §. IX.

Si corpus est cacochymicum, prævis succis plenum; si scorbutica, vel etiam ventris hæc infestum; ubi viscera non sunt integra, hepar, lien, aut vasa mesaraica sanguine crasso infarcta, non caret malum periculo, sed multum negotii medico facessit. Etenim sub ejusmodi fluxu, succorum lates & cachexia semper increvit; eo quod quo plus debilitantur vires, eo minus ventericulus bene appetit & digerit, eo magis crudis succis, qui difficultus in sanguinis boni & liquidi cerebri subflantiam transeunt, generantur, eoque minus de in per facta & congrua emunctoria fit recementorum excretio.

## §. X.

Vita valde periculatur in iis, quæ ante partum, foetu exsistente morbo, magnam sanguinis patitur profluus. Nisi enim extraordinario naturæ robore & præstantio medici auxilio fœtus excludatur, vel operatione chirurgica opportune extirpetur, mortem sequi certissimum est. Periculose etiam ex utero hæmorrhagiæ sunt, quæ ex rupeis ob secundinam cum violentia extractam vasa oriuntur, nec non quando frustula retenta, postea, in deformes massas, molas dictas, concrevunt, mensum fluxum scilicet vitiant & nimium reddunt.

## CURATIO.

### §. I.

In medicatione dextre adhibenda, omnino medicus ad variis generis causas & alias æque alias circumstantias de symptomata debet respicere, quo iis removendis idoneæ & efficacia conveniendi tempore opponere possit remedia. Igitur, ubi nimia sanguinis redundancia & quidem a retardato sanguinis mensurali confuso fluxu immoderatio hæmorrhagiæ causa est, non melius ac certius ad præservatiorem ejusmodi mali suppetit præsidium, quam venæ scissio, aliquot dies ante factum ordinari fluxum tempus, in paribus superioribus infusa, sufficientem sanguinis copiam, ad sex vel octo uncias, evacuando. Rectius adhuc, si uterine purgationis per aliquot menses suppeditio impetuosa hæmorrhagiæ causa est, tempestiva sanguinis missione in pede, hæc ipsa avertitur commodissime. Ubi vero jam multum sanguinis profluxit, ad ejus impetum divertendum & ad superiora loca revocandum, parcius quantitas est emittenda. Et certe quam præstans sit in venæ scissione præsidium adversus hunc morbum, conceptis verbis testatur Hollerius in comment. ad apbar. L. Hippocr. Sect. V. videmus, iniqua, quæ sanguine multa à vena detorta convalescunt, quam nulli aliis remediis fluxus sanguinis reprimi posse.

### §. II.

Quando nimis ebullientis sanguinis orgasmus fovet & augeat hoc malum, ob motum

*Periculi in partu utero.*

*Menses in partu utero.*

*Signum in partu utero.*

*Si in partu utero.*

*refrigeran-  
tia & di-  
luentia.*

intestinum parvum sulphurearum concitantiorem, diluentia, humectantia, refrigerantia auxilio sunt efficacissima. Atque inter hæc excellit quam maxime sola aqua frigida fontana, modo satis sit pura & subtilis, aut que melior adhuc pluvialis, probe conservata & putredinis experta, vel admixta nitri decenti quantitate alterata, vel cum spiritui viridoli & syrupo papaveris rhœodis in iulapii formam redacta, & sufficienti copia pota. Etenim simplex hæc medicina, & diluendo spissos humores, & acres contemperando, nimiumque æstus reslinguendo, fibras quoque relaxatas firmando, plus certe præstat, quam tantopere à medicis, alia varii generis ad hoc malum domandum laudata specifica. Non tamen postponenda virtus qua pollet hunc in finem serum lactis dulce, & acidulum, item chalybeatum, nec non aqua Selterana cum lacte asinino, præsertim ubi corpora sunt graciliora, teneriora & sensibilia indolis, & lento calore macerantur, item ubi scorbutica & exanthematica acris materia vitalibus succis immixta, graviorem hunc & difficiliorem reddit affectum.

## §. III.

*spasmi  
compensati  
per anodyna.*

Ubi spasmus & dolorum ferocia, quod subinde in puerperio, item post abortum, aque in hypochondriaca & hysterica passione affectis evenit, sanguinis profluvium ciet, confugiendum unque ad ea, que blanda & anodyna vi dolores & motus effrenos solidorum placam acque sedant. Hoc nomine liquorem nostrum anodynum mineralem cum pulvere nitroso simul sumum, pulvers antispasmodicos, qui ungulae alciæ, dentem hippopotami, lapidem manati, cornu cervi philologice præparatum, pulverein marchionis, nitrum, cinababrum, succinum, castoreum recipiunt; merito laudamus, quorum virtus eo fit efficacior, si unum vel alterum granum Ludovici, item massæ pilularum de cynoglossa addidit ipsi. Papaveracea quoque, anodynorum lenissima, ut folia papaveris rhœodis, in infuso theiformi cum summitatibus millefolii, & floribus chamomillæ vulgaris, aqua, syrupus, extractum papaveris, laudabilem, præsertim ubi simul humorum peccat acrimonia, opem locant.

## §. IV.

*Serum im-  
purum alio  
ad congruam  
quantitatem  
diluendum.*

Quia in hoc affectu frequenter copiosum & viscosum serum sanguinis se immiscet, opus est, ut ad alias vias id dirigatur & per congrua excretoria evacuetur. Perficitur id optime & efficaciter per blanda per epicrasin operantia laxantia, inter que manna, rhabarbaro, cassia & tamarindis nihil datur convenientius & præstantius, modo in convenienti & sufficienti quantitate exhibeantur. Nam manna tabulata, ad duas uncias cum drachma una cremoris tartari in infuso ex aqua florum acaciæ cum oleo citri præscribenda pro dosi, alias non sufficiens, & suis valida sit purgatio. Rhabarbarum optime miscetur cum passulis Corinthiacis in infuso, vel si cum his in syrupiformem massam redigitur. In paulo robustioribus pulvis mechoacanæ albæ, ad drachmam dimidiam, vel scrupulos duos, cum equali cremoris tartari parte permixtus, locum perquam commodum invenit. Divertenda vero etiam serosa illavies ad renale cribrum, quod præter serum lactis, vel aquam Selteranam, terra foliata tartari, solutio oculorum cancri, nitrum arseniosum, tinctura tartari cum spiritu ni-

tri dulci & spiritu tartari mixta, præstant efficaciter.

## §. V.

Impetu sanguinis nimis vehementer ad liphthymiam usque persistentem, confugiendum utique demum ad ea, que adstrictoria polent facilitate efficaci, cujus indolis sunt species de hyacintho, trochisci de carabe, hæmatis, bolus Armena, essentia terræ catechu, cum liquore anodyno & refracta dosi essentia anodynæ remixta, famigerantissima Sylvii mixtura, ad omnes immo-dicas sanguinis profusiones utilis. Externe vero in forma emplastris sterus faillum, aceto fori imbutum, regioni pubis applicatum, sistendi facultate gaudet haud proletraria. Vel concinnandum cataplasma ex foliis plantaginis & polygoti, floribus rosarum, balustionum, coquendum in aceto rosaceo & subfrigide appendendum. Nec minus præstans hoc nomine est efficacia emplastri spermatis ranarum, cum alumine, oleo hyocyami & camphora permixti, ac regioni lumbari admodum.

*de robell  
fucus aschi-  
sanda ad-  
stringentia  
interius.*

*Ex externe.*

## §. VI.

Quando fluxio jam per aliquod tempus con-quevit, præstivandi causa ad arcendum recidivam, præsertim si corpora sine serofiora, & cachexia jam adeit, aut imminet, robur non modo utero, sed & omnibus visceribus conciliare oportet. Id vero commodè & efficaciter præstari potest pilulis methodo Becherianæ paratis, aliquoties assumtis, item elixirio nostro balsamico viscerali, cum tinctura maris Z.wolfseri, vel etiam Ludovici, permixto. Laudem etiam meretur pulcula alterata cum succo plantaginis, cichorii, acetosæ. Potus sit aqua frigida, in qua aliquoties frustum chalybis candelaeti extindum. Aque quoque Selteranæ solæ per plura dies epotæ, laudabilem præstabunt opem. Contra ea fugienda vina, carnum, ovorumque eûs & omnia ea, que sanguinem nimium adaugent & exagitant.

*ad præser-  
vationem  
robis aff-  
ectibus  
resolven-  
dum.*

## §. VII.

Quia vero experientia multiplici testante, quam maxime abortio & puerperium ad enormes hæmorrhagias, præsertim si uterus postea non bene purgatus fuit, dispoñere solent; providendum utique omni cura erit, in puerperio, vel etiam post illud, ut ipse sanguis mundificetur. Cui scopo obtinendo felicitè & efficaciter omnino pilule Becherianæ, & que ad eam imitationem paratæ sunt ex extractis amaris, temperatis resinosis-gummanibus, extracto rhabarbari & refracta aloes gummosæ dosi, concinnatæ inserviunt, si non modo dubius aut tribus diebus post partum per aliquot dies sumantur, sed & medio puerperii tempore, simili modo per tres aut quatuor dies ipsarum usus continetur. Vel pilularum loco infusum ex aqua mellissæ, vino, rhabarbaro, herba mellissæ, rosamarinis, radice pimpinellæ, agarico, passulis minoribus, corticibus aurantiorum & citri per aliquot dies hauriendum. Quibus remediis id efficiatur, ut uterus ejusque vasa ab omni succorum viscosorum illavie, atque etiam lacinis, que ex retenta secundina remanent & rudimentum molarum carnearum præbere possunt, expurgetur ac liberetur.

*de utero  
post puer-  
perium.*

CAUTELE ET OBSERVATIONES  
CLINICÆ

## §. I.

Pina fo-  
dracis mi-  
nuta et  
cautela.

Ad perficiendum aque ac protelandum hoc malum, possimum prudentia medicæ momen-  
tum in eo repositum, ut pro differtente cor-  
porum & causarum ratione, mensura, modus ac  
tempus, sciendi è vena sanguinis, rite perspi-  
ciatur & observetur. Sciènt quæ habitioris sunt  
corporis & à sola sanguinis abundantia sæpe cum  
immani hæmorrhagia abortiunt; illæ sola lubra-  
tione sanguinis, tempore in brachio celebra-  
ta, vel etiam si res postulat repetita, ab incurfu  
hujus morbi possunt vindicari. Contra ea ubi  
viribus jam valde exhaustis, nimia sanguinis co-  
pia profusa, præstat à venæ sectione abstinere.  
Tum vero è re est, brachium utrumque repide  
aque, cui quippiam vini admixtum, per horæ di-  
midium immittere, quo sanguinis impetus ad ex-  
teriora divertatur. Idque remedium longe effi-  
cacius est ac utilis ipsi cucurbitis ad mammas  
applicatis, quas tamen Hippocrati passim in  
scriptis suis in ejusmodi casibus magnopere com-  
mendat.

## §. II.

Alvum sol-  
ventia an-  
ticipia.

Si diutius hoc malo colluctantur feminae, si-  
ve sint biliosæ, five phlegmaticæ sanguineæ con-  
stitutionis, rarius feliciter sine alvum solventibus  
remediis sanantur. Sunt autem inter hæc optima  
rhubarbina, rhubarbarum cum cremore tartari,  
aut si multum ferose colluvie evacuan-  
dum est, cum serena parte mechaconne albae  
acuanum. Utiles quoque pilule temperate bal-  
samice, secundum exemplar Bechorii, refracta  
bene præparatæ alois dosi concinnatæ, vel loco  
harum alexiphurgæ, vel de succino Cratois,  
quarum virtus interpositis nitrolo-salinis pulveribus  
unique exaltatur.

## §. III.

Quando  
que emetis  
in istis.

In tenerioribus biliosis & cachecticis leniora  
emetica, cujus generis est radix ipecacuanhæ, sin-  
gulis mensibus ad arcendum malum exhibita, non  
male cessisse novi, à qua methodo ipse Hippocra-  
tes & Rerius quoque non alieni. Prima enim  
regio, ob dependiam digestionem, haud infre-  
quenter mulcorum chronicorum uteri affectuum  
causam & fontem fovet ac præbet eaque prop-  
ter ut efficaciter depleatur expedit.

## §. IV.

Adstrin-  
gentia et  
anodyna  
cum dan-  
da.

Validiora adstringentia cause & provide ad-  
modum adhibere oportet, quod etiam de narcotico  
tenendum, quæ neque in principio, neque  
etiam ubi vires à nimia sanguinis profusione pe-  
nitus jam exhaustæ, imminente fere semper aui-  
ma deliquo, conducunt. Quin vidi sæpius, ab  
adstringentibus fluxum exacerbatum fuisse; vidi  
quoque non nullas, ab immoderatiore horum usu  
in immanes & graves chronicas passiones, ca-  
chexiam, hydropem, lentam & hecticam febrem,  
perpetuam lymphæ ac utero stillicidium, cum in-  
tumescentia & tumore duro circa dextram laam  
inguinalis regionis, fuisse præcipitatas.

## §. V.

Atrium  
Hæmorrhoidi  
pulvis.

Pulvis Hæmorrhoidi cujus descriptionem in com-  
mentario ad aphorismos Hippocratis Lib. V. a  
Frid. Hoffmanni Opt. Tom. II.

phorismo. L. exhibet, & quem maximo cum suc-  
cessu semper in immoderatiore uteri fluxu re ad-  
hibuisse refert, non commemorandi est. Compositio  
autem ista habet: accipe feminis hyocyami  
papaveris albi ana drachmam unam, hæmatidis,  
coralliorum rubrorum ana drachmam finiss,  
camphoræ scrupulum dimidium M. de quo in-  
ne & vesperti dimidia drachma pro dosi sumenda.  
Not quoque ab ejus usu olim laudabilem effec-  
tum vidimus, sed convenit eum exsolvere, ubi  
omnis in æstuoso sunt motu, arteriarum pulsus ce-  
leri & vehementi, cum assidua vigilia, atque tum  
etiam securus, cum ipsi additur ritum ad dimi-  
diam drachmam; minime vero ubi vix cum  
sanguine exhaustæ sunt, & pulsus vix digito tangi  
potest. Nam a feminis hyocyami usu paulo lar-  
giori, in dementiam conjetas fuisse quidam per-  
sonas novimus. Idem motuum etiam tenendum  
de pulvis de cynoglossa, quæ pariter subiectum ist  
exhibitione desideratæ judicium præsticim.

## §. VI.

Quando à viscerum obstructione chronicum  
malum fovetur, cura sine legitimo aquarum mi-  
neralium, vel acidularum, vel thermiarum tem-  
peratiorum usu, rarius ex voto succedit. Expedit  
vero medicamentis temperate balsamicis hæc cu-  
ram secundare, & exterius quoque ad roboranda  
viscera ipsumque debilitatum uterum, sicut fluxu,  
balneo aquarum subdiligenti vinctu gau-  
dendum, cujus indolis sunt notæ à Lauscha di-  
ctæ, uti.

## §. VII.

Mulum inzeret, quo potius genere utamur il-  
le, quæ ejusmodi introductis sanguinis fluxionibus  
inacerrant. Neutiquam enim ventriculus,  
in hoc affectu valde imbecillus, omnia aque bene  
ferre potest. Inprimis abstinendum ab omni cere-  
visia, a potu quoque vinolo, ac potius in usum  
vocanda decocta, ex ratiura ligni fantali rubri,  
citrii, radice cichorii, semine feniculi & palli-  
lis, parata. Quibaldam totas pona aque fortissimè  
frigida, alteras quodammodo in rupe acutissimè  
cieri, vel tantillo niri inserto, optime celat.  
Ludovici Septimus Lib. VII. auctorit. ref.  
dicat. art. CXLIV. decoctum cornum au-  
rantiorum, mane ad octo vel novem uncias po-  
tum, tanquam remedium certissimum de prædi-  
cat, eoque fere à finem mulierum numerum ab  
hoc morbo se liberasse alieverat, sed uti secrete  
id servavit. Recepit autem aquæ huius septem,  
in hac incosid cortices trium pomorum aurantio-  
rum, aliquando adhuc viridum, interdum etiam  
addit in fine aliquod herbe pilosellæ.

## §. VIII.

Ut in omni præternaturali hæmorrhagia, ita  
etiam in hac ipsa, ventriculi & exacta vivend-  
ratio maxime habenda est. Ub vires enim cum  
sanguine perditas, ventriculus nec bene appetit,  
nec decem digerit, nec recte cernit, sed  
crudum & stagnam corpiæ turgit ut plurimum  
venter. Optimus est cibus siccus, modicus &  
salubris; minime gelatinosus, diffusioris solutio-  
nis & qui inflat. Potioribus, si fuerint aquo-  
se, subinde medicum visum optima thensum, vel  
genuini vini Pontack, admiscendum est. Ac uti  
nimium frigida, ita etiam immoderatus æstus ab eis  
nocet. Neque admittenda est nimia corporis  
quies, neque nimia ejus exercitatio, viciaria  
vis sit parcissima. Demum si quando affectus

animi praesentaneum damnum inferunt, certissime id contingit in sanguine exhaustis corporibus.

## § IX.

*Quamvis  
morbum.*

Mulum tandem refert, ut quae extreme immodica sanguinis fluxionibus debilitatae, sedato fluxu, convenienti diæta pristinam sensim recuperent sanitatem. Nam si sepe cibus se replet, quos imbecilla ventriculi non satis digerere potest, facile incurrit ob cruditates in alias chronicas passiones. Nimirum ut effato Hippocratis impura corpora nutriendibus laeduntur: ita etiam valde debilitata. Habenda igitur est quam maxime ventriculi ratio, & analeptica ac nutriendis cibus quidem restaurandae sunt vires, sed parca manu obsistantur necesse est.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Hæmorrhagia uteri  
cum sale  
sua le-  
vitate.*

Vidua hujus loci honesta, jam septuagenaria, extenuari corporis, sedentariae vite multum addicta, post quinquagesimum annum cessante ex toto mēstrua purgatione, afflucta fuit singulis annis circa æquinoctia sanguinis rāssioni, post annum autem sexagesimum ex mulcularum consilio eam omisit. Unde intra sexagesimi & septuagesimi anni spatium aliquoties pæthematicis spāmodico-flatulentis, namentibus quoque venia hæmorrhoidalibus externis, interdum etiam sanguinis mictione, tentata fuit. Medicus salutaris consilio fuisse venæ sectionem crebrius repetendam, sed ipsa hujus moniti negligenter, incidit tandem in ingentem animi mororem eumque diurniorem, ac paulo post ex improvviso immo- dicit sanguis per uterum effluxit, & frustra datis optimis analepticis & roborantibus, per menses ab eo & longius continuavit. Tandem cum intolerabili fœtore profluxit ex pudendis cruor, lenta successit febris & summa virium dejectio, donec placide obiret misera.

## Epicrisis.

Neque ab immoderata uteri hæmorrhagia velut iturmes, si plethorice sunt & sanguinis rāssionem negligunt. Quin si cum vita sedentaria animi moror pungitur, quam facile abundante sanguine & in viceribus abdominis, præsertim utero, stagnante, sphacelosa corruptio facere potest, quam fœtor subinde indicat, qui intolerabilis fit, maxime quando hæc corruptio ad ipsum innesinum rectum penetrat. De fortissimo uteri profluvio historiam quoque refert *Hæmorrhagia in utero ad apertis. Hippocras.* & quidem 56. Sect. V. vidi inquit, nobilem matronam, quæ profluvio uteri extabula & tanto fœtore effundebatur, ut nullus non existimeret alio venire. Sed hic fœtor longe alium superabat. Existimo totum ejus uterum, in terrærum solum eliquatum, una effusum fuisse. Longuebat hæc morbus in modum, ac quasi lethargo stupebat mente, lente obire intolerabilis fœtoris, ego sane nil facidius unquam affeci.

## OBSERVATIO II.

*Hæmorrhagia uteri  
post. Supra.  
et fœtore.*

Illustris stemmatis femina, floride formæ, sanguine & succis plena, vigesimo octavo ætatis anno tertium jam mensem gravida, ex uteri sinu

sanguinem per duas hebdomades exigua quidem quantitate profusere sensit, vebementioris vero sultationis motu itox in talem incidit hæmorrhagiam, ut universus propemodum sanguis, usque ad mēstruas sex, vel septem, floridus & fluidus, intra aliquot horas, & corpore promanasse visus fuerit, intercurrentibus fœtide animi deliquis. Nihil auxilii tam intra quam extra ad cohibendum tantum sanguinis impetum præternitium fuit, sed frustra effecta. In tanto inque vitæ periculo constans ego fui ad anceps & extremum confugere auxilium, linteum scilicet apte conortum & probe solutione capitis morui vitrioli imbutum, quod in uteri sinum quousque penetrari posuit, intrudi curavi. Hoc non multo post subsistit fluxus, & exhibitis analepticis medicamentis & alimentis erectus quodammodo animus cum viribus. Tertia die post, tentata est extractio linteæ, quæ non fuit sine difficultate, quia illud plane exiitum & siccarum erat, ipsique superne congruam, niger, aridus sanguis adhærescebat. Factum hinc est, ut, quum secēssum pateret agra, frustum massæ carnee ex utero simul, cum aliqua sanguinis fluidi portione prolaberetur. Quo excludo, quum nihil amplius exiret, postea per commodam diætā & medicamentis, ventriculi digestionem ac vires restaurantia, generosa hæc femina successively convaleuit.

## Epicrisis.

Non novum est, ab incoercibili sanguinis ex utero profusione in partu laborioso, ut abortu etiam, in lethalem syncope incidere posse feminas. Sub tanto autem moris periculo, anceps etiam remedium experiri non inconsumulum est. Et licet tale stipicium uteri internis paribus applicare nunquam antea observatum vel visum fuerit; tamen hæc observatio docet, stipicium etiam internis uteri paribus non adeo esse iamica, si quidem post hæc formā gratiosa admodum & concepit & peperit scilicet.

## OBSERVATIO III.

Judæi uxor annorum sexaginta tenerioris & mobilioris naturæ multorum liberorum mater, quum tertio jam mense crederetur gravida, citra ullam manifestam occasionem copiose sanguinem ex uteri sinu prorumpere sensit, exclusa simul non ita multo post massā carnea pugni magnitudine. Hoc facto nihilo minus permansit fluxio puri & etiam fibrosi sanguinis cum virium insigni decremento; quin quum gravi terrore percelleretur, mox continua ad lipothymiam ingruit proclivitas, cor palpitavit, & tremuit cum magna præcordiorum anxiestate spirando angustia, extrema friguerunt, & quandoque, ut in epilepsia fit, sub animi deliquio, pollices cum reliquis digitis fortiter contracti fuerunt. Atque hæc omnia sub suavi quodam oblato odore, graviora, remissiora vero sub graveolenti adhibito remedio fuerunt. Quum itaque omnia desperata adlansum videretur, ut consilium vocans ego, bono animo ipsos esse iussi, ac remotis aliis medicamentis, clysterem injici curavi carminativum, postea ad violentas systemas nervosi illas commotiones sedandas præscripsi pilulas, quæ extractum storac chamomillæ, millefolii, crocum, castoreum, camphoram & asum scordium habuerunt, quarum singulis tribus horis numero V.

*Hæmorrhagia  
uteri  
post. Supra.  
et fœtore.*

vel VI. deglutire fuerunt. Quibus ægrotæ successively sanata sunt.

*Epirisus.*

Uti vehemens animi commotiones in plethorica magna, ita in sanguinis defectu longe majora damna procreare possunt, potissimum pathemata spasmodica convulsiva & quæ vulgo in feminis appellari solent hysterica, quibus frequentius puerperæ post lochia infestari solent. Terror vero, si ullus ex animi affectibus, in immodicis hæmorrhagiis perniciosissimus. Nam si sit quidem ipsa, sed postea graviora concitat mala. Imprudentiæ hinc effert, denovo sanguinis millionem tentare. Nihil potius a prudenti medico aliud agendum, quam ut antispasmodicis convenientibus motus huius intensiores nervorum parium componat, & per diaphoretica & analeptica sanguinis liberum cursum, per extima etiam corporis, promoveat.

OBSERVATIO IV.

Fœmina quinquaginta trium ætatum, temperamenti cholero-melancholici, in animi commotiones valde prena, ante annum & dimidium incidit in immodicam sanguinis ab utero fluxionem, quæ die nocteque integrum per annum duravit, & subinde parciat, quandoque vero tam larga fuit, ut cyathos aliquot compleret. Inde maxima animi ad lipothymiam ulque, nec non virium & appetentia defectio sequuta est, incurrerunt sæpius, mox singulis, mox tertio die, cum horrore præcedente, febricula. Varia frustranea evenit opposita fuerunt remedia, tandem vero martialium usu cohibita fuit hæc sanguinis profusio, sed in eam locum fluxus albus succellit, cum tumore pedum oedematoso, spiranti difficultate, & subinde parciat, quandoque vero tam larga fuit, ut cyathos aliquot compleret. Inde maxima animi ad lipothymiam ulque, nec non virium & appetentia defectio sequuta est, incurrerunt sæpius, mox singulis, mox tertio die, cum horrore præcedente, febricula. Varia frustranea evenit opposita fuerunt remedia, tandem vero martialium usu cohibita fuit hæc sanguinis profusio, sed in eam locum fluxus albus succellit, cum tumore pedum oedematoso, spiranti difficultate, & subinde parciat, quandoque vero tam larga fuit, ut cyathos aliquot compleret. Inde maxima animi ad lipothymiam ulque, nec non virium & appetentia defectio sequuta est, incurrerunt sæpius, mox singulis, mox tertio die, cum horrore præcedente, febricula.

*Epirisus.*

In hac historia venit illud notatu perquam dignum, quod post illud tempus, quo alias ordinatio cessat menstrua purgatio, excessiva adhuc tandem prodierit ab utero fluxus; id quod ex parte iracundæ animi affectioni ascribendum. Quoniam autem hic morbus ingentem ætatem viscerum abdominis, præsertim uteri, habuit pro fundamento, ad eam expugnandam & totum refinuendum, præter amara atque inermem effentiam, quæ simul diaphoreticæ & diuresi movet, nec non sufficiens, ad sistendum album fluxum nihil unquam inveni præfens, & hinc quoque in nostra felici & saluberrima fuerunt effectus.

OBSERVATIO V.

Illustris fœmina, constitutionis tenerioris, triginta & aliquot annorum, inordinatum mentium sæpius experta fuit fluxum, ita, ut ad duos & plures menses retineretur & postea impetuosis

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. 11.*

sanguis, primo grumulosus, dein tenuis, magna copia profunderetur. Tum quidem remediis convenientibus beneficio malum depulsum, sed sequentibus annis, mensibus præsertim hyemalibus, Januario & Febuario, suppressio tribus lunaris in tertium mensem rursus accessit, ac postea fluxus effusissimus rediit, excurrentibus simul frustis duris fortensibus, cum magna portione aque. Tertio anno species morbi prodit, dura nempe carnea massa, pellicula alba cincta, multæ cellulis repleta cum excessiva sanguinis profusione, quam magna virium lætura, inappetentia, ventriculi imbecillitas, nausea, præcordiorum anxietas, dolor dorsi & artuum, cum paucis somno sequuta. Quare ego in consilium aditus, hac medicationis methodo, divina favente gratia, ægram à molestissimo hoc affectu liberavi & integre restitui, ita, ut gravida aliquando facta, singulis binis mensibus misso à brachio sanguine, feliciter liberos sanos pepererit. Methodus vero curationis, quæ tribus vicibus adhibita, in eo consistebat: per tres dies circa finem tempus deglutire fuerunt pilule balsamicæ nostræ, ad quarum operationem promovendam mane post sumit drachmam pulveris salini, ex tartaro vitriolo, lapidibus calcnorum, citro, sale Elishamensi, æquali pondere permixtorum, post quinque dies descendit mane in balneum, paratum ex aqua pluviali, in qua infusa herba mentha, melissa, origani, horromi, salvia, flores spicæ, adjecta convenienti quantitate aluminis & cinerum clavellatorum.

*Epirisus.*

Minum forsitan cuiuspiam videri poterit, quod inter casus nimia hæmorrhagia uteri laborantium etiam abortus recensuerimus; verum cum hi ipsi non aliter fieri possint, nisi præcedente ex utero hæmorrhagia, etque præternaturali, unque curant incubit, convenienti methodo, & secum in utero servare saluum, & fœminam à gravibus & fonticis pathematis, quæ à nimia sanguinis profusione, seu causa, oriuntur, vindicare. Quæ omnia melius præstari nequeunt, quam methodo jamjam à nobis propolita. Potissimum balnea de infusis ex convenientibus remediis parata, in diuturnis uteri morbis & vicis corrigendis, si ullum aliud, plurimum valent. Et sic multæ ad fœtum vivacem edendum inhabiles ac sæpe abortientes, ad gestationem, parum & gratia matrimonii pignora idoneæ redditæ fuerunt.

OBSERVATIO VI.

Generosa fœmina quadraginta & aliquot annorum, fluxibus ex utero immodicis sæpius laboravit, tandem à vehementi terrore in immanem hæmorrhagiam incidit, ad quam sistendam, Medicus venæ in brachio sectionem, pilulas Struthianas, pulverem antispasmodicum, neque minus effentiam millefolii, tincturam maris Sydoniæ, massam pilularum de cynoglossa, sed omnia incassum, adhibuit. Eruperunt potius frusta sanguinis congruati cum ferore, cui thalo mixturæ ana-leptici, item tinctura maris cydoniæ cum arcano tartari maritata, & ad alvum pertinaciter confectam, magnesia alba frustra obviavit, & icrura rursus venæ sectione in brachio, sanguis serosus lixiviosus liquoris, profudit. Diutius itaque periclitante hoc fluxu, mirum non modo vires languiscebant, sed & lipothymia, capitis

*Hæmorrhagia uteri immodica, antispasmodica & diaphoretica mixtura jamjam.*

*Hæmorrhagia uteri immodica, antispasmodica & diaphoretica mixtura jamjam.*

*Hæmorrhagia uteri immodica, antispasmodica & diaphoretica mixtura jamjam.*

V 3 dolo-

dolores, yerrogo & aurium tinnitus accedebant. Unde ego in auxilium vocatus, sequentem dare iussi mixturam: Recipe aque florum sambuci, nixæ, liliorum convallium, mellisæ, ana unciam unam semis, theriacalis, cinnamomi sine vino ana unciam semis, aceti destillati unciam, lapidum cancerorum drachmas duas, antimoniij diaphoretici drachnam, spiritus nitri dulcis purus XXX. syrapi acetosissimi citri drachmas sex, M. D. de qua quotidie bis vel ter, duo cochlearia sumere præcepi. Ad regionem pubis vero epithema ex herbis menthar, mellisæ, rorismarinæ, organij, floribus rosarum rubrarum, & cortice chalcidillæ, cum vino rubro, Pontack, coctum tepide applicate, manusque sæpius de die in aquam tepidam cum vino rubro mixtam, insinere iussi, pro potu suavi decoctum fennicæ, lentici & radicis cichorei. Quibus dextre adhibitis remedijs, hæmorrhagia uteri cum omnibus symptomatibus cessit, & generosa pueri, recuperatis sensim viribus, optime convalescit.

#### Episcifa.

Nimis frequens & repetita uterina hæmorrhagia ingentem uteri ejusque vasorum atoniam subindicat, ad quam removendam, Medicus maxime apta remedia porrigere debet. Huic vero scopo obtinendo, neque adstringentia, neque anodyna, neque nitrofa, aut sola refrigerantia interne sumus, respondent, sed applicanda etiam ad confirmandum harum partium robur externa idonea remedia. Præterea mixturæ anæstheticæ & diaphoreticæ, cum conveniente regimine calido, ad transpirationem, si malum urget, & alia, speciatissime alias virtutis remedia respicit, augendam, diveriendo non modo sanguinis impetum, sed & acrimoniam, quæ sæpius subest, demulcendo, insigni emolumento sunt.

#### OBSERVATIO VII.

*Hæmorrhagia uterina destillat in foetum.*

Ediderat feliciter partu gemellos femina fere trigentaria, sed reterens paulo diutius secundinis, extractionem earundem mollis est obstetrix. Quod quum non sine violentia perficeret, remanserunt frustula non nulla, & sequens tam immodicus lochiorum fluxus, ut aliquoties animi deliquium incurreret puerpera. Quin ex eo per dimidium anni stillicidium profusse ex pudendis sanguinolentum, plane refractarium & fere perpetuum, vix quandoque ad aliquot dies inducias concedens. Bis etiam interea simul excreta massa ovi gallinacæ minaris magnitudinem referens, cucula obducta pæsulida & ionis habens liquorum spississimum turbidum atque foetentem. Perfine ea propter habuit misera, appetitus perit, vires conciderunt, caro contabuit & vix corpus movendi superstit potestas. Tandem haud ita pridem a me salutare petiit consilium, qui ipsi basii usum piskularum Becherianarum, cum equali portione extracti rhabbari & aliquot granis pulveris antimoniij martialis sic dicti cachectici, mixturam, & externis pubis regionij adnovere, ac si fieri posset, ipsum in uterum injicere iussi, decoctum mellisæ, menthæ, caryophyllorum, mastiches, florum rosarum rubrarum & balsationum, ex vino Gallico, quod vocant Pontack. Quia methodo quibusque prædictis plures sanitati reditas fuisse novi.

#### Episcifa.

De infelici extractionis secundinarum cum vi

quadam factæ successu, plures in artis exercitio notavimus observationes. Nam si quando distillans in frusta secundo partu edenda, & ex his non nulla remanent, in corruptionem ipsa abeunt, & colligata ichorosis faciunt fluxum, simul lentum quandam accendunt calorem, vires mirifice deprimunt. Quandoque præpostero hoc molimine enormis inducitur hæmorrhagia, cum omnimoda fere virium jactura, quin ipsæ vix periculo. Non nunquam etiam ex relicta frustula succrescunt postea concrementa fungosa, ex membranis in variam formam & magnitudinem contexta, quæ molas dicunt spurias, continuo materie sanguinolentæ ferocis forside stillicidii stipata. Frustræ autem, teste experientia multiplici, pugnatur contra hæc mala internis solis, ac potius locis affectis ipsique utero, nimis partim laxato ac debili, partim læso & evulserato, admovenda injectiones, aut epithematis forma, ea, quæ roborant ac putredini resistunt. Interna enim salva sua textura eo pervadere & vitium tollere nequeunt; sed quæ immediate labe affectas partes tangunt operationis sunt & celestioris, & melioris. Unde longe profecto opportunius & efficacius succurri possit gravibus & diuturnis in utero morbis, qui haud raro post partum accidunt, si tam libenter admoveantur injectiones ejusmodi de topica uterina, quam quidem veteribus pessus admoveere moris fuit.

#### OBSERVATIO VIII.

Adit Carolinas thermas femina viginij quatuor annos habens, sanguinea, ipsidemque ad hysteriam, quæ detinebatur, passim demebellandam ex medici consilio usa est. Sed ipsum inter usum, minus forsitan dextrum, experta est inordinatum copiosum sanguinis ex utero fluxum & postea ad aliquot interduum hebdomades durantum. Inde virium debilitatem, appetitus defectum & languorem cum lurido faciei colore incurrit. Medicum igitur vocavit in consilium, qui pulverem Heurnij sanguinis profluvium composuit quidem, at ingens postea præcordiorum anxietas cum cardialgia infestavit, ipsam suffocationem minitans. Unde ad hæc mala depulsiunda multis variisque usæ est remedia, quorum tamen nullum effectum edidit speratum. Summis quoque ex alius medici suavis emeticum, quo multum viscidæ ac viridescens materie exturbatum, & non nihil levaminis allatum. Nihil fecius sanguis paulo post largius proflavit & agram ut de malo funditus exstirpando esset sollicita cogit, id quod etiam fortunante DEO præstitum est his; pulvis nempe nostris balsamicis, quotidie ad aliquot grana, interposito pulvere ex antimoniio martiali cachectico, nitro antimoniato & depurato, assumptis, usurpata subinde tinctura maris Z welfersi & poto cerevisiæ loco decocto ex radicibus & lignis temperato.

#### Episcifa.

Mineralium aquarum usum non minus nimium fluentibus, quam suppreßis ex utero fluxibus, opulatur; sed prudenem & peritum desiderat medicum. Nam morbus uterque, in æternas præterit, ab obstructione & factu vasorum uteri ducit haud raro nates, ea tantum cum differentia, quod in nimio profluvio obstaculum liberi progressus sit in vasis majoribus venosis, in deli-

deficiente vero in vasis minoribus, maxime arteriis. Minerali autem aquæ unque impediuntur hoc tollere valent, eaque propter præstant utrumque. Id vero tenendum: utendum esse iisdem non ipso sub fluxu, sed extra eum, ad arcentum recursum. Si scilicet sit, augeatur uteri laxitas, augeatur affluxus. Tum porus per balsamica roborantia interiori & exteriori utero remissio robore reddere, ac postea, ne repetat profluvium, minerales aquas ad eluendos meatus eisdemque servandos apertos, in usum vocare convenit.

## OBSERVATIO IX.

Illustriissimi Censilarii uxor, quæ quadragesimum jam compleverat annum, habens valde teneri ac gracili, ætatisque admodum mobilis & sensus exquisitissimi, aliquot abhinc annis per semestris fere ipsorum diuturno & fere assiduo ex utero fluore alterante cruento laboravit. Hinc primum medicis loci usum, ac eorum medicatione effectum sensit nullum. Unde consultit se ad virum quandam celeberrimum, qui brevi felicem ac certam operi spondens, pilulas suas ipsi commendavit, ut de his quavis hebdomade ter vel quater sumeret, aliquamdiu. Sed inde etiam vix quicquam levaminis est experita. Denique merum petiit consilium, quo posuit Scleritarum per mentem & ultra in cura cum debito regimine, interpositis interdum laxante, fusi. Quod priusquam faceret, B. D. Brueneri iudicium exquiri, qui meo pariter calculum adjecit consilio. Unde tanto majori fiducia ad usum huius præsidii accessit; atque etiam ex eo tam salutarem percepit effectum, ut hæmorrhagia sensim remitteret, penitus tandem cessaret, ac ipsa ad pristinum perfectam sanitatem rediret.

## EPISTOLA.

Concinne illæ ad mentem & methodum Becherianam balsamicæ pilule unque in affectibus ex utero, præsertim in ictericis, item puerperii tempore, debita sua non de fraudanda sunt laude. Sed quod medicus pro lubina iisdem & inordinatas ac nimias hæmorrhagias moderari ac sistere, & vicilim incutere, si supprestæ sunt, revocare possit, id non sine ratione iuxta tabellas reponendum. In nostra certe id docuit eventus. Fors autem Scleritarum acres & tenues humores diluendo & temperando, eoque per diuresin efficaciter evacuando, sicque causam spasmodicæ hæmorrhagiæ auctores succincentem tollendo, non potius non prodesset egregie.

Confer quoque eos casus, qui Sect. III. CX. & CXI. item CXXVI. legi possunt.

## CAPUT VI.

## De Hæmorrhagia ex urinaris viis.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

VENIT hæc hæmorrhagia in scholis plerumque mictus cruenti nomine, & est sanguinis per urinaris vias, cum, vel sine urina, sive ex renum, sive vesicæ vasis, nimium ampliatæ, ruptis, aut atrofis, emissio, pro circumstantiarum ratione plus vel minus periculi habens.

## §. II.

Haud raro accidit, ut medici in dignoscendo: utrum sanguis cum urina mictus sit, nec ne? eximie fallantur. Si quidem majori in copia, ut interdum contingat, ad libram & ultra, sanguis sincerus cum urina mictus, vel pars aliqua cruentis sine urinae consubio, prodiit per urinarium meatus, res nullo eger discrimine. Si vero cruentæ fuerit admixtus parcius, tunc paulo curatori opus est scrupulo. Sæpe enim mingitur lotium coloris sanguinei, sæpe etiam deponit sedimentum non aliter ac sanguis solet, nullo tamen præfente sanguine. Sæpius vicissim bruni, vel nigrescentis coloris urina emittitur, ut nulli suspicio sanguinis, qui tamen mixtus est, in sensus & mentem incurrat. Quare suggerenda unque sunt certa indicia, è quibus hoc tam multiplex discrimen perspicendum. Scilicet si rubedo urinae sanguinis æmula a particulis sulphureis, mixtura salium, præsertim alcalinarum indolis, & extraneis, proficiatur, tunc quam primum emissæ fuit, clara & perspicua apparet, sedimentum vero incrustati & cinnabarinæ coloris est; quod tamen, sufficienti calore admoto, mox in supernatantem liquorem se recipit, ut clara rursus & perspicua ut antea appareat. Contra vero quum urina rubet a sanguine, tunc opaca & crassiuscula sine perspicuitate mingitur, sedimentum vero est granulosum, ex rubro nigricans, idque non dissolvitur, aut rursus ab urina absorbetur. Si etiam lotii rubedo est a sanguine, lineum per quod colatur, nigre rubore, quod non fit, quando est a salibus color tantum intensus.

## §. III.

Quia plures urinae stercorandæ & excrementæ servantur viæ; scire refert discrimen: unde prolixius mictus reddens sanguis. Quod si itaque sanguis sincerus confertim, repente & sine dolore mingitur, ex renum substantia sanguineo valculosa illum prodississe recte jam iudicavit Hippocrates Sect. IV. aph. 78. Sed ubi parcius sanguinis quantitas, obscuro nigricantis coloris, cum vel sine materia purulenta, maxime si cum dolore & ardore in pube sub mictione, vel post eam redditur, tunc ex vesica lesa, aut exacerata illum stillasse certum. Quod autem renalis sanguinis effluxus sine, & qui ex vesica venit cum exquisito dolore succedat, id diversitatis structurae tribuendum: renes enim exquisito carent sensu. Sed quando sanguis per nervosius acutissimæ sensationis vesicæ tunicas viam molitur; dolor non potest non oriri atrocissimus, nec mirum gravissimum tum incidere symptoma, animi deliquis, spirationem difficilem, pulsuum obscurem, parvum & frequentem non nunquam, nauseam, animi anxietatem, & frigidum sudorem. De quo mictus etiam confertim meretur, Hippocrati aphor. lib. IV. aph. LXXX. Si quis sanguinem unaque grima sæpe mingat ac stragoriam habeat, unaque dolor incidat in aqualicium & in interfemur, huc vesica vicina partes laborant. Quando porro ex uretheribus, a calculo magno, vel aspero lesa, sanguinis quippiam cum urina mictetur, dolor circa lumbos & via acutus, difficilis & sabulosa mictio, aliaque calculi in uretheribus hærentis signa id manifestant. Propter lesa a calculo vesicæ quæque tunicularum sanguinea valcula, si exornantur quippiam cruentis, non modo cum summo dolore & prævia obstructione quandoque urina prodiit, sed & grani interdum cum moleculis crassiusculis.

fibulofus firmiet compacti una cum ea emittuntur, quod etiam interdum accidit, si calculus in rene firmiter impactus eum calcuat.

## §. IV.

*Alia species  
est, quae  
per urethram  
effluit.*

Alia adhuc mictionis cruentae species datur, cuius tamen raro mentio fit a scriptoribus medicis, quae videlicet ex ipsa vasis vesicae, vel potius ipsius sphincteris contingit, quando nimium hians & a sanguine difflata aperta fuerunt. De hac mictionis cruentae specie notata dignum est *Calii Aurélii Lib. IV. tardar. passionum cap. IV.* effusum, ita habens: *solum, sicut in pedice, vel femur suum, aut matricis collo, etiam in vesica, haemorrhoides generari, quae fluxum sanguinis praestant, quibusdam intervallis variatum. Quod oportet apprehendere prudenter, cum non concurrens primo fuerit effusio, sed augmentis quibusdam provocata, interjunctis desistentibus, ac reventis sanguine dolore circa pubem, siquidem aliquando inflata ac intumescit haemorrhoides difficultatem vel obstructionem faciunt mictui, dysuriam Graeci vocantam, vel ischuriam. Archigenes vero dicebat, ut sit ut perinde menseri & haemorrhoides, ut & certis virgitudinibus interdum plethora se effundit per urethram & vesicam. Cum metuo addendum *Hennin Camerac. in apboris. Hippocratis 78.* de signis discriminis loci praecipuum: sanguis qui ad musculo vesicae emingitur, non exatle permisceatur urinae, sed in fundo depositum grumescit, quin hic grumum, qui interdum circa urinam excidit, dolorem circa vesica musculum consistenter facit; à rene vero qui mingitur sanguis, & copiosus est, & urinae exatle misceatur, videturque tota urina consistens nihil aliud esse, quem tenuis ac doloris sanguis, maxime tamen sedes liquidus minusque concretus & rubicundus.*

## §. V.

*Differt à  
gonorrhoea  
sanguinolenta.*

Non autem confundi debet ipsa sanguinis mictio cum gonorrhoea, five feminis fluxu sanguinolento. Non enim adeo est insolens, ut in his, qui gonorrhoea laborant virulentam, ex glandulis prostratis valde relaxatis, vel maiorem lympharum vel feri affluxum, non modo seminalis liquor, sed & serum mucidum, arenulis etiam repletum, interdum quoque per intervalla plane sanguis ex hiantibus nimirum, aut ab acrimonia materiae effluens artiosis vasorum oscula, per urethram, citra urinae fluxum, emittatur.

## §. VI.

*Ab haemorrhoea  
per urethram  
differt.*

Probe etiam à sanguinis mictu discernere oportet illum sanguinis fluxum, qui fit per membri virilis integumentum. Nos aliquae memoria tenemus exempla, ubi certis periodicis in viris ex ipso pene fluxit sanguis per aliquot hebdomades purus, satis largiter, praecedente tenso quodam in inguile ac femoribus dolore. Collegit etiam ejusmodi exempla *Stalpert van der Werf, Cent. I. Obs. LXXX.* Sed nunc sanguis non prode urinae mixtus, sed stillat scissim guttatim, ex ramo vasorum haemorrhoidalium exteriorum, qui ad pendenda excurrit.

## §. VII.

*Discrimen  
est quoddam  
inter.*

Item tenendum discrimen mictionis cruentae criticae & salutariae, à minus tali & morbosa. Illa quippe fit frequentissime per renes magna in copia, rarius & in minori quantitate per sphincterem vesicae, citra dolorem & magnum incommodum, & redit etiam certis periodicis. Contra-

git hoc maxime per translationem, five quae Graecis dicitur *metastasin*, excremendi sanguinis per menses, aut haemorrhoides, ita vel cessantibus, vel obstructis, aut suppressis. Vidimus nos talem criticam mictionem liberatiorem in viris, sanguine abundante, five plethorici, juvenilibus, vel etiam senilibus aetate, suppressio, vel etiam penitus cessante haemorrhoidalibus fluxu, aut consueta omnia sanguinis missione, periculi tamen procul experiri. Vidimus quoque in feminis octogenariis, vegetis & laetis adhuc viventibus, praeterum si cessantibus mensibus sanguinis missio vel fuerat neglecta, aut plane omissa.

## §. VIII.

Praeterea non semel, sed aliquoties notavimus in senibus, deficienti fluxu haemorrhoidalibus, item in viris aetate consistentibus, haemorrhoidibus caecis & tumenibus si afflicti fuerint, à motu corporis & animi fortiori, sanguinis portionem non exiguam, bruno colore insar decocti caffee tingit, citra urinae difficultatem curpi mictui produlsi; qui procul omni dubio ex vasa vesicae sanguinis circa sphincterem ejus tumenibus & aperta protecta sunt. Venae enim haemorrhoidales externae communicant cum vesica & ramos etiam ad eam spargunt, minime vero, ut nonnulli locum fert opinio, de internis id putandum, quarum ramos ad vesicam excurrentes anastomus huc usque vidit nullus.

## §. IX.

Succedit vero hac sanguinis cum mictu excretio, ex alia sanguine suppressa, haemorrhoidalibus potissimum, per renes, dum videlicet sanguis accumulatus & per arteriam melaricam inferiorem ad tunicas intestini recti adductus, ibi cum exitum non invenit, quasi regurgitat ad truncum arteriae magnae, five potius majori copia ibi colligitur, & ad vasa renium arteriosa, quae & copia, & magnitudine, venas emulgentes superant, delatua, officia, eorum minus dissendendo & aperendo, ad tubulos urinarios, qui cum arteriolarum finibus connexi sunt, ex his in papillarum oras, in pelvim, inde tandem ad urethrae & vesicam transit. Atque adeo in tali casu nec anastomosis, nec diuturnitas, nec chapedis, tantopere ab auctoribus decantata, locum obtineat.

## §. X.

Vesica tam etiam excretioni sanguinis obnoxia est, quia valde difficilis est, ob perpendicularitatem & valde densissimam ejus sinum, sanguinis per venas ex ipsa regressus. Quo fit, ut sub haemorrhoidibus externis tumenibus, vel internis obstructis, in plethorici praesentiam, accumulatus & ibi stagnans sanguis, praeter naturam officia vasorum capillarum ipsius vesicae, vel magis sphincteris, aperiat atque perturpet.

## §. XI.

Maxime omnium fluxus haemorrhoidalis suppressus, vel ex quacunque alia causa cessans, causam mictionis cruentae, maxime illius, qui fit per renes, subministrat. Notatu dignum hanc in rem est exemplum, cuius meminit *Hericuli Saxoniae lib. III. cap. IV.* nobilem *Bata-*rum, fluxu haemorrhoidalibus suppresso laborantem, per quinque annos, ex intervallo, multum sanguinis sponae & subito ante urinam ex-

*Post sup-  
pressionem  
haemorrhoi-  
dalium.*

*Quomodo  
haemorrhoides  
remittuntur.*

*Quomodo  
ex mictu.*

*Causa po-  
tissima sup-  
pressionis haemorrhoi-  
dalium.*

ut-



urethra emisisse. ROLFINGIUS quoque *Differt. anat.* Lib. V. cap. 26. alium hæmorrhagiam refert: *Illustr. vir.* scribit, hæmorrhoidali fluxui affluens, eo suppreſſo, incidit in miſtionem cruentam, multarum ſepimanarum ſpatio duranti, qua evanuit hæmorrhoidibus apparentibus, levi fluxu & parvo ſatis, ita, ut vix ani terga tingeret. Neque minus Reſiſtus *epiſtola LXIV.* calum memorabilem enarrat, de pulvere quodam, ob hæmorrhoidum à triennio ſuppreſſionem, magnam ſanguinis craſſi & ſinceri, ſine urinarum aquis, cum impetu promanentem & maſculum replentem quantitatem, excurrente, qui tamen per totam vitam nihil ſanguinis à vena miſerat. Cum vero hic eundem paroxyſmum, ter ſtato circuitu, expertus fuiſſet, ſecceſſerunt tandem naturales & ſimplices urine. Poſtquam autem medici conſilio vino uſus fuerat paulo largius, de diebus aliquot continuatis pilulis ex aloë, ſucco cichorii imprægnata de extracto trochiſcorum alhandal, hæmorrhoides ei fluxerunt & malum ceſſavit.

## §. XII.

Unus vero omnia motus corpora fortior in plethoricis facile ad hæmorrhagicas excretiones ſufficientes anſam præbet; ſpecialim tamen ad miſtionem cruentam nulla ipſius ſpecies majorem vim habet equitatione. Poſſumus ejus exempla plura afferre, quæ etiam paſſim apud auctores reperiri. Sic *Reverſus Centur. II. obſ. 13.* memorat de quinquagenario, qui quoties equitationis peregrinationis cauſa ſeſe commiſſit, urinas ſanguinolentas reddidit. *Hollerius* quoque in *Aphoriſm. 78. ſect. IV. Hippocrat.* inquit: *Sunt non nulli, qui ſi duris equent, aut ſeſe exercent immoderatis, ex calcſctu renibus ſanguinem morſum.* Et paulo poſt: *arbitramur, ut ſanguinolentam urinam & turbidam reddi ob hoc Reverendiſſimo Epifcopo propter dilatationem ſcæli tunc in cavitatione renum, tunc in vaſto urinarii, propter intenſam caliditatem, à motu violento primo generatam, dum curſu, ſubſtroſo itinere cauſaretur, præcipue circa doſi regionem: deinde ſuccedente ingenti calore, dum cum viſſo pellice ſub ſole ardente motum aſcenderet. Ex his quæ omnibus tantus calor circa partes renum fui excitatus, ut ob nimiam dilatationem, urina ſanguinolenta excreta fuerit. Et inde eſt, quod nunc quoque quæſivimus ſanguis & corpus exeret, in idem ſymptoma incidat, turbule ſcilicet ſanguinolenta urina.* Ratio vero, quare equitatio, cujus alias in præcavendis & etiam ſanandis chronicis affectionibus magna vis & efficacia eſt, ad hæmorrhagiam renum & velicæ plurimum diſponat, inde petenda venit, quod propter compreſſionem venarum in ſemioribus, in perineo etiam & ano, ſanguinis reſcurſus multum retardetur. Hinc copia ſanguinis major fit & increſcit in arteriis, motusque ſanguinis in ſuperioribus partibus augeſcit & interior fit præſertim circa lumbos, per motum ſuccuſſorium. Sic ſaſto citatioſi ſanguinis affluxu, emulgentes tandem arterie cum facile aperiantur. Recte enim ſcribit *MALPIGHIVS* tractatu de reſibus: *In noſtro corpore, præter pulmones, non alia eſt pars, qua exundanti ſanguinis injuriis magis ſubjiciatur, quam reſes.*

## §. XIII.

Deinceps ſanguine miſtionis, ſed magis prioris inſuſus & periculoſæ, cauſam non infrequenter calculus intra renem deſcendens ſubminiſtrat.

Multa enim hujus ſuccurrunt exempla, & tale quoque habet *Horſius Lib. IV. Obſerv. 37.* ubi ſine omni lumborum dolore, calculoſi, præteritum qui ſanguine plus juſto abundans & corpus vehementer motu exerceat, ſanguineam emittunt urinam. Quomodo vero hoc fiat, (ero videtur ſimiliſſimum, quod calculus mole major ac figura aſper, ſine dolore quidem intra quies diu deſcendere poſſit, nihilo minus haud levis compaſſi renum vaſculoſæ ſine viſſu ac compreſſione inducat, eorum quoque functionem naturalem lædat & ſic anſam erumpendi ſanguinis præbeat. Scilicet quando calculus mole & pondere ſuo ramos venæ emulgentis comprimit, liberiores ſanguinis tranſitum per hos impediendo, efficit, ut per arteriolas emulgentes adductus, nimia copia & impetu carum tenues & capillares ramulos, qui ultimo terminantur in nubulos urinarios, valde diſtendat & tandem viam ſibi faciat in eos, qui ſecundum naturam tantum urinam vehunt, conſiſtemque ſubeat ac in urinam tranſeat. Id quod longe adhuc magis fit, quando in diſpoſitione ad calculum, variis generis remedia, quæ urinam & calculum pellunt, commendantur & applicantur, ut quidem communis & peſſima eſt conſuetudo, præſertim ſi calidiora fuerint, ex terebinthina, ſuccino, vel ſapinero parata. Fit enim tali in caſu, ut calculus in renalibus tubulis incarcerationis, arroſione & excoſiatione dilacerando minima renum vaſcula, ſive ſiphunculos, exulcerationem efficiat. Qua facta, poſt cum ſanguine per urethras in veſicam inſillat, & ſic miſtum valde dolorificum, excurrente puris & ſanguinis corrupti cum urina portione, producit. Id quod tamen etiam quandoque fieri poteſt, quanquam rarius, ab urethris per calculum exulceratione.

## §. XIV.

Miſtionis quoque cruentæ, copioſæ & valde anticipi ſpecies eſt, quando ex veſica, ab actioni præſertim ita ſtagnante copioſo ſanguine, exulcerata, mucoſa valde, ex parte purulenta & cruenta materia in ejusdem cavitate deſcendit. Tum enim cum interno ardore, intolerando dolore & diſſicultate urina redditur, ſimulque tremores & convulſivæ artuum, cum frigore & tremore ſtipatæ motiones, ſeſe jungunt. Vidimus id aliquoties in gonorrhoea deſperata & inveterata laborantibus, acri ſimul & corrosiva materia à penialibus profluente ac partes vicinas arroſedite. Quæ labeſ interna ubi adeſt, ac renum, vel veſicæ ſubſtantia ſimul corrupta eſt, & purulenta ac putrida materia copioſe ſecedit, urinae exeunt ſuſturacæ, & parvæ caſculæ, aut corpora, capillos, vel vermiculos emulgentia, in urina conſiſciuntur, quæ a veſica nequaquam poſſunt abſcedere. Hæc enim reſolvi inquit in ejusmodi filamenta. Sed a conſerta mucoſa, vel in renibus, vel in veſica, materia, concrevit in ejusmodi figuram & conſiſtentiam.

## §. XV.

Accedit aliud cruentæ miſtionis genus, à cauſa videlicet externa, conuſione, lapſu in ſtram, elevatione onerum & percutione productum. Hoc quidem in vita civili & praxi læpius occurrit, cauſam tamen ipſius reddere non tam promeum ac obvium eſt. Quod ſi enim vaſorum in reſibus ruptio, vel continu ſolus, cauſa foret, non tam ſubito, uti tamen fit, per venæ ſectiorem & ſanguinem diſſolventia poſſet ſani.

Abſcru deſi  
corpora  
fortior ma-  
jorem equi-  
tatione.

A viſſu  
arriſſu  
& morſu.

Calculus in  
reni deſcendens.

fanari. Nos potius modum ita concipiendum esse censuimus, quod a consensione & consensione variorum, imprimis sanguineorum, & ibi stagnante sanguine, ejus circulo per has partes laesas impediatur; hinc crescere impetum & copiam sanguinis in vasis internis; atque hanc nimium inde, praeterit in plethoricis, distensa, ut sanguis locum suum ac effluat, facere. Tale quid enim commode maxime fit in renibus, si ibi facta fuit percussio. Unde sunt inter exempla, ubi etiam a luxatione vertebrarum, cruenta insequuta fuit mictio. Quin si cui ex tibia amputata dysenteriam *Hildanus* *Cruent.* II. Obs. 10. sic etiam de nos observavimus, ex offe tibiae fracto, urinam cruentam redditam fuisse. Ut adeo facile concipiendum sit, à consensione venarum & sanguine hic stagnante alicubi, fieri posse ejusdem per urethram stillicidium.

## §. XVI.

A torminibus atrocibus ventris, item à functis acrioribus purgantibus, nec non à diureticis acrioribus, ut cantharidibus, urinam reddi posse cruentam, experientia est confirmatum. Debetur autem hoc symptoma spastica venarum strictione, quibus liber sanguinis circulus intercipitur. Unde ex facili jamjam ratio reddenda, quare morbillis, & variolis imprimis malignis, functus ejusmodi affectus incedam allocuer. Proflant quidem observavimus apud auctores, quod a vesicatorio quae habent cantharides, externe applicatis, cruenta fuerit mictio exorta; interim nos fatemur candidè, a nobis nunquam tale quid visum vel observatum esse, ut haud injuria hanc operationem in dubium vocare liceat, ac forsitan longe ab alia causa in morbo sub applicatione vesicatoriorum hanc cruenta urina excreta fuisse possit.

## §. XVII.

Omnis vero cruentus mictus est periculi non experts. Etenim licet etiam in principio salutaris & criticus, à palindrome facta ob mensum vel haemorrhoidum suppositionem, visus fuerit; tamen quia non modo facile revertitur & vires exhaurit, sed & si error accidit, vel in dieta, aut si imprudenter simpliciter tractatur, inflammatio ac corruptio facile ipsis renibus, vel vesicæ induci potest, utique periculum alit. Incidit praeterea & hoc frequentissime, quod gravis quidam sanguis ex renibus descendens, in ea parte, ubi urether ductu obliquo inseritur vesicæ, impachus, valde infestam & difficulter sanabilem inducat ischuriam. Quandoque etiam congruatur in vesicæ cavo sanguis, & sphincter finitieri inhaerens, implacabilem cum urinae suppositione praebet dolorem, id quod etiam accidit, quando vasa sphincteris sanguinea, non secus ac haemorrhoides coecæ, sanguine crasso admodum turgent.

## §. XVIII.

Ex periculossimâ mictus sanguinolenti speciei est, quæ ex rene, vel vesica profundius laesa & ulcerata venit, & junctum habet cum acerbo dolore puris mictum. Interim tamen cavendum ne mucosum & glutinosum quod in urina spicruenta subinde conspicitur sedimentum, pro pure habeatur, quod superari magis solet. Sedimenti enim hujus saepe tanta est copia, ut, si à renum exulceratione esset, jam acies absumi ipsi fuissent. Est potius mucosi-

tas, quæ ex nimis relaxata glandulosa vesicæ & urethrae tunica, aut ex proflata laesa exillat & urine permiscetur.

## CURATIO.

## §. I.

Perpectis sic paulo penitus variis excretionibus per urinam cruentæ causis sedibus, prudentis tunc est medici, tum ad avertendas praeservative, tum ad tollendas in cura differentes has causas judicium in propinandis convenientibus remediis paulo exactius adhibere. Igneur, quando ex nimia sanguinis redundantia oritur, vel metuendus est affectus, sanguinis missione nihil tutius & praestabilius est, hac tamen observata cautela, ut ipso in paroxysmo in partibus superioribus, brachio videlicet, sanguis detrahatur, & ejus mittendi copia ex virtute & habitus corporis ratione aestimetur. Quod si vero à congesto haemorrhoidum fluxu suppreffo, insolita hac evacuatio ortum traxerit, ad praeservationem tutius est venam pectus aperire. Idem tenendum est, quando in colica spasmodica & vehementibus ventris torminibus, ut interdum fit, urina cruenta mingitur, ob sanguinem stagnantem & congestum circa intestinorum nates, exitumque per venas haemorrhoidales non invenientem. Quin potius, quia hic affectus per certas etiam periodos reverti solet, tempestiva venæ sectione ut ipsi occurramus, eo magis est necessarium.

## §. II.

Si à vehementi, cum, vel etiam sine plethora, organica sanguinis ebullitione & expansione, qualis subinde à seniori corporis, vel etiam animi commotione, vini & calidorum sanguinem nimis motuentium remediorum abusu accidere solet, malum hoc ortum suum habet, praeter sanguinis per venam sectionem suberactionem, nitrosi & intestinum elasticum motum sanguinis refrenantibus, sive refrigerantibus, nihil certius & praestabilius. Hoc nomine depuratum nitrum, vel artificiale, cum spiritu nitri & sale tartari confectum, cum terreis & absorbentibus mixtum, vel in forma pulveris, vel etiam potui inditum, plurimum commendamus. Cui pro vehiculo in hisce casibus firum lactis dulce, & acidulum, aqua decocta hordeacea, & sola aqua pura fontana, vel ad dimidium partem cum Seherana, aut Tönneleinseni mixta, decoctum cornu cervi & scorzonerae, optime inserviunt, vel etiam crevisse tenuiores, quibus tinetur rosarum, florum bellidis, cum spiritu vinioli, minime vero salis, cujus acrimonia volatilis pulmonibus & renibus infesta est, parata, sunt sufficienti quantitate insillanda.

## §. III.

Quam alvi adstrictio, seu tardæ faecum secessio, plurimum ad ingenerandum, imo ad fovendum & sustentandum hoc malum habeat momenti, partim quod oriunda inde flatibus & spasmis intestinorum aequalis sanguinis circulus & distributio impediatur, & ad usum, praeterit debiliorem partem, solito plus sanguis feratur, partem etiam, quod multæ impure, acres, bibulosa ex prima regione particulae ad sanguinis & humorum massam adducantur; hinc, si quid aliud, ad illud avertendum ejusque recidivam praecidendam,

dendam, certe alvi laxitas & subductio admodum proficua est ac necessaria. Id vero minime purgantibus, seu acrioribus stimulantibus, vel salibus copiose affusis, multo minus aloeticis, & pilulis quas etiam reſectâ doſi aloë ingreditur præſtandum. His enim exacerbatur malum certissime. Lenientibus potius laxantibus & quæ simul roborante gaudent virtute, id exſequendum, inter quæ, ut in omni immodica & præternaturali sanguinis excretionē, rhabarbaria, imprimis cum paſſulis mixta, uni sunt paſſule Corinthiæ, ſolutione rhabarbari per blandam inſiſſationem laxativæ reddita, vel pulvis rhabarbari cum cremore tartari remixtus, nec non chyliferi emollientes, ita etiam hec primas tenent.

## §. IV.

Ad vaſa vero nimium in renibus dūducta & aperta roboranda & leniter adſtringenda, vel etiam, ſi eorum ſubſtantia læſa fuerit, conſolidanda, decocta, vel inſuſa, ex lenioribus vulnerariis & leniter conſtringentibus, uni ſunt agri-monia, hederæ terreſtris, equiſetum, herba millefolii cum ſummitatibus, virga aurea, radix conſolidæ majoris, cum melle Præſico, renibus mi-nium amico, quodammodo dulcificata, opem ferunt laudatiſſimam; quæ decocta pro re nata etiam miſceri poſſunt cum lacte. Neque minus egregie ad demulcendum & conſolidandum uſus erit lac amygdalinum, præſertim ſi bolus Armena cum ipſo seu vehiculo ſumatur.

## §. V.

Si renem, uretherum, vel veſicæ, atroſio & exulceratio præſens eſt, ut ſæpius fit in continuo & diutius cum doloribus vexante malo, ad humorum acrimoniam contemperandam, præcipua medicatio debet eſſe directæ intentio, eaque neglecta, nullum doloris levamen, nulla etiam parvis ſauciata & læſe conſolidatio & reſtitutio ſperanda, aut obtinenda. Hunc autem in finem nobiliſ eſt viſus ſyrupi diſtillatæ Ferreſti, nem decocti Foreſti, nec non ejus, quod *Myſicibus* contra mælum cruentum laudat. Facit huc quoque inſuſum, quod præter jam dictas herbas vulnerarias, corticem radicis acaciæ, gummi ceraſorum habet; nec non, pulvis ex radice albeæ, glycyrrhizæ, ſpermate ceti, ſeminibus quatuor frigidiſ, papaveris albi, hycopodii & croci, cum Cq. ſacchari candi conditus.

## §. VI.

Ad dyſuriam, immo iſchuriam, quæ frequens & periculolum, renalis vel etiam veſicalis hæ-morrhagiæ ſymptoma eſſe ſolet, dum ſanguinei grumi urethra principium, ubi inferior veſicæ, vel ipſam ſphincterem veſicæ obſtruat, non certe efficacius & promtius auxilium, quam aqua pura calida copioſe hauſta, & exterius balneum applicatum, proſtat. Tum quoque præſtat aquam epiſdam ſyringa in urethram & veſicam inſpicere, quo acris humor diluatur & gra-vuſi hi diſſolvantur. Atque etiam ipſe *Hippo-crates* L. c. eadem hæc remedia commendat, lavacrum nempe aquæ calidæ & tepeſcencia ad locum affectum appoſita. Quod ſi vero ob grum- ſanguineos in ipſa veſica, ſeu ſphinctere ejus obſtrictus, ſpasmus oritur, ut inde totalis & perni-cialis iſchuria inducatur, interne emulſionem ex ſeminibus quatuor frigidiſ, cum lapidibus cancro-rum & animonio diaphoretico, nem pulverem ex ſpermate ceti, lapidibus cancrorum & nitro;

externe vero veſicam repletam decocto ſorum emollientium ex lacte abdomini applicaram, nec non alvi apertionem, cum manna, vel chylifere emolliente & oleoſo, uſus deprehendimus longe præſtantiſſimi.

## §. VII.

Præter hæc autem omnia ad renum & veſicæ vitia detergenda, invenrata etiam ſananda, nihil uriquam aquis medicatis temperativioribus, ut ſunt Selæranæ, Ammoniacæ, Wildungicæ, efficaciſ, tanto certius ſi cum lacte, imprimis alimmo, fue- rint remixta. Id enim docent non modo ſubter-ranea ipſarum elementa, ſed poſſimum multiplex de hoc effectu experientia, de quo omnes, qui de viribus medicatarum aquarum experti ſcripſerunt, teſtimonium ferunt conſenſu unanimi.

## §. VIII.

Neque minus egregia virtus & adverſus hunc morbum præſidium eſt in lacte, nec non lactis ſero. Hæc enim jam olim ſuo tempore, in urinae miſtione cruenta, magni ſcit *Hippocrates* lib. de internis affectionibus §. 17. 31, inquit, urina prodi veluti à bubulo carnis affatus ſucco, agnus pro temporis opportunitate ſerem & lac bibas; ſervan quidem ad purgationem, lactis autem potum faciat in tempore, per quinquaginta aut quadra-genta dies; hæc ſi feceris, morbus in melius vertet. Lac quoque ovillum vel caprillum laudat *Rhe-rus* Obſ. XIII. Centur. 17. nec non *Gaiſius* urinae æque *Foreſti*, qui hoc ſolo remedio ſanguinis mælum ſæpe ſe curaffe gloriatur; ita tamen, ut utriusque doſi, boli Armenæ drachmam unam permilcuerit. Id quod etiam in graviori ſanguinis mælu unico convenit, in leviori autem mi-nus faciendum ceſſet idem *Rhe-rus*.

## CAUTELE CLINICÆ

## §. I.

De venæ ſectiōe, in qua præcipuum tam ad curationem quam præſervationem, ſi malum a cruentis hæmorrhagiis ſuppreſſus oritur, repoſitum eſt momentum, hæc adhuc tenenda: i quod ſanguis miſſio in principio ſit inſtituenda largior. Sic enim non modo evacuantis, ſed & diverſis remediis vicem gerit. Quando vero ſanguinis miſtus ſuas ſervat periodos, duabus vel tribus ante accellioſiorem horæ, venâ pertruncanda & prout corporis conditio fert ſanguis emittendus.

## §. II.

*Hippocrates* L. c. in miſtione ſanguinea ab ul-cerato rene, vel veſica, vinum album, mellei co-loris jucundiſſimum, probe temperatum, bibendum permiſſime ſuadet. Nam vina nimium ſpiri-tuoſa, aut acido abundantiſ, ut Rhenanum, mi-nime ubi nimia de dolorifica aſſeſt ſanguinis mi-ſtione, conferunt, ſed potius vina dulcia, ut Hiſpa-nicum, Canarienſe, Hungaricum præſtant, dum ventriculi digeſtioni & ſumal veſicæ aſſectui fa-vent.

## §. III.

Quum potro multum inu. rſu, quale potus ge-nus in uſum ducat renem & veſicæ vino labo-rans, tenendum omnino: ab omnibus cereviſiis craſſioribus & acidis abſtinentium eſſe, potum eligendum copioſum, ex cereviſia tenui, quippe quæ medicamenti aquoſi miſtar, acce & arenuloſi alit ac diluit. Teſtis hæc in rem gravis eſt ſy-  
denhaus

Paſſu-  
mum la-  
nata addi-  
enda.

Rhe-rus  
aut veſicæ  
exulceratæ  
danda  
acrimo-  
niam tem-  
peranda.

Grumi  
ſanguinei  
diſſolvendi.

Optimū  
acidula  
temperanda.

Egregiū  
quæ in lacte  
uſusque ſer-  
vatur.

Vina ſu-  
bſtantia  
tenuiſſima.

In vino po-  
tem.

In potu ar-  
dentiſſimo.

*desinat*, qui eundem ceu saluberrimam commendat *Libr. de miltu* cruento a calculo renibus imposito pag. 705. adeo, ut ipse, quoties curru vehi debuerit, non prius rhedam ingressus sit, quam haustum cerevisiae tenuis paulo liberiores ingresserit, eundemque pariter iterare ante regressum domum versa, si forte alicubi diutius fuerit commoratus. Ex hoc pacto semper sibi à miltu cruento satis praescautum esse, asserit. Observandum tamen; cerevisiam bene coctam esse debere & fermentatam.

## §. IV.

*De corporis miltu.* Unus motus & exercitatio corporis conveniens magnum sit, tam ad praecavendum, quam persanandas chronicas passiones praesidium, atamen in excretionibus sanguinis, & praesertim quae sunt urinariae per vias, res longe aliter est comparata. Etenim vix aliud, motu corporis citiori, praesertim equitatione, ad propagandum hoc malum magis valet, quin solum loquelam paulo elatorem & longius continuatam, in miltioe dolorifica & cruenta, quae per vesicam laesam sit, vidimus damnosam. Jam dudum etiam id notatum fuit ab antiquissimo medicis nostrae parente *Le. p. 16.* perhibere: *si quis sanguinem cum urina mitti, & corpus quietum habet, citius sanabitur, si vero laboraverit, dolores multo gravesiores obtinebit.* Neque minus *Sydrham* in *opp. p. 700.* suo exemplo rem optime docuit. Nam quoties permultum itineris pedibus confecit, vel in curru per platearum pavimenta vectus est, quantumlibet tardo equorum gressu, toties miltum reddidit cum sanguine permixtum, quoties vero per viam regiam lapidibus non serrat, licet perquam longissime, curru vectus est, tale quid ipsi accidit nunquam. De somno etiam peritissime refert, quod ipsi curae fuerit, ut lectum citius peteret, quo eo magis concoctio recte perficeretur, sicut ex adverso nocturnae lucubraciones cum imminuant.

## §. V.

*Qua sunt proinde.* Inter ea vero demum, quae in medicatione huius mali vitanda, nihil certe esse potest insectis, quam si cruenta haec miltio, five ex renibus, five ex vesica fiat, five critica, five symptomatice sit, remediis adstringentibus, fluxum nimis impetuosi subleventibus, et communis fere & detestabilis medentium error est, excipiantur. Hoc enim facto, a gravis intra vasa retentis inflammationes sunt, exulceraciones & putredines. Sic enim haemoptysis idem his remediis tractata, quam facile in inflammationem & phthisin, vel pulmonum exulceracionem, ita etiam miltus cruentus in inflammationem, exulceracionem & putredinem abit. Nihil minus tamen, si excreto sanguine effusissima fuerit, cum summa vium iactura, mixturam, qua *Sylvius* feliciter in cruento miltu usus est, ex aquae plantaginis uncis duabus, portulacae, cinnamomi, acetis dissilati ana uncia una semis, coralliorum rubrorum praeparatorum, lapidum cancrorum, terrae sigillatae ana scrupulo uno, laudani liquidi grannis tribus, syrapi coralliorum Quercetani, vel de symphyto Fernelii, q. s. ad gratum saporem, experientia invenimus olim comprobata.

## §. VI.

*Externis applicandis.* Externorum quoque non inutilis est ad lumbarem regionem applicatio. Hoc nomine venit emplastrum spermatis ranarum, quando cum alumine vel saccharo saturati de paucillo camphorae mis-

ceatur. Vel meretur etiam commendari albumen ovi cum alumine conquisitum & subfrigidè regioni pubis appositum, sub forma epithematis. Nam blanda refrigerante & adstringente vi, haec sanguinis impetum quodammodo refrenans.

## §. VII.

*Ad artem, dam miltu non feranda.* Qui ejusmodi malo subinde consistantur, vel ad illud inclinant, providam omnino & diutae & vitae regiminis curam habeant necesse est. In victu quam maxime a vini potu, ab omnibus aromatibus, praesertim alio de cepis, radicibus aperientibus, ut petroselinis, pascinacae, Seleni, asparagi, proutius abstinere, neque somnum in dorso capiant, atque nimis calida panis, seu pellicus illud sufficiens. Vitandus etiam est nimis potus calidus infusi Theae, vel aliarum herbarum, sed potius frigidus, vel subfrigidus concedi debet. Decoctum potissimum cerasorum exsiccatorum in pulsa, non sine euphoris, sapiei pro potu sumendum commendavimus.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Miltus cruentus ex calculo re.* Femina illustrissima LII. annorum, sanguineo-cholerici temperamenti, ab ineunte aetate catarrhis, nulli, cephalalgis, vere praesertim & autumnis, fuit obnoxia. Menses semper largiter fluxerunt, qui nunc à biennio penitus cessarunt. Ex quo tempore doloribus ex calculo saepius consistetis, sustinde quoque intensi spasmi, tensiones & dolores occupant abdomen, cum alvi strictione & urina aquosa copiose secedente. Nunc saepius in extremitatibus manuum & pedum dolores persentit satis exquisitos, tunc maxime, quando dolores ex calculo conquiescunt. Nam his praesentibus propterea artuum dolores evanescunt. Anni vero spatium ferme est elapsum, ex quo miltu cruento, sine omni dolore lumborum vel artuum fuit afflicta, qui potissimum sub motu corporis, qualicunque etiam recrudescit. Originem huius profluvii derivandum esse arbitrat ex nimio lithonripticorum à medicis exhibitorum usu; quocumque ad cruentam mictionem comprimendam vitur remediis, propterea se pejus habet, & de sensivo hypochondrii sinistri dolore, de nausea, de flatibus, capitis dolore conqueritur. Contra haec vitia tollenda aliquoties secta est pedis vena, quam in brachio minus belle potuit ferre; invalecentibus inde mox symptomatibus. Frequenter vit acidulas Selteranas, thermas Embenses, sed frustra esse efflavit. Exegit à me salutare consilium, Imperavi, ut singula biuis mensibus, sanguinis mictionem five per scarificationem, five per incisionem venae in pede admittat, secundo, ut loco potus ordinari usatur sequenti decocto: recipe Santali rubri, radice scorzonerae, ana unciam, cremoris tartari drachmas duas, sacchari Canariensis unciam, coque in mensuris duabus aquae communis per horae dimidium, in fine addantur gumulae duae vel tres olei de Cedro, cum saccharo subactae. Infusum quoque theiforme ordinavi ex summitatibus millefolii, floribus papaveris rhodae, hyperici, herbae veronicae, pilosellae & semine feniculi adomatum; & ad singulas lunae phases, ad alvum laxandam assumere iussi.

jussu decoctum rhabarbarino-mannaum, & circa proximum ver domo curam famis Scherani per integros duos menses, cum tripla lactis asini pari remissione assistere: Aliquot menses post, relaxam mihi esse ex Hollia, insignissimum molli kvamen ab hac cura fuisse expertam feminam illusterrimam.

## Epicrisis.

Sanguineam mictionem infestare quam maxime facientes phlogosæ, post cessum menstrui purgationem, neglecta sanguinis missione, sub victu præsertim laevo & motu corporis concitatori, multis exemplis in præxi confirmatum habemus. Nihil vero ad calculi generationem & mictum concitantur protrahendum, si dolores jam addit lombosum, magis valere, quam incussiles & tenere, calculum quæ pellunt progredire, etiam nobis conperitum est. Oxydandum itaque fuerit, ut omnia lithomiptica, quæ rariissime optatum habent usum, è præxi medica epicrisetur, præsertim si aciora & calidiora fuerint; neque enim ante affectum nephriticum, neque in eo, necne post eum, utilitatem quandam habent. D. neque quam circumspectam, immodice omnes sanguinis profusiones, tractandi methodum exposuimus per adstringentia, etiam nostra hystoria docere poterit, quum repressis sanguinis fluxu, mox læva internas abdominis partes incessante symptomata. Venæ in brachio æstivo, ubi jam plurimum sanguinis per inferiora profluere, non semper tota de utilis: quia languis extracto sanguine partes vitales, cor & cerebrum, eo si deseruntur, cum tota functionum œconomia labefactantur. Fons Scheranus cum asinino napeus lacte, in omnibus reum vitis & doloribus ac spualis nervosorum partium scorbuticis, est præsidium omnibus aliis longe superius.

## OBSERVATIO II.

Ex repulsa  
scabie reu-  
matis micti-  
one.

Vir sexaginta annorum, olim hæmorrhoidum fluxui circa æquinoctia obnoxius, per annum iam caruerat de pruriginosa scabie in toto corpore, præsertim circa anum, fuerat vexatus. Ad hunc tollendam variis usas est medicamentis sanguinem purificantibus, ut tinctura antimoniæ, tinctura sulphuris tartarifera, quam cum decocto tem, crato ultra mensum assumsit. Externe, unguento ex balsamo sulphuris, cum oleo amygdalarum dulcium & saccharo sanum parato, frequentius cutem inunxit. Quibus remediis adhibitis, scilicet quidem molestum cutis malum evanuit; sed præter omnem opinionem, quum urinam redderet, apparuit illa crassa, sanguinea colore tincta, scæcilique mox in fundum subnigricans cruor. Sic reddebatur aliquoties lotium, semper fere sine incommodo, sed quando alvum exonerabat, sub illo nisu, inhumani fere dolore cruciatus fuit, cum magna stranguria. Venæ sectione in pede singula mensibus instituta, exhibitis simul infusis ex manna, rhabarbaro, pulvis & vino, laxantibus, ac decocto ex avena, radice cichorii, floribus papaveris rhæodos, summitatibus millefolii, saccellive malum discessit.

## Epicrisis.

Notum in hoc casu perquam dignum est, quod a reimpulsa scabie sanguis cum mictu prodierit. Sed dubio omnino præci id factum esse Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

arbitror, quod materia serosa, tenuis, caustica, renum & vesicæ vasis se infinuavit & acrimonia tenues eorum furculos fasciavit, non aliter ac id à cantharidibus intro sumis sibiinde obtingere solet. Notabile etiam hoc est, quod exigua dolor fuerit, quia sanguis ex renibus promanavit, quando urina copiose emissâ fuit, gravior autem factus sub alvi depositione, quia sub vehementi nisu salus sanguis & acris sine dubio ex vesicæ valculis expressus dolorem auxit.

## OBSERVATIO III.

Accersitas ante aliquot annos ad Quæstorem, virum quinquagenarium floridi, sanguinei & carnosus habitus, qui semper sanus ac vegetus, nunquam etiam dolore ex calculo vexatus, vel hæmorrhoidum fluxu afflictus, & qui nec sanguinis mictionem per totam vitam, nisi bis, vel ter admiserat; in mane quum surgeret, emisit præter omnem expectationem, sine magna alteratione, urinam cruentam. Ego quum advenirem, fluxus jam per duos dies durarat, sedimentum erat valde nubulum, crassum, subnigricans. In patina uncias aliquot hujus urinae probe subactæ super prunas arduentes curavi incoquendas & vix dimittit parte exhalata, crassamentum instar albuminis ovi coagulatum, nigricans tamen coloris, remansit, non secus ac sanguis quando in cochleari argenteo supra candelam incoquatur. Inquisivi in hujus fluxus, insolentem plane, causam, nullam tamen aliam asserere posui, quum quod liberalius potasset vinum in urbe vicina de post nocte merie majore valde frigida, mane per vias miliaria equo concitatus vectus sit. Altero enim die post, hoc symptoma fuit sequutum. Quare quum pulsus adhuc sanis magnus & citatior esset, venæ sectionem in manu, & loco cervicali, quam ordinario bibebat valde sanantem, decoctum avenaceum, ex avena, radice scorzonæ, cichorii, floribus papaveris rhæodos, nitro & melle paratum, item pulverem præcipitantem cum liquore anodynæ aliquot guttis assumentum infusum quoque thesaurum ex herba veronica, agrimonie, polygoni, summitatibus millefolii, floribus papaveris rhæodos semine fœniculi siapius hauriendum suasi, & præcepi, ut à vino abstineret & singulis anni quadrantibus venæ sectionem administeret. Quo facto, non ulterius mictionem cruentam est expertus.

## Epicrisis.

Non semel sed sæpius observavi copiosi & feroci sanguinis mictum ex improvviso simul & semel factam & per intervalla ex levi causâ recurrentem sine ullo apparente signo vel vestigio calculi renalis ante & post illum fluxum, idque in corporibus sanguine temperato valde diffusiis; nullum dubium est quin io phlogosæ, præsertim post equitationis motum, facta concitatio sanguinis ad renes affluat & impeditiori ejus per venas refluxu, extremitates arteriarum emulgentium, quæ principium canalulorum hydragororum constituent, nimis dilatare & disrumpere, cum effuderint in canaliculosam & papillosam renum substantiam. Tali in casu quies, aquæ frigida potus, abstinencia ab omnibus spirituosiss, venæ sectio, omnium opemina sunt præsidia.

## OBSERVATIO IV.

*Mictus  
cruentus  
cum dolore  
sibilante  
venit.*

Laboravit ante aliquot annos vir consularis vicinæ celebris urbis quinquagenarius, laute & vinoſe diæta deſectus, tranquillè inſuper viæ generis, dolore gravativo lumborum, cujus cauſæ conſulti medici judicabant eſſe calculum re-nalem. Quidam ticturam *Amelegii* lithon-tripicam, alii baccas juniperi quinque ſingulis diebus mane devorandas ſuaſerunt; ſed nihil inde levaminis conſecutus eſt, ut poſtus dolores invaluerint, ipſum lateris dextri femur in conſenſum trahentes. Commendatus ipſi fuit pulvis ſpecificus antinephriticus, cujus baſis millepedes & ſal ſuccini volatilis erant, quem circa ſingulas ha-næ phafes aſſumit, urinae quidem fluxus libera-lior inde reddidit, ſed per menſem uſurpatum hoc pulvere, obſervavit quæ urinam redderet, eam ſanguinolentam, ita ut inſerendum plus, inſerendum minus cruoris haberet. Medicus ordinarius à ſpecifico hoc ut penitus abſtineret ſuaſit, & me-dicamentum ad fluxum ſanguinis reſtringendum dedit, unde mictum reſtinctum quidem, ſed non multo poſt ardot in oſſe ſacro ingens cum diffi-cultate magna faeces egerendi fuiſſe ſubſecutus, dolore mox tonum femur, qui ad pedem uſque ſe protendebat, occupante. Hic poſtea venæ ſec-tione in pede aſſucto admiſſa ſans larga, & de-cocto temperate uſurpatum ſuperius à nobis de-ſcripto, convaleſcit.

*Epiſciſu.*

Ex hac conſtat hiſtoria, aliſque innumeris comprobari exemplis poſſe, pernitentem admo-dum eorum, quæ urinam & calculum valide pel-lendi poſſent facultate, uſam eſſe in plethoriciſ & quando de doloribus lumborum conqueruntur. Optandum certe foret, ut acriorum & nimis ca-lidorum diureticorum, quæ ſale ſubtili cauſico veſicatorio agunt, ut ſunt quæ ex infectis pro-ductum medicamina, non ſecus ac aciora & va-lentiora purgantia penitus in praxi & uſu medi-co exularent; quippe natura in excretionibus blande vulgari, non vi cogi; fortiori enim diuretica nunquam non reſerant & vaſculoſam renum ſubſtantiam lædunt, calculoſque, ſi non adſunt, ingenerant, vel ſi adſunt fortiter expel-lunt, vaſſique ſucciatis inde cruorem educunt aut inflammationes & exulcerationes conſuma-ces & exitiales relinquunt. Novi à crebriori pul-veris millepedum in aſthmate humoralis uſu cor-poris atrophici & ſuſſeſſam renum exulceratio-nem cum febre hectica ſuſceſſiſſe. Si quis autem ejusmodi cauſici, cujus generis ſunt cantharides, araneæ, vermium majalum & millepedum ſpecies, ut in gonorrhœa virulenta non nunquam accidit, uſi veli, ſuaſor ſum ut nunquam ſine miſcela niri & camphoræ, quæ omniſum opima eorum ſunt corrigentia, ea adhibeat.

## OBSERVATIO V.

*De vera  
cauſa  
mictus  
cruentus  
ſponte  
venit.*

Ineunte anno noctu colica prehendebatur ve-hementi ſixagenarius vir, quem jam ante no-ven etiam meſes circiter fuerat perpeſſus, cui tunc accieſſit mingendi difficultas. Poſt aliquot dies remiſit quidam colicus dolor, ſed frequen-tior ad marulam ſtimulus fuiſſe perpetuus, quin quandoque ſine cauſa conſpicua, mirum fuiſſe exacerbatus. Interſpecto aliquo tempore accedit tertium mictus ſanguinis, qui quandoque per

octo & quatuordecim dies ſucceſſit, quibuſque elapſis urina iterum quidem tenuiſſe inclareſcit, ſine tamen agroti levamine. Atque hoc mictus cruentus citius aut ſerius impetit, quo magis vel minus corpus motu exageavit. Sic miſer jam ſeptem anni quadrantes ſub perpetuis viciniſſi-mis affligitur, nec unquam penitus ceſſavit dol-or, licet interea variæ adhibita ſint medicatio-nes, inter quæ etiam bis repetita Egranarum po-nas. Poſt emiſſum in pede ſanguinem & appoſi-tas ano hinudines, datique ſubinde per epicraſin laxantibus, ſincerus ſanguis cum lotio non am-plius profluat, ſed poſtquam reſrigerat urina, di-miſiſſe craſſum ſubrubicundum ſedimentum, tan-demque plane molecule ſanguinis congruati exciderunt intra aliquot dies vel viginti, quarum non nullæ magnitudinem digiti ſere auricularis æquabant & quaſi in carnem videbantur mutata. Poſt aliquot dies ægrum inceſſit colica nephrica, & lapillos binos miliares elidebat, atque elapſis quatuordecim diebus eodem modo. Ex eo urina aliquamdiu manſit pellucida, neque etiam quic-quam ex ipſa ad fundum ſecceſcit, ſed illud crebri-oris mictus malum manſit, ita ut ſingula hora di-midia, quin quadrante, matulam polcere cogere-tur, cum ardore in ano, teneſmo & ſpaſmo circa glandem, ac purgentem, ardente, ſcindentem tam exquisito in glande dolore, ut rigida penis ſubſi-queretur tendio. Iterum urina nunquam plane fuiſſe ſuppreſſa, alvus autem plerumque offici obſiſci-tur & ſtanibus tamen, appetitus quoque vacillat cum ruſtibus, ſuccuſſatorum motum ſere nequit æger & circa lunæ phafes tam notabile doloris percipit incrementum, ut plane non ſole movere ipſi ſit licitum. Somnus propter crebram urine emiſſionem interruptus. Vires mediocri adhuc ſunt firmitudine. In oſſe ſacro & dorſi dolor non ſenſitur; ſed in pubis regione exteriora quando-que pruritus, interioris preſſioris & tractoris dol-or verſus dextrum latus, quaſi ibi præternatu-rale quid conſiſteter, qui ſenſus, motus, tuſſi, ſternutatione exacerbatur. Urina intereum tan-ta vehementia exitum molitur, ut vel involuntarie erumpat; viciffim non nunquam talis in membro eſt ſenſatio ac ſi exſtillaret urina, quod tamen non fit; poſt aliquas vero ſanguinolenti mictus inducias, rediit tandem illa eadem ve-hementia. Quare meum poſtularunt conſilium, qui quidem caſſide edixi periculo non vacare ejusmodi malum, inverteram maxime & in ſe-tili corpore, ne tamen ex neglectu ejus corruptio & ſphacelus lethalis partibus affectis accedat, unice omni cura eſſe providendum. Hunc in finem ſuaſi, ut quotannis minimum ter, vena in brachio perturbaretur; dein ut æger à vini ac cereviſiæ potu abſtineret, ac ordinarium habeat decoctum ex radice chinæ, ſarſaparillæ, ligno ſan-talo rubro & cinorro, nec non radice glycyrrhi-zæ, & ſtomachi cauſa unicum vini Burgundiaci aut ſimilis vinum bibat. Tum videndum, ut al-vus ſemper ſit aperta, idque ope maxime paſſu-larum rhabarbarinarum; aliena vero & acra purgantia cum cura eſſe vitanda. Exterior ni-hil ſive conductibus aqua ſclopetaria, triptica-tis lineis pubis & perinæi regioni noctu maxi-me adnota. Sic me ſperem fovere haud dubiam, fore, ut æger exinde levamen obtineat exoptatum.

*Epiſciſu.*

Venit redditus à noſtro mictus ſanguis, non ut committeret ſi, ex renum vicio, aut vaſorum

genium aperiens, sed potius ex ramo venæ hæmorrhoidalis externæ hypogastricæ, quæ in viâ præsertim, ad vesicam maximeque ipsius cervicem complures furculos spargit, reñtibus anæmiciis oculatissimis, imprimis *Barbina*. Est itaque mictus cruenti genus oppido rarum, non tamen defuncti inter observata medica ejus exempli. Sic HOECHSTATTERUS, in *obferv. Dec. I. febol. in cas. II. fundi supin, air, hæmorrhoid. externa sanguinem in vesicam, in obferv. vitio renica negatur, quod in ubili quodam licuit videre*. Ejsdem indolis & nostro perquam similis casus relatus legitur in *M. N. C. Dec. I. Ann. VIII. Obs. XXIII.* Quod autem ex hoc fonte venerit sanguis, testatur facient pathemata. Nullas enim in lumbis & renibus adest dolor, sed continuus ad mingendum stimulus, cum doloribus in ano, pube & perineo multis & variis. Quod si itaque sanguis, sub vitâ præsertim sedentaria, accumulatur & circa hæc loca stagnat, vasorum in cervicæ vesicæ orificia tandem debilitant, & sanguinem in vesicæ cavum fundunt, tumque multum sanguinis illabunt. Quod si vero per tunicas aliquid tantum mora transfudat, sensim coagulantur, & cum vesicæ mucosâ miscetur, concrevunt inde ejusmodi molecule sanguinis congruam quasi membrana vesicæ, quæ postea excernuntur. Atque idem etiam factum esse habet allegata ex *M. N. C. observatio*, conceptis sic verbis: *tandem cum maximo cruciatu & ardore vehementi in ima pube & circa trigon. variis magnis, ac oblongis sanguinis granis, inflat hepatis latus pifci, mingendo ejaculabatur.*

## OBSERVATIO VI.

Anne duodecim circiter annos, vir generosissimus, aulæ Cæsaris minister, meam opem ac consilium requisivit. In iam septuagesimum & sextum ætatem conplevit, constitutionis, per omnem ætatem, valide & robuste, ut nunquam sere agroaverit; laetiori quidem gaudebat victu, ita tamen, ut in poculis de venere modum fervaverit. Solitus erat longo abhinc tempore, sub coelo sereno corpus equitatione exercere, idque, cum paulo fecisset validius, mane urinam, quæ antea semper erat naturalis, bruno & subatro colore tinctam prodidisse observavit, aliquot sanguinis grumis urinalis vasis fundo adherentibus, & quotiescunque equitatione vel alio fortiori motu paulo validius corpus agitar, idem expertus est; quamdiu vero corpus permanet quietum, urina & colore & consistentiâ naturali erat, nihilque vitii habebat. Per aliquot jam menses hoc insolito accedente affectu, de nulla corporis lassitudine, de nulla circa pubis vel lumborum regionem molestia, de nulla dysuria conqueratur, nullum unquam calculi vesigio apparet, neque ullas unquam molestias ex hæmorrhoidibus percipit: interim bene appebat, dormiebat. Venæ sectionem per totam vitam rarissime admisit. Delectatus multum cibis qui grata acrimonia linguam ferunt, germanicæ *voss hoben* Gout. Medici ejus loci peritissimi de morbi causâ & effectu nihil certi decernere poterant, & medicamentis, quæ nihil proficiebant exhibitis, per litteras petiit meam opem & consilium. Judicavi maius originem & causam esse plethoram, quæ etiam sensibus bene appetentibus & laetioris victus huiusmodi familiaris esse solet, præsertim si à sanguinis missione, quæ in florida senectute longe utilissima deprehenditur, prius

abstineant. Susi itaque singulis mensibus venæ sectionem in brachio, parca tamen manu, ad uncias tres vel quatuor administrandam, & ut loco potus ordinari decoctum ex radice chinæ, scorzonæ, rasura cornu cervi, fiasco rubro & aniso stellato biberet; subinde quoque pulverem ex lapidibus cancrorum, rhubarbaro & saccharo assumeret, ab omnibus acerbis & spirituosius abstinere, corpusque in quiete servaret. Quorum remedium energia ita adjuva est, ut generosus ejus gener, exactis aliquot septimanis rescripserit, illum immunem hoc malo fuisse redditum. Post duos vero annos, marasmo eum extinctum esse, mihi fuit relatum.

## Epiresis.

Binos, quoad omnes propemodum circumstantias, similes casus, olim in praxi mea observavi. Anne viginti annos generosus cameræ consiliarius octuagenarius mihi aperuit, se ultra decem sere annos, urinam per intervalla, sanguineo colore tinctam grumis interdum prodeuntibus ex ipsâ urethra reddidisse, citra ullum tamen incommodum sive sanatis offensam. Nullam novit mali huius causam assignare, nisi quod per multos annos, vinum quod in vinis sua rubrum, sive Rosæcer fuit natum, in frequentissimo & quotidiano sere usu habuerit. Motui ut abstinere ab hoc, sed respuat hoc consilium, eo quod jam per viginti annos, hoc vino fuerit usus. Secuta vero postea est crebrior cruciatio mictio, quam lenta exceptis febribus cum marasmo. Anne aliquot luftra in læmina septuaginta & aliquot ætatum vegetæ etiam constitutionis similem urine colorem observavi per certa tamen intervalla appareantem. Colorem urinae bruno-nigricantem in simili ætate quam maxime familiarem credituribus acidis, sanguini permixtis, dum facile omnia alimenta in eorum ventriculo coactant, tribuendum esse existimo, quæ humorum acida acrimonia plurimorum senilium morborum matrix ad vasorum sanguineorum in renibus referenda orificia etiam multum confectæ videtur.

## OBSERVATIO VII.

Hebraus LX. annorum ab aliquot jam annis doloribus ex calculo valde excrucians, tandem ingentis magnitudinis unum cum cruenta excrevit urina, postea immensi dolore in regione pubis corripuit, urina penitus suppressa, alvoque ita obfistata, ut nec flatus nec quicquam excrementi inde prodiret, quæ per quatuor dies symptomata perfluerunt, tormentis ita adactis, ut nec quicquam somni capere, neque in uno loco quiete consistere posset. Ad urinam eliciendam catheter sed sine effectu fuit applicatus, quem vix aliquot guttulae urinae profluxerunt, hinc non sine ratione judicavimus, urethrae ubi vesicam ingreditur a grumis sanguinis esse obstructam, quare pubis regionis vesicam speciebus emollientibus in lacte coctis repetam applicari iussimus: ingentem quoque infusi herbarum veronicae, urticae mortuae & radicis glycyrrhizæ quantitatem quotidie ebibere debuit; præterea clysteres oleosi emollientes in anum injecti plures, & nil levaminis inde fuit consecutus, auctus potius ab urina suppressa fuit dolor in abdomine & lumbis, cum extremorum refrigeratione mortique vicinus in continuo sopore jacebat æger: quando paululum se recolligebat de summis querebatur anxietatibus quæ respirationem demere vi-

Historia  
ex melle  
cruento  
poculis  
memoria  
facilis.

debantur. Dedi ad alvum, quæ erat strictissima, laxandam sequentem mixturam: recipe manne electæ uncias duas, solve leni calore in aquæ florum acaciæ uncis sex, adde olei amygdalarum dulcium unciam semis, niri purificati grana XII. essentia corticum aurantiorum drachmam semis, quæ duabus vicibus assumpta, atque intra quatuor horas repetita; habuit inde octo sedes, quibus copiosa materia stercorea rejecta & simul tanta urinæ profusus copia, ut aliquot repleverit matulas, quæ vero primum prodiit, instat luteæ carniem erat. Horum remedium efficacia ex ore pene faucibus erepta miser, qui postea adhibitis idoneis stomachicis, roborantibus, bono vice regimine accedente, pristinam valitudinem recuperavit.

#### Epiçrifa.

Extra dubium est à sanguinis gravis obstructum fuisse iterum uretheris in vesicam, qui transversim fit per ejus membranas; id vero mirum est, per alterum vacuum, urinam in vesicam non descendisse, quod à spasmotica vesicæ constrictione factum credibile est, quia etiam vicinum intestinum rectum per consensum arctissime fuit occlusum. Perquam notabilis etiam est singularis effectus dycochi manas in hoc casu, quod una cum chyliferis & caraplasmatibus emollientibus, spasmus harum partium relaxato, urinæ liberum iter & fluxum conciliaverit. Neque semel sed iterum à nobis observatum est, quæ alvum blanda virtute solvendi valent, in morbis vesicæ commodum etiam præstare solatium.

Plures observationes inveniri possunt in *Caus. Med. Sect. III. cap. LXXVIII. LXXX.*

### CAPUT VII.

#### De Hemorrhagia cerebri.

#### THESES ET OBSERVATIONES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

Quid intelligatur per hæmorrhagiam cerebri.

**H**æmorrhagiæ cerebri appellatione, nos forem & perniciem illam apoplexiam sanguineam comprehendimus, quæ ab effusione cruoris in cerebro ex ruptis ibi, circa violentiam externam, vasculis, oritur, & subito functiones animales & vitales quoque pessumdat atque extinguunt.

##### §. II.

Haec de hæmorrhagiæ cerebri signis.

Hæmorrhagiam cerebri existere reversa, ejusdemque proximam causam esse rupturam vasorum in eo, luculenter monstrant sectiones anatomicæ in defunctis insinuant. Hæ enim in comperio est; sanguinem modo inter cranium & duram matrem, modo inter hanc & piam, frequentius hanc inter & cerebrum, frequentissime in hujus anfractibus & ventriculorum medullarum, quandoque in basin ipsius, interdum minor, interdum etiam satis magna copia, effundi. Hæ quoque constat: ipsa languida vasa per cerebri membranas & corticem discurrentia, sanguine nunc liquido, nunc concreto turgida & veluti aneurismatica nunc etiam rupta compici. Possunt hanc in rem legi historiam apoplecticorum dissectionum à clarissimo *Wepfero* consignatæ.

##### §. III.

Paras igitur primario affecta est cerebrum, quod ad concipiendam sanguinis stagnationem & inde oriendam hæmorrhagiam admodum dispositum. Etenim insignis sanguinis quantitas, & minimum, teste *Malgigio*, tertia pars, illius qui ex ventriculo cordis sinistro in universum corpus ejicitur, eo per quatuor capaces suis arterias adducitur. Dein arteriosa hæc sanguinem adveniens vasa tortuosum admodum ubique, & maxime in pia matre, servant tractum. Tum, quod maximum, ipsæ hæc arteriæ, postquam subierunt cranium, deposita exteriori tendinea, potissimo motus systolici instrumento, tunica, tenuior longe sunt, quam in reliquo corpore, & quasi venas referunt. Ne dicam, adeo demum gracilescere hæc vasa, ut sanguinis per ipsam angustias in venulas socias transitus, sensim plane suberfugiat. Quæ omnia faciant utque, ut sanguis heic tardius circumeat, facile etiam subsistat, aditu in venas expedito facile intercludatur, novique accessu cumularum continuo, alveos canalium admodum dilatat & ad consequentia plura mala ansum præbeat.

##### §. IV.

In primis præsentæ jam ejusmodi dispositione, facilis postea in rupturam & effusum est transitus, nam videlicet, ubi accesserint causæ, quæ sanguinem majori copia & cum impetu ad caput congerunt, ejusdem in ipso stagnationem invitant ac liberum per venas recursum valde sufflamant. Sic enim demum fit, ut vasa non modo cruore turgent, sed & ab appulsu pugnet novo nimium facta, dehiscant, ruptantur & sanguinem effundant. Id quod maxime in pia meningia nec non corticali cerebri substantiæ vasculis, atque ac iis, quæ choroidæ plexus constituunt, contingere, cadaverum sectione constat.

##### §. V.

Per effusum in cerebro cruorem non modo subtilissimi liquidi, quod motum, robur & sensum præstat partibus, secretio & distributio per nervos impeditur, sed & tonus circularis sanguinis per cerebrum motus turbatur & interceptur; ubi animales atque vitales functiones elanguescunt & tandem penitus exstinguuntur. Quæ omnia sic omnino contingere, testantur faciant pathemata, illa truculenta, quibus hæc hæmorrhagia stipatur, & è quibus, creu diagnostici signis, etiam cognoscenda. Nimirum qui eam incurrit in terram concidit subito, omni mentis vi ac cogitatione, sensu quoque ac motu privatur omni, cuncta membra sunt languida & flaccida, lingua obtumescit, palpebrae suspensæ & ocia hians comparet, deglutitio subtilis, & alvus, & vesica retinenda excrementa haud raro sponte dimittunt. Atque hæc omnia læsam cerebri functionem & elanguescens inde muscularum robur produci luculenter.

##### §. VI.

Difficili autem & intercepto sanguinis per capitis interiora commensu tribuenda reliqua quæ observantur phenomena. Quod scilicet genæ rubicundo admodum & florido colore suffundantur, facies tumet, vasa per faciem & maxime tempora discurrentia, turgent, rupe in ore, naribus ac auribus sanguinem interdum, maxime post mortem, fundant, quis accedentes putredines,



dine, caput in miram distendatur magnitudinem; quod à sanguinis per carotides internas aditus denegato, & ea propter in externas facto impetu, merito derivandum. Quod oculi distendantur, promoveant, rigidi & quasi virescunt comparant ac lacrimas uberius fundant, id lymphæ à sanguine stagnante copiosius secedenti in acceptis frenandum. Quod cor valide pulset, arteriarum quoque pulsus in principium magnus, postea languidus ac rarus sit, quod spiritus sit diffusus cum stertore & rhoncho, id sanguinis pulsiones obstruentis molis, eorundemque ea propter intercepto equali reciproco motui, aërem rite nec expellenti, nec admittenti, imputandum. Quod demum vomina & convulsionis cum demum stidore variæ accedant, non aliunde quam à sanguine in duriæ matris vasis hærente eandemque ad spasmus sollicitante, deducendum.

## §. VII.

*Signa antecedentia.*

Jam sicuti omnis omnium hæmorrhagia supponit ac præviu habet sanguinis, in illa ubi succedit parte, nimiam ad rupturam ulque congestiorem; ita quod eadem in hac, que in cerebro sit effusione, præsto sit, est unique certum. Evincent enim id omnes, que morbum hunc antecedunt ac prænuunt passiones, quas inter præcipue, capitis cum vertigine remulencia, eisdemque præcipue in occipite, dolor pressorius & gravivus, formationis sensus in artubus, visus modo per caliginem, modo confusionem, turbatio, oculorum humiditas & intumescencia, aurium fufurum atque rinnus, memoriæ & ingemii aliquis hebetudo, somnus profundus, incubo & infomnis sopans, ventrum jugularium turgescencia ac faciei præter consuetudinem rubore suffuso.

## §. VIII.

*Diffusio difficilis.*

Quemadmodum porro ad inducendam sanguinis in certa parte congestiorem, præter eandem abundantiam, tum ipsius validior per spalmum in aliis partibus eo succitatus appulsus, tum etiam parvis congestiorem admittens quædam debilitas, concurrunt; ita, quin eadem hæc ad gignendam eam, que in cerebri vasis colligitur congestiorem, conferant, neutiquam dubitandum. Huc enim redit omnis vis & efficacia illarum causarum, quas ad ingignendum hunc morbum, seu antecedentis & procatarricticas conferre, ratio docet, experientia confirmat.

## §. IX.

*Plethoricæ maxime & ubi sanguinis febrem exortitur diffusi hinc multo citius.*

Ut de sanguinis plenitudine primum dicamus, propter eam omnino accidit, quod hæmorrhagia hæc frequentissime incidat in aetatem virilem, & juxta Hippocrati apb. 57. scilicet 6. ab anno quadragesimo ulque ad sexagesimum, ubi confecto corporis augmento, succi in vasis plus solito non modo accumulatur, sed & densiores fiunt. Hinc porro fit, quod qui temperamenti sic dicti sunt plethorici, nec non obeli, cum iis, qui laetam, otiosam & sedentariam vitam sectantur somnoque indulgent, peritulis hæmorrhagiæ huic admodum sint obnoxii. Idem accidere iis, qui propter suppressas, aut imminutas spontaneas hæmorrhagias, nec non omittas diu fuertas anæa artificiales subtractions, nimiam sanguinis copiam colligunt & coaccervant, uberius testantur medicorum observata. De neglecta sanguinis missione testes sunt Aëtia Medici. Vrsulorum. MDCCH. de naturæ hæmorrhagiæ suppressæ.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

Hildanus Cent. III. Obs. XI. de hæmorrhoidibus retentis Hippocrates, Avicenna & Zacutus Lusitanus, & qui primo loco ponendus fuisse, Lævi-fius, de febri. mortib. de mensibus & lochiis cohibitis cum Fontano Aëtia Nat. Cernof. passim; de Vicaria etiam mensium per os & naris vacuatione Hildanus Cent. III. Observ. XII.

## §. X.

Tanto vero magis tantoque certius hæc sanguinis redundancia ad inferendum quod dicitur damnum sit efficax, si accesserit altera illa causa, spasmus nempe in aliis externis remotione à capite corporis partibus. Hujus enim tam infesta est operatio, ut non tantum sanguinis progressus in ea, quam deninet parte, fibras stringendo & vasa coarctando, obicem ponat, verum etiam eundem urgeat, ut aliorum cum impetu ruit, ibi vasa opplet, diducat tandemque pertrahat. Spasmus autem in hæmorrhagiis ferme omnibus, atque etiam in hac, præsto esse, testatur juncta inagrudina pulsus durities, stricturam nervosarum in arteriis tunicarum productis. Testatur quoque antecedens extensorum relaxatio, nec non ille, quem quidam in artubus sentiunt, formationis sensus. Arque etiam hanc ob causam fieri censendum est, quod ex ætate teste, hæc hæmorrhagiæ sepe incurant, qui spasmus, in abdomine maxime, aliquandiu fuerint deventi, qui scilicet colicis passionibus, præsertim spasmoticis, hypochondriaco malo, doloribus ex calculo vesicæ item ex stidibus felleæ nec non diuturna alvi strictura laborant.

## §. XI.

Ex quo jam ulterius concludendum, omnia que spalmum inducere apta, in numerum causarum hujus mali esse referenda. Conspicuum hoc nomine maxime est animi affectuum effectus, iure imprimis ac terroris, que proxime in nervosas partes agunt, easdemque in anormalos spalmos motus adducendo, inaequalem quoque faciunt sanguinis circuitum, præter malum hoc sapienter accerunt; ubi inter alios Hildanus, Schenckius ac Forstius fidem faciunt. Idem efficere valet venerem cessum, quo motuum æquilibrio sublati, adeo in quibusdam exagitatione fuisse sanguinem, ut ipso in actu occubuerint attoniti, ex Henrici ab Heers Observ. XVIII. Bartholus de nostra de morbi ex intermissione venere oriundi, dissertatio, constat uberius. Neque tantum impendit animi, verum etiam corporis commotio, ad sanguinem versus caput urgendum multum facit. Nos inter alia novimus à mica panis asperæ arteriæ illapsa, vehementissimam concitamentum fuisse nissim, quam excepit hæmorrhagiæ in cerebro, lethali cum eventu.

## §. XII.

Magna quoque ad inducendum hoc malum vis est materię illi acri, corruptæ & veneris tantum non naturam habentis, que à succorum vitium commobio, salutaris admodum consilio segregata, ad corpus ambinem propellitur, quando, vel sponte incutit recedit, aut per injurias externas repellitur; quippe que nervosis internis membranis illapsa, spasticas atroces suscitât stricturas, per quas sanguis utique etiam agitur cum impetu ad caput ibidemque congeritur. Sic ex ulcerum manantium & fungiculorum coactis id factum esse, æstimo est Wepferus; ex coryzæ, pedum sudoris catarrhaliumque affectuum

*Spasmus in nervis partibus motum ad gradum latus hæmorrhagiæ conferunt.*

*Affectus animi sunt quocumque præter sunt mali causas.*

*Everitio, quoque in partibus externis sunt verapula sunt cum sunt præter sunt latus dicit afficiunt.*

suppressione, nec non retrocedente scabie, *Ephemerides natura curisformis*; ex arcanide & podagra emanante vid. *Med. System. rat. tom. III. p. 189.* nec non *Wepferus*. Haud dissimilem penitientem effectum in internis nervosis paribus edunt adstringentia, praepostere, imprimis in haemorrhagiis nimis data, de quo notabile exemplum a nobis observatum & quod pluribus expositum in dissertatione *Altorfii* habita, de viro *apoplexia ex inconsulta haemorrhoidum suppressione extincto*, cujus auctor est *Clarissimus Schultze*.

## §. XIII.

Merino preterea in numerum causarum huius mali venit ipse aer, cujus constitutionem insalubrem & praeternaturalem, epidemicum prorsus fecisse hunc morbum, *Lotenius* positivum, *Baglivi* & *Lancisii* affirmant. Maxime omnium vero generationi ejusdem faver frigus, quod fibras cutaneas stringendo vasque in ambitu coarctando, ad interiora ipsumque caput urget ac pellit humores. Unde *Hippocrates* jam Sect. III. aph. 23. hyemalibus morbis annuerat apoplecticum. Et *Fisj* notavit: quod, quando circa solstitium hybernus boreas, corpora valde comprimens & mercurium ea proptur in barometro sursum urgens venit, repente insurgit, dispositos admodum infestare solet atrox morbus. Neque minus ad producendum hoc malum muleum sicut subita aeris mutatio. Nos certe crebrius observavimus, quod, si diuturnam aeris intemperiem frigido-humidam, vento diutius ex occidente & zephyro spirante, subito ventus frigidus valde ex borea excipit; aut etiam intemperiem aeris calidam & humidam cito sequitur algida & consurgens atmosphaera constituit; facili admodum in hunc morbum dispositis fit lapsus. Quo etiam fundam. no nititur illa *Amati Lusitani Cent. I. curat. XXXVI.* observatio, quae admissio liberis corpori ex balneo fervido altissimi frigido aere, apoplexiam accessisse memorat.

## §. XIV.

Accedit causa, inter praecipuas numeranda, vasorum scilicet & membranarum cerebri imbecillitas, sive imminuta potentia motus systolici. Sine hac enim nec abundantia, nec appulsus sanguinis, ad excludendum hoc malum suffiunt; ut ubi adeit, membranae sanguinem appulsu minus vegete protrudunt, vasa eidem cedunt, lentus fit circuitus, stagnatio, factus tandemque ruptura. Est autem hac debilitas quandoque nativa & a parentibus accepta, qua fit, ut certis familiis, fatalis atque funestus sit hic morbus, uti exemplis *Hofstetii*, *Forestii*, atque *Sennertii* confirmantur. Alia demum accedit, quod patet in senibus, in quibus, quia partium omnium labascit robur, non mirum est, id etiam contingere in capite, ipsosque ea propter frequentius pati hos males.

## §. XV.

Inter causas, quae vasa ac membranas cerebri tono privato debito, potissima unque est, ingluvia, intemperantia atque ebrietas, ex cerevisis lupulatis, vino, maxime sulphuris fumo infecto, nec non visu spiritui. Horum enim ea indoles, ut sanguinem exagitant, expandant, eoque simul ipsa vasa per quae decurrit, distendant. Quod ubi accidit cerebro, manet illa distensio, systolica vis infringitur & ad concipiendam

morbosam stagnationem stemitur via. Unde merino hinc causam repetit *Henricus ab Heer*, quod septentrionalibus populis adeo frequens sit hic morbus, ac uti *Lancisii* observavit, nemo fere sobriae vitae addictus eodem corripitur. Nec dispar ratio eorum, quae capiti stuporem conciliant, opiatorum, ablynthia, lupuli, nicotianae, croci, carbonum vivorum, mulsi & cerevisiae fermentantis vaporum, quibus dum succi & caustici plus julto rarefunt ac distenduntur, impedius unque fit progressus.

## §. XVI.

Non minores momenti ad funestam in cerebro haemorrhagiam proripendam facit habitus corporis cachecticus cum dolore gravativo capitis punctus, sub quo fibrillae cerebri medullares & nervosae flaccidae & nimis lubricae evadunt, systolica & oscillatoria sua virtute privatae. Quae cerebri dispositio quod non modo ad haemiplegiam, sed & ad forem & sanguineam apoplexiam multum conferat, nobis compluribus est compertum exemplis. Observavimus etiam afflictos, praesertim quando truciorem hoc malum a polyposis coagulis intra cordis ventriculos, vel vasa pulmonalia haerentibus fovetur. Observavimus quoque frequentius est, non modo grumosas, sed & polyposas massas, sinibus cerebri, praesertim longitudinali, ac venis jugularibus internis inhaerentes, letalem sanguinis in cerebro effusione produxisse.

## §. XVII.

Dein hic qui a sanguinis effluxu in cerebro oritur atrox morbus, probe discernendus ab illo, qui fit a feri ibidem cessu, & quem consequitur hemiplexia & paralytica totius lateris, ac vita quidem servatur, sed admodum misera. Hec enim fit, quando quidem sanguis nimis copia cum impetu congeritur ad caput, non tamen vasa perurrit, sed propter diuturnam tantum stagnationem ferri per poros secedit, ac descendens vel ad cerebri basin, vel ad spinalis medullae alterutrum latus, eademque incumbens, liquidi subtilioris activi tum secretionem, quam influxum in nervos, intercipit, eoque partes in latere alteruto sensu privas ac motu. Ut praeterea conspicuam illam differentiationem, quae affectus inter soporosos & hunc quem delineavimus intercedit, dum illi sensum non simul ac semel accedunt, neque sensus & motus abolitionem, sed tantum sub somnolentia ob nubilationem punctam habent.

## §. XVIII.

Quod ceterum *Hippocrates* de apoplexia Sect. II. aph. XXXII. consignavit prognosticon, id utique veritati responderit egregie: *vehementer, scilicet qualis est quae a sanguine effuso, plane non, debiliores autem, sive quam sanguis stagnans & serum secedens gignunt, diffuciliter solent*. Nisi enim post venae sectionem & congrua adhibitis auxiliis intra XXIV. horas sequatur levamen & symptomata remittant, spes salutis decollavit, & ex observatione *Aureliani* tertius dies longissimus moriendi terminus. Ilique funestus evenus menandus tanto certius, si senes invasit plethoricos morbus, ubi jam vires fractae & cerebrum debile; si inebriationem summas, gravemque animi affectum itam & terrorem excipit; aut etiam si alii antea perpessus morbo supervenit. Mortem autem insilire concludendum:

Stans caustici ut  
et polypos  
in morbo  
sione.

Causa  
pneumonia  
inflam-

Apoplexia  
sanguinis  
diffundenda  
et ab eo  
quod fit a  
feri ibidem  
cessu.

Pneumonia  
latae co-  
mune  
sunt.

In com-  
mune  
sunt.

Quae ha-  
emorrhagia  
cerebri, si  
potenter  
sunt.

Merino  
quodque  
fit apople-  
xia & in-  
fecta aere  
mutantem.

Merino  
quodque  
fit apople-  
xia & in-  
fecta aere  
mutantem.

Ad quem  
distensio in-  
creascentem  
vires ga-  
mna.

si stertor magis magisque ingravescit cum respiratoris difficultate; si cor palpitat vehementius arteriarumque pulsatio admodum magna, dura simul atque inæqualis; si, ubi paulisper ad se redit animus, aliena tamen est mens; si convulsivi motus unius lateris ipsiusque pectoris accedunt, frigidi præsertim in superioribus sudor hæret guttatis, ipsa exspiratio frigida est, & urina, & alvi stercorea sponse elabuntur.

### THESES THERAPEUTICÆ CUM CAUTELIS.

#### § I.

Cursus  
primæ  
inflam-  
mæ.

Quum adeo præcepta & periculofum sit hoc malum, cito unique ac tempestive succurrendum, ubi adhuc saluta spes, ac æger in loco temperato & lucido ita collocandus, ut cervicæ non nimis declivis ac supinus, neque etiam planus erectus cubet, pedesque inprimis, vel plumbis, vel integumentis, à frigore defendendi ac fovendi. Ipsa autem curatio respondeat causis. Inter quas quia præcipua antecedens ipsum effluxum sanguinis redundans in cerebri vasis congestio eminens, cum imminuta morrice vasorum ibi & membranarum potentia, eo quam maxime medicatio dirigenda: nam ut sanguinis motus & impetus a capite divertatur; tunc etiam ut partibus, ibi à robore defectis illud reddatur, ad redigendum iterum in motum, qui subsistit sanguinem.

#### § II.

Principium  
secundæ  
inflam-  
mæ.

Ad exsequendum primum, ab omni ævo seu efficax æstimatum, & ab ipsa natura comprobatum remedium est in sanguinis missione, mox in principio mali, sine mora instituta. Huic merito primas in medicatione detulit cum *Nymæno Dodonæo observ. medicæ. cap. VIII. exercit. præf. p. 385.* memorabili exemplo venale LXXII. annorum, per eam ab apoplexia liberatæ, confirmat. Quin ipsam naturam hanc monstrare viam, ex *Lancisi* observatione patet, qua senem fere septuagenarium apoplexiæ prodromis affectum, effusissima narum, ad duodecim libras hæmorrhagiæ, sanatum esse memorat.

#### § III.

In remota  
dici loco.

Quo vero pacto sanguis fit subtrahendus? non omnes eodem modo definiunt. Nonnulli, ac inter hos potissimum *Cathartæwood*, in libello Anglice edito, arteriorumque omnibus aliis sanguinem mittendi modis anteponebam esse rationibus & exemplis docet. Cui sententiæ calculum adjecterunt Germani quidam Medici, inter quos etiam *Loewe* ab *Erlsfeld in Medic. præf. Nec improbandum videtur consilium, ac dolendum modo, nostris in oris, ob Chirurgorum ineptitudinem ac remedia novitatem, illud adhibere non esse integrum. Plurimi venæ sectionem fuisse; sed quo in loco secanda sit vena, jectum in diversum abeunt. Alii venas in brachio, alii in fronte, naribus, nec non sub lingua incidere jubent. *Morgagni* venarum occipitalium incisionem eximie collaudat *Advers. anat. VI. p. 108.* quia hæc venæ intra cranium cum utroque laterali sinu communicant, easque propter instituta ipsarum sectione, sanguis, quem in sinu convehitur etiam, avenerit, atque hinc reliqui sanguinis, qui per eodem sinu progreditur, copia minuitur aliquantum, motus autem non*

sine emolumento augeatur. Quia vero harum venarum trunci profundius siti & non nunquam in plures minoresque ramos divisi reperiuntur, cucurbitulas & crebras aliaque incisiones æneferendas putat. Quo quidem modo jam *Zacutus Lusitanus Med. Princ. lib. I. lib. XXXIII.* bis apoplecticos se sanasse refert. Ab exercitissimis tamen & numero plurimis medicis *Severino, Lancisi, Freindio*, à nobis in *Medic. ration. system. tom. III. p. 608.* venarum jugularium incisio laudatur, quia cerebro valde vicina & quam optime spatium libertatemque fluendi facit sanguini cerebro impactio libique copiosius congesto.

#### § IV.

In sanguinis missione tenenda hæc. Instruatur quam potest fieri cito, priusquam ad astionam usque dilatate arteriæ & à sanguine effluo cerebrum intundantur. Foramen inflatur facis amplum, ut sanguis citatiori & liberaliori flumine effluatur, quia lentus effluxus juvat nihil. Adornatur in loco parti affectæ proximo, brachio scilicet vel jugularibus. Quantitas sanguinis emittendi, ex valorum plenitudine, pulsus viriumque habitudine determinetur, semper tamen sit larga. Si corpus phleoricum, temperamentum sanguineum, morbus à sanguinis evacuatione impediens oritur, iterum sanguinis subtrahito, quin repetatur, quam *Dionis* perhibeat, sepius demum incitum venam profuisse. Sed primum celebretur in pede, postea in brachio, hoc collo, ne, si secus sit, dato in parte superiore exitu, ex inferioribus & corpora ambina ad caput major invitetur affluxus.

Cursus  
tertius  
inflam-  
mæ.

#### § V.

Præter venæ sectionem, ad divertendum sanguinis à capite affluxum, præstans virtus eorum, quæ alvum irritant fortius, non tamen drastico-illum illorum catharticonum, quæ venæ quippiam reconduunt, sed quæ iudolis innoxie, nervens tantum intestinum tunicas exstimulant efficaciter & ad motum sollicitant, qualia sunt salia, germæ scilicet, Sedlicense & ammoniacum. Hæc indenda paulo liberaliori dosi clystibus, ac præterea addenda speciet, quibus flatus discutiendi & roborandi virtus inest, cujus indolis ruta, salvia, majorana, saureja, thymus, serpillum, flores lavendulæ, liliorum convallium, chamomillæ Romanæ, item lemnis carvi & anethi, unicum oleis ex pressis, rutaceo, chamæmelino ac laurino. Et sic confecta ementia non nimis copia, sed crebro, injicienda, ne iterum elabuntur, & quidam ministerio syringæ, quo eo altius penetrant ac pervadant.

Cursus  
quartus  
inflam-  
mæ.

#### § VI.

Quæ vero nervosâ robore exuas partes roborant & ad motum exstimulant eoque humoris subsistentis dissolutionem promovent, exterius partim, partim interiori admoventur. Exterius præstans virtus volatilium urinosorum, mixtorum cum cephalicis; inter quæ palmam fert in liquida forma salis ammoniaci cum calce viva paratus spiritus, rutæ & majoranæ, vel lavendulæ oleo imprægnatus; in sicca forma sal volatile salis ammoniaci siccum, illidem oleis irritatum. Quæ vel naribus ad odorem adrota, vel pluma ad interiora narum admixta, vel etiam per calammum scriptoriorum insufflata, excitant efficaciter. Eundem in finem locis exquiritioris sensus, maximeque pedum plantis, admovent solent ea, quæ

Cursus  
quintus  
inflam-  
mæ.

doloris quendam sensum ibi excitant, sicque universum nervosarum partium systema ad contractionem sollicitant. Quo nomine notæ sunt frictiones asperiores cum panis aut excutia institutæ, nec non unctiones; notæ quoque vesicatoria ipsique cauteria actualia, quorum novum & a Lauriso approbatum adhibendi modum, evulgavit *Domenicus Alstherelli* in tractatu Itala lingua de apoplexia edito.

## §. VII.

Interius autem si deglutendi facultas superest, aut reddita, nequaquam danda spiritiosa, aut volatilia; quippe que sanguinem, jam tum assuantem, magis commovent ac rarefaciunt, easque propter a *Pikarnio* de *circul. sangu.* merito rejiciuntur. Sed propinanda, et, quæ analepticam, excitantem & simul discutientem virtutem possident; inter quæ ipsædatis vires diaphoreticarum fixorum, cum cinabari, succino & niero, quæ in pulveris forma cum aquis congruis, vel melius adhuc in potionem redacta porrigi possunt. Nobis quidem frequentioris & probati usus mixtura hæc: recipe aquæ litorum convallium cum vino, aceti destillati ana uncias duas, spiritus cornu cervi succinaci drachnam, animonii diaphoretici, cinabaris, lapidum cancerorum ana drachnam semis, syrupi corticum aurantium drachmas duas. M. Cui non nunquam, ad levem quendam stimulum nervis stomachi fibrillis cum omnibus reliquis consentientibus inferendum, tantillum tartari emetici adijcere solemus, ne tamen vomitum moveat.

## §. VIII.

Sed quia hæc cerebri hæmorrhagia non tantum oppido periculosa, verum etiam, licet curata fuerit, facile repetit; haud postrema medentis cura eo unque dirigenda, quo ejusdem tam accessum, quam recursum, arceat. Jam recte utique cum *Mariano* & *Ballerio*, sensit *Cels.* *Hippocratus*, lib. III. *influx. med.* apoplecticos, quorquos sint, esse plethoricos. Ideo, ut sanguinis redundantia minuietur, danda est opera quam maxime. Hunc autem in finem nunquam non utilis sanguinis missio, maximeque illa, quæ circa æquinoctiale instans solet tempus, quo solennes fere esse solent sanguinis & humorum commotiones, namqueque conatus ad eliminandum id, quod est in corpore superfluum. Saluti ea propter etiam est, vel ipsius *Hippocratis* testimonio, hæmorrhoidum fluxus, maxime is, qui eundem antea jam experit. Sed eundem sine damno provocare & promovere, est utique artis. Nos ad obtinendum hoc, præter frictiones in ano & admittis lotus, maxime proficuum censuimus sturidum applicationem. Quibus utilis adijungatur usus elixiri balsamici, ex aloë correctæ, croco, myrrha & succino, cum menstruo fixivioso aquoso, non spiritioso parati, nec non pilularum balsamicarum circumspecte daturum. Quæ tamen hæmorrhoides movent, minime adhibenda, si nulla ad fluxum adeit dispositio, sed tum demum, quando emanare, aut parcius fluere incipit, alias, præsentæ plethoræ, plus nocent.

## §. IX.

Dein ad vindicandum ab incurfu hujus mali corpus, maximum utique est præsidium in debito alvi secessu. Etiam generalis fere canon est practicus: neminem facile capios morbos insinuat, jcau officium ritæ facit alvus. Interim

tamen alvina hæc excretio nequaquam proficienda validioribus drasticis, quæ nervas intestinorum tunicas impetuosius aggrediendo, spasmos suscitant in eis, & inæqualem sanguinis circuitum inducunt. Blandioribus potius & naturæ amicis hocexpediendum. Interque commendabilia maxime rhabarbarina cum salinis abstergentibus, nec non pilule polychrestæ ac clysteres.

## §. X.

Quæ præterea à quibusdam commendantur, aquæ & balsama sic dicta apoplectica, tam interne usurpanda, quam externis temporibus, naribus ac nuchæ insungenda, ad curanoneum æque ac præservanoneum hujus mali, nostra quidem sententia, in eis, quibus mens hæmorrhagiæ cerebri, plethorici, sanguineis, virilis ætatis personis, sunt potius perquam nociva. De quo grave est testimonium *Dodonæi* *Simp. hist. lib. VI.* in habens: *ubi humorum copia adeit, præsertim sanguinis permixtorum, non tutus hujus (stillantis lavendulæ liquoris) usus est, sicuti neque compofitionis, quæ ex stillatis viis, in quo hujusmodi herba, flores, semine & aromata macerata sunt, conficitur, quam plerique temere & indifferenter exhibent. Nam calidiorum hujusmodi capni impletuam usum, & morbus intendunt, & æger in periculum inducitur.* Tuiora longe insula theiformia cum aqua, ex herbis cephalicis, melissa maxime, betonica, salvia, cum cardamomo minori condita, quæ frequentius sorbilla, sanguinis motum æqualem servant æque ipsi etiam cerebro nervique conducunt.

## §. XI.

Nulla vero ab omnibus erit expectanda incunctantia, nisi simul accesserit exactum in vita victuque moderamen. Potissimum autem ad præservanoneum momentum fertur quies cum abstinentia, quo *Celsus* magnos morbos curari perhibet. Quare vitanda ciborum repletio immodica eorumque varietas; vitanda vina dulcia potentia, omniæque inebriantia, valida corporis exercitia, maxime post cibum. Neque is qui malum hoc metuat post cenam statim ear cubitum; neque etiam capite nimis declivi cubet. Si air ita comparatus, ut generi hujus mali sit accommodus, corpus ei non continentendum, sed pedes maxime à frigore defendendū, quandoque etiam pediluvio tepido immittendū, & in conclavi temperate calido manendum. Monus subinde insinuendus est placidus, animus liber servandus atque tranquillū, somnus nec nimis longus, nec nimis brevis sit. Verbo vitentur omnia, quæ supra in causam peccatarèticarum numerum relata leguntur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Comes illustrissimus, fere quinquagenarius, sanguine succique plenus, aliquot ante annos affectus fuerat aliquoties paralyti, leviores tamen, cum loquendi difficultate. Inde petiit vicinas ditioni suæ Carolinas, iidemque usus est tam interius, quam exterius. Sed quam inconsulto id fecisset medico, neque sanguinis missione, neque alvi purgatione, corpus prius ritè præparasset, accidit, quum in balneo nimis adhuc calens descenderet, ut subito sensum tam internum, quam externum ulu privaretur omni, sequuta

Constitit  
interius  
danda sunt  
Givanaia.

Comes  
interius  
danda sunt  
Givanaia.

Ad artem  
dum hoc  
malum  
necessaria  
vires spiritus  
cornu cervi  
succinaci.

Ad artem  
dum hoc  
malum  
necessaria  
vires spiritus  
cornu cervi  
succinaci.

Plurim  
hæmorrhoides  
in diffusi  
in. p.  
moria.

Ad artem  
dum hoc  
malum  
necessaria  
vires spiritus  
cornu cervi  
succinaci.

Ad artem  
dum hoc  
malum  
necessaria  
vires spiritus  
cornu cervi  
succinaci.

sequeuta mox respiratio valde citata, cum convulsivo quadam pectus attollente motu, arteriæ pulsarunt valde cum quadam duritie & facies intense rubuit. Secta fuit vena, admodum quoque naribus stertuatorium, quo vehementior pectoris concussio cum fumoso stertore inducta. Latus sinistrum tonum omnis motus ac sensus fuit expertus, manus tamen in eo convulsa perpetuo agitata. Mens plane non sibi conscia & intra quinque horas excepit mors. Post quam ingens sanguinis ac feri sanguinolenti copia, per viginti quatuor & longius horas, è naribus manavit.

## Epicrisis.

Si ulius thermalium aquarum ad balneum usus circumspiciendum posset ac prudens, cerne est Carolinurum. Harum enim ea indoles, ut terreo calcareo, nec non martiali quo pollent principio, corpora superficiem constringant valde & sanguinem ac humores ad interiora agant. Atque hinc est quod cedematosos pedum tumores abigant cito, ac ubi corpus spasmi obnoxium est finalque vasa sanguine turgent, graves passiones, cordis palpiationem vehementem, capitis dolorem acutum, cum virium dejectione & artuum debilitate inducere, quam febrem continuam æque ac intermittentem accendere valent. Ea vero propter etiam non mirandum, quod in illustralissima hac persona, sanguine retardante & presente jam in capite ad humorum stagnationem dispositione, usu inconsulto, sanguis cum impetu fuerit congestus ad caput, ac tam in ipsius interioribus, quam exterioribus vasa rupta, lethali cum evenit. Id enim luculenter arguit sanguinolentum illud largum post mortem narium pressurium, quod factum in cerebro hæmorrhagiam semper prodit. Quod autem stertuatorio admodum increvit spirans cum stertore difficultas, id usque monet medentes, ut in apoplexia sanguinea parum eorum quæ stertuamenta movent & circumspiciunt, sedato prius sanguine ad caput impetu, habeant usum, ne sanguis majori cum vehementia ad locum cui stimulus impressus ruit mortemque acceleret.

## OBSERVATIO II.

Femina generosa, quinquagesimum ætatis annum agens, constitutionis sanguineæ & tæxuræ admodum generæ ac molli, copiosum semper experta fuerat sanguinis per menses fluxum. Sed quum in quadagesimo nono anno ob atrox rationem reineretur, ipsa de anxietate & angustia præcordiorum, inflatione in latere abdominis sinistro, gravitate & flacciditate artuum, vertiginoso capitis ac gravativo dolore, cum somno inquieto & interrupto, graviter corpit conquiri, licet vulnus rubicundum admodum exhiberet. Accedente tandem hyeme, adeo exacerbata fuerunt hæc omnia, ut medici auxilium implorare cogeretur, qua ad discutiendos flatus salia dedit volatilia oleosa, itemque carminativas essentias, ac præterea porrexerit purgantem pulverem, ex resine jalappe scrupulo dimidio ac tartari viriolati grana sex. Quo quam scies non sine acerbis torminibus fuisset purgata, insequenti nocte infusa correpta est apoplectico, pulsu tamen & respirazione adhuc integra. Secta fuit vena prolixius & injectus chylister acris; quibus ad finem quidem rediit atroxitas, sed super-

fuit aphonia magnæque capitis debilitas. Hæc ut tolletet & recidivam arceret morbi artifex, obtulit denuo purgantem cum aqua liliorum convallium pulverem, ex resine jalappe grana XII. & viriolati tartari grana X. Quo afflatus, elapsa vix hora, rediit apoplexia & miseram brevi tempore tradidit morti.

## Epicrisis.

Inclinant unique in sanguineam apoplexiam sanguineæ formæ desinente mensium fluxu, etque propter venæ sectione opus habent quam maxime, ne accedentibus aliis causis, in actum erumpat dispositio. Ad quod si quicquam aliud efficax, est certe usus purgantium validiorum ac tormina inducentium. Quæ inot merito numeranda sunt multis effectibus infamata jalappe resina in pulvere data; quippe que deglutita in stomacho facile coit ac plicis nervæ intestinorum tunica adherens, spasmos ciet ac oppido dolorosas tensiones, quibus ungue sanguis urgetur ad superiora, ibidemque effectus edit exitiales. Quo magis puer, graviter excessisse medicamentum, qui accedente post obitum hoc purgata apoplexia levior, hac remittente, idem obtulit iterum in tanta copia, eoque recidivam induxit graviozem simul atque lethalem. Ac licet haud adeo incongrua videri possit noxios humores ad inferiora deducendi invenio, clementioribus tamen laxantibus, vel etiam chylisteris id fuisset perficiendum, non is, quæ inest illis spasmos, ex torminibus cognoscendos, inducunt, eoque sanguinem ad caput urpando, ut ibi pernumpat & lethum inferat, faciunt.

## OBSERVATIO III.

Theologus celeberrimi nominis, quinquagesimum notidum ingressus annum, floridæ & sanguineæ constitutionis ac vividi ingenii, sana semper ac vegetus; ob peculiare quoddam ejus facinæ ac exaltationis infellex casus, in impensam animi perturbationem cum anxio dolore & morore conjectus, & valde inquietus sub parco etiam somno, ad levandum animum & suppri-mendam melancholiam, poculis vini, quæ alias etiam amabat, paulo largius se subinde invertebat. Procedente inde tempore ciborum amittere appetentiam, & vacillante digestionem perpetua fere vexabatur ructibus sine ullo ex alvo conspuita prodeunte flau; labascere incipiebant vires, ingenti quoque præcordiorum dolore & angustia premebatur, moestas simul mentem fatigantibus cogitationibus, repentine & inopinatum cum omnium sensuum amissione cecidit in terram, pulsu tamen & respirazione manente salva; collectis vero intra bihorium, post remedia idonea data, paululum viribus, ad se rediit, sed inde de genarum imbecillitate, de torpore & languore dextri lateris, nec non de debilitate memoriæ anxius insinuebat querelas. Proprio fusu peti Carolinas, non modo ut affectum depulset hypochondriacum, sed cinere & conversatione mollibus animo exuaret afflictionem. Quam ego jam præsentem effem, exiit meum etiam questiv consilium, suasi ut moderatus biberet temperatorem illum fontem vulgo *Möhlen-Brannen*, quo per viginti dies insigni cum euphoria utebatur. In reditu vero quam celebrem pertransiit urbem, invitatus ab amicis, laudique convivis exceptus nimium indulgit genio & vini potui. Sub nocturno frigido coelo in potiam revertis, de spirandi angustia

*Angustia  
spirandi, in  
gustatione  
& inha-  
litione munda  
ta.*

*Ex pur-  
gante  
acris re-  
cidivam in-  
duxit.*

angustia & anxietatibus conqueſtus fuſiſſe diaphoreticos quosdam pulveres, a quorum uſu purpura rubra in univerſo ſere corpore comparere coepit, conqueſcenti ſimul de inſimam capitis dolore medicus in conſilium vocatus venæ ſectiōnem in pede commendavit. Explorans meam de hoc remedio ſententiam, proſus eam diſſuaſi ob meum recurſus purpuræ ad interiora. Medico nihilo minus magnum periculum ex neglectu venæ ſectiōnis prædicente, admiiſit eam, quæ in pede ſanis largiter celebrabatur. Non ita multo poſt præcordialis anxietas majora fuſiſſe incrementa ſub extremorum refrigeratione, & purpura diſſipante improvſo vehemens inſultus ſequēbatur apoplecticus cum omnium ſenſuum amiſſione, cum ſtercore, pulſu valido & inæquali, facie exiſtente tumida & rubicunda. Quo gravi affectu intra octo horas Vir magnæ doctrinæ & ingenii in meliorem vitam tranſferebatur.

#### *Epiſiſt.*

Pura in hac hiſtoria ſunt memoratu digna quæ in uſum pathologico-therapeuticum animadverti poſſunt; ac primum, quod in homine ſanguinei temperamentī, quando morori diurno & gravi adiungitur prava diæte ratio, inque primis immoderatio vini uſus, ſyſtema nervo-  
rum ita infirmari poſſit, ut pathemata formaliter

hypochondriaca progignantur; quæ non facile alias in ejuſmodi temperamentum incidunt. Notandum quoque eſt, quod ob diuturnas mentis fatigationes & labores cum incore diutius inſeſtante conjunctis, tam imbecille rediſſe poſſit cerebrum nervorumque ſyſtema, ut ad inſultus apoplecticos evadat diſpoſitum. Inſuper noſtro in ægro primus inſultus ſuit leviffimus, à ſolo impetuofiori ſanguine ex imo ventre ad caput per ſpasmus obortus, qui venæ ſectiōne, ſtagnantem in vaſis cerebri ſanguinem reſolvente & divertente, brevi poſuiſſet ſubmoveri. Quia vero nullus affectus facilius recurrit, quam apoplecticus, præſertim ſi non accurata de exquisita vivendi ratione, idoneique remediis avertatur; factum hinc eſt, ut poſt uſum Carolinarum, quæ magnum quidem hypochondriacorum præſidium ſunt, minus vero morbis capitis favent, non obſervata accuratiori diæta, gravior dein inſultus ſubſecutus fuerit & quidem in noſtro ægro lethalis, dubio procul, quod a largæ venæ ſectiōne purpurea materia ad interiora violentia majori converſa, ſpasmus ſuſcitavit, quibus ſanguis impetuofius adactus ad caput, tandem intus vaſa diſruperit. Cæterum de apoplexiæ aliis cauſis, ſpeciebus, & obſervationibus huc pertinentibus, in Parte III. de morbis ex æonia oriis, ſuſius egimus.



## S E C T I O II.

D E

DOLORIBUS ET SPASMIS VARII  
Generis Internis & Externis, nec non Artbricitis  
& Rheumaticis.

## CAPUT I.

De Doloze Cephalico.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Definitio.



**D**OLOR cephalicus est valde molestia in membranis capitis nervosis à variis causis distractis suscitata sensatio, quæ pro differenti gradu & loco variæ & gravia faciat post se trahit symptomata.

## §. II.

Doloris  
ræp.

Dolor diversæ in capite occupat loca, cujus rei nulla alia subest ratio, quam quod diversis intra & extra cranium nervosis membranis illud instructum sit. Extra cranium occurrit tenuis sed sensu valida & exquisitæ sensationis membrana, quæ immediate id cingit, & à carotide posteriori parte arteriolas; ramulos vero nervorum è vertebra colli & pari septimo cerebri. Cohæret autem pericranium cum multis cranio vicinis ac per suturas cum duræ matris exteriori lamina: in qua membrana frequentior cerebri doloris cephalici sedem reponimus; quod inter alia, idonea ad leniendum gravem dolorem externe applicata remedia, sub forma emplastris vel epinematibus, item ex fonte chirurgico, scarificationes, setacea, cauteria inusta & vesicatoria, clare sensu atque perspicue demonstrant. Neque tamen excludere hæc volumus ipsam quæ caput regit cutem, præsertim anteriorem ejus partem vicinam pericranio, à qua etiam separari potest, & quam plura sanguifera percurrunt vasa, tunc præcipue doloris ledem constituentem, ubi à magis solet esse obtusus, gravatius & pressorius, cum in pericranio magis sit acutus.

## §. III.

In dura  
matre.

Neque immunis à doloribus est interior, quæ cerebrum cingit membrana, sic dicta dura mater, quæ ex fibris valde tendiosis & nervosis contexta atque ex duplici lamina conflata est, & à quinto & septimo nervorum pari ramos accipit; arteriolas vero tribus donata: prima oritur à carotide interna, quæ ad anteriorem duræ matris partem abis, secunda, à carotide externa, quæ per foramen proprium intrat cranium & ad mediam partem vergit, tertia, à

vertebralis internæ ramo externo, quæ per foramen jugularis internæ ingreditur cranium & ad posteriorem duræ matris partem spectat. Rarior quidem ibi dolorum sedes, sed multo periculosior: nam si sanguis in ejus vasculis diu stagnat, vel copia aut acrimonia eorum vim motricem valde ledit, quam facile graviozem morbum capitis; atque in acutis phrenitidem vel convulsionem, præsertim si dolor sit pulsatorius; in chronica morbis paralyticis, hemiplegiam, nec non affectus soporosos post se trahit.

## §. IV.

Reliquæ tenuis illæ membranæ, quæ cerebrum immediate involvunt, utpote pia mater atque arachnoides, quæ posterior tamen portus externa piæ membranæ videntur, celluliform interstitium efformans per quod vasa repunt, nostra quidem sententia minime molestæ sensationis sedem continere videntur, eo quod careant fibris tensilibus nervosis elasticis, atque etiam nervulorum ramulis ibi non conspiciendis. Denique membrana valde exilis & sensibilis, quæ ex tunica piniæ natiuitur, & sinus oculi frontis investit, non raro præbet acutissimæ doloris domicilium.

Reliquæ  
membranæ  
sunt  
non  
confusæ.

sensu.

Sed sensum  
morbosum  
piniæ.

## §. V.

Ingens doloris in capite, ratione loci quem occupat, item ratione vehementiæ ac diuturnitatis discrimen est, quo inde etiam diversæ à auctoribus ipsi imposita sunt nomina. Nam si levior est, & modo partem capitis afficit, dicitur cephalgia; si diuturnior & gravior, ac totum caput occupat, cephalæ nomen accipit, quam GALENUS ita optime describit: *pr. 3. tr. 2. cap. 35. cephalæ est dolor totius capitis diuturnus atque solubilis, qui à parva occasione vehementer habet exacerbationes, adeo, ut neque strepitum, neque vocem violentiam, neque luminis splendorem, neque motum tolerare possit, sed tranquillitatem & obscurum cubitulum querat, idque ob doloris vehementiam; quippe alii se malleo percuti arbitrantur, alii caput contendi distendique sentiunt, ac pauci ad oculorum radices dolor extenditur: qui in dolore totam capitis membranam vehementer affellam esse non dubitant.*

Discrimen

Inter  
cephal-  
giam  
& cepha-  
læam.

## §. VI.

Sæpius fit, ut unum tantum latus dolor obfideat, altero salvo & sine dolore; tunc græce hemicrania vocatur. Interdum etiam in certo tantum verticis loco circumscripto fixus hæret, ita ut vix magnitudine grassum vel imperialem æquet, mulieribus & quædam hysterice fami-

Inter hemi-  
craniam& clavam  
hæc. hanc.

laris;

latis; qui clavi nomine insignitur. Quandoque dolor frontem & loca supercilia acutissimus obfidet: alius solum fyncipus, alius occiput, alius verticem prope sinuam, alius tempora magis occupat. Neque una eademque solet esse sententia: nam alius acutus, pungivus, lancinans dolor est, alius confusus, gravivus & pressorius, alius rursus contrictorius, quidam ardens & inflammatus, alius frigidus est, qualis in mulieribus potissimum verticem ferire solet, ut quasi se glaciem gelidam in ipso gestare conqueantur.

## §. VII.

In genere omnis doloris cephalici causam, à libricori & æquabili sanguinis per vasa sanguifera, quibus cutis capitis, pericranium, ipsaque dura mater instructa sunt, progressivo & circulari motu impedito, tanquam a fonte derivamus. Nullus certe medicorum exacutus, & secundum legem mechanicas, genesis doloris hujus demonstravit, ipse HIPPOCRATE, qui lib. de flatibus §. 13. ita rem perbelle exprimit: *sanguis, inquit, transit in capite magna angustia coarctatur, cuius abundantia ac coarctatio dolorem excitat. Sanguis cum ipsa natura calidus existens, ex coarctis, per angustiam viam transit celeritate non potest, cum multa impediantur sicut obstructa & oppelluntur; quapropter etiam pulsus circa tempora. Qui sane locus, Hippocrati non penitus incognitus fuisse sanguinis progressivum motum ex artibus in venis, tam abundeque declarat: obstructa enim, que libricorem transiunt ducunt vocat oppelluntur, que in vasis revolutibus, quia carent impulsu, unde tardior & lentior motus, consistunt. Id quod etiam dissectiones ex gravi cephalica mortuorum confirmare videntur: nam teste BONETO, WEPFERO, PECHLINO aliisque, sius ceretui, jugulares etiam internæ & externæ venæ, sanguine mucoso crasso, imo pseudopolypis subinde infectæ fuerunt repente: quod etiam non in malo epileptico demorui aliquoties observavimus. Se enim major sanguinis copia ad caput ferretur, quam ipse venæ eadem celeritate reducere possunt, vasa arteriosa, & inter hæc maxime minima de capillaria, a congesto sanguine valde distenduntur & ipsæ membranæ insigniter tenduntur; qua ratione tristis illa sensatio excitatur.*

## §. VIII.

Notandum vero hoc loco est, quod pro conditione, intemperie vel vicio sanguinis, si vel nimia copia peccat, vel nimis spiritus & glutinosus, vel sero valde acri repletus est, alia etiam atque alia inde doloris species enascitur. Nam quando is impetuose & nimia copia in membranas irruit, quod præcipue de pletoricis & ubi congesta per narces fluxio suppressitur, nec non de adhecentibus valet, dolor totum caput occupare solet; quod tunc calet, tumet, dolet, rubet, vasa turgescunt, forisque pulsant, præsertim circa jugulum & tempora, narces audire & sicce sunt, facies ardor & sitis occupat. Talem dolorem veteres a causa calida suscitari dicebant.

## §. IX.

Ubi sanguis in vasis capitis collectus multo scaturit de macido sero, vel ex obstructa aut suppreffa, quod sæpius accidit, coram aut gravissime, dolor in capite oboritur, tunc magno gra-

vativus, obtusus, pressorius, maxime in antica parte atque in fronte esse solet, quandoque etiam caput instar ponderis grave est, ut vix in alium possit elevari. Non raro evenit, ut in ipsius capitis cute, in vertice præsertim, tumores quibus digiti imprimi possunt exsurgant, palli interea languido, facieque livida existente. Quod inde à longo jam tempore CELSUS notavit, lib. IV. cap. 2. ita differens: *præter hæc invenitur genus doloris, quod potest longum esse, ubi humor cutis instat, eaque intumescit & prematur digito rectu. Veteres hujusmodi dolorem à causa frigida deduxerunt.*

## §. X.

Deterior doloris & magis perniciosa species est, qui accidit lue venera valde afflicti, cum materia serosa, acris, caustica firmius pericranio infidet & interdum ipsum cranium cariosum reddens difficillime remediis cedit atque sanescit. Eiusdem generis esse videtur, qui a materia salino-calcifica indolis ad habitum corporis propulsa & postea retrocedente nascitur; uti id in arthride, podagra, scabie, erysipelate capitis, gutta rosacea laborantibus, sæpius in praxi observavimus. In variolis & morbillis, antequam peccata materia nature robore ad extimam eueni prope elinur, vel, quod peius, si repellitur, atrox fæq cum febre aut delirio, vel io infantibus cum epilepsia, dolor caput torquet; quo cala, ubi materia erigua calidiora dolorem elicit, præternaturalis & vchemens membrarum potius strictura, quam earundem distensio, que a copia feri de sanguinis magis fit, locum habet.

## §. XI.

Sæpius in capite dolor est acutissimus, fere intolerabilis, fixus & diutius assigens, qualis totius corporis & animi vires pellendur, sonnum tollit, concoctionem impedit, nauseam & ciborum fastidium parit, & alios sæpe gravissimos capitis & nervorum morbos, ut sunt vertigo, oculorum caligo de fusissio, coecitas, aurium tinnitus, convulsio, epilepsia, post se trahit, atque etiam reliquis nervosis corporis partibus in consensum trahendo, vomitum, alvi stricturam, extremorum refrigerationem, faciemque moribundo similem elicit. Id quod a veteribus quoque animadversum videmus. CELSUS enim lib. IV. cap. 2. scribit: *cephalæ nota sunt: error validus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, vocis suppressio, corporis refrigeratio, animæ desectio.*

## §. XII.

Ad genesis doloris cephalici quod attinet, consideratione etiam digna est nativa vel à parentibus tracta nervosum capitis partium immobilitas; pars enim quod debilior, id est vitonica & elastica sua naturali valde privata, eo facilius & promptius humorem alienum admittit, recipit ac retinet, atque inde stagnatio, partiumque nervosarum atilio contrigit. Novimus sæpius cephalalgiam hereditariam, à parentibus debili capitis constitutione prædicta acceptam; vidimus etiam a diuturno animi morore, a præposita Venere, a nimis lubricationibus & mentis satiationibus, item a nimis creta sanguinis missione, vel effusibus hæmorrhagiis caput ita debilitatum fuisse, ut graves inde dolores, nec non alii, qui vehementer caput infestant morbi, exorti fuerint.

## §. XIII.



## §. XIII.

*Ex his re-  
bus quae  
sunt frigoris.*

Neque ex classe caularum, quae vocantur remorae, excludi debet frigus, quod uti omnibus nervosis partibus, si jam dolore premuntur, infestum est, & liberam transpirationem per cutim impedit: ita maxime nocet, si capiti denudato admittitur, vel si id non satis contra nocturnum frigus fuerit munitionum, vel etiam, si a longo sermone vel motu corporis nimio, aut a sole, aut ab ira, vel ab ingellis largius potibus spirituosus & inebriantibus incalciscens pluvioſo caelo, nocturno praeteritum, repente exponitur.

## §. XIV.

*Cephalalgia  
symptoma  
maius.*

Memorandum id quoque est, cephalalgiam frigidam tantummodo esse symptomata, quod morbo detum accedit. Ita frequentius febribus continuis, intermittentibus quoque, & inter has maxime quantae jungitur: atque vix quicquam in praxi crebrius occurrit, quam quod mensibus inordinatis prodromibus vel immineantibus, caput doleat gravissime; spasticæ videlicet dum ex imo ventre stricturne, in caput suum effectum exerunt. Digestio visio & affectu sic dicto hypochondriaco laborantibus frequenter associatur: nam si prima regio viscerum humorum colluvie scatur, & inde oborientes spasmi ac flatus, humores ad caput plus solito urgent, nimia eorum congestio, valorem distentiones, à quibus tunica nervosarum laeso fit, parit. Constat etiam hemianxia causam, à stomachi visio frequentius oriri, dum hoc non bene coquente, molae generantur crudae, quae cum succo ciborum chyloso permixtae, per thoracicum ductum ad cor adducunt, ac protinus ad caput delatae, antequam per congeria corporis emanatoria expurgatae fuerint, dolores periodicos efficiunt; qui absoluta digestionem ut plurimum invadunt.

## §. XV.

*Puerilis  
aetate quae  
obnoxia est.*

Obſervamus porro aetatem puerilem valde doluribus esse obnoxia, tum quod in hac aetate minus exacta servatur digestio & ventriculus cibis dulcibus, fructibus horaeis, placentis ac laciniis oneratur; tum quod etiam vermes, quibus gignendis pueri peropportuni sunt, causam huius mali praebent, dum putres & corrupti humores ad caput cum chylo delati, membranis moricibus elasticis tonum & robur naturale asserunt. Sciendum quoque est, non semper & continenter dolorem hunc cruciare, sed dilucida sua ac definita interdum habere intervalla, ut magnos aegrorum solatio subinde remittat, & ad notabile etiam tempus aegros deferat, qui certis tamen postea horis, diebus, imo mensibus & annis revertitur: certo nunc indicio, causam magis in remota partibus, maxime omnium in ventriculo ac visceribus imi venteris haerere; quorum visio sanguinis liber progressus per universum corpus, maxime per caput, ubi impeditur, dolor exciatur: quod imprimis in viris, qui suavi haemorrhoidali sunt vel fuerant obnoxii, vel malo hypochondriaco affectu, observantur.

## §. XVI.

*Prognosis.*

Neque semper sine periculo cephalalgia est: nam si causa doloris magis intra cranium inque membranis cerebri constitit, sique dolor vehementer & assiduus cum febre exaceruat & som-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

num pene omnem adimittit, phrenitidem non raro praenunciat; si vero subito in hypochondriacis vel in melancholicis prunis, praeteritum graviore animi affectu praecedente oritur, & somnum atque appetentiam auferit, ac cum audinis difficultate valorumque interna pulsatione jungitur, haec vero cuncta sine febre sunt, furorē praefagit. Ubi vero subito & peracutum in capite dolorem aurium tinnitum, difficultas incessus, genium imbecillitas, & impedius tardusque sermo sequitur, signum est futuri morbi attonitii vel etiam hemiplegiae; qui tamen magis in opposito latere quam in affecto exaceruat, dum hoc percipiendi dolori non amplius par est. Neque praetermittendum esse cenſeo, quod in adolescentibus & iunioribus, frequentiores cephalalgiae, futurae arthritidis vel podagrae indicium praebant.

## INDICATIONES CURATORIAE.

## §. I.

Quod attinet ad curationem huius mali, cum variae ejus sint causae, probe eas debent discerni, quia eisdem removendis, omnis medendi ratio superstructa esse debet. In genere tamen omnes scopi hunc morbum curandi, sequentibus absolvuntur indicationibus. Primo sanguis & humores impetuosi ad caput congesti si fuerint, partim ad loca ignobiliora derivandi, partim idoneis remediis discutendi sunt. Secundo stricturne membranarum capitis spasticæ, quarum causa plerumque est acris caustica materia, relaxandae sunt, ut liberius fluida, quorum curfus per has impeditus fuit, nunc progressi possint. Tercio causa materialis vitiosa, peccans intemperie, temperanda & per convenientia emanatoria placide subducenda. Tandem ad evitendum recidivas, capiti & toti nervorum systemati idoneis remediis praeteritum accurato dietae & vitae regimine totum conciliandum.

## §. II.

Si causa doloris est nimis ex inferioribus locis ad caput per spasmos appellus & irruens sanguis, non facile praesentis auxilium quam in ejus missione positum erit, quae in locis non procul a parte affecta, melioris derivationis causa influenda est, videlicet sub lingua aut in fronte, vel venae jugularis externae incisione, aut hirudinum pone aures applicatione: hac tamen adhibita observatione, ut si corpus nimis turgat sanguine, primo vena circa pedum talos percutatur, postea sequente vel secundo die vena circa caput aperiatur potest. Consultum quoque judicamus, ante sanguinis detractionem, alvum per libus deslere, quod commodè & insigni cum levamine clysteribus fieri potest domesticis, vel etiam per insulum mananum & rhubarbarum, adjecto sile quodam aperitivo, ut cremore tartari, vel sale Sedlitzensi.

## §. III.

Ad compescendum vero nimium sanguinis abundantis & ebullientis organismum, mixturam blande diaaponicam & temperantem, ex aqua florum nitar, hiorum convallium, sambuci, cerasorum nigrorum, antimonia diaphoretico, nitro purificato, cornu cervi uſto, cinabari & syrupo papaveris albi compositam, dare expedire. Externe vero episthma discutiens & temperans

*ratione  
non  
pro-*

*Quando  
vera sit  
causa.*

*Quoniam  
causa  
est  
causa*

fronti & capiti cum linteo duplicato est applicandum, cujus formula hæc esse potest: Recipe acet. rosacei, rutacei ana unciam & dimidiam, spiritus rosarum drachmas duas in quo camphoræ grana sex soluta, nistri purificati scrupulos duos, olei ligni Rhodii guttas quindecim: vel sequens emulso cum fructu ulisari poterit. Recipe nucleorum Perficorum, amygdalarum amararum ana unciam dimidiam, seminis papaveris albi drachmas duas, æque rosarum, florum sambuci, ceraforum nigrorum ana uncias duas. Fiat emulso: adde nistri drachmam dimidiam, camphoræ in oleo amygdalarum dulcium solutæ grana quinque. M. D.

## §. IV.

*Quid faciat, utrum si à sine viscidis dicitur etc.*  
Alia vero medendi ratione opus est, si à seri viscidis & viscosi intra vel extra cranii membranarum vasâ flagrantis copia, dolor cum torpore & gravitate sæpe valde diuturnus innascitur, ubi nec sanguinis missiones, nec leniora laxantia quicquam efficaciter præstare possunt, sed tum dare convenit paulo violentiora, quæ crassos glutinosos humores dissolvendi & simul per alvum expellendi facultate pollent. Id quod utrumque egregie præstant, quæ sequuntur pilulæ: Recipe gummi ammoniaci depurati, sagapeni, myrrhæ electæ, aloës rosæ, extracti hellebori nigri, resine jalappæ, mercurii dulcis, cinnabaris præparatæ ana drachmam dimidiam, extracti croci, pulveris castorei, salis succini ana grana XV. M. F. Pil. ex scitupulo numero XII. quorum sex vespere, & sex postero die mane sumi possunt; quo tempore etiam ab omni cibo abstinendum & tenuia tantum jacula ægro præbenda sunt: tribus vero diebus exactis, idem recipe potest remedium. Vacuata sic sufficienter viscosi seri copia, medicina utendum est tonica roborantæ & simul diuretica; quo fine ego multociens mixturam, quæ ex tincturæ animoni acris partibus quatuor, essentia succini & spiritus bezoardici Bulfin, vel tartari & liquoris nostri anodyni mineralis, singulorum partibus duabus erat composita, summo cum fructu expertus sum; cujus usus, dosin bis vel ter de die sumendo, per septimanam & ultra continuari potest. Nam quæ fibras torpidas roborando earum vim motricem elasticam excitant, simulque urinae fluxum promovent, ea in hac cephalalgia specie, quæ ab extravasato sero intra cutem & cranium, vel etiam in ipso cerebro oritur, valde proficua observavimus. Præter hæc autem cum CELSO, laborem & exercitationem usque ad sudorem, vehementem frictionem, & cibos ac potiones quæ urinam movent, in tali doloris genere commendamus.

## §. V.

*Adhibenda estne præparatio in casum adhibenda.*  
Si his in usum vocatis dolor non discutitur, coniugendum etiam ad externa, inter quæ vesicatoria virtutis sunt expertissima, quia pernicioso flagranti humori exitum concedunt. Nos in usu habemus emplastrum melioli, cujus uncia cum drachma cantharidarum molitur, adjectis granis alique camphoræ. Hoc magnitudine thaleri nuchæ applicari, & postea renovando illud, per longum tempus continuari potest; quod si te ullo incommodo insignem serosi humoris copiam fundit. In malo graviore autem & ubi à sero sub cute capitis flagrantæ, tumor visu, nec non ex dolore tactu cognoscitur, B. WEPFERUS totum capiti emplastrum vesicatorium,

inflat cucuphæ imposuit, cujus effectus hic fuit, in sine oboritur vesicis magnam seri viscidis subtraxerit copiam: quod remedium genus jam tum ab ipso RIVERIO, vide ejus observat. in perniciaci capitis dolore, summo cum fructu usurpatum fuisse animadvertimus.

## §. VI.

*De dolore sine quid constat*  
Interdum fit, ut præter consuetudinem intensus dolor, cerum duntaxat locum occupet, à materia fixius & paulo profundius membranæ inhaerente, oriendus; quo casu medicus Gallus cum prudentia doctus & in observatione curiosus CHESNEAU, vide ejus observat. miraculosum plane herbarum ranunculi præsentis impostitæ vesicantem effectum, non satis prædicare potest: de cujus herbarum specie scribit, quod folia anemone affimuletur, & masticata linguam mordere quam maxime; hujus folia in mortario marmoreo contusa, & simul emplastro periorato apposito, parvi applicare jubet. Videtur hæc herba autem haud dissimilem cum moxa possidere effectum, quæ etiam in ejusmodi dolore à medicorum periculis magnopere assimulatur. Ego rebus sic stantibus, felici aliquoties cum successu, rase prius quam occupavit dolor parvi, siccum sal volatile salis ammoniaci, cum aquali parte pulveris sinapi mixtum imponi jussi, eo quod paulo fortiores tum dissoluerem, tum profunde inhaerens viscosus humor requiratur.

## §. VII.

*Quid in præparato*  
Ubi vero dolor à suppressa coryza, sive à muco, intra narium concamerationes & sinus, detento oritur, expedit crebro, sal quod vocant Anglicanum, & nihil aliud est, quam sal volatile siccum salis ammoniaci, cum oleo cephalico, ut lavendulæ vel majoranæ exalatum, naribus admove, vel etiam erithrum pulverem kniser sternutationem moventem, qui ex herba majoranæ, beconice, maro vero, floribus benzoiis & pulvere caryophyllorum concinnatur, ad interiora narium administrare.

## §. VIII.

*Quomodo præstetur quod si à sero & jam quid constat*  
Quod si vero causa chronici & immanis doloris, in valde corrupti seri & sanguinis massa, ut fit in hæ Gallica & scorbutica, fundamentum suum habet, tunc usque necessarium est, congruis & specificis remediis hîce morbis sanandis accommodatis causam morbi aggredi; quo facilius quam maxime liquorum decocta cum animonio crudo, si prius humores corrupti per alvum probe, per ejusmodi quas jam supra dedimus pilulas, exclusi fuerint. Multum etiam tunc ex diætica confert abstinentia sive inedia per unum vel alterum diem, nec non labor & exercitatio corporis ad sudorem usque. Utile quoque est, in perniciaci tali morbo, ab impuro qui nascitur sero, per medicinam, sudorem provocare: cui scopo egregie sequens pulvis sinificat. Recipe cinnabaris nativæ præparatæ, crustæ animonii sive bezoardici mineralis, salis volantis viperarum vel cornu cervi, nistri purificati, singulorum grana X. camphoræ granum dimidium, pro dosi, desuper bibendo decoctum sanguinem purificati.

## §. X.

*Quid in præparato*  
Hemicrania & præsertim periodica, causam latentem ut plurimum prima in regione habet, quando ventriculus cum annexo duodeno, viscosa humorum colluvie repletus est, quam lenioribus

Quomodo præstetur quod si à sero & jam quid constat

Si dolor humoris præparati vel in sero & jam quid constat

vel in sero & jam quid constat

ribus tunc emeticis evacuare proficit: alvum quoque ducere, & per inferiora sordes expurgare, noxiisque humores à capite derivare, interdum valde est necessarium; id quod optime, per pilulas polychrestas ballusticas, fieri potest. Postea elixira stomachica, tonum ventriculi & intestinorum roborantia, sunt subiungenda. Si vero ab inordinato mendium vel hæmorrhoidum fluxu, causa doloris nascitur, remedia que salutares excretionem in pulsum & convenientem ordinem reducant, prudenter est utendum.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ

### §. I.

Quando  
et quando  
dolor loci  
signetur.

Aboluta sic doloris cephalici cura, quasdam necessarias adhuc cautelas & observationes ad eam spectantes subijcere haud erit inutile. Quandoque diutius & acutus dolor, præsertim qui consistit in fyncipite & sinibus frontibus, tanta vi poller, ut vires minum in modum frangendo, vitæ discrimen minetur, ablatio causæ morbi minime erit prius expectanda, sed ægro potius primo omnium levamen quoddam afferendum est; eo quod viribus amissis, medicus frustra semper laboret. Quin imo ipsa doloris acerbitas sæpe tanta est, ut graviora symptomata, vigiliam assiduam, æniti deliquia, febrem, inflammationem mentisq; alienationem accerere possit. Erunt ergo tum remedia interna, tum externa, ad dolorem levandum primario dirigenda. Ego vero ex interitis, primas unque partes massæ pilularum Wilegansii, quando cum cinnabari nativa miscetur, nec non pilulis Starckii deferre soleo. Prius vero semper ante usum anodynorum enemate venter subducendus est. Inter externa nec tuius, nec virtute præstantius invenimus remedium, quam linimentum spissius ex sequentibus ingredientibus, sub tali forma paratum. Sumitur nempe olei nucis moschatæ expressi uncia dimidia, refinæ styracis, refinæ corticis thymamatis æquali pondere drachma, extracti croci, balsami Peruviani, utriusque drachma dimidia, olei ligni Rhodii guttæ XII. M. linimentum fiat spissius, quod corio inductum, magnitudine imperialis, temporibus applicetur. Sedulo doloris impetu per interne & externe adhibita anodyna, lenè catharticum propinare juvat: postea ad alia, causam morbi peritus pro ejus conditione & natura per congrua remedia removendi, medicus confugere debet.

Si dolor ab  
humore extra-  
vasato,  
vel in sinu-  
bus frontis  
hæret

Quando dolor acutissimus virique tolerabilis, cavernæ narium, sinibusque orbitis capitis diutius infusus hæret, qui ab exigua sanguinis vel humoris extravasati quantitate, sub membrana hos sinus tegente, produciunt, sedare non modo, per jam dicta remedia, doloris atrociam convenit, sed & laborandum est, ut sanguinis appulsus, sub quo dolor augeatur, minuat; quod commodissime more Ægyptiacorum medicorum scarificatione facta in naribus, fieri potest, vel compendiosiori modo, si stramine paulo durioris portio valde & subito naribus intrudatur, ut sanguinis inde sequatur profluvium.

### §. II.

vel sub  
membrana  
pericranii.

Si vero sub membrana pericranii extravasatus, mordax & acris humor inclusus, os incipit cariosum reddere, tum omnibus aliis in callum applicatis ad incisionem accedendum est, quæ

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

uti in paronychia ex simili fere causa orta, ita hic mirabile ferme adfert auxilium. Si vero jam caries ad diploën ipsamque lamellam inferiorem cranii penetraverit, unicum auxilium in trepanatione providere erit reponendum.

### §. III.

Porro in genere sciendum est, in omni, à quacunque etiâ causa proficiantur, dolore cephalico, initium curacionis ab injectione enematis, item a venæ sectione, si plethora id exigat, faciendum esse, ita tamen ut alvi apertio huic præcedat. Postea de aliorum congruorum remedium tam internorum quam externorum usui erit decernendum. Sæpius plethora soluta, ad meliorem derivationem causæ peccantis à parte affecta, frontis venam aperire expediet. Et tunc Clarissimi HEURNII moniam, quod notu in aph. 68. HIPPOCRATIS, *Sell. V. infirmus*, dignum unque observacione est. Suadet nempe, *ante sectionem, ut vinculum collo injiciatur, quo innoscat hac vena, que oblique per secundam, cavendo diligenter ne lædatur TURICA potestatis.*

Cura quæ  
maxime inveni-  
pienda.

### §. IV.

Arteriotomia in temporibus celebranda, præteritaneam & pene mirandam, ceteris omnibus manibus adhibitis, sapienter opere ferre & lenimen, probatissimorum medicorum fide constat. Neque ego, quancumque nunquam hoc remedio usus sum, detrahere illi quicquam volo, ita vero de hoc existimo, quod si sanguis ex ramo venæ jugularis extremo aperto extrahatur, longe melius retardatur circularem sanguinis motum in capite restitui, humoremque subistentem vel extravasatum, à quo pendet dolor, felicius dimoveri & excludi posse; dum videlicet sanguis arteriosus, majori ut antea celeritate in spatium venæ ab extractione sanguinis evacuarum feratur. Si vero, ex consilio & deliberatione medicorum, temporalis vena perundi debet, tunc optime hæc operatio juxta aurem prope articulationem mandibule, ubi periculo vacat, celebranda erit.

### §. V.

In omni dolore, ubi vires non serunt sanguinis detractionem, neque ejus satis est, pediluvia, quæ nunquam non in hoc affectu utilia, modo sunt temperatoria, ad divertendum sanguinis & humorum motum ad partes infernas, cum fructu adhiberi possunt; neque pedum frictions paulo asperiores cum pannis sunt improbandæ; nec rubefaciendæ, ut taleis raphani rusticani cum sale mixti pedibus imponendi, usui suo destituantur.

Pediluvia

### §. VI.

Circa epithemata actu frigida tenendum hoc est, quod cum summa circumspectione applicanda sint. Prostant enim exempla nobis etiam cognita, cum, qui in febribus præsertim exanthematicis, variolis, morbillis, purpura, ubi natura per extremam cutem peccantem materiam sub specie halitus non sine fructu excludere nititur, per crebrius in dolore capitis applicata frigida epithemata, in coarctatam ad dies vine durantem, in epiphoras quoque ac suffusiones oculorum sunt præcipiati. Neque etiam semper consistit in hoc dolore proligando, pluribus & variis topicis uti, quorum applicatio interdum plus periculi habet, quæ etiam prudenter a me-

Circa  
circumspici-  
endum.

medico deſiderat, quam interſorum uſus. Neque omnia, omnibus aque ſalutariter conveniunt: nam quæ alius ferre poſſet, ea alteri incommodant.

## §. VII.

In paroxyſmo.

In ipſo paroxyſmo ad atrocem dolorem mulcendum, non una ſed pluribus vicibus, inſignem efficaciam a liquore noſtro anodyno minerali, aliquot guttulis aque ſacchari in pulverem redacto inſpillariſe & in os ſumere, experiri ſumus. Extra paroxyſmum ad roborandum caput, vel etiam ut illud a recurſu mali vindicaretur, baſſamo noſtro analeptico quod vitale audit, ſi vel exterius temporibus aut vertici applicetur, aut naribus modeſte hauriatur, vel ejus aliquot guttules ſaccharo inſpillatæ cum inſulo Theiformi ſumantur, peculiariſſime plane, non ſine ratione & experientia, virtutes & laudes tribuimus.

## §. VIII.

In inguſſum ſanguinis non exaruit.

Quandocunque nimium ebulliens & variis de cauſis in motum concitiorum actus ſanguis, doloris originem præbet, neuiquam purgantia vel evacuantia, ſed potius refrigerantia & temperantia locum inveniunt: quo ego nomine plurimum ſolus aque frigida potui aque nitroſis tribuere ſoleo. Et certe in hac re non eſt de nihilo, eximium noſtri HIPPOCRATIS monitum, qui libr. de ratione vitiis in morb. acutis, ſic ſcribit: *Animadvertere oportet in iis quibus caput, vel ob exercitationem vel curſum, vel ier, venationem, vel aliam quandam interſiſſivam laborem dolet; horum quidem nullos purgaverit. Vult enim præclarus ſenex, ubi ex calore vel ſanguinis fervore oboriatur dolor, purgantibus uni non debere.*

## §. IX.

Cephalus hypochondriacus.

Sæpe fit, ut melancholia hypochondriacæ cephalatæ conjungatur cum diſtentione depravata, macie corporis, timore & vulus colore vitato: quo in caſu venarum ſectio, balnea aque dulcis, conveniens motus corporis, aquarum medicarum prudens uſus, pulſula medicata præſtrium quæ ſunt cum ſucco cichorei, ſerum lætis captivi chalybeatum, nec non cichoreatum ceteris omnibus palmam facile dubiam reddant.

## METHODUS PRÆSERVATORIA.

Uti in omnibus capitis affectibus, ita etiam in dolore ejus hanc vivendi rationem ſuadet MERCURIALIS Conſultus. Tom. I. p. 140. Conſult. 107. cujus integrum textum methodi præſervatoriae loco hic inferere minime uideb. *Arem, enim inquit, inclementem & inſuriam quantum fieri poſſet aut vites aut integumentis & cubitulis arceat, ſomno moderate utatur, nec unquam niſi duabus poſt cibum horis: caput ſemper elevato dormiat: corpus & animam na exercere oportet ne alterum ab altero labore vel otio vincatur. Neve circa nimis, nimisque cogitationes & ſtudii calorem nativum hebetent. Alvum præceteris lubricam, niſi ſua ſit, quantum fieri poſſet ſervec, ſiquidem nihil eſt quod perinde caput afficiat & ſubinde vertiginofus affectibus occaſionem præbet, ac facit in inſignem diſtentionem. Jam vero repletiorem & crapulam, quæ interdu iſtorum plagarium habitaſcit, etiam ſi peregrini ſint, committere cogitant maxime omnium tibi monite ſui: & idcirco c. u. ac viciorem generoſerum aſſiduum potui*

*fugias neceſſe eſt. Cibi omnes craſſi, pingues, ſtuleri, cujuſmodi legumina & olera, piſces ac ſercula multis aromatibus conferta, quolibet geſu germana aut ſolet, niſi à te videntur, ne mala tua in dies augerantur mendum eſt.*

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Studioſus virginis & aliquot annorum graciſſe & tenerioris habitus, à ſtudioſiorum intemperantia & nimis lubricationibus, diſpoſitionem ſibi contraxit hypochondriacam, cum diſtentione ciborum viniata, alvi ſtriſtura, ſpalinis, flatulentia, ſubinde etiam capitis dolore junctam. Invitatus ab amicis in convivium, magna & inſolita vini Rhenani ſed ſulphuris ſumo valde infecti copia ſe replevit, & ebrius ſaſtus. Ex hoc tempore gravi & continuo capitis dolore correptus fuit, qui tamen ſiniſtrum maxime latum occupabat, equalis anticum cum primis partem, frontem, oculum, aurem & dentes ejusdem lateris vehementer interdum ſtringebat ac obundeſcebat. Sub notabili vero ſempiterna mutatione vel ſub profundiori paulo mentis medicatione adeo increſcebat, ut vires, ſonum, appetentiamque proſus ſere adimeret. Suſperum medici crebras venæ ſectiões, alvus ſæpius polychreſis pilulis ſubducta, & cephalica tam interne quam externe, neque nimis ſtomachica adhibita, ſed citra opranoſum ſucceſſum. Ego potius, cum conſilium à me petere, diſſualiſſimam ſanguinis miſſionem & medicamentorum frequentem uſum. Pediluvia vero & pedum friſtiões cum pannis alperis, neque minus caput crebris perſtricandis commendavi, atque ut illud & pedes in aqua bili & temperato calore ac tranſpiratione contineret, maſque quotidie in lecto inſuſum Theiforme æſ herba meliſſa, ſalvia, veronica & ſemine ſonculi aſſumeret, blandum ſudorem exſpectando, auctor fui. Pro potu ordinario, loco cereviſia, decoctum ordinavi ex ſpeciebus temperatis. Deinceps baſſamo noſtro liquido vitali ſæpe inunctæ, ubi dolor nimis urgebat, nuxa, nucha, tempora. Quorum remedium opẽ inſigne levamen æger expertus eſt.

## Epiſtola.

Dicti vix poſſet, quam inimicum nervoſa capitis paribus ſit vinum ſulphuratum. Et ſicut vinum præſertim potens & generoſum, inque ſpecie vina dulcia ad capitis morbos: ita multo magis quodvis inſeſto ſulphuris vapore reſerum vel adulteratum diſponit. Sulphuris enim particule dum altius ſe ſe inſinuant membrarum poris in ſtriſtura eas adigunt. Vinum vero rarefaciendo ſanguinem nimiam fibrarum nervoſarum & vaſorum efficit expansionem & diſtentionem: unde dolor oritur. Quod ſi vero ſemel & iterum ſolidis nervoſis partibus inducta fuerit interius infirmitas & earum vis moris eluſtica naturalis leſa, affectiones quæ inde prodeunt præternaturales, ex facilis cauſa, in iſdem partibus recurunt. Deinceps obſervari quoque velim, in nulla corporis parte nervoſa & ſenſu prædita membrana facilis lædi quam in capite, eo quod liberiori aeris acceſſui ſunt expoſita. Quantam autem vim ſubite aëris & tempeſtationum mutationes, præſertim quæ ab uno extremo ad alterum vergunt, in mutando & lædendo nervoſorum partium tono & cla.

& elatere habeant; id dolores, spafmi, convulfiones & aliae partium nervofarum praeternaturales affectiones, quae inde ingravescunt, ostendunt luculentissime. Liqueor noster balsamicus ex sinceris non adulteratis & temperatis oleis cephalicis confectus, infirmitati nervofarum partium, exterius praefertim si applicetur, mirifice opulatur; nifi corpus admodum plethoricum fit, & natura profus a fuaveolentibus abhorreat.

## OBSERVATIO II.

*Cephalalgia perniciosa, cum oculorum ardore & diarrhoea dysenterica juvenis, in persona oleosa vixit, fa delicia, curata.*

Persona quaedam splendidi annuum jam aetatis quadragesimum & tertium agens, valide a natura constitutionis, a prima aetate adolescentiae largiori vini potui assueti, cui etiam in hunc usque diem nimium indulget, sub tempestate valde ventosa & humida & frigida, per aliquot septimanas venarumque incumbens, non modo defluxione acri, falsa, dolorifica & ardente in utroque oculo, sed & gravi & perniciosa cephalalgia cum cutis capitis tumore juncta corripitur. In consilium & ego quoque accitus, fontem Scleratum vino intermiscendum & vesicatorium nostra methodo praeparatum nuchae applicandum suasi; aciculae quoque Egrae cum decenti regimine fuerunt usurpatae: & dolor inde valde minuebat. Balsamo vero vix cum inveniretur caput, materia ichorosa, qualis ex ulceribus prodit, copiose effluxit: cucupha quoque ex speciebus balsamicis & cephalicis temperatis ad roborandum caput gestata fuit. Qua ratione atrox ille dolor penitus sublatus est.

## Epicrisis.

In genere hoc attendi velim, eos qui pocula amant & fere quotidie se immergunt vino, ex transpiratione, qua diffili debent partes nimis calidae & sulphureae, per aetam frigidiorem admissam cohibita, graves in capitis morbos & dolores frequentius incurre, quia in nullo corporis loco immediate & proxime magis quam in capite, praefertim si illud non satis tegumentis munitum sit, totus valorum & tunicarum nervearum a venis frigido penetrante laedunt. Vesicatoria rite & paulo diutius applicata, uti materia in partibus capitis externis vinola refidet, excimiam solent opem etiam in acerbis falsis & calidis oculorum defluxionibus praestare. Ceterum in ejusmodi morbis, qui a dyscrasia calida & sulphurea sanguinis, qualis ab excessu veni potu & cuticulari perspiratione prohibita nascitur, aqua diluenda, aciculae, imo aqua simplex loco potui ordinari magno & efficaci sunt praesidio.

## OBSERVATIO III.

*Juvenis cephalalgia cum oculorum ardore & diarrhoea dysenterica juvenis, in persona oleosa vixit, fa delicia, curata.*

Juvenis spongiosi habitus & sanguineae complexionis, a longo hinc tempore natum haemorrhagias obnoxius, ob paulo validiora corporis exercitia nimiumque veneris usum & potum largiorum, frequentiores & largiores eas passus est: ad quas minuendas & compescendas ter singulis annis admisit in pede venae sectionem. Postea vero eam confectum tempore semel omisit vel potius neglexit. Hinc immani corripitur cephalalgia cum auditis difficultate & tinnitu, caput totum rubore innuascit. Venae sectio instituitur in pede & multum sanguinis extrahitur. Mitiga-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

tur inde quidem dolor; neque tamen sedem suam penitus relinquere voluit, donec stramine paulo duriori naribus introfuso largius sanguinis ex hisilicidium fuerit procuratum. Inde dolores mitigati fuerunt mirum in modum. Sed cum a supra memoratis causis ex facili dolores recurrebant, nec sola venae sectio his aliendis sufficeret; & quae tam vitam & hydropoliam nec non serum lactis acidulum frequentius bibendum commendavi, interpolare quoadque pulverum nitroforum usu. Quibus ex toto integram valetudinem consecutus est.

## Epicrisis.

A sola plethora in junioribus nates crebrius fundere sanguinem, sique hoc non accidit, capitis agnitudines inque primis cephalalgia levis, per crebriam experientiam certissimum est. Quos morbos si natura non sponte per narium haemorrhagias fovit, medicus id arte praestare debet evacuando sanguinem ex venis non procul a capite distans, incisione venarum jugularium externarum vel quae sub lingua posita sunt; meliori vero adhuc successu per scarificationem in naribus vel apertionem venae idoneo instrumento factam; non neglecta tamen sed probe observata hac cautela, quod videlicet, si nimis adit sanguinis exundantia, consilium sit, in disto loco a parte affecta sanguinis missionem prius instituere, & postea non procul a morbo loco; quia dum exire sanguis ex partibus inferioribus spafmo subinde affectis saepius cum impetu in lesam partem ruit, non sine gravioris mali metu. In tali cephalalgia specie topica, volatilia & fuaveolentia calidiora fugienda esse censemus: sed praestat epineuribus paulo frigidioribus sanguinem ebullientem reprimere, quod tamen etiam adhibita prudentia fieri debet; praemissa videlicet venae sectione, pediluvio, & alvi segnis per chyleris decenti subductione.

## OBSERVATIO IV.

Vir quinquagenarius sacerdotali munere fungens studis & meditationibus nimium indulgens, ex prava inde sequuta digestionem & ventriculi infirmitate, crebrius catarrhis defluxionibus, odontalgia & cephalalgia obnoxius fit: quae tamen pathemata, cum plane abstineret a prandio, summa tantum coeca multum decreverunt. Postea vero dolores in capite usque ad colli & thoracis dextrum latus valde molesti exarrecti sunt, diutius perseverantes. Quibus remediis varia a variis praescripta sunt remedium genera, atque inter haec interne essentiae & elixiria cephalica, pulveres cinnabari, foniculicus quoque nuchae & brachio dextro inusui, celebrata venae sectio, externe affectae partes oleis penetrantibus inunctae: sed sine levamine. Scripsit ad me historiam, adjiciens, quod nares tenacem albicantem mucum sed exili in copia fundant, & sensum se ponderosi saxi in sinistra capitis parte percipere: caput vix sine dolore inclinari vel verti posse, ita ut linguae etiam usus valde difficilis sit; colli quoque glandulas compere tumidas. Adiecit quod ante biennium febris tertiana ipsum corripuerit, quae, postquam materia largiter ex pectore excreta fuit, levamen quoddam attulit. Mentionem quoque fecit doloris circa ventriculi regionem atque inflationis in hypochondriis. Dedit consilium ut thermas Gasconiae adiret & secundum praescriptum a me regimen per mensem & ultra in usum acciperet.

*Chromatis ex capite lateris in faciem hypochondriacae, Conclude curatio.*

accuratum viar institutum cum motu corporis sufficiente & animi quiete; fuaque fui, ut præmissis frictioibus in nucha & cervicē cucurbitulas cum scarificatione apponendas curaret. Et inde cum melius se habuisset cognovit.

*Epistola.*

Non simplex cephalalgia hic affectus sed potius rheumatismus, qui totum caput & vicinas partes occupat, meretur appellari: eo quod humor viscosus non unam partem occupet, sed per porosam substantiam serpendo, in vicinas nervas partes, eas lacinando & vellicando delabatur. Causam sine omni dubio discrasia feri febricitans, ex depravata ventriculi digestionē & hypochondriorum vitio nata subministravit. Originem primam vero dedit nimia fludorum cum profunda mentis meditationibus intemperies, junctā cum lucubratoribus: quæ quantum vim, ventriculum & intestina infirmāda & totum corpus morbidum reddendi habeant, experientia facis apertum ac manifestum est. In tali statu morbi particularia ut ita loquar remedia seu symptomatica dicata nihil prohibent, sed, si salus & sanies speranda est, non ab aliis nisi ab iis, quæ vitis fludorum & solidorum amovendis sufficiunt, cupis generis sui fontes medicari calidi vel frigidi cum regimine dietæ ut usurpati, peti debent.

OBSERVATIO V.

Formina nobilioris generis septuaginta jam septem annos transgressa sanguinis plena, conuatiā à quinquagesimo circiter anno, quo menstrualis fluxus valde existeret, hæmicephalas affligebatur. Ex quo tempore, multa hæc atque varia ad sedandos & abigendos hos dolores continuo adhibuerit remedia & frequentiores in brachio pariter ac pede venæ sectiones influxerit; nullum tamen ex his percipit levamentum. Donec eandem sanguis ex naribus venulis ad uncias circiter VI. ope pennulæ interuallū, in eo nimirum laetare ubi dolor consisteret, fuerit evocatus. Neque ullum aliud præter aquam frigidam simplicem in usum esse vocatum, ita ut non modo exterrat in duplicato lineo capiti sæpius admoda, sed etiam interne ad tres quotidie mensuras triduum sume fuerit. Et sic diu exoptatum, quæ DEI erat gratia, passionis valde dolorosæ perit levamen. Quæ de re simplici hac potione semper loco cerevisiæ est usā, haustu tantum inter prædicandum uno exiguo vini cyatho.

*Epistola.*

Aquam simplicem frigidam puram tamen, tum interno, tum externo usu, in multis & gravibus affectibus valde conducibile & efficacissimum remedium præbere, perpaucis quidem cognitum & creditale videtur. Nihil minus & experientie & rationis & auctoritatis quoque multorum veterum Medicorum suffragio id ipsum est probatissimum. Egimus ex instituto in peculiari distillatione de *salubritate potus frigidi*, paulo prolixius: ubi evidentibus argumentis tam aquæ quam frigoris quoque in ea contenti eximias in morbis debellandis vires abunde demonstravimus: nam magna inest vis frigoris elasticam fibrarum & valorum corporis nostri vim firmandi, roborandi & virtutem expansi-

vam interni liquidi calidi coarctandi, quo vis valorum à nimia expansione valde debilitata ad statum redeat naturalem, & sanguinis ac fludorum motus liber & æquabilis restituantur. Et sicut potus sufficiens aquæ simplicis & frigide, firmando totum solidorum, humores fluxiles reddendo & salinas sulphureas partes diluendo ac evehebdo, multorum affectuum causam præscindit; ita externe frigore suo etiam succurrit us morbis, qui à nimio valorum infarctu & expansione originem suam ducunt. Nihil minus quotidianus aquæ potus non omnibus naturis convenit, sed ejus præscriptum prudentiam medentis requirit.

OBSERVATIO VI.

Vir erat Hebræus circiter quadragenarius stricioris corporis habitus, qui ab iracundia & superingesto cibo contraxerat dolorem in vertice capitis fixum, spasmus occupans magnitudinem imperialis, sensus hujus doloris quidem non adeo erat acutus, vibratorius, lancinatorius aut pulsatorius, uti alias in cephalalgia esse solet, sed magis pressorius & gravitativus sub cranio; neque erat perpenus, sed subinde maxime circa vespertam & noctem ingravescente. Nihil minus tamen adeo graviter inde luebat, ut appetitus concideret, somnus abesset, vires minime deciderent, pulsus inordinatus, modo celer, modo rarus & languidus mæaret, ipse quoque animus abjectus esset & sub paroxysmo quandoque plane turbaretur. Pugnam fuerat adversus hunc dolorem tum à me tum ab aliis strenue & efficacissimis aliis remediis. Sed licet quandoque inde remittere per aliquot dies videretur, levi tamen accedente occasione ex ira aut aliis externis injuriis iterum vehementer recrudesceret priori similia. Exactis inter hæc duobus circiter mensibus in consilium simul vocatus est civitatis hujus medicus natione Galus, ingeniosa curandi remedia subinde non infeliciter adornans. La purgato prius per aquam Sedticeniam corpore, dedit consilium, ut æger mane de post meridiem biberet dimidiam aquæ fontanæ frigide mensuram in lecto. Inde primum quidem factum refrigerium & symptomatica viā exacerbata, sed elapsi hora pulsuum magnitudo increvit, & sudor erupit largissimus cum doloris levamine. Hinc per septem dies potum continuare præcepit, tam felici successu, ut successive dolor evanesceret omnis. Ac licet elapsi aliquot hebdomadibus, post iram dolor hic repeteret, eodem tamen remedio per triduum usurpato iterum felicitati est discussus, & æger sanus jam est ac vegetus.

*Epistola.*

Sedem hujus atrocis doloris in eo loco ubi conjunctio est summarum, coronariæ nempe & sigmatæ, qui in infantibus fontanelle nomine venit, reponendam esse judico: nam ibi est pericranii cum dura matre arcta connexio; & proinde etiam dolor qui extreme in illo loco existit, in consilium trahendo duram cerebri membranam majorem symptomatum exacerbationem, virium prostrationem, animique turbationem neque minus pulsuum inordinationem efficit. Causam ego mali esse bilem vitandam ab ira commotam in flexura duodenæ stagnantem & corruptam credidi, cujus vis ebulliens & acrimonia

cephalalgia  
in partibus  
acutis  
dura pot  
pugna. Co  
natura des  
cassa.

Hæmicephalas  
autem  
doloris &  
vires  
aquæ frigide  
causa.

monia mire à frigida potu coarctur & reprimuntur. Siquidem ego sapies in praxi mea, ex vehementi ira mox ante cibum sumtum, gravem cephalicam animadverti, quam alii nihil proficiētibat, feliciter à feri lactis aciduli potu quotidie ad mensuram summi à me discutiam meminī. Secutae inde fuerunt saepe lux alvi de die dejectiones, & sic expurgata biliosorum humorum lentina, desiderata convalescentia facta est.

## OBSERVATIO VII.

Civis hujus urbis annorum quinquaginta febre per novem menses laboravit quartana, quae tribus corticis chinae dosibus sumis praeter expectationem evanuit: sed in ejus locum gravissima cephalaea, quae nunc torret hominem, vires attenuando successit: dolor erat continuus & valde gravativus qui maxime incrementa sumit per actus quatuor vel quinque horis à digestionē, conjuncti simul erant dolor, tumor, imbecillitas manuum cum insigni corporis debilitate. Postquam in cassum multa fuerant usurpata, venit ad me auxilium meum rogatus. In similibus casibus essentiae nostrae tonicæ usum paulo protractiorem subinde convenientissimum expertus sum: quoniam praeter vim roborantem, serum vitiosum, tum per vias urinarias, tum per insensibilem transpirationem efficiendi efficaciam possidet insignem. Sed fausti theriacum Carolinarum usum, corpore prius, per salia deservita, aperientia, interpositis nostris pilulis balsamicis probe praeparato: & sano successit auspicio.

## Epirisus.

Quartana familiarissimum esse cephalicam dolorem symptoma satis constat. Causam hujus rei inde deducendam esse arbitror, quod in hac febre quam maxime humor corruptus, tenax, fixioris acidæ postmodum indolis dudeno & valvulitenuum inherens, simili charactere praeterlabentem chylum insitiat, qui postea ad minima & capillaria mensurarum capitis vasa delatus, liberiore fluidorum motu obicem ponens earum distensionem dolorificam causari potest. Id vero non modo in capitis, sed & aliarum nervolarum partium minimis vasculis evenit. Quamdiu motus febrilis durat, tam diu vasorum obstructio & humorum stagnatio nequaquam incrementum capit, propter celeritatem sanguinis per solidas partes tractionem. Quodcumque vero motus febrilis corpori salutaris supprimuntur, non mirum est, majores fieri infarctus & obstructions vasculorum, indeque dolores arum, capitis, tumoreque oedematosis sequi, qui non meliori & ratione, quam laudat jam tempestive adhibitis remediis possunt expugnari. Eiusmodi in casibus, ubi neque locus neque tempus vel occasio est utendi aquis mineralibus, curam hanc infeliciter cum decoctis blande diaphoreticis lignosis & pulveribus ex cinabari, sale volatili, cornu cervi, vel etiam reguli antimonii medicinali & sale abstinui composis, non omissis ex manna & rhabarbato per infusionem parvis laxantibus, bono cum DEO peregi. Atque insignis quoque & expertæ virtutis, usum essentiae nostrae roborantis, cujus mentio supra §. 4. p. 197. fit, reperi.

## OBSERVATIO VIII.

Fœmina rectoris & sanguineo-cholericæ constitutionis annum quem jam trigessimum complevit, vix nimium quiescebat inordinatæ diuturne indulgentia, minus ordinatae nec sufficientes per annum & ultra habuit menstruales purgationes. Exinde de dolore in capite tenso, gravativo, lancinante diu conqueritur, qui primum totum occupavit caput, nunc vero ad sinistram laeum declinat, ubi saepe, tempora, mandibulam, dentes, aurem, labia ejusdem lacrua punitivo & urente dolore infecta, ad brachium interdum pertingens, frequenter incurrunt horripilatione cum pulsu inaequali, duro & celeri. Ab hisce incommodis sequentibus liberata est. Primo singulis diebus pediluvia convenientia fuerunt ordinata: dein venæ sectio in pede post menses inordinatos & parvas fluentes: tum quotidie infusum loco Theæ mane copiose haustum, quod ex verbena, melissa, fummaribus millefolii, semine sauculi, cubebis, floribus chamomillæ vulgaris constabat. Pilulae nostrae balsamicae cum extractis croci & mercurii dulcis portione remixtae, alteris diebus circa leſtingeſſum, parvis dosi assuetae fuerunt. Tandem externæ balsamum nostrum vix sine ambra cum spiritus vini camphorati aequalibus partibus minorum locis affectis dolentibus immixtum fuit: inquantum accuratiori vitae regimine, motu corporis & ut frigida atque acidæ vitaret, nec non digestionem vasculorum cum cibis sumendis cunctis nostro stomachico, quod in notis ad Poterium describitur, succurreret. Erata per DEI gratiam ad valetudinem exoptatam pervenit.

## Epirisus.

Quando in gravi capitis dolore etiam vicinæ nervosae partes in consorciu trahuntur, cephalalgia rheumatica oritur, quæ à ferro acri vellicante, ob interceptum per venas obstructas sanguinis circumum, recedente ac extra vasa posito, & per poros & loculos ad membranas delato originem suam sumit. Et tales rheumaticae affectiones ab impuro ferro sequuntissime in fera sequiori, ob hanc tribui minus rectum statum eveniunt. Neque melior ac certior iis modendi ratio suppetit, ac si medicus operam & studium in ordinem redigendo urinam excretionem per convenientia remedia adhibet. Nihil minus tamen semper, si talis casus occurrat, ventriculi simul ejusque digestionis habenda est ratio, ut bene temperatus chylus ad sanguinis & humorum massam accedat, qui ejus intemperatam crasim sensim paulatimque, successu temporis corrigere valeat. Quod vero dolor saepius unum tantum capitis & vicinarum partium laus petat, ex anatomica rependa erit ratio: quandoquidem constat, sicut cerebrum in duo hemisphaeria divisum; ita etiam in dextro & sinistro latere distinctos ramos arteriarum, venarum, nervorumque extare & communicationem inter se habere, ut licet lesio fiat & circulatio non recte procedat quoad vasa in uno latere, salvis tamen & integre motus sanguinis circularis in altero hemisphaerio persistat.

## OBSERVATIO IX.

Nobilis adolescens qui vix ætatis annum decimum

Cephalalgia  
rheumatica  
et  
epirisis  
nunc  
nunc

Cephalaea  
et  
quarta  
na  
cui.  
china  
pro  
figura  
Cephalaea  
dilecti

Cephalaea  
nunc

num octavum amigri, excitari alias & promi in studia ingenii, postquam sanguis è naribus folliculidum cui frequentius obnoxius fuit, nescio ex qua causa, præter quod crebro venenosis sub coelo frigidi interfuera, emanerit, insignem in capite aliquot jam menses torporem & obtusum ac gravativum dolorem, qui ad oculorum radices pertingit, perennis. Perit omnis animi & corporis vigor, ciborum appetentia, placidulque somnus. Facies erat pallida cum extremorum frigore & lassitudine. Opem à me & ipse & mater ejus efflagitabant quam follicite. Celebrata in pede venæ scëbæ, & quia ali- quid hypochondriaci subelle judicavi, præscrip- ti curam fontis Scherani cum debito regimine: sed effectu plane frustraneo. Postea insulium Theiforme ex temperatis herbis cephalicis mane hauriendum ordinavi: reiterandam quoque iussi venæ scëtionem & tertio die post, cucurbitulas cum scarificatione nuchæ apposendas; erthinus quoque pulvis naribus frequenter admonus. Et non ita multo post cessavit dolor, rediit appet- tus & quies somnus, omniumque ætionum vigor, ac pristina valetudini redditus fuit. Silla- re quoque rursus sanguis, sed non largo flumi- ne, corpi è naribus.

#### Epîrisu.

Causam hujus gravis doloris & symptoma- tum hæc omni sublequebantur, à sufflaminata narium hæmorrhagia deducendam esse, extra dubium positum est. Vasa vero cerebri repleto sanguine plus quam par est fuisse infecta, tes- tatur faciunt symptomata in nervosa prima- rum viarum partibus, non sicut ac in hypochon- driaci contingit, suscitatis, idque tutum prop- ter passionem & consensum nervorum: liqui- dem ante accessiorem hujus doloris, ab ejusmo- di pathematibus plane liber fuit, quæ sedato do- lore etiam conquiescerat, ut adeo clare pateat, quanta sit capitis cum ventriculo & aliis ner- vosis corpora partibus consensio. Deinceps il- lud notari velim, in capitis morbis qui à redun- dantia sanguinis ortum ducunt, ejus mollitiem semper observari maiorem in loco capiti propin- quiori ac in diffusis partibus. Pulveres erthinos & cephalicos naribus susceptos, vellicando & irri- tando in cerebri quoque membranas agitationem quandam dum efficiunt, à molesto humorum in- fusu eas liberandi vim & potentiam excedere posse, haud videtur improbabile.

#### OBSERVATIO X.

*Cephalica, ex gonor- rhœa viru- lenta, de- cussa juve- nile cura- ta.*

Juvenis vegetæ & robustæ constitutionis, æ- no- rum XX. & aliquot, virulenta gonorrhœa bi- nis vicibus affectus, sed nescio qua methodo curatus. Aliquot menses post, ulcerosæ & pru- rientes pustulæ hinc inde in cute efflorescebant: quarum tamen major copia in dextra quam in sinistra capitis & reliqui corporis parte conspice- batur, qua in regione etiam tumor testiculæ du- rus & valde molestus consistebat. Præter lan- guorem universi corporis, immaniter eum do- lores in capite, præsertim nocturno tempore, tor- quebant, adeo, ut non modo somnum tollerent, sed appetitum etiam & vires immuerent. Ad sublevandum hoc malum de chirurgorum & me- dicorum opera usus: sed nihil omnia, neque mer- curialis quam adhibuerat salivatio profecerunt. Ultra anni dimidium atroci hoc malo afflictus

& valde extenuatus me quoque in auxilium voca- vit. Expurgatis prius lenissimis remediis ali- quodis primis viis, decoctum cujus vires in pu- rificando sanguine multoties expertus sum, tum ad sudorem elicendum, tum ad corrigendam intemperiem, pro potu ordinario usurpandum & quidem sequentem in modum imperavi: Sar- saparillæ uncia IV. & animonii crudi uncie, salis gemmæ & salis tartari cujusque drachmam adjecti, & cum mensura quaque esse simplicia puræ decoctio facta est in vesica stanno obdu- cta, cui alembicus imponebatur. Decem sic ad- moto igne, cum propemodum dimidia pars de- stillata esset liquoris forti odore nares ferentis, destili ab ulteriori coctione & destillatione affudi residuo in vesica; facta filtratione, quod filtrum subiti servavi pro usu, eo quo sequitur modo. Dimidia ejus pars cum æquali portione decocti scorzonæ & passularum miscebatur pro potu ordinario; quod remanebat in duas partes divi- sum fuit, quarum una mane, altera hora quinta pomeridiana calide fuit hausta, sudorem cum de- bito regimine in lecto expectando. Interpolans quoque huic decocto interdum fuit usus unctura animonii acris cum spiritus tartari & liquo- ris nostri anodyni mineralis tertia parte permix- ti. Sed tertium dolo-rico tumori simul duxi per idonea resolutiva & discutientia topica proli- sciendum; inter quæ emplastrum diachylon em- plastro Vigonis cum mercurio permixtum, de- cima parte florum sulphuris, nec non balsami sulphuris animoniaci notabili portione adjecta, cataplasmatæ superimposito, quod ex radice enu- le, albeæ, iridis nostratis, cucumere asinino, flonibus sambuci, semine cymii, carvi, cum aqua florum sambuci & vino coctis confabatur, laudabile levamenum attulerunt, tumore ad di- midium & ultra discussa. Quibus remediis per DEI gratiam id consecutus sumus, ut ab om- nibus incommodis liber, sanitati fuerit restitutus desideratissimæ.

#### Epîrisu.

Et gonorrhœa virulenta & Gallica hæc, ex eorum sunt morborum numero, qui nisi radi- citus idonea & satis efficaci cura extirpentur, ob relictas vel in glandularum tubulosa substantia, vel etiam, ut nonnullorum fert sententia, in membranis quæ pinguedinem cingunt, aliis impa-ctas particulas, ex facili reviviscunt, dum ex laibulis suis excussæ de denovo cum lymphæ & sanguinis massa commixtæ, perituali sua vi, instar semini vel fermenti sese multiplicat, omnis generis fluida inquinando. Cura horum affectuum, quæ per salivationem à mercuriali- bus excitantur, quasi specificum passim com- mendatur remedium, si immanis & chronicus capitis dolor fuerit junctus, non semper expectatio responderi: & proinde WILLISIUS de anima brutorum cap. 2. tali in casu eum reji- cere, multis exemplis quæ recedunt infelicis suc- cessus adductis, non veretur. Addo etiam il- lud, quod chirurgi quibus vulgo ex committitur, erapirice ut plurimum, posthabita & indi- vidui & aliarum circumstantiarum ratione, hanc curam tractare soleant. Ceterum sudorife- ra, quæ animonium crudum ingreditur, de- cocta, si decenti modo & artis lege præparata adhibentur, in hujusmodi veneris affectibus ma- xime recrudescentibus laudabilem opem subin-

Definitio  
traliu can-  
dantiu.

Remedio  
epirice  
epirice.



# De dolore Cardialgico spasmodico & flatulento. 257

de praestitisse, compluribus exemplis edocti sumus; neque etiam, sine convenienti horum usu, testium tumorum cursu non tam facilem, solis externis etiam alias valde efficacibus sanari posse identidem nobis perspectum compertumque est. De usu vero & viribus supra laudatæ nitellæ antimoniæ acris cum aliis permixtæ illud infundendum esse duxi, quod morbis & præsertim capitis doloribus a collivæ serofa ortis magnas vires medendi possideat, eo quod viscosum ferum cum per cutis meatum tum per renes insinuet educat. Illud enim notatu dignum est, quod cachectici gravatissimi dolores noctæ maxime insistentia & per longum tempus durantes admodum sine familiaribus, æque ægri tudines quæ ex viciata & impura lympha proveniunt ut plurimum infrequi tolerant; unde cum WILLISIO loco citato p. 202. non semel annotavimus, plures post variolas, morbillos, imo purpuram, cephalalgia quoddianæ fuisse obnoxios, ubi de sanguinem depurantia, quæ feri visiosi copiam per renes efficaciter educunt, optimam locant operam: nam ferum in cachectici corporibus in cerebri sinusificationibus imo ventriculi stagnans, dolorem illum ponderis instar gravem excitare valde est credibile.

Præter hac usque recensitis casus, notatu dignos adhuc suppeditant consultationes nostræ medicinales *sest. 1. cas. 1. & 2.*

## CAPUT II.

### De Dolore cardialgico spasmodico & flatulento.

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.

**I**nter graves & acerbos, qui misere genus humanum torquent, & corpus æque ac animam moleste afficiunt dolores, in qui cardialgici nomine venit, non postremum sibi vindicat locum. Neque vero cordis, ac vulgi fert opinio & germanice *Hervens-Angst* dicitur, dolor est, sed ipsius stomachi, cui partis valde nervosæ & exquisitæ sensationis, de præcipue ejus officiorum, acutus circa scrobiculum cordis consistens, cum ingenio anxietate, spirandi angustia, viriumque prostratione, inquietudine, nisi vomendi, extremarum partium tremore & frigore, levi animi deflectione junctus, à spasmo vel inflatione ortus, totum sæpe nervorum systema in consensum trahens.

##### §. II.

Neque vero omnis stomachi dolor; qualis subinde, à crudorum ingestorum copia & longiori eorum in ventriculo mora, pefflorius & anxius incidit, cardialgia nominandi, quia non est acutus, neque orificia ventriculi tunc valde dolent, neque passio corporis ac virium prostratio, quæ propria fere & formalia hujus morbi sunt signa, sentimus: nisi cardialgiam hanc spasmum vocare velimus. Est vero pro magnitudine causæ dolor vel vehementior vel minor; & hinc vel gravioribus vel levioribus stipatus symptomatibus.

##### §. III.

Acerbi hujus doloris sedes, ex communi medicorum tam veterum quam recentiorum sententia, finistrum tantum stomachi habetur orificium, quod jam olim HIPPOCRATES & GALENUS cardium vocarunt; unde etiam hic dolor cardialgicus nomen mutuatur. Nos vero potius dextrum, quod pylorum nominatur, orificium, imo totum, ratione tunicæ quæ instratus est valde sensilis nervosus fibrosus, stomachum adfici, vel ex eo elucere arbitramur, quia circa cordis scrobiculum, sub macronata carilagine ad latus dextrum, ubi constans pylori sedes est, hic atrox incipit & consistit semper dolor, & inde ad finistrum, quod in dorso non procul à speculæ medulla situm est & diaphragma circa vertebra thoracis undecimam vel duodecimam penetrat, se extendit. In his enim qui cardialgia defunguntur dextrum potius quam finistrum orificium in sectione affectum fuit inventum, adeo ut in quorundam pyloro, ulcera, abcessus, tumores, corruptiones sphacelose, quæ simul duodenum ipsarumque ventriculi fundum affecerunt, annotatæ fuerint.

##### §. IV.

Cum autem nunquam tristia & anxia in anima excutitur sensatio, nisi à causa violenta partes nervosæ & fibrosæ, vehementi distensione continui dissolutionem minante, vel valida constrictione, sive spastica strictura supra modum afficiantur: ita etiam observamus, cardialgiam aliam esse flatulentam, aliam spasmodicam, adeo ut in illa, ab incarcerationis flatibus, totus stomachus violenter defendatur æque dilataetur; in hac vero in ætius potius spasmus crispetur, coarctetur atque contrahatur.

##### §. V.

Non parum quoque refert discrimina & signa nosse, quibus cardialgia flatulenta à spasmodica distinguatur: in illa major spirandi juncta est difficultas æque angustia, eo, quod ventriculus inflatus, liberum diaphragmatis descensum, qualis ad faciliorem spiritum trahendum summe necessarius est, interceptat: deus tumor frequentius ad sensum sit manifestus, instat ovi in scrobiculo cordis ad dextrum latus inclinandus, observetur, dum pylorus inflato ventriculo semper attollitur: præter hæc ructuum aditus frequentia, quibus ex ore prodeuntibus, dolor nonnihil levatur incipit: denique post cibum, præsertim qui instat, assumptum dolor ordinario ingravescere solet. Ubi vero pericinationi spasmum tota ventriculi substantia affigitur; tunc major circa præcordia anxietas, major virium defectio, corporis passio atque extremorum frigus percipitur.

##### §. VI.

Si ad veneni naturam accedens humor causæ est, longe vehementior & quæ plurimum habent periculi junctæ sunt symptomata. Ita subinde in capite dolor, vertigo, somnolentia, agrypnia, mentis interdum emotio & convulsio: in cavitate thoracis, peffloris oppressio, cordis tremor & syncope, pulsus exiguus, debilis, interdum durus & inæqualis interminens quoque: in abdomine, ventris tormina, alvi confusio, urinae suppressio: in partibus extremis, refrigeratio, tremor, horror, sudor frigidus, facies livida, con-

Sed.

*Deflectit in flatulentam & spasmodicam.*

*Signa flatulenta.*

*Spasmodica.*

*Deflectit in spasmodicam.*

*Quomodo agnosceretur & curaretur.*

*et casus.*

contracta, foedi & flavescentis coloris in conspectum produnt.

## §. VII.

*Pathema-  
tum ex  
vitiis  
communibus  
causantibus  
est  
ventriculi  
inflatio.*

Tam atrocia in universo corpore, à ventriculo male affecto, suboriri posse pathemata, is non mirabitur qui ex anatomicis didicit, par nervorum oclavum, quod ad precipuas nervosas corporis partes internas fertur, & eis vigorem, robur, motum & sensum largitur, valde notabiles & insignes duos ramos ad ventriculi finitimum orificium spargere: atque inætnos per arcum minorem ad pylorum; externos vero ad fundum ventriculi ferri: & hinc confensionis, quam hæc nobilis pars cum syllemate nervosarum partium alit, ratio docuit quam apertissime. Neque enim ulla alia, in universo corpore pars est, quæ similem cum præstantioribus eisdem partibus aliat habeatque confensionem ac mutuam communicationem, præter stomachum; uti id fufius in *Medicina ration. Syftem. Tom. III. Sect. I. c. V.* à nobis est expositum. Inter alia hujus rei luculenta testimonia, observationes hinc inde in medicorum, qui casus ad medicinam forensam spectantes ediderunt scriptis, repetere id exhibent: quibus constat, a forti percussione cum manu vel instrumeto duro circa cordis scrobiculum facta, gravissima protinus symptomata, ut quis statim in terram gelidus concideret, epilepsia, imò morte repentina corripiatur, insequi.

## §. VIII.

Cum duplex sit cardialgia non secus ac colicæ species: altera nimium flatulenta, quæ ab incarcerationis fit flatibus, totam ventriculi cavitatem foriter distendentibus, qualis vocari solet germanice *Ober-Colic*, *Herr-Colic*: altera sit cardialgia spasmodica convulsiva, vulgo *heßiger Magen-Krampf*, sequitur nunc ut inquiremus, quæ ratione flatas, cum liberum alias habeant per aperta orificia transitum, firmiter in caviatæ ventriculi includi & detineri possint. Hujus quidem phenomeni tanto vix à medicis est tacta. Nos ejusmodi vehementem inflationem, quæ incidit in ventriculum, etiam effectum ipsius esse, affirmare nihil dubitamus; quæ tamen non totam ventriculi nervoso-membranaceam substantiam, sed tantum ejus orificia subtilioris sensationis infestat: unde is valde coarctatis & clausis, non mirum est, vapores ex indigesta maxime crudorum ingestorum mole, mediante calore, cum non inveniente exitum, totum ventriculum mire distendendo ac distrahendo, atrocem cum summa anxietate & spirandi angustia dolorem excitare.

## §. IX.

*Subiecta  
rationalis  
flatus.*

Sunt vero imprimis flatulente cardialgiæ obnoxii hypochondriaci, quorum stomachus copiosa colluvie biliosa & acida facit; ex quo fit, ut à passu aliquot horas, fortes circa præcordia tensiones, inflationes, gravæque dolores cum difficili spiratione experiantur, qui postea, ructibus ut plurimum acidis procedentibus, non nihil remittunt, vel vomitu superveniente acido pituitoso insigniter levantur, & demum paulatim redeunte calore ad ventriculum & extremas partes, quæ algescere solvantur. Vidimus tale quoque vitium sæpius in iis, qui post morbum paulo diuturniorem, magnam sibi ventriculi infirmitatem contraxerunt, quando paulo avidius cibos, præsertim incongruos, ut sunt pingues, acidi & fermentescibiles, fructus quoque horæ, ingerunt,

accedente simul corporis & quam maxime pedum vel regionis lumbaris refrigeratione, suboritur & crebris per intervalla reversum.

## §. X.

Vidimus quoque ejusmodi ventriculi, cum dolore & respiratione difficili, inflationem, in infantibus lactentibus, à lætæ in ventriculo coagulato & ibi stagnante acidoque faeco, ubi tota præcordialis regio, sub costis fissuris, mire flatibus distenta & turgida, visui pariter ac tactui se offerebat. Vulgo id vitium dicitur *das Hertz-Gespann*. In mentem nobis etiam incidit exemplum ejusdem juvenis, qui, à nimia recentia & mollioris casei comestione, & desuper Rheumato non adeo spirituosum sed acidulo vino hausto, in flatulentiam & gravem cardialgiam incidebat: quam medicus colicum dolorem, qui tamen longe inferiorem fidem habet, neque cum tanta spirandi angustia jungetur, reputabat. Neque hoc loco discrimen illud inter dolorem colicum, qui sub ventriculo in ea parte colli, quæ immediate ipsi subternitur, & inter stomachicalem colicam, si ita loqui licet, prætere debemus; quia non semel sed aliquoties, hac in re deceptos fuisse medicos, animadvertimus. Ut itaque circumstantias loci dolentis, antecedentes causas, notas quoque quæ cardialgiæ propriæ sunt, item sauos remedium successus, probe semper circumspiciat medicus observet, non sine ratione monendum ducimus; nam unico discutiente applicato chlystere, colicum sub ventriculo consistentem dolorem sublatum meminimus.

*Interdum  
inflatio  
flatibus  
causa.*

*qui differt  
a colica.*

## §. XI.

Unus vero plerumque flatulenti & tensivi ventriculi doloris causa, viscosus humor, qui intra duodeni cavitatem paulo diutius retentus, fluxu ventriculi orificia ipsius costringentes excitat: scimus tamen occurrere exempla mali flatulenti, ubi nullam materiam viscosam in ventriculi vel duodeni cavitatē animadvertimus. Quod vel ex eo judicare possumus, quia tales anxiet & flatulente cardialgiæ, formis præsertim junioribus, resistant mensium fluxui, imò per primos menses gravidis, familiarissime observantur, & ructibus dolorisque circa cordis scrobiculum & dextram se manifestant, atque exacte circa mensium tempus revertuntur. Simile quid aliquando in viris, hæmorrhoidibus suppressis qui laborarunt, evenisse novimus.

*Ad emphy-  
sem vel hæ-  
morrhoides,  
supposita.*

## §. XII.

Quamvis veto non adeo facile fit, hujus rei invenire causam, nos tamen quandoque consideramus, à sanguine intra intestini coli vel recti membranarum vasa stagnante, spasmodicum dolorem in iis partibus effici; nullam aliam pariter hic subesse causam judicamus, quam, quod facla valindrome, sanguis ad regionem ventriculi & præcordialem delatus, atque vasa ventriculi infarciens, ejus potissimum orificia spasticis stricturnis pariter afficit & infestare possit. Ex confirmamus in hac sententia, cum inter frequentes observationes in corpore fit, in iis qui æstivate stomachali flatulento spasmotico, sæpius lethali, & ut plurimum hydrogem post se trahente, laborant, post mortem inspecta & obstrueta viscera sanguinea, præsertim hepares, vel etiam polyposas concretiones in cordis ventriculo repertas fuisse, quibus dum obex ponitur sanguinis libero circulo, facile ejus im-  
penus

*causa effe-  
ctum.*

## De dolore Cardialgico spasmodico & flatulento. 259

penus ad præcordia ferretur, qui sic causam tam anxii doloris, quem perpetuo ructus concomitari solent, subministrat.

### §. XIII.

*Cardalgia  
spasmodica  
ab animi  
affectibus.*

Cum vero & sine singulari vel plane nulla inflatione, ille acerbissimus & anxius ventriculi dolor, vulgo *Magen - Krampf*, non tantum orificiorum, sed etiam totius substantiam, ob tunicam nervosam, spasmodum vehementem affligat, ejus etiam causas paulo exactius investigare oportet. Jam vero tal propædum in praxi frequentius occurrit, quam quod mox à vehementi iracundia, circa præcordia & cordis scrobiculum, & magis versus dextram partem, compressioris & contrictivus dolor cum anxietate & angustia pectoris, nausea, ciborum fastidio, oris amaritie obnotatur. Hujus ergo mali causam non difficilis invenietur, qui considerat talem esse iræ vehementioris vim atque indolem, ut maxime suum perniciosum effectum in præcordia exerat, per quæ, ut bene explicat FERNELIUS *lib. IV. de febr. C. 10.* regio circa ventriculum, diaphragma, jecoris cavum & in eo ductus biliaris deventi, pancreas, in specie ventriculus, ejusque superioris orificium, & quæ sub costis natis, anteriora versus & sternum inflectuntur, intelligitur, spasmodicis contrictionibus ea exercendo. Denique quoque ab ira valde commoveri biliosum faccum, & systole canalium, qui bilera vehunt, intensiori reddita, eam copiosius in duodenum effundi constat; ubi postea diuturniori mora, coarctativa fit & corrumpitur, & diarrhoeæ, cholerae, vomitionis, atque etiam doloris cardialgici causam omnino subministrat, quia acrimonia sua, & pylorum & fundum ventriculi afficit. A terrore quoque paulo graviore cito induci posse cardialgiam multoties experientia docet: & mororem etiam sensim sensimque humores corumpendo ad graves diuturnasque cardialgias disponere PLATERI *Obsero. II.* testimonium exhibet.

### §. XIV.

*Symptoma  
alignandi*

Affectio ventriculi spasmodica est frequenter symptomatice. Non pauca nobis sunt cognita exempla ubi calculus in principio, vel quod pejus, in medio uretrem harent, præter alia gravia accidentia, etiam vehementem cum intolerabili anxietate junctam cardialgiam excitavit. Simile etiam quod observavimus a calculo biliaris, si canalem cysticum vel cholangium pertransit, vel fixorem in eis sedem habeant. Quæ de re in frequenti Capite fusius agere nobis constitutum est. Luculenter vero etiam hinc apparet, quomodo per consensum à solo morbo vitio, pars corporis nostri sensu prædicta, absque materiali ibi existente causa graviter affici queat.

### §. XV.

*à venis.*

Longe vero atrocior & plenior periculi species cardialgie est, quæ ab hausto veneno urentis de caustica indolis inducitur. Vulgatissimum atque innumeris funestis exemplis infamatum illud arsenicum, & ei similia, non alia ratione perimunt, quam quod subtili & penetrante veneni acumine, alius in intima fibrarum nervearum ventriculi se infinuans, easque discindendo ac arrodendo, ad immanes spasticas strictiones adigunt atque exstimulant: quæ postea universum nervosum partium genus in consensum trahendo, non modo ea symptomata, quæ cardialgie sunt essen-

tialia, sed & insuper sèrviora & funesta, ut inflammationem sphaecologam, delirium, convulsiones, inducunt.

### §. XVI.

*ad emetic.*

Emetica ex sibi regularis substantia petitis, si paulo fortiori dosi imprudenter offeruntur, non nisi cardialgia inducunt symptomata; quam alius etiam motus concurrentibus causis, & ubi præcordia jam spasmo adfecta sicut, lethalem, non secus ac venena, quod multis, pro dolor! constat exemplis, operationem exequuntur. Id quod etiam de acricibus & validioribus purgantibus, quæ sublimi, caustico, & vesicante principio agunt, quorum impudenti usu multi pereunt, intelligendum esse existimamus.

### §. XVII.

Ipsam pestilentia virus, eruculentam suam vim, primo omnium, in ventriculum spasmi atque inflammationibus exercere, & graves cardialgicas passiones, sæpe syncopicas inducere, in propatulo est. Penechie, febribus purpuratis & malignis, si cardialgia succedit, quod maxime in morbi vigore fit, lethale signum esse solet. Pestimum quoque est, si cardialgia doloribus arthriticis, podagricis, quod evenit maxime, retrocedente materia ad interiora, item quando foetida cutis & partium externarum exulcerationibus supervenit, quod frequentius accidere solet. Nam materia illa activæ causticæ indolis, ubi à nexu & implexu humorum sequestrata, & ad cutis extima propulsa, relegit sua vestigia, atque nervolis tenerioris & firmioris texture ventriculi & intestinorum tunicis se altius infusant, non secus ac venenum agere solet, siquæ diutius persistit, cardialgicas anxietates inducendo, hominem exanimat atque non raro interficit.

### §. XVIII.

Dysenteria epidemica & maligna, quando ea incaluit compressit, insaulto de periculo sine omni cardialgia supervenit: dum caustica acris materia, ex intestinorum inferioribus ad superiora & ventriculum, retrogrado motu & impetu delata, principes huius partes graviter infestat, subinde lethalia accrescere symptomata consuevit.

### §. XIX.

Periculi quoque plena à vermibus innascitur cardialgia, quando videlicet, uti bene meminit TRALLIANUS, ex parvis inferioribus fustibus ad ventriculum ascendunt, ejusque orificia firmiter inhaerescunt. Memorabile est quod proponit HERCULES SAXONIÆ in *prælect. pract. P. II. cap. 7.* scribens: ante tres annos ego vocatus ad puerum indicem ætatis, verminibus repleto, cui pilulas exhibui. Mane cum reverterer, erat mortuus. Curavi ventriculum aperiri, inveni triginta tres vermes dodranodos viros, ori ventriculi adeo tenaciter inhaerentes, ut vis avelli non poterit. Similia exempla levi possunt apud HENRICUM ab HEER, & LANCISIUM *tr. de mori. febriu.* nec non apud RIVIERUM *L. 9. cap. 10.* Repente ejusmodi mortis causam non aliam fuisse, quam syncopen invincibilem, à validiori cordis sui prius valorum ipsi vicinorum contractione derivandam, veri est simillimum. Ex quo intelligitur, quanta sit ad vitam servandam stomachi seu pilorici

bilioris partis præstantia, ut igitur HELMONTIUS hac causa fuerit adductus, animæ sentientis ibi sedem collocare.

## §. XX.

Sunt vero adhuc aliæ, atrocis stomachalis spasmus abditæ causæ. Nam ubi dolor indefensus est, & per multos trahit menses, ut carnem ac omnes demum vires consumat, labem ac vitium in partibus solidis subesse recte concluditur: quod etiam sectionibus post mortem insinuat evictum habemus. Ita in tali chronico vitio, RIVERIUS, vid. cent. 1. obs. 90. scirrhum, totum pancreas, pylori ac duodeni principium ambientem, invenit. JACOBUS HOLLERIUS, de morbis internis pag. 173. de quodam narrat, qui febre, cardialgia, vomitu, torminibus ventris, dejectionibus pici similibus diu vexatus, tandem obiit. In cujus secto corpore inventum ulcus pustulanum in ambitu, quod nuncas omnes ventriculi, qua parte in pylorum est aditus, exedit.

## §. XXI.

Alia adhuc durum hunc affectum generandi ratio ac via per metastasin est. Ita binis exemplis nobis constat, parovidum tumores in fœtu muliebri non adeo exiguos, æternis quidem applicatis evanuisse, sed brevi post cardialgiam cum angustia spirandi inscutum fuisse. Observant quoque à nobis est, & hemicraniam, & cardialgiam inter se alternasse, ita ut cardialgia subita hemicrania fuerit secuta, & postea, hac ipsa discussa, cardialgia redierit.

## §. XXII.

Ceterum dolor ventriculi cardialgicus ex iis est morbis, qui, nisi diutius persistant, non facile necent, nisi accedat inflammatio: quare non sine periculo est, si alius morbis præterum febribus acutis & malignis superveniat. Perire enim HIPPOCRATES prodidit Sect. IV. aph. 65. in febribus circa ventriculum fortis æstus & cordis morbus seu dolor malum est. Porro etiam hic adfectus inter eos referendus est, qui certis & ordinatis temporum intervallis quandoque etiam inordinatis redit, & vel breviori, vel longiori tempore affligit, ac alio tempore mitior, alio vehementior est. Et ut ordinario fere cum frigore in dorso, horripilatione cutis, non raro etiam oscitatione & pandiculatione ejus accessio est, atque in vigore extrema, inferiores maxime partes inalgescunt, adeo ut etiam calidum sitis vehemens admonum vix percipiantur: ita hic dolor, non nisi calore redeunte in partibus extremis, calidoque tandem sudore obortente per totum corpus, solvitur atque discutitur. Et ut sub frigore pulsus consuetus & exiguus est, ita major & mollior sub declinatione fit: quod etiam evanescens mali certissimum est signum.

## CURATIO.

## §. I.

Quemadmodum sagax & peritus medicus, nec certa ad morbum tollendum remedia commendare, nec una eademque semper via ac methodo in curando procedere debet & potest; sed opus habet, ut ad varii generis causas, agro-

tantis naturam, & alias atque alias circumstantias, morbos antecedentes & symptomata respiciat: ita etiam in hoc gravi & periculoso morbo sanando, idem fieri debere omnino necesse est. Nihilominus tamen generales has medendi indicationes, pro scopo, per medicamenta succurrendi, tenere debet, quæ hæc sunt: primo, ut materia viscosa vel mole vel acrimonia peccans, circa stomachum hærens temperetur, corrigatur ac demulceatur, blandeque per digestionem vel commodam evacuationem removeatur: secundo, atroces dolores, qui vires mirum quantum depriment, ne inflammatio succedat, sopiantur: tertio, si symptomata est, morbi primarii ratio habeatur, & quarto, ut tonus & robur ventriculi & intestinorum à dolorum & spasmodum violentia labefactorum idoneis remediis restitatur & confirmetur.

## §. II.

Quis sæpius acidi ponici humores accumulati ac congesti in stomachi regione, bilem in duodeno diuturna mora portaceam, æruginosam & valde corrosivam reddunt, & atrodendo nuncas nerveas, præbent doloris cardialgici causam, idque non raro in hypochondriacis, nec non à nimis viscosorum acidorum ingurgitatione & fructuum horarum fermentatione evenit; solis unique absorbentibus, nec non acrimoniis demulentibus, non adeo difficulter curam expediri posse experientie conforme est. Quo nomine pulveres qui lapides cancrorum, cornu cervi philosophice præparatum, conchas vel marem perlarum, crystallum mooratum vel melius glaciem Mariæ præparatam recipiant, commendamus, præsertim si cum aqua carminativa leniter spirituosâ exhibentur. Pertinet huc quoque ad infrigendam & mulcendam acrimoniam ex rursu cornu cervi gelatinosa decocta probe saturata, decoctum avenæ excocticanæ, cum amygdalis dulcibus subactum & syrupo papaveris albi edulcoratum.

## §. III.

Ubi vero bilis valde acris sulphurea & calidissima, ab ira commota, causam hujus mali subministrat, consultum est, ejusmodi jam laudatis pulveribus aliquot grana admiscere nitri purificati pro dosi, atque in decocto eos exhibere. Opus vero interdum est correctam bilem leniter per alvum evacuari. Experientia etiam crebriori didicimus, in hoc atroci adfectu, si à bile nimis calida ebulliente & caustica obortus fuerit, solam aquam puram & frigidam, per vices, usque ad mensuram dimidiam vel ultra hausitam, recto bene corpore & impoſito stomachali regioni calido somento, insigniter profuisse, ac subsecuto sudore per universum corpus, dolorem summo cum levamine discussum: eoque remedio acrimoniam biliosam non modo dilutam & temperatam, sed & nimium æstus depressum, ac denique ipsum robur, quod ingenti calore & dolore dejectum erat, quodammodo restitutum fuisse. Vidimus quoque, cardialgiam cum cholericâ passione junctam hoc unico remedio summo cum levamine conquiescere. Pertinet huc quoque insignissimus feri lactis, item emulsionum usus.

## §. IV.

Non rarum nec insolens quoque est, post tertianam, anxium circa præcordia dolorem, cum

causa abditæ

in partibus solidis vitium.

in partibus solidis vitium.

Morbi durus.

Indicatio in quibusdam.

Commen-  
datur ab  
Hollerio.

demulcentia.

nitroſa.

lavanda.

aque frigida.

alio qui  
in vomitu.

Post tertianam  
anxium circa præcordia  
dolorem, cum

## De dolore Cardialgico spasmodico & flatulento. 261

cum insigni virium languore, ciborum falsidio, oris siccitate, & animi leviuscula defectione, lentoque calore interdum observari; quæ cuncta mala a bile acri & viscosa, coëssosus in duodeno, si virus ejus motus peristaltica sub morbo valde fracta fuerit, conservata diuvsusque flagranteproduci, exinde demum intelleximus, dum leni emetico, verbigratia, uno vel altero grano tartari emetici, cum sufficiente quantitate aque dato, effusa magna salutar, conquevisse protinus hæc omnia mala vidimus. Refertur huc optima ratione HIPPOCRATIS *Aph. XVII. Sect. IV.* meretur, qui, non febricitanti, ubi cibi fastidium, cordis dolor, vertigo tenebrosa & oris amaritudo, purgatio per superiora opus esse, significat.

### §. V.

Siquæ cardialgie biliosæ, quod sæpius fit, vomitio jungitur, liquorem anodynum nostrum minieralem cum aqua frigida fontana, vel aqua florum chamomillæ, millefolii, acaciæ, tilia, simibuci, lilorum convallium, primulae veris, cum presentaneo levamine exhibuimus. Sub hoc flatu magnopere cavendum est, ne medicus calidas effluvia stomachales vel carminativas porrigat, neque crebriori calidiorum infusionum usu acutum maceret, quippe hæc omnia dolorem magis augent, quam minuunt.

### §. VI.

Ubi vero intestus, pressorius, & gravativus stomachalem regionem diutius sollicitat dolor, ille quæ a crudantibus acido viscidis, firmiter ventriculi aut duodeni tunicis inhaerentibus oritur, quod frequentissime in illis, qui ex morbo jam convalescent, ac qui etiam ab aliis causis infernum habent ventriculum, evenit, tum unigue alia curandi opus est ratione. Nam sub tali casu, medicamenta digestiva, & quæ salino oleo & aromatico incidente ac roborante principio agunt, necessaria sunt: quod nomine probatur & experientia, quæ sequuntur, proponere & laudare volumus, ac prout pulverem qui ita habet: rec. radiciae an, pinguinellæ, zingiberis, galangæ, flavedinis corticum aurantiarum, seminis cymini, macis, singulorum drachmam, sacchari Canariensis ad pondus omnium. M. f. Pulvis, qui convalescenti doxi leniter cum vino optimo decoqui & propinari potest. Dein sequens se commendabit mixtura: rec. essentia zedoariae, carminativæ Wedelii, spiritus de tribus ana. drachmas duas, balsami nostri vitæ guttas XV. Interdum vero opus est, ut ante horum usum, colicæ visioforum humorum, si nimia est, blande per superiora educatur, præsertim si ad vomitum appareat dispositio. Verum tunc non facile ultra radicem ipecacuanhæ ascendere licet: cum hæc non tam valide nervosæ tunicas contemoveat atque aggradiatur, nec post operationem, dispositionem ad vomitum relinquat, sicut ea quæ ex subito purgantur consueverunt.

### §. VII.

Ab haustu veneno caustico, item a nimis drastico purgante & vomitorio, si quis in hoc malum, quod vitæ sæpius præterit minatur periculum, conjectus fuerit, tunc vix efficacius auxiliandum, ac in usu lactis recentis, item in oleis, oleo amygdalarum dulcium, olivarum, sufficiente quantitate haustis, addita simul doxi theriacæ veteris expectandum erit. Præsertim vero in principio

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

tantum lac solum, siue melius ejus cremorem sine theriaca dare, ne vomitus & secessus, quod sæpius optime venenum & corrosiva materia simul expellitur, nimis cito sistatur.

## CAUTELÆ

### §. I.

Quando cardialgia seu symptoma, aliis morbis ut acutis vel etiam exanthematicis supervenit, quod rarius fit sine periculo exitialis inflammationis, tum pulveres bezoardici, cum aliquot granis neri, & quarta parte vel dimidio grano camphoræ, ob vim blande diagnosticam & discutientem, non caret usui eximio. Sed consilio ob auspicatum & meliorem succellum, ut cum emulsione, quæ ex amygdalis dulcibus, seminibus IV. frigidis, & semine cardui Maris, cum aquis florum præsertim sambuci concinnata est, pulveres dicti propinquantur. Siquæ materia à superficie corporis propulsa, veneni propemodum indolem referens, rursus ad exitum cum releganda censetur; liquorem nostrum anodynum minieralem, cum quarta parte spiritus Bussii vel tartari mixtum, & per vices pro re nata datum, adhibito simul conveniente & placido regimine diaphoretico, sæpe numero convenientissimum & proficuum invenimus.

### §. II.

Quando à mensibus subsistentibus, & represso inde sanguinis impetu ad præcordia, mali origo est, tunc unigue venæ sectio in pede celebrata, modo non fiat in paroxysmo, sed eo remittente, nec sub extremorum frigore, præfens & efficax auxilium præstat. Postea reliqua curatio, cum blande anodynis & discutientibus externe adhibitis, erit conficienda. Nos in omni dolore cardialgico, seu peculiari virutis remedium, flores chamomillæ vulgaris & quæ ex illis parantur, plurimum commendamus; cujus generis aqua florum chamomillæ, oleum de stillacum delicatissimum verum, non cum oleo terribitudine adulteratum, in eleosaccharum redactum, item Essentia bene saturata cum Spiritu florum chamomillæ non adeo spirituosus & eleosaccharo ejusdem olei adornata, ad motus spasticos sopiendos, longe efficacissima. Spectat huc quoque extractum, quod cum aliis convenientibus, intra pilulas recipi potest. Vulgatissimum, sed revera valde probatum domesticum est decoctum chamomillæ florum, cum cerevisia vel jusculo avenæ excorticatæ, vulgo *Haber-Grütze*, adfuso præsertim oleo amygdalarum dulcium, calide per vices haustum.

### §. III.

Deinde in omni dolore cardialgico, chylisteres thymum ano infundere demulcentes & emollientes, nunquam non proficuum. Quales ex floribus chamomillæ, ex oleo horum cocto & de stillacum, item seminibus IV. carminativis parati, si ex lacte coquantur, sunt omnium optimi. Sed opus est, ut bis vel ter quandoque injiciantur, nam blando suo tempore demulcent, nec non rigidas fibras laxant ac emolliente facultate, ut in omnibus fere gravius doloribus, ita etiam in hoc, insigni levamen afferunt.

### §. IV.

In præcordiali & gravi dolore quoque, nunquam

Quomodo  
trullanda  
impuncta  
est.

Si à mensibus  
desistit.

London  
per ex  
chamomilla  
pavara.

thymum  
ano.

nam.

quam non exterius epigastriacae regioni applicata idonea remedia, magnae observantur utilitatis; & inter plura alia summam & mirabilem efficaciam eorum, quae sequuntur, saepius experti sumus. Inter quae primum est linimentum, ita componendum: Recipe etherae, olei nucis expressi uniusque unciam, castorei, croci, balsami Peruviani ana drachmam, olei de cedro, caryophyllorum ana guttas XX. camphorae drachmam dimidiam. Aliterum sunt species quae sequuntur. Rec. herbae menthae, florum chamomillae vulgaris, Romanae, sambuci, singulorum manipulum, baccarum lauri, juniperi uniusque unciam dimidiam, seminis cymisi, carvi, caryophyllorum, nucis moschatae, ana drachmas duas C. C. D. S. Species quae sacculo possunt includi & calide parti adhaerere applicari. Calor enim egregiam vim levandi & discutendi possidet.

## §. V.

Si vermes causam subministrant, tunc utique longe alia curatio est ingredienda via. Minime vero, si hospitium eorum est in ventriculo, fortiora anthelmintica, praeterquam quae acri, valida arrodente facultate, operationem suam consequuntur, ut mercurialis, viriolum Venerei, vel Martis, purgantia aloetica, vel etiam salia alia non inutilia porrigenda; eo, quod haec malum saepius exasperent: sed potius hoc tepidum, cum oleo anisidulorum dulcium sufficienti quantitate offerendum. Quae demum cecido, escam pariter animalculis hinc, ne arrodant tunicas, praebendo apertissima sunt; maxime omnium vero, eam quoque ob rationem, quia, si repide hac in magna copia hauriatur, ventriculi inversione facta, ingenti itumore per superiora episturum.

## §. VI.

Hypochondriaca - spasmodica passio obtutu, crebro recurrentibus hinc anxietatibus, per longum tempus praesens. Quo in casu, omnibus aliis interim adhibitis, aquae theriacales, praeterquam Carolinas aliquas usurpatis utilissimas observavi. Sed harum usus interdum reiterari debet. Haemorrhoidalem fluxum inde secutum, maximo cum levamine, non semel experti sumus. Ceterum elixir balsamicum nostrum quod viscerae audit, item quod in notis ad *Petentium* descriptum, cum essentia castorei remixtum, nec non pulveres temperati leniter nitrosi, amissulmodici, venae sectiones aequinoctiales, in chronicis istiusmodi doloribus, magno sunt praestidio.

## §. VII.

Qui cardiagie passio est sunt obnoxii in & extra accessiones a medicamentis, quae facilius sunt naturae, provide fieri cavere debent: quo perimit usus formae Sedleensis, quem plus novae quam emolumenti attulisse observatum a me est.

## §. VIII.

Ad recursum perniciosis huius mali impediendum, plura occurrunt notia digna. Primo non facile, qui ad hoc malum sunt dispositi, purgantia praeterquam acriora admittere debent: quia haec natura sua, stomacho ejusque partibus insensata, ingentem, si crebrius usurpamus, irritamentum reliquit: quae nihil ad recidivas contrahendas pejor est. Praeter haec, motum humo-

rum ad primam regionem ex aliis partibus alligunt. Videndum tamen nihil minus, ut alvus semper maneat libera atque aperta, quod multo tutius sit, quando per alimeta id praestare alaboramus. Deinde contra frigus quam maxime & praecordialis & dorsalis regio, ubi ventriculus cum orificiis situm suum occupat, sufficiens integumentorum ope, munienda erit. Quam nocivamenim partibus nervosis, & inorbia qui in eorum debilitate consistit, frigus sit, dici non satis potest. Vix autem eo perducere homines possunt, ut veritati hanc fidem faciant, eamque intelligant. Denique, victum quod concernit, ab omnibus excelsiva qualitate & immoderie praeditis, nimis salinis, sumis induratis, pipere, alio, aceto conditis, raphano rusticano & huic similibus abstinere oportet. Vicilium maptem in modum commendamus jura gallinarum, ac carnis vitulinae; & ut sibi a pingui carne temperent, imprimis quando potio frigida supercingitur, vel externo frigore stomachalis regio tangitur, suademus.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Feemina honesta aliquot supra quinquaginta annos nata, habitus corporis lymphatici, succi & sanguinis pleni, vitae sedentariae addicta, decennio abhinc fluxum uterinum non amplius passam, venae sectionem binis vel ternis quotannis vicibus celebrans, vegeta atque continua sanitate usque; sex ante annos gravi & diuturno animi dolore ob laetissimos familiaris fratris casus afflicta. Ab hoc tempore valentius vacillare & molestissimum per quinque jam annos crebro redeuntibus paroxysmis infestare cepit morbus, à levi statim frigore dorso admisso vel ab animi commotione aut terrore originem manans. Morbi vero insectus hunc servare plerumque laevit modum. Praeestitit nimirum dictario, sequente natum, animi nec non faciei frigore. Striguntur dein fauces, tum gelu dorsum, manus ac pedes occupat, postea fibriculus cordis infestus, fixa & ardens dolore affligitur, qui extenditur ad ipsum dorsum ubi ventriculi orificium finitimum situm est, imperialis tantummodo spatium implens. Adest praeterea summa anxietas, inquietudine juncta; pulsus contractus, frequens & debilis micat. In lecto consistere nequit sed exurgere debet. Ad alvum & urtham reddendum neque minus ad vomendum stimulum quidem perentit, neuritis tamen sublequentibus. Inter omnia autem, quae agram aciem infestaverunt symptomata, animadverti meretur istud, quod frigus quo dorsum corripitur adeo intantum sit, ut nulla, nec à calidissimo admoto lapide caloris precipitatur sensum, quin sub brevi temporis lapsu illud satis spemularem removeatur. Sed ad alvum firmiter clausam subducendam, clysters emollientes & oleosi injecti sine effectu redierunt: neque flatus per inferiora, neque ructibus per superiora exhus ulla, sive raro illud congerit, sive concessit. Tandem elapsa aliquot horis partes superiores primo, dein inferiores sensim incallescere ac madescere incipiunt, donec ultimo largus sudor prolicuit, & paroxysmus, quatuor vel sex interduum horas perflans hoc ipso solvit. Sub decursu paroxysmi omnia fere remedia, cumprimis sub frigore, agra valde averantur: conclave autem calidum, regulas

Cardiagie  
in calidum  
et reme-  
dium ca-  
mum afflu-  
verunt  
& frigus

Sella vi-  
landa.

Neobis  
propru-  
aria.

## De dolore Cardialgico spasmotico & flatulento. 263

calidas & lineamina calefacta extremis præsertim paritibus adnota ferre quam optime possit. Calore corpori reddito pocula aliquot infusi Colicæ cum liquore nostro minerali anodyno, quarta ballami vice, vel dimidia elixiri stomachicæ parte remitto assuam, quod unicum fere medicamentum naturæ ægrotantis conducibile reperi. Finito morbi impetu virium remanet defectus, & urina que modo in paroxysmo aquæ instilar limpida comparebat, rubicunda crassum deponens sedimentum prædia.

### Epirisus.

Affectus hic cardialgiæ chronicæ spasmotice nomen pure in retur. Neque enim ventriculi inflatio in incoagulatis ingelitis oranda, liquidæm ægra accuratorem fervare diuturn consuevit, dici poterit: sed nervolum maxime genus affici atque compari & ortus & motus progressus agere loquuntur. Notum enim dignum est, motuum affectui originem dedisse, ac frigus denum & animi affectus cum excelsis. Animiactum quoque, motuum hunc paroxysmi febtilis pene typum æquæ, a lumbari regione, ubi magnus mectricæ plexus sinus obit, initium sumere, ac nervosa corpora partes contrahendo, sanguinemque & humores ad cor & vasa mæstra repellendo tragediam ludere. Accedit quod acceperim ab honestissima femina, ægritudinem esse hereditariam, quæ matrem, matricem sororem contempnerit, eaque longo tempore excruciatæ. Ceterum consilii, ut frigus omni modo vitaret, atque sedulo caveret, ne illud doctum temere possit, calidis idcirco pannis tegendum; ac animi quoque commotione nec non alimentis refrigerantibus quantum fieri possit abstinere. Quidam quidem & pulverem nostrum præcipitum in non bene ferre possit; elixiro autem stomachicæ cum hquore anodyno remitto, sapus unius, nec non infusum Colicæ ter per septimanam bono cum fructu usurpat. Quasi demou ut corpus motu decem sapus exerceat, quia tam malum raris affligere observavi.

### OBSERVATIO II.

Mulier parvæ sed obese staturæ atque plethorica, quadragesimum jam annum supergressa, cognatum invadens grana cum marino in propinquam civitatem iter fecit. Præter alia edulia carnem vervecinam pinguem assitam larga manu assumpta, cervicium triticæ, qua nutritum alias fuerat as, superbibendo. Vesperti sub aura intente frigida domum reversa, conqueri de anxietatibus & vehementi dolore circa præcordia coepit, concomitante faciei & extremorum frigore, nocteque inquietæ. Dolor non perficit in præcordiali regione, sed per totum abdomen flatus mire turgens se extendit: alvus simul erat adstrictissima. Symptomata non modo nocte affligebant, sed die etiam sequente infestabant. Opponebantur huic malo varia ex domesticorum apparatus pecunia: parvi quoque & tepide calidæ in usum extrinsecus tractæ: sed succellus fessile. Accessus ego, ægram inventi angustis circa pectus valde molestantem, ut spiritum ægre docere poteris, abdomine mire turgido, animum levissimis defectibus intercedentibus. Adstans catarthum fuscicativum trepide movebat. Ego singulis horis, duo pocula brodia renais ex carne gallinarum, una cum cochleare Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

olei amygdalarum dulcium, additis X. liquoris nostri anodyni mineralis & V. ballami vice guttalis præbere iussi: post, enema, ex speciebus carminativis, oleis expressis, adjuncto stimulo salino paratum ano incipiendum præcepi. Præstabilem reliquerunt effectum, & flatus ac ructus cum & ætra non sine levamine succellere. Tegulas valde calefactas removi, utpote quod non modo molestiam, sed & doloris augmentum, ipsa id ægrotante allevarent, creabant: ast linimentum, quo inungeretur locus affectus, ex axungia humana, oleo distillato curvi & aliquot granis camphoræ subleui. Ad levandam, qua premebatur, sinu, infusum Thiciforme ordinavi. Præterea vini calidi medicati ex infusione abstinui, cornicum aurantium & macis parati poculum aliquando potexi. Postero die potunculum mannatam, ex mænnæ uncis duabus, cremoris tartari drachma, essentia cordum aurantium guttis XX. & olei amygdalini dulcis aliquot cochlearibus paratam propinandam curavi: cujus operatio duas post horas clystere secundata. Quibus id consecuti sumus, ut ingens visioforum humorum colluvies, tam per superiora quam per inferiora, fuerit educta. Sudor denique per totum corpus erupit, & symptomatum vehementia DEO adjuvante finem disculsi. Ad recursum vero morbi prævidendum, ventriculi digestionem pulvis nostris balsamicæ atque elixiro carminativo adjuvimus.

### Epirisus.

Nihil ad ingenerandum ventriculi & intestinorum doloris ac flatulentis reperitur valentius, ac caro pinguis vervecina, superingerendo frigidum inusitatum potum, corpusque spongiosum excessive frigide autem committendo. Eri autem enarratus affectus cardialgico-colicus recte dicens, eo quod coagulatum pingue in duodeno subsistens, ventriculum & intestina flatus mire distenderit, atque à transpiratione prohibita serum acre redditum, tunicas earum vellicando & irritando, ad spasmodicæ stricturæ magis sollicitaverit. Quæ cum in corpus plethoricum venæ sectioni minus assuetum, sed eam maxime abhorrens, incidere; tam atrocia malo se focalis symptomata nemo mirabitur. Ceterum ut coagulatum in duodeno dissolveretur atque saluberrima transpiratio restitueretur, potus urique calidus erat præbendus: sicut ad discutiendos flatus vinum abstinere non in casum fuit adhibuit. Hoc quoque instar camæla tenendum repeto, quod in abdomen doloribus qui ab inflationibus oriuntur, extreme calida partibus affectis applicare non semper sit consilium; ut autem extreme partes blando atque temperato calore foveantur ego quidem auctor sum. In priori enim casu, flatus qui ab aere tarcfacto & intestinis inclusio nascuntur, à calore externo, ut experimentis physicis edocuit, majorem elasticam & expansivam vim acquirunt. Deinceps annotationem meretur, vitiosam materiam flatus in intestinorum canali excitantem nusquam felicius ac etiam tutius quam lenioribus convenientibus laxantibus, & clystere una vel altera hora post injecto eliminari posse; siquidem hac ratione primæ viæ non modo potius à sordium inquinamento liberantur, sed flatus quoque versus inferiora ducuntur.

### OBSERVATIO III.

Quinquagenarius illustis, temperamentis fan- Cardialgia  
Z 2 guineæ flatulenta

Cardialgi-  
ca circa  
ex com-  
plene san-  
na afflu-  
tu impetua  
de frigore.





argumentis demonstrata, eo perventum est, ut aperiri quidem veniat sed non ultra quinque uncias educi permitteret. Verum nec tum symptomata conquieverunt, ut ut remittere visa fuerint. Dedi interea sanguinis impetuosum motum compescens: quo nomine liquorem meum atodynium, pulverem precipitantem nitrosum, nec non emulsionem ex seminis IV. frigidis celeberrime deprehendi. Quam vero ex toto cessare malum nollet, pulsus eadem celeritate ageretur, atque nox inquieta persisteret, multa opera impetravi, ut tertium, quarto videlicet ab invasione die, venam secari concederet. Detraclis VIII. circiter uncis, praecordiorum anxietas, inquietudo, ac febrilis calor confestim deservuerunt immensibus tunc doloribus maceratum Principem, non sine insigni ejus & adflictum exultatione. Atque appetitu, somno, virumque augmento redeuntibus, integre sanatae divitiae bonitatis adjutorio fuit restitutus.

#### Epicrisi.

Circa hunc casum animadvertere quam maxime licet, sanguine nimium abundantibus vehementem & diuturniorem motum subito & imprimis sub coelo aestuoso susceptum valde perniciosum esse infernum esse; siquidem sanguis copiosus inest in agitatione fortiter commotus valde urgetur, valaque dilans hinc inde stagnat atque subsistit, graves scilicet spasticas stricture pariter ac impetuosas ad partes congectiones. Similiter fieri observamus, quando corpora plethorica in balneo nimis calidum minuantur, vel sudorifica fortiora cum regimine calido obstruuntur: nisi enim symptomatibus ingravescentibus mature solvantur plethora, graves & periculosa haud expertes sentiamus agnitiones. Porro ex hac morbi historia docetur, quod immanes cardialgicæ passionis a solo sanguine intra membranas ventriculi stagnante, sine ulla viscerum humorum in ejus cavitate itabulante copia, excitari possint, atque unicum auxilium in sufficienti sanguinis detractatione repositum sit: quæ neglecta vel insuper habita, nec praefensibilis alias virtutis ad vincendum talem morbum remedia quicquam perficere posse, recte colligitur.

#### OBSERVATIO VI.

Cardialgia  
spasmodica  
et plethorica  
et humorum  
plethorica  
non rite  
sanata.

Duobus abhinc annis ex Anglia hic casus ad nos fuit missus & consilium meum requisivimus. Illustissima femina, triginta annorum, sanguineae complexionis, ante decem jam annos gravissima laboravit hemerica, quæ usu theriacum Epistemonium fuit liberata. Postea maritata, in ipso puerperio idem malum rediit, atque eandem ope aciculatorum post aliquot tempus sublata fuit. Verum non ita multo post, intolerabilis intestinorum invasit dolor, per decem dies in inferiori eorum parte consistens cum tumore, qui etiam alvi depulsionem valde difficilem reddebat. Ubi vero haemorrhoides fluere coepissent, sublevatus quidem dolor, sed inferior tumor alvi obstructionem efficiens remansit, atque etiam semper pressione thoracis, quæ sit in seminis per ligacula, interire, qui tamen applicatione alii cum lacte levans quodammodo fuit. Ab eo tempore labem contraxit ventriculus, ita ut à cibo minus salubri vel etiam copiosius ingesto, anxia compressio & constrictio circa praecordia fuerit secuta: quæ in puerperio secundo atro-

cior reddita, licet carminativis & anodynis exhibitis quodammodo remiserit, tamen ex toto vinci non potuit. Hanc medicus quidam expugnandam vomitorio promissit: sed tantum absuit ut inde diminuta fuerit, quin potius incrementa majora coepit. Neque vina medicata, neque laxantia, quæ in usum subjunxit, quicquam profecerunt. Optimum tamen levamen vinum Hungaricum in quo cinamonum & caryophylli cum saccharo leniter coquebatur, ad duo pocula loco Theæ haustum, praestitit. Inde vero facies valde rubicunda pruriente tunc pleno colore perfusa fuit, qui sub graviditate multum remisit. In ipso vero subsequente puerperio tam atrox spasmus ventriculorum & praecordiorum regionem per septem fere hebdomadas indefinenter afflixit, ut virus inde nimium in modum fuerit profligata, omniaque fere ingesta vomitu rejecta: pari modo a vino Gallico Frontignan vel Hispanico quodammodo sive hic dolor fuit sedatus. Interea spasmus primarum viarum semper continuat, adeo ut ab omni cibo, sive in coena, sive in prandio summo, augeatur: ita, ut interdum caput & pectus constringendo, & abdomen comprimitudo, afficiat. In scrobiculo cordis, circa dexteri lateris costas spurias, dolor semper magnitudine ovi gallinacei percipitur, qui interdum remittit, sed sub ejus accessione, quæ iam facile proritat, dorsum occupat & insensum languorem, exterarum quoque partium tremorem inducit. Ceterum, haemorrhoidum interitum tumor, cum alvi obfipatione, continuas & fere indivulsas mali lupus fuit comes. Cerevisiam assument, ardorem semper cum dolore percipit, qui tamen summa magnæ dosi mitis: quare decocto ex mastiche & cinamomo parato, pro quotidiano utitur potu.

#### Reflexio.

Meum de hoc affectu ejusque causa & mendi ratione tale fuit iudicium. Originem videlicet & causam tum orbitalis tum cardialgicæ atque haemorrhoidalis tumoris & doloris, à nimia sanguinis spissi & impuri redundancia, valde sanguinea membranarum capitis, ventriculi & intestini recti, praetertim cum ibi non inveniuntur, supra modum dilatescentis & distrahentis, in persona laetis atque dubio & nimis quæte vivente, duendam ac derivandam esse putavi. De sanguinis missione nulla fuit mentio facta, quæ tamen summe fuisset proficua, perinde ac hirudinum ad venas sedis applicatio. Tempore gravidationis semper melius se habuit, quia supervacanea sanguis in nutrimentum fortis absorbuit esse. Puerperium exaclum, conversio rursus per spasmus hystericos puerperia solennes impuri sanguinis motu ac impetu ad congestas imbecilliores nervos partes, exacerbatio mali fuit secuta. Nihil omnino ad hanc causam removendam & etandam, neque emetica, laxantia, neque potius etiam spiritalia, licet levamen quoddam palliativum praestiterint, conferre poterunt. Consilium dedi, ut ter minimum quotannis venæ sectio in pede administraretur: dein, ut bis in anno curam cum aquis mineralibus insisteret, utpote quæ etiam inter initia hemericae tumorem in sublevari felicissime. Epistomonem enim aquarum sublimium & spirituosarum ope, spissi & impuri humores corrigimus, dilui & fluxiles evadunt, excretionem salutaris promovetur & partibus nervosis robur adjuatur.

præsertim, si cura debito diæte moderamine, motuque corporis decenit secundetur. Id quod nos enim omni diligencia inculcavimus.

## OBSERVATIO VII.

Tribus circiter abhinc annis, Consiliarius & Nobilis ex Livonia ad me valentinianum suum statum perscriptit, consilium meum efflagitans. Conqueſtus nempe est de immensi dolore pectoris & spasmus circa præcordia, quo jam per aliquot annos correptus fuit: initium sumens cum extremum frigore, ab hypochondrio sinistro ad cordis scrobiculum, sternum, pectus, dorsum, imo ad brachia se extendens, cum spirandi angustia, inquietudine, virium omnium dejectione atque anxietate affixit, quandoque minori gradu & haud diu insistenti. Admotis fomentis calidis, injectis chyliferis, exhibitisque internis diaphoreticis movendis remediis, sensim redeunt ad partes externas calore, vis mali imminuit quædam vel sopita fuit; atamen ex animi perturbatione aut frigore hiemali ad cutem penetrante, vel incongruo assumpto potu ac cibo, promte & facile recruduit. Originem & causam hujus perquam molesti affectus intemperstivæ & immodicus venationibus, sub cælo rigido & frigido susceptis, nec non liberalioribus vini potationibus adscripsit. Non nulli ex medicis a defectu hæmorrhoidalis fluxus mali causam accercentes, quem nunquam tamen expertus est, venam pertundi his vel ter quotannis suaserunt: sed citra omnem salutarem successum. Exquisivit meam de usu Carolinarum sententiam. Ego consilium omnibus modis approbavi, eo, quod plures viderim simili affectu laborantes, qui non nisi interno horum fontium, externo vero Torpescens usus, ab atroci malo liberati ponerant. Adsci illud, quod si stagnatio sanguinis in intestinis crassioribus exoritur per venas sedis molens causam præbeat mali, vix ullum præter has danti neque mihi cognitum esse remedium, quo, si modo natura ad hæmorrhoidalem fluxum inclinet, rectius & facilius promoveri possit. Scripti quoque post aquarum thermalium potum, balneum Torpescens in ejusmodi parium nervosorum affectibus longe utilissimum me observasse. Mira enim est ejusmodi aquarum subtilium in infirmis nervosis partibus roboranda, in spasmus contractis relaxanda, atque in sanguinis & fluidorum motu versus superficiem corporis determinando, efficacitas. Aulicavit Generosus & illustis patiens meo consilio: & ænequam adiret thermas, suum ad me direxit iect. Ubi præscripto salutari regimine & idoneis atque necessariis medicamentis ipsum instructum dimisi. Quantum levaminis ab hac cura expertus fuerit, reverens dilaudare non sitis potuit. Quam postea breviori tempore ac minori gradu accessio facta esset; altero anno, vernali tempore ipse rursus cum uxore has thermas petiit: & utique, tam externis quam internis horum fontium usus prosperissimo successu se probavit. Nam, quam per sex annos in sterili viveris conجو, uxor gravida reddita pulchrum & bene valentem filium peperit. Ex medicamentis quæ ipsi suppeditavi atque postea transmissi, elixir vitæ cum liquore anodynno permixti, nec non plurimum balsamicarum polychæstorum, nem pulvis præcipitæmis nitrosi cum aliquot guttulis olei macis vel chamomillæ veri cotulperfi usum & vires, non sine singu-

lari comodo atque emolumento expertus est.

## Epicrisis.

Ejusmodi affectus chronici & inveterati, non tam fluidarum, quam potius solidarum nervosarum & parium, quæ motu & elatere præditæ sunt, nimis perumque coarctationi debentur; quæ si in habitum & consuetudinem degeneraverint, omnia remedium genera, quæ humoribus corrigendis unice dicata sunt, pene eludit. Hinc neque venæ sectiones, neque laxantia, purgantia, anodyna, diaphoretica, neque etiam diuretica, tali in casu usui sunt, ut potius malum sepius adaugerent. Præcipuum vero auxilium in ejusmodi remedio, quod totam sanguinis massam omnemque partes solidas moderate & blande afficiat, cujus generis fontes & balnea, est reponendum.

## OBSERVATIO VIII.

Vir virginea annorum, generosa stirpe ortus, robustæ alias naturæ & structuræ corporis; pectus & præcordia vix unquam commoda tegumentis defendit à frigore, sed linteis & levibus vestibus munium libero aëri omni fere tempore exposuit. Præterea & ingluviæ & poculis deditus, frequentius ad ebrietatem vini variis generis se immergit. His de causis acerbissimos sæpe dolores, distensionem, lancinationem cum inappetentia, vomitu, anxietate circa stomachi regionem est expertus. Enixe & anxie remedium à me petiit & quesivit. Mihi idemdem multa ad demulcendum dolorem interna & externa alia apta, sed speratus effectus non sequebatur, quia plane omnia diætetica respuebat præcepta. Tandem consilium dedi, ut thermas Carolinas & Torpescens adiret, usque cum regimine debito uretetur: & inde iterum levamen, cum ipse ibidem esset, inveniret præstanteum. Sed exiguo post curam tempore, inter initia autumnii, venationibus deditus, frequentius pedes & femora in flamma & picinis dimisit. Inde valde refrigeratus; post varios cibos vinum in copia ingessit. Recurrit paroxysmus valde acerbis, qui etiam undinis Lipsiensibus, me cum præsentem, tam graviter cum affligebat, ut omnem fere respirationem tolleret & partibus extremis sudore frigido perfusus, crebroque recurrentibus animi deliquit, mori videretur proximis. Fomenti calida externa & apta remedia interna allevamenti parum amulerunt. Suavi ut in balneum sive potius semicupium ex aqua & lacte paratum descenderet, & per horam imo amplius in eodem moraretur. Quo facto, postea in lecto liquorem anodynum trinealem cum dimidia parte spiritus Bussii remixtum ex aqua florum chamomillæ vulgaris propinavi. Tum sudore prorumpente id consecutus est, ut dolorem vehementer remiserit, alvus per aliquot dies clausa, jam soluta, & calor ad exteriora fuerit reversus.

## Epicrisis.

Quam infestum sit frigus paribus nervosis, imprimisque regioni stomachali & præcordiali, vix credibile est; & plures suo damno id subinde experiantur. Inde non semel sed sæpius asthma spasmodicum, affectum spasmodico-hypochondriacum & dispositionem ad fluxum hæmorrhoidalem, sed minus rite succedentem, vidi excitatam. Id quod facile si ex medicis concipere possunt, quibus multa experientia cognitum & periculumque est, quantum condensationem & con-

Cardi-  
gia, in  
aracand  
ab afflu  
quicuri  
fuerit.

Cardi-  
gia, in  
aracand  
ab afflu  
quicuri  
fuerit.

confortium inter se partes corporis universi nervosae alant, adeo, ut una laesa ad reliqua facile idem vitium transeat. Deinceps id quoque debet animadverteri, quod vitæ austeræ addicte, Serenæ & splendide personæ, præ aliis omnibus, ventriculi & maxime cardialgicis passionibus expostæ sint; quia vitæ illud genus, quod ejusmodi personis est familiarissimum, cum exactam vitæ & diæte rationem respiciat ac perpetuo fere saluberrima medicorum hoc in genere præcepta insuper habeant, ejusmodi morbis invehenda, materiam, originem & causam subministrat uberrimam. Possem multa recensere exempla illustrium imo Serenissimarum personarum, quæ fervidiore æstate glaciato potu, ita ventriculi & primarum viarum torum atque inde bonæ digestionis opus destruxerunt, ut per omne pene vitæ tempus multa incommoda, quæ vix ulla medicina poterant tolli, circa præcordia perpessæ fuerint.

## OBSERVATIO IX.

*Cardialgia  
et æstus  
in præcordiis,  
ab æstione  
venæ cava  
functis.*

Vir in vigore ætatis constitutus, nec tenerioris natæ habens, sed sæpiè validi, in iram vero valde proclivis, occasione data, binis mox vicibus gravissima animi incandescencia adeo turbatus, ut frigore & horrore extremæ partes tentarentur; immani mox corripiebatur circa præcordia anxio dolore cum ardore & mortu in scrobiculo cordis, nausea & vomendi cupiditate juncto, totantem noctem transigebat insomnem. Hicæ symptomatibus intra vixiginti quatuor horis maceratus, flagitabat à medico vomitorium & quidem instantissime. Ille pulverem, qui tria grana tartari emetici continebat, porrexit. Inde paucam quidem & mucosam viridescentis coloris materiam, sed summo labore & anxietate extraxit. Poterat aliam dosin, quæ ipsi etiam concessa, sed proxinus omnia in deterius conversâ. Associabantur continui ructus convulsivis quæpiam præ se ferentes, sed nihil amplius rejecit. Præter vocant liquorem anodynum mineralem, & videbatur symptomatum atrociam minescere & remittere per noctem. Sed ipse pateriens impatientissimus, altero mane, ob alvum firmiter clausam, à flatibus hanc tragediam fuisse oram reputans, petiit à medico priori salis Epsomensis unciam, quo ad alvum aperiendum alias frequenter fuerat usus; dedit, sed proxinus priora symptomata multo atrociora tenebantur, & viribus omnibus collapsis intra tertium ab emetico diem è vita discessit.

## Epiçrifi.

Affectus iræ si vehementior fuerit, quam infusus sit universo generi nervoso maximeque stomacho, cum non modo spastica strictura dum afficit, sed & bilem in duodenum magna in copia effundit, gravissima atque haud infrequenter funesta, præsertim si non ocyus appropriata medicina malorum fontes præcindantur, quæ inde sequuntur pathemata suis abundeque testantur. Et sicut tali in casu, lenissimo emetico, quod ex uncis duabus vel tribus olei amygdalarum dulcium, mellis uncia dimidia, & libra aque tepidae paratur, ad spasmodum relaxandum & visiolam bilem vomitu exturbandum, remedium vix datur præstans: ita vitæ nihil infusus nec periculosus, præter emeticum vehemens è minerali regno petrum excogitari possit, præcipue, si primo statim post iram tempore porri-

garat. Plures novi hac ratione motus, non aliter ac si verum venenum arsenicale allumissent. Hac de re etiam peculiarem dissertationem: *de emetico post iram teneo*, ad præcavendam gravissimam hinc inde illam damna, conscribere permotus fui. Lethalis enim & cum convulsionibus juncta ventriculi inflammatio, nisi inter initia statim congruis remediis occurratur, insequi consuevit. Postremo ex hac morbi & mortis historia hoc eliciendum duxi, quod, ubi ventriculus spasticè afficitur, medicamina salina majori dosi & sine sufficiente diluentium quantitate data, ad augendum potius quam minuendum dolorem & spasmodum, stimulo nervosæ fibræ, sint apta atque disposita. Hinc in omni cardialgicarum affectionum specie, salini generis medicamenta semper diluere solentur.

## OBSERVATIO X.

Illusterrimus vir tenerioris & paulo sensibilioris naturæ, quinquagesimum ætatis agens annum, à longo inde tempore, cardialgia & sæpe quotidiana, tempore præsertim autumnali & hiemali, ex stomachi inflatione, corripiebatur passione, quæ inde suam traheret originem: Ipse ob exulperant primam in regione acidum, avidissime cibos jussu majori quantitate in prædico præcipue cepit. Sed alvus semper pigra infesta, nunquam recte respondit ingesta. Præter hæc, æstivo tempore fructibus horatis, fragis, cerasis, malis Persicis, præter omnem modum, autumno vero uvæ, & hieme dulcibus se replevit, corpusque tegumentis idoneis minori diligentia à frigore defendit: omni pollebat diæte ratione, & ex toto dictis medicorum spreis atque contemptis. Post summum cibum ad dextrum scrobiculi cordis laus tumor gallinaceum ovum æquans se prodidit: mox sequebatur spirandi angustia cum facie rubicunda & anxii stomachi compressionibus, nec non extremotum frigore, ut in lectum concedere teneretur. Admotis ventriculo & extremis partibus fomentis præcalidis, ructibus præcedentibus vomitu rejecit mucidam tantummodo materiam: post aliquot horas, reverso calore madido in superficiem corporis, à doloribus fuit liberatus. Ceterum Illusterrimus hic Vir interdum autumno catarrhis defluxionibus cum gravi tussis & inquiete afficiebatur. Medici tum ad præstandum leniem, dosin pilularum de styrace cum refracta aloë & xanthinanum dosi, repetitis vicibus potrigebant. Hinc minora quidem reddita symptomata; sed postea morbus præcordialis cum inflatione cardialgica, longe majora summa incrementa, adeo, ut quandoque per integrum septimanam graviter in lecto decumbere cogereetur. Opem vero tunc temporis atque levamen sæpius insignis fuit expertus à leni emetico, dum ab uno tantum tartari emetici grano soluto & cum potu diluente summo, magna saburra & matrice pituitosæ copia vomitu fuit rejecta: quæ obicuri bruni coloris cum esset, metum & suspicionem incutit sanguinis corrupti; cui etiam lenientie medici ordinarii suffragabantur. Sed ego postea accersinus cum rem penitus inquirerem, Illusterrimum Virum styriacum usum fuisse poti succolade reperi. Judicavi inde hunc insolitum colorem accersendum: & obtinavi me experimentum à me factum, ubi materia incocta & carbonibus injecta, nullum foridum odorem diffusit idebat.

*Cardialgia  
et æstus  
in præcordiis,  
ab æstione  
venæ cava  
functis.*

## Epirisus.

Ex præfata morbi historia id saltem in usum suum medica artis tirones depromere possunt, quod in tali cardialgia, quæ ab atonia & inflatione oritur specie, doloris levandi causa, minime quæ opium ingrediatur, ut sunt pilule de styrace, in usum duenda, præsertim quando causam morbi viscosæ & copiosæ ex prava digestionis provenientes cruditates subministrant. Nam unum hæc ipsa cum aliis corrigentibus permixta, in morbis ubi spasmodorum atrocitas urget circumspicte data, locum invenire possint; tamen ubi robur ipsius ventriculi & primarum viarum deficit, & cruciatur ingens est proveniens, nunquam, nisi augere velimus mala, præbenda possunt. Eiusmodi potius in casibus, quæ leniter provocant vomitus, educendo salutarum viscosorum humorum, utilitatem afferunt desideratissimam; quibus denique tonica & temperata balsamica interne & externe substitui possunt. Ceterum illustrissimus vir omnia remedium genera aspernabatur, præter lapides cancrorum quibus cum aqua fontana quotidie fere vesperi utebatur, nec non aquam analepticam spirituosam ex corticibus citri, aurantiorum, pomorum chinæ, cum vino Hispanico destillatam & julepo rosarum dulcificatam, quam non nunquam assumebat.

Plura qui de hac affectione desiderat exempla, adeat *Consult. Medic. Sec. I. cas. VII. IX. X.*

## CAPUT III.

*De doloribus & spasmodis præcordiorum à calculo fellico ortis, & de ejus generatione.*

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*ad calculi felici fœculi, seu siccum, effigiem.*  
Sævissime quidem sunt passiones, eæque dolorificæ, quæ universum nervosarum partium systema vel maxime impetentes, totam moruum vitalium œconomiam pervertendo, à calculis in viis & canalibus urinaris suscitantur: sed non minoris lævitiæ, nec minoris periculi sunt illæ affectiones, quæ à calculosis concretis intra canales biliosos contentis proficiuntur. Ut vero interdum ægre admodum in ductibus qui consistunt urinarii calculi, ita longe difficiliore ratione biliosi dignoscuntur & dispiciuntur, adens, ut demum post sectionem atrocium variorum symptomatum, quibus per longum tempus afflicti fuerunt ægri, incognitæ causæ in sensus incurrant. Hinc quam frequentius, quam medicis communiter existimant, graves, pernicieuses & vix explicabiles ab eiusmodi calcula soveantur dolores & spasmi, qui præsertim præcordia infestant; & re unico fore duximus, hanc in præxi medica utilissimam materiam speciali capite includere.

## §. II.

*in homine utrobique experientiam.*  
Primo annotare licet, quod in nullo animalium genere crebrius ac in humano corpore folliculus fellicus calculis repleti observetur, & quod hi ipsi ratione figuræ, coloris, magnitudi-

nis, consistentiæ, numeri mirifice inter se differant. Vix enim ulla in rerum natura reperitur figura, vix ullus color, qui non in calculis cyllidis fellicæ conspiciantur. Alii ovalem & rotundum, alii exacte cubicam, quidam triangularem, hexangularem, octoedram, pyramidalem etiam recipiunt figuram: sunt, qui fabas, phaseolos, lentes, pisca, castaneas, tribulos aquaticos, nucem molchatam referunt. Mirum etiam in modum ratione coloris variare solent; sunt, qui cærulei, gypsæi, ex albo-cinerei, plumbei coloris observantur; frequentius flavescerent vel ex flavo rubicundi, bruno-nigricantes, nigri, viridescerent etiam interpersis maculis deprehenduntur; alii pluribus coloribus variegati; quidam exteriori crassa cærulea & gypsæi obducti, interiori nucleum habent ex bruno-rubicundum.

## §. III.

*sem comp. fluvia.*  
Ingens etiam est differentia biliosorum calculorum ratione consistentiæ. Quidam sunt friabiliores & molliores & tales sunt plerumque albi, cineritii & flavescerent valdeque leves; alii sunt magis compacti, solidi & graviores, & tales sunt quam maxime qui saturatorem colorem habent ex flavo-rubicundum nigricantem, & hi sæpe lavigati & politi observantur. Licet vero ordinario plurimi lapides cyllidi aque injecti supernatent, tamen solidiores & compactiores, quales sunt maxime lavigati & obscurioris coloris, submergi & fundum petere non semel observavimus. Deinde etiam sexipus vidimus, eos, qui leviores aque supernatant, si paulo diutius in ea detinentur, descendisse, forsitan quod in ipsis poris successisse particulæ aque se se insinaverint. Neque hoc prætermittendum esse ducimus, quod lapidum, qui supernatant, fragmenta & minores portiones in fundum secendant, non secus ac in pumice, qui grandioris molis supernatat, in pulverem vero redactus descendit.

## §. IV.

*Adquirunt de cr. mures.*  
Mirum etiam variat cyllidicorum calculorum magnitudo & numerus. Nam certa auctorum probabilissimorum fide & observatione constat, totam vesiculam à calculo ingentis magnitudinis, qui aliquot uncias pendebat, valde fuisse expansam & rotam ejus cavitatem impletam: quin interdum in defunctis numero triginta, quinquaginta, octoginta, imo trecentis, quorum alii sunt majores, alii minores, alii mediæ magnitudinis, inventis experientia docet.

## §. V.

*in ductibus biliosis humanis variis eff. immutatur.*  
In ductibus biliosis, qui immediate ex hepate vel intra vel extra ejus parenchyma proveniunt, concretiones etiam solida ex bile producta, in animalibus præsertim bovini generis frequentius, in humano vero corpore paulo rarius offendi, ipsa loquuntur experientia. Dubio procul ob eam rationem, quia bilis hepatica longe liquidior, dilutior quoque est ac cyllica, quæ crassioris consistentiæ & saturatioris etiam coloris, nec non amaricantis saporis observatur: deinde, quia in ductibus hepaticis, ex quibus continuo in satis notabili quantitate ad duodenum biliosus ferretur humor, non tam diuturnam, quæ requiritur ad huius dispositionem & solidescerent materie concretionem, necesse potest moram. Si tamen, ut auctores testes sunt, ibi offenduntur, longe friabiliora, & molliora

Figura & color variam.

Reminiscitur cyllidis, non calculi felici humani factis.

cum calcis deservit.

cum bile deservit.

in ductibus biliosis humanis variis eff. immutatur.

si non fuerit a concretione, non calcis.

horis sunt consistentiæ, asperiores quoque, tubulosi ac flavescentes.

## §. VI.

Reverſa  
est experi-  
mentum  
cum calca-  
do folio  
Saururus  
ſalsa.

Experimenta, quæ cum calculis felleis ad eorum elementa & ingredientia paulo curatius perveſtiganda & diſcernenda, inſtituimus, hoc loco recentior operæ pretium videntur. Primo obtinavimus, quod omnes illi, qui ſaturatoris & obſcurioris coloris pauloque ſolidioris texturæ, ſufficienter exſiccant, vel in maſſa, vel in pulvere, candelæ ardenti admoſi mox inſtar reſinæ lucidiſſimam concipiunt flammam, & toti, exigua ſcilicet reliſta materia nigra & cinerina fere inſpiſcita, comburantur: illos vero, qui albi & cineritii coloris, gypſeæ & cretaceæ materiæ erant, flammam reſpire, vel leviter ſaltem tam ſuſcipere & inſtar cere in lumina ferrea ignita fluere videntur. Deinceps annotavimus, eos lapides cyſlicos, qui ſolidioris fuerunt texturæ & ſaturatoris coloris, nec a ſpiritu vini rectiſſiſſimo, nec ab aqua, accedente etiam leni coſtione, diſſolvi poſuiſſe. Alio vero tempore a nobis animadvertimus, illi lapides cyſlicos, qui ingentis fuerunt magnitudinis & mollioris ſubſtantiæ, totam ſere cyſtidis impletes cavitatem, ultra diſſidium in aqua calida fuiſſe ſolutos.

## §. VII.

cum calca-  
do herba-  
na.

Non indignum porro obſervatione eſt, quod qui in hepate ejuſque ductibus in bove reperiuntur & examinantur calculi ſaturate flavoſcentes & friabiles, diſſicilius admodum, vel exiguum ſaltem concipiunt flammam, in nigrum vero cum fumo, qui cinerium inſtar combuſtorum reſert odorem, redigantur carbonem. Spiritus vini hiſce aſuſus & leniori calore digeſtus, brevi tempore flavo colore tingitur & ſaporem valde amaricantem exhibet. In aquam calidam horum calculorum fragmenta inſecta parumper diſſolvuntur, ſed ſaltem levis, flava cum amaricante ſapore extrahitur tinctura.

## §. VIII.

cum ſale  
herbina.

Recentis bilis ex veſicula bovis deſumpta tribus uncias æquans, tam amaricante prædita eſt ſapore, ut una penula unciam aque amarore imbueret poſſit. Huius uncia in vaſe ſtanneo leni evaporatione in extractum reſiniſſimè redacta, drachnam vix unam largitur, cujus portio flammæ admodum lucidiſſime ardet, diſſidio præterpropter in cineres abeunt. In ſpiritu vini rectiſſiſſimo agere ſolvitur, optime vero in aqua utque etiam ſpiritu vini aquoſo: color eſt flavus & ſapor valde amaricans. Quod ſi inſpiſſata bili bovine liquidiſſiori tenuiſſima argillacea & gypſea macria intime permixtur, per exſiccationem exhibet maſſam paulo duriorē, quæ flammæ admodum æque ac calculus cyſlicus ardet.

## §. IX.

ſalia non  
ſervant ad  
generatio-  
nem patris  
ſi.

His ita conſtitutis & accurate perpenſis plane apparet, ſalia nec alcalia, nec acida, neque neutra vel tartarea, ut communis fert opinio, ad generationem & concreſcitionem bilioſorum calculorum concurrere; ſed eos ex ſulphurea paulo mucidiſſi biliſſi portione, intermixta plus minus tenuiori plumboſa vel topheacea materia calore ſuccellente inſpiſſata in durum quoddam concreſcere mixtum, & variam figuram, variumque, pro differenti parium mixtum conſtitutum poſſe & ſui, recipere colorem. Nam ſalia

bus taneummodo haud proprium eſſe ſub variis coaleſcere & concreſcere formis & figuris, id inter alia variè & elegantiffimè ſæpius figurati lapides ex ſola aqua calcare in cryſtis & ſpecubus ſubterraneis, ut ſunt Baumanniana, Scharzfeldiana, guttatim ſiſſantæ producti, luculentior demonſtrant.

## §. X.

Generis  
reſinæ.

Genuinam autem tam diverſæ configurationis & coloris in progignendis calculis cyſlicis rationem ac modum expedire concipere æque invenire, non tam expeditum pronum eſt ac facile, ſed tamen poſſibile videntur. Equidem, ſi conſideramus longe craſſiorem & ſaturatiorem quin etiam amaricantiorem eſſe, qui in cyſtide deſcendunt, bilem, ac eam, quæ immediate ex ductibus hepaticis ad duodeni cavum deſertur, utpote quæ longe tenuior, liquorioſius minuiſque amaricans eſt: ſiquè ſimul attendimus bilem, ex qua in ejus folliculo eſſormantur calculi, ex hepate etiam per minimos ductus, qui recte cyſlico-hepatici nominantur & in tunica cellulolâ cyſtidis finiuntur, in ejus cavitatē identidem liquidam & diſſutam fieri; non aliam poſſimum durioris conſiſtentiæ reperiſſe cauſam, quam quod in homine ob ſinum veſiculæ ſelleæ erectum bilioſus humor non continuo ſtamine promanet, ſed tum demum prorumpit, quando à ventriculo cibis reſerto ipſa premitur: hinc ſi ut vacuo ſub longiori inapparentia ventriculo diutius ibi motam necleſce & ſtagnare debeat, æque interea liquorum ejus pars tum per ipſos etiam poros ejus tunicatorum, quæ microſcopio inſpectæ oculis non aliter ſe obſciunt ac pannus Indicus vulgo *Nyſſel-Tuch*, foras propellatur, craſſioris quæ facile in coagulam abire poſſet, remaneant parte.

## §. XI.

Figura  
ſpæriæ.

Prout vero bilis pro diverſa indole & conſtitutione ſeri excrementiſſi, quod materiam præbet, in tanta varietate corporum inſtimatorum, non unius ejuſdemque eſt mixtionis ac craſſos, ſed plus minus paribus terreſtribus, topheacis & in coagulum abeuntibus, item ſulphureis magis vel minus exaltatis, reſerta, hinc variè inde reſultant figuræ & colores. In cachectica enim ſæpius calculi gypſei albicantes inventi ſunt, quin etiam in iſtis ſclero chronico laborantibus, copioſa cretacea & gypſea, quæ dubio procul ductibus hepaticis intedit, per alvum deſecta materia, motum ſubſtantia fuiſſe binis obſervavimus exemplis. Ita etiam commemorant *M. N. C. Decur. II. anno VII. obſ. 145.* materiam topheacem in puero atrophæa laborante cum alvi dejectione copioſe fuiſſe educatam, quæ inſtar lactis modo ruſo, modo fulſco, modo atro prædita fuit colore.

## §. XII.

Ad generationem calculorum bilioſorum complures utique cauſas concurrere certiffimum eſt. His inter præcipuas ſunt ætas inclinans: rarius enim in hominibus ætatis florentis, frequentius vero in ſenibus decrepitis ſexaginta, ſepuaginta, octoginta annorum cyſtidem pluribus & ductioribus etiam calculis reſertam fuiſſe, per multis obſervationibus confirmatur. Qui deſcendunt agunt vitam & parum corpus exercent, præ iis qui mobile ſemper viæ genus colant, ad ejuſmodi calculoſas concreſcitiones magis idoneos eſſe videmus. Sic quoque in ſenibus cre-  
larius

obscuro  
sanguine

brius quam in viris reperiuntur. Quorum retum hæc in promptu sunt causæ. Progressus sanguinis per venas mæsticæ, per portæ venam & hepatis, uti secundum naturam & consuetudinem semper paulo tardior & difficilior est quam in aliis visceribus: ita in iis, qui vitam colunt sedentariam, cupis generis præcipue sunt ætate confecti & sequitur lætas, longe legior & difficilior redditur; unde ob impedimentum sanguinis per hepatis progressum fit, ut partes aqueæ & fluidæ in vala secunda lymphatica, remanente & sanguinis & bilioli humoris, qui ex eo separantur, crassiori substantia.

## §. XIII.

spirituosa

Porro ad horum calculorum frequentiores proveniunt immoderatum spiritus vini item cerevisiæ crassioris usum plurimum conferre, non modo auctoritas & fide CL SYLVII constat, qui *prax. med. libr. I. p. 302.* testatur, se ex huius aliorumque potuum generosiorum abusu aliquoties icterum & huic succedentem ascitem ut plurimum lethalem observasse, hepate scirrhoso multique calculi & topus obfeso subinde reperi; sed & ipsa sana ratio id evincit: nam spirituositas inque primis spiritus vini, & chylum & lympham & sanguinem ad coagulum quam facile disposunt. In laboribus enim chymicis ad crystallisationis negotium promovendum spiritum vini mixturæ assiduum magnam vim habere, compertissimum est: præterea, potibus vinosis & spirituosius corpora nimis incalcescunt, & dissipata liquida sanguinis & humorum incrassatur massa.

## §. XIV.

In feminis  
quingenis  
genuis  
sanguinis  
§. XIV.

Deinceps feminas post quinquagesimum ætatem, cessante mensium fluxu, calculi non modo utinarius, sed & biliiaris atque inde gravibus obortis symptomatibus tenari, identidem experientia docemur; cuius vix alia subest ratio, quam quod succedente majori sanguinis in vas copia, hæc difficilior moveatur, & hinc inde subtiliter secedentibus partibus tenerioribus spiritibus reddatur. Nec rarius vidimus, ejusmodi feminas inexplicabilibus in epigastrica regione doloribus expositas fuisse, ita, ut mori vicinæ ob vehementes angustias & anxietates visæ fuerint, superveniente auxilio subinde extremorum frigore, dictorumque symptomatum singulis diebus circa mediam noctem recurso, quibus accessit dolor in hypochondrio dextro ad totum abdomen interdum sese extendens, cum sædo ad flavum accedente, faciem totumque corpus deturpante colore; quæ tamen pathemata exclusis per alvum vel sua sponte vel artis beneficio excrementis argillaceis prorsus quæverunt.

## §. XV.

Invariis  
partibus  
§. XV.

Sunt vero varii & valde acerbis generis, quæ calculos ductibus biliariis inhaerentes comitari & insequi solent pathemata, ut etiam collective sumta & considerata, eorum præsentiam arguant. Ordinaria fere sunt: non vagus, sed in una eademque sede, hypochondrio nempe dextro circa regionem hepatis defixus & constans, premissis, gravissimus vel etiam acutus cum sædo plerumque faciei colore, interdum ad epigastricam regionem & cordis scrobiculum sese extendens dolor; cuius certis intervallis tanta fit exacerbatio, ut tormina ac cruciatus totam abdominis cavitationem occupent, juncta plerumque inappetentia, nausea, cotinatio ad vomendum, circa

præcordia anxietas, dolore cardialgico, animi defectione, alvo duriori & adstrictiori: quibus tandem dira & consumax optimis haud auscultatis remediis accedit ictericia. Quidam affectuum consensuum ventris torminibus exagitantur de vitam per multos annos miserrime trahunt; plurima pars hydropere perit. In quibusdam gravissimus, obtusus, profundus finitque consumax cum sensu ponderis dolor persequitur, idque plerumque fit, quando mollioribus & minoribus calculi folliculus fellicus valde distenditur.

## §. XVI.

Intusior vero & acutior si persistit & universum systema partium nervolarum in consensum trahendo vehementes spasticas stricuras, non modo circa partes vicinas, sed etiam remotas, brachii nempe & artuum distensiones, convulsiones epilepticas, neque minus cum pulsu duro & celeri febrem efficit; indicium est, calculum & mole & asperitate insignem firmiter ductibus biliariis inhaerescere: ex quibus causis tandem fit, ut brevi mortem acceriat.

Dolor non  
tunc quid  
inducit.

## §. XVII.

Inter hæc vero omnia, quæ jam monuimus, signa, nihil datur certius vehementes a calculo fellico prognatas dijudicandi passionis, ac si ipsi cum excrementis per alvum secedunt; & tamen non secus ac in calculis renalibus, quando hi ex ureteribus in vesicam fuerunt delati, omnes simul & semel dolores cum reliquis gravibus afflictionibus cessant atque expirant, icterus saltem excepto qui non simul, sed sensum tandem evanescit, eo, quod bilis sanguini & lymphæ inime immixta non tam facile & expulsa rursus est totius corporis fibræ discuti possit. Calculi autem hi, qui per alvum deturbantur, non unius ejusdemque coloris, magnitudinis & numeri observantur, atque etiam pro differenti horum ratione, scilicet quam occupare solent, subdividuntur: Nam si sunt molliores, diluiores, vel etiam opaciores & gyptici coloris, & ductibus hepaticis, quibus inhaerent profectus esse haud levi argumento est: si vero minores, si asperi, si duriores, angulares & coloris paulo saturatoris, folliculi fellici hospites fuisse & per angulum illum canalem cum acerbissimis symptomatibus iter suum consecisse, haud obscure colligitur.

## §. XIX.

Ceterum testatur observationes earque non rare, post mortem vesiculam felliam multis lapidibus repleta inventam fuisse, ubi & corpus a sædo flavo colore immixtum & ab aliis etiam gravibus passionibus liberum extitit. Cujus rei causam sine ulla dubitatione inde derivamus, quod calculi tam illi qui vesiculam felliam, quam etiam qui renem substantiam obfident, si quiescent, nullas valde sensibiles procreant molestias atque incommoda: quandocunque vero ita vel ratione sedata vel ratione molis & figuræ sunt comparati, ut nervosæ exquisitæ sensum membranas vel ductus violentè lancinent aut distendant, prænotata tota oeconomia adionum vitalium & animalium in universo corpore perturbatur. Idque non tantum fit, quando calculi per ductum cysticum ad chodolodum iter suum consueverunt, sed & quando ipsi vesicula fellica, quæ membranas nervæ sensibilibus ob dexteri intercostalis nervi interspersas ramificationes, gaudet, à nimium aucto bilis coagulo vehementer & supra modum disten-

## De doloribus & spasmis præcordiorum &c. 271

distendunt, tunc non secus ac in vesica urinaria, si ingens molis quandoque ad sex vel octo uncias accedens, quale exemplum nuper habuimus, ibi hospitantur calculi, symptomatum acerborum cætera corpus obstruunt. Legimus enim apud auctores spectare fidei, scilicet vesicam tum grandem a copiosa intra hærente solida materia fuisse deprehensam, ut naturalem magnitudinem vel triplum superaret.

### §. X X.

*Dolores ex calculis fellicibus periodictis.*

Dantur etiam dolores & spasmi cum consuetis symptomatibus puncti ex calculis fellicibus oborti, certis periodis invadentes & repetentes. Ita notabilis est casus, quem B. PETERMANNUS in differt. de *serpente illius ex calculo vesiculae fellicis* recenset, ubi quidam ichero annuatim periodico cum doloribus afflicti sunt, qui vero post evacuationem lapilli bacce lauri similis cessavit: altero anno cum idem morbus rursus invaderet, exhibitis convenientibus remediis repetiti sunt, per alvum plus quam sexaginta calculi flavescerunt, quorum alii rotundi & levissimi, alii angulosi & asperi, alii molliores, alii duriores fuerunt, magnitudine parum phaeolos & pisæ, parum quoque lenes refrigerantes.

### METHODUS MEDENDI GENERALIS CUM CAUTELIA.

#### §. I.

Perfectissimè sic omnibus & singulis, quæ ad historiam hujus affectus, tum quoad causas & prognosin, tum quoad eum dignoscendum faciunt, permenibus circumstantibus; sequitur nunc, ut etiam solliciti sumus de accommodandis ad eum tollendum vel mitigandum saltem, vel ad eorum generationem præcavendam præsidia. Quemadmodum vero duplex semper morbis medendi via est; altera que in paroxysmo, altera que extra eum locum invenit, datam in illo medici consilium magis ad symptomatum, spasmorum & dolorum ingravescentium mitigationem & allevamentum: extra paroxysmum vero ad removendas causas directum esse debet; ita etiam hanc in prædicti affectu locum obtinere existimamus.

#### §. II.

*Spasmus fellicis anodynus & calmans.*

Nihil itaque antiquius esse debet medico, ac ut si vera illa, quæ a spasmis nervosorum partium strictis circa præcordia & etiam partes vicinas excitantur, quodammodo leniantur symptomata; cui scopo obtinendo, quæ anodyna, demulcentia & fibras nimis strictas relaxante virtute gaudent, egregie servantur. Hujus generis sunt ex pinguibus interne succum oleum amygdalarum tam dulcium, quam amararum, recens sperma ceti: externe vero pinguedo casti sylvestris, castorei &c. Ex demulcentibus lac, serum lactis dulcis, emulsiones ex seminibus IV. frigidis, infusa vel decocta ex radice altheæ, herba perietariz, floribus malvæ, papaveris thoracis, sambuci, quibus addi potest syrupus de althea Ferriellæ. Ex anodynis spiritus nieri dulcis rite preparatus, liquor anodynus mineralis, extractum croci, papaveris thoracis. Ex antispasmodicis pulvis ex lapideis cancerum, cinabari & ruto paratus, cui tanninum extracti croci adjecti potest, pulvis antispasmodicus Marchonis, pulvis humbricorum terrestris, pulvis antepi-

lepticus niger & qui ex rasura ungule alciæ, crani humani, nec non lepore ex uero sectu & exsiccatio parari solet, prædictum quando ex eis cum aquis florum blanda anodyna virtute gaudentibus concinnatur mixtura.

### §. III.

Externe epistematia & sacculi ex emollientibus & carminativis speciebus parati, vel etiam vesicæ decoctis florum emollientium de paragonum repleta partibusque afflicta applicata, plane singulare dolorum & spasmorum lenimen affert solent. Expetit quoque ad dolores sopientes chylinatos ex lenientibus parata ano crebrius insundere, nec non alvum per blandum laxare, quale est, quod ex marina, thalibarbato, apurco recentur trahificato, cremore tartari & id genus aliis confici solet, leniter ducere.

### §. IV.

Extra paroxysmum vero quiescentibus spasms & doloribus ad causam malis fundam evellendam, ad obtinendum meatus fellicis apertum &c. ad calculos, si ipsi firmiter inhaerescant, quantum fieri potest, extra corpus propellendum utique alia medendi via est inveniunda. Ea enim, quæ sumus huius virtute jam dictos effectus præstant, in usum vocanda, cupis generis sunt infusa & decocta ex aperientibus, resolventibus, discutientibus & excretionem promovens, vel ex aqua sola vel vino permixta parata v.g. radice rub. insector. graminis, asparagi, petroselinæ, pimpinellæ, aristolochiæ, cascuaræ, cuborei, glycyrrhizæ; additis poltea rhubarbaro, mochiæ de agrario, tartaro tartarico, terra foliata terrena vel sale polyphosphato & syrupo de althea Ferriellæ. Quæ decocta, si convenienti dosi & longæ sitis tempore in usum ducuntur, in facie affectus debellandis magna vi gaudent, experientia & multis observationibus evicti sumus. Clarissimi SYLVIVS in p. ex. med. Lib. I. Cap. XLV. de exo Celebenimii nominis Itali medici LANCIUS, item BIANCHI inter medicamenta calculi balausti specificæ quædam vi dissolvenda, decoctum radices graminis, graminique succum nutritive laudant atque commendant, hæc possimum ducti ratione, quod boves & oves mensis Maii, quo gramine viridi vescuntur, sensim ab omni crassa lapidosa liberantur, quæ tempore hyemali, ubi sumo nutriuntur, in eorum folliculo fellis concretae sivebit.

### §. V.

Præter hæc radix perizæ traxæ hardi radia ex Brasilia in Europ. in translatæ ad drachmas duas in libra una aquæ leniter decocta, potum admodum salubrem in omni calculo etiam in altissime humido præbat, si tertio quoque partibus singulis horis cum paulullo fœchari tepide bibitur: hæc enim ratione ichterum felleum cum torminibus & ingenti dolore stipantem intra viginti quatuor horas discussum in Acad. Reip. des Sciences Anno MDCCCL. p. 75. agnoscit.

### §. VI.

Nonnulli etiam millepedes vivos in infundendo & siccatos in pulvere terunt & huiusmodi cum salibus meatus, ut sunt terra foliata tartari, sil polyphosphatum, tartarus vitriculus & tartarus, solutio oculorum canceri, parca & refracta dosi ad obstruendos hepatis neri &c. excludendos & ab omni biliosa amara liberandos maxime

Cura. Avicenna.

maximi faciunt. AVICENNÆ vero cura, uti in ictero chronico, à veteribus medicis magni semper habita est, ita etiam tam in illis, quæ in mentium biliariorum obstructione & bilis ad concoctionem ciborum necessarij præpedito affluxu, consistunt visis, locum habere posse haud dubitandum est. Venustissimum vero hic auctor humiles siccatos cum vino albo & saccharo ad saporis graniam fumos plurimum laudat, vel etiam horum pulverem cum syrupo de byzantiis in pilularem redigit formam & crebrius vesperi propinat, postremo superbibendo serum caprillum, ex lacte à capris, herbis prius aperientibus, fœniculo, apio, petroselinò, rufco, lapulo, eupatorio, asparago, nutritis desumpto, relictis ejus caecis substantia parum. Ceterum externis quoque leniendis gravioribus symptomatibus occurrere è re erit. Faciunt hæc plurimum epithemata hypochondrii dextro applicata, quæ ex floribus chamomillæ vulgaris & Romanæ, herba scorodii, absinthii & cardui benedicti, aqua florum sambuci & vino rubro præparantur, si frequentius de die renovata admoveantur.

## §. VII.

Ultima  
fieri in  
opere me-  
dicæ.

Hæc vero omnia quando inane & incassum longo tempore usurpata fuerint, ultimo tandem spes est sanationem recuperandi in aquis medicatis naturalibus tam thermalibus, quam etiam sic dictis acidulis; inter quæ celeberris fœmæ & effluvis sunt thermæ Carolinæ, Aquigranulæ, acidulæ Egranz, Pyrmontanæ, quibus certe magna & efficax virtus ipsis rebellis chronicas, quæ ab obturatis de crasso humore factus visceribus, præsertim hepate, proveniunt, persanandi passiones, si corpore prius probe præparato, soluta nempe plethora, vel cacochymia amittiprata, debito regimine tum interne tum externe adhibeantur.

## CURA PRÆSERVATORIA.

Præservatio  
in ictero  
chronico per  
resera de-  
buit.

Cum in superioribus dilucide satis ostensum sit, quam gravia & sæpius funesta calculi felici, præsertim si exitum per angustios & valde sensiles canales nervos mobilitur, excitent symptomata; circumspecti nunc erit medici, ut, ubi in corpore ad eos progignendos dispositionem invenerit, id omnibus modis impediatur. Quod nostra tandem sententia vix rectius & meliori succellere fieri poterit, ac si diligenter ad progressum & cursum sanguinis per melenarium, per viscera abdominis imprimique per hepatis attendatur, ut liber ille ac integer, in vero difficilis & præpeditus sit; quandoquidem ex hoc, tanquam ex fonte sicut plurimi hepatis morbi, ita etiam calculosæ concretiones in hoc viscere proveniunt. Nam quæ spissior est sanguis & serum multis glutinosis partibus refertum, eo bilis ad coagulationem magis prompta atque proclivis est: & quia graves ille chronicæ passionis, cachexia, hydrops, icterus, asthma hydropicum ex retardato sanguine per hepatis viscum progressu idemdem nascuntur, non mirum est, in corporibus, quæ ejusmodi morbis defunguntur, passim id testantibus observationibus, concreta calculosa in folliculo felico vel etiam ductibus biliaris inventa fuisse.

Quæ hæc  
faciunt.

Quicumque itaque ex medicis hos morbos prudenter avertere vult, è ejusmodi remedia præscribere & in usum ducere debet, quæ in genere morbis, qui ex vicio hepatis nascuntur præcavendo dicata sunt, ejusmodi sunt fontes medi-

cati & minerales, item ponis diluentes, ut ferum lactis cum convenienti regimine, sufficienti motu & exercitatione corporis usurpat, nec non medicamenta, quæ tenaces viscidis humores dissolvunt, & acidum, quod fere omnis coagulationis principium est, destruant, uti sunt decocta ex radicibus quinque aperientibus, præsertim si cum sale polychretho, terra solam tartari, nitro acuantur, item elixir temperant viscerale cum equali parte effluvis rhabarbari sanitate permixtum, cujus frequentem usum in ejusmodi morbis hepatis præcavendis non modo tutissimum, sed & efficacissimum semper deprehendimus. Præterea tempestive infusa sanguinis missio, ponis sufficiens, temperata & modicus victus, parior cerevitiæ crasse, vini, spiritus vini ac calidiorum medicamentorum purgantiumque usus, sicuti nunquam non a molestis & chronicis passionibus, ita etiam a præfatis hepatis morbis corpore egregie vindicant.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Vir generosus sexagesimum & sextam jam supergressus ætatem, sanguine & succis plenus, laute & vinoſe dietæ affluens, jam fere per decem annos dolores modo ex calculo, modo podagricos est expertus. Ante aliquot annos immanes dolores accesserunt circa vesicæ regionem cum ingenti gravitatis ibi sensu, quæ suscepto corporis motu augebantur. Aderat simul crinitio circa pubem & perineum, & veluti fillicidium sequebatur urinae, ut vix poterit inhiberi: stimulus quoque ad alvum deponendam persistebatur, atque urina prodibat alba, turbida, cui sedimentum mucosum ierat; interea dolores nephritici & podagrici consuecebant. Aeger immensis fractus doloribus & viribus sensum privatus ac emacians tandem supremum diem obiit. Dissecto post mortem corpore, lapis in vesica VIII. uncias pendens inveniebatur, & pelvis renis sinistri, lapidem firmæ basilar marmoris consistentiæ drachmas VI. pondere habentem involvit; in cystide vero fellis plus quam LXX. minoris vel majoris magnitudinis calculi deprehenduntur, quorum nonnulli tam pulchre lævigati, polii, variegatique erant coloris, ut jaspidium illarum annulis aureis a curiosis includerentur.

## Epiçris.

Reverentur mihi de hujus ægri statu, quod averſatione quadam naturalis tanquam venæ leonionis remedium passus neque etiam inclinante ætate, sanguinis excretionem natura mollis fuerit, quam tamen in juvenute per nares frequentius fuit expertus. Relatum quoque accepi, quod pater ejus podagricis & nephriticis doloribus sepius fuerit tentatus. Quibus circumstantiis probe animadvertis, haud sine ratione colligi poterit, nimiam sanguinis & succorum exuberantiam, in corpore, per nativitatem hereditario quasi jure imbecillitatem ad calculum trahente, præsertim sub quoque reddito vice genere & intemperantiori vini usu, adeo numerosæ calculosarum concretionis, non modo quæ in vesica & renibus, sed & fellis cystide subsisterant, primam originem & causam subministrasse. Sententia in hac ego confirmo exemplo celeberrimi nominis Archæi, qui cum per totum vitæ cursum abstineret ab omni sanguinis missione,

per

Calculi felici  
in ictero  
chronico  
per resera  
debuit.



per plures annos calculosa nephritide laboravit, cui tandem accessit icteritia; ad quam tollendam dum præscriberentur mixturæ vi aperiente & laxante pollentes, septem per annum calculos exclusit. Ex quibus deinceps id in usum præservatorium ad dictos morbos averiendos colligere licet, quod venæ sectio in statu plethorico neglecta, ad procreandos dictos adinam pascificare possit morbos, semperque autem admixta, corpus ab illi vindicari queat. Dūcē etiam id ex commemorata morbi historia licet, plures in felles cylindre calculos sine incommodo & dolore consistere posse, modo non afficerent exitum per angustos canales, quorum nimia & violenta distensio tot gravissimorum & pece lethaliū symptomatum vera & genuina causa unice evadere possit.

## OBSERVATIO II.

*Calculi felles in hydropico æstivo, quatuordecim jecti.*

Primarius hujus urbis civis, sexagesimum jam quinquam ægus annum, ictero & tumore hydro-pico laborabat. Hic plura remedium genera frustra opponerentur. Tandem medicus hujus loci insulam corticis media sambuci ex vino, paulo largiori porxit dosi: inde factum, ut à medicamento & vomitione & alvi dejectione fluxus concitarentur, & quod valde erat notabile, per ipsum vomitum successive numero viginti lapides ex flavo viridis coloris, diversæ magnitudinis, valde læze superficie, figuræ tam quinquangularis quam angulose, drachmam vel unam & dimidiam ponderantes, quorum ego adhuc aliquot in rarissimo meo recondo, rejecti fuerunt; idque sine præcedentibus lateris dextri torminibus. Cessavit inde quidem icterus, sed remansit tumor hydropicus, qui etiam augmentum sumens, laborantem è vita sublebat.

## Epiris.

Id maxime præfati in casu memorabile atque considerandum dignum videtur, quod sine atroci dolore præcedente, ex tam angusto nervo canali, qualis est cylindrus, tot numero lapides tam insignis magnitudinis & figuræ potuerint propelli. Ego itaque in hanc deveni meditationem vel potius conjecturam, quod in ipsius duodeni flexura epistimodi lapides à bile crassiori & terrestriori successive concreverint & progigni potuerint. Nam quod in ipsis intestinis, præsertim ubi in flexuram abeunt, variae formæ & magnitudinis calculi ex præterlabentibus humoribus apponi & compingi possint, id non pauca à fide dignis auctoribus memorata exempla testantur. Neque præterenda hanc in rem est animadvertenda dignissima observatio, quam Cel. LUC. SCHROECKIUS M. N. C. Dec. I. ann. IX. inseruit, ita se habens: *mulier annorum septuaginta quinque de ventris torminibus, fluxibus, ac alii pathematibus hypochondriaci sepius conqueritur, respiratione subinde, ad suffocationis mentem subsequens animi deliquium superjuncta, ita ut de vita ejus altum esse adhauc judicaret, subito in colo obstus per sensibus dolores, sensum adeo increpentes, ac intestinum restitutum lenientius, ut præ atrocitate doloris disputationem animi pertimesceret, donec tandem calculum valido conatu, divaricatis cruribus stans deponeret, perorando intem cum drachmis duabus, color erat castaneus eleganter levigatus & potius ex cinereo flavescens variegatus, ex lamellis aliorum calculorum.* Frid. Hoffmanni Oper. Tocu. II.

rem more sensus concrevisse confusus: internas substantias meris ostendebat circulos striis intersectos, indicio haud obfcurum, eam facies intestinales esse induratas. Pertinet huic quoque familia observatio FERNELLI quam lib. VI. c. IX. de partium morbi & symptom. prodidit, calculos in intestini coli, cæci valvulis fuisse reperiens referens. In equis grandes lapides libram & ultra pondere æquantes, insitit marmoris duros & politos, in flexuris intestini coli inferioris, Altenburgi & nuper in pago Herrn-Gesftråde fuisse reperiens & mihi monstratos testari plena fide possum. Ceterum de calculis in intestinis progenitis SYLVATICUS Com. III. Consultat. VII. it. ZACUT. LUSITANUS lib. III. præadmiration. obs. 133. haud parum luculentum testimonium exhibent. Nihil minus non plane etiam incredibile est, in ductibus biliaris hepatis mirrimos felles calculos primum posse herere, sensim à præterlabente bile augmentum capere, & successiva horum ductuum ingenti dilatatione facta ibi diutius subsistere, donec per valida medicamenta fortiori flossem ductuum intendentia expurgentur: atque in hanc sententiam ob eam rationem deduci quispiam poterit, quod statim à reiectione lapidum per vomitam icteritia subleata fuerit.

## OBSERVATIO III.

Ance aliquot iustra arifex ensifaber, per integrum ante obitum biennium de intolerabilibus & fixis moribus, doloribus, arduoribus circa præcordia in dextero hypochondrio, quasi ignitos in corpore aleret carbonem, conquisitum est, qui totum sæpe abdomen acerbissimis torquentibus occupabat, cum fædo faciei colore, animique deliquio intercurrente. Post mortem ejus vesica fellea tota erat calculus repleta: nam ultra sexaginta sex grana, partim pila, partim globulos referentia, bilis coagulata & lapidescentes continebat. Circumjacentes vero partes, præsertim intestinum colon, nec non pars duodeni cum pyloro, item ventriculi fundus fædo flavo colore nictat conspiciebantur, earum tunica exteriori cotrosa.

## Epiris.

Sævi dolores & tormenta, quæ circa hepatis regionem in dextero hypochondrio fixam sedem habent, non tam à calculo quam potius ipsi bile, per poros, cum non liberum habent exitum, transadante & partes circumjacentes atrodente oriuntur. Legi meretur de hac re STALPARTUS van der WIEL cent. I. obs. XLVII. qui in apertis infantum cadaveribus, veneris doloribus, nausea, vomitu, febre ac convulsionibus, nec non cardialgia coæqueporum ventriculum non intrinsecus, sed & extrinsecus bilis flavo colore infectum se reperisse, fidem facit.

## OBSERVATIO IV.

Aliquot abhinc annis requirebat à me consilium honesta femina quadraginta & aliquot annorum, quæ à multo inde tempore pathematibus hysteriæ cum suffocatione junctis erat obnoxia, quandoque etiam incidebat in icterum recidivantem, modo longiori modo breviori tempore percreverant, sub laevo vultu, otio quoque maximam vite partem transigens: vacuantes

*Intolerabilis dolor in hypochondrio dextero.*

*Sævi dolores in hypochondrio dextero ac emensio.*

menstrum & hemorrhoidum quibus subiecta erat, parcius & non flato tempore procedebat, corpusque ingravescente subito & ex improvilo coepit. Innotabilem in dextro latere & sub costis spuriis persistebat dolorem cum nausea, vomendi conatu, vehementi praecordiorum anxietate, spirandique ad suffocationem difficultate: circa scrobiculum cordis perfusebat dolor vehemens pressorius, qui etiam ad umbilicalem usque se extendebat regionem. Alvus erat obstructa, urina suppressa, pulsus cum aëtu celet & noctu levi delirio corripiebatur, summaque aderat corporis aestatio, inquietudo cum extremorum frigore: quae cuncta, per bidentum, mala & tormenta perfluebant. Supposito chlystere faeces instar albi græci secedebant. Datis pulveribus anodyno-antispasmodicis & infuso florum chamomillæ vulgaris, pontibus calidis oleo amygdalarum dulcium alteratis & fœu emolliente in vesica suilla loco affecto apposito, remissio symptomatum sensim sensimque facta, secesserunt faeces navali colore tinctæ, & abdominis quoque dolorificæ distensio atque inflatio, leni oborto sudore interjectis aliquot diebus fuit discussa. Seduo morbi impetu per vices potio, quæ constabat ex rhabarbato, radicibus quinqueasperen-tibus, radice cucurme, summitatibus centaurei minoris, agarico trochiscato, terra foliata tartari, semine feniculi, tartaro tartarizato, & viro purificato ex aqua summitatum millefolii & vino propinata. Ita sensim magna copia crassiorum biliosorum fecum fuit educta, agri operata virium cum tolerantia. Quæsumtæ me fuit, quam ad teccidivam tam immanis dolorifici affectus præcavendam essent utilis remedia; & num instans vere acidularum potus conveniens sit? In responso ego causam atrocis huius doloris & insequens symptomatum non quidem à lapide solido & compacto, sed amurca biliosa ductum cholochochum obstruente, & bilis ad dundenum progressum retardante reponendam esse iudicavi, eam ob rationem, quia mihi similes in praxi casus obegerunt, ubi ipsi calculi per sedem rejectis mox omnia gravia conquieverunt symptomata. Ego vero potum acidularum Egnaruro, præsertim si calidæ habetur, summe proficuum iudicavi.

#### Episcris.

Male affectum in hac nobilissima ægra icter esse ibique sedem ponendam huius subitæ & dolorificæ affectionis, ex hisce causis iudicandum censui: quia non semel, sed aliquoties icterum perpessa; dein quod sub paroxysmo alvi scybala rejecta fuerint: tum, quod sub oriosa viâ & laetiori victu, præsertim ubi vacationes per hæmorrhoides & menses non rite succedunt, quam facile obstructions in hepatis vasis, quæ calculorum generationi velficantur, fieri possint. Ex una non semper miniscente malo calculi sub forma episciantur duri & solidi, suffecerit tamen, quod materia biliosa tenax, ad concrendum valde apta, similem in obeandis ductibus effectum ac calculus verus, quando exitum per angustos canales molitur, producere valet, quæ si ad cavitate inestimatorum delata cum reliqua vinoferum sibiarta rejecta, dolor conquiescit. Quod vero hæc affectio morbosa comitem non habuerit icteriam, inde deducendum puto, quod obstructio illius ductus non diu perseveraverit. Tandem etiam & illud mouendum existimo, quod calculi

fellei, si minoris fuerint molis cum sacibus infensibiles sæpius projiciantur.

#### OBSERVATIO V.

Aliquot ante annos, consumaci icteritis, Vir Amplissimus annorum quinquaginta, tenerioris corporis & melancholici sic dicti temperamenti, laborabat. Dolor fixus erat circa jecoris regionem luncinatus & pressorius. Quotiescunque quippiam ore, sive alimentum, sive medicamentum assuinebat, summa circa præcordia insequente anxietate, vomitu mox omnia rejiciebat. Totum corpus flavo sœdo colore tinctum conspicebatur, faciesque grysei coloris prodibant. Ego in consilium accitus, tum ad sedandum dolorem & ipsam, tum ad ruborandum ventriculum efficaciam alias remedia præscripsi; sed nihil opia tulerunt. Ex omnibus tamen acutum duplicatum, micori sed repentina doxi, item liquorem nostrum anodynum, ex aqua cerasorum nigrorum exhibitum, citra offensam fete potest. Extrinsecus jecoris regionis episthema ex vino rubro, in quo coquebantur, herba ablinthii, flores sambuci & chamomillæ vulgaris ac Romanæ, crebro imponebatur. Interne emulso ex feminibus IV. frigida, amygdalis dulcibus & amaris, semine papaveris albi cum aqua florum confecta, per intervalla frequentius fuit propinata. Ita sensim miniscebant dolores atque symptomata, urina instar crassæ cereviæ rubra prodibat & alvus sponte aperiebatur, ac quod valde notabile erat, faeces secedebant albæ, tophaceæ & calcareæ minus solubilem substantiam referentes, cujusmodi dejectiones cum difficultate per septimanæ fere spatium continuabant. Quod naturæ beneficium, leni laxante ex rhabarbato, manna, & cremore tartari secundavimus, sub-junctis postea medicamentis temperate balsamicis. Ita intra mensis spatium cura fuit feliciter absoluta.

#### Episcris.

Nobilissimus hic tenerioris & melancholice constitutionis vir, in officio valde laborioso, quod sedentariam vitam atque ingentes mentis contentiones & fatigationes exposcebat, erat constitutus; & quum multo jam tempore ventriculi inbecillitate & ex hac proveniente lenta febte laborasset, ceteris nihil proficiensibus, tandem à me leni emetico hac fuit evicta, quo ingens vitio & corruptæ bilis copia educta. Non mirum proinde est, eum incidisse in talem hepatis morbum. Illud vero in hoc casu explicari difficile admodum videtur, unde copiosa illa glycea materia alio exclusa prognata fuerit, ubi sedem habuerit, & unde ejus color albicans subgrævus? Si conjecturæ rationales tamen locus est, crediderim in ductibus hepaticis eam in principio hæsisse, productam ex bilis terrestribus fixioribus particulis repleta, pinguioribus vero oleosis destituta; quæ postea ad ductum cholochochum delata, eum obstruendo memotata concitavit symptomata; quandoquidem ego hac in sententia sum, multum biliosum humorem, ratione materie & ingredientium ex quibus componitur, pro corporum dispositione & maxime ita tu valenadino variare, adeo ut variis generis impuritates ipsis sæpius immisceantur: & ab hac causa omni procul dubio etiam, tanta morboe magni-

Dolor fixus  
in regione  
hepatis ca-  
vitas man-  
ens typha-  
res feda-  
tus.

distin-  
guere circa  
hepatis do-  
loris ex calculo  
factum.

magnumdus, coloris & consistenz in calculis  
diversitas, & tam valde diversa bilio humo-  
ris actio & operatio nervos paribus plus minus  
infesta duenda & derivanda venis. Postremo  
illud hoc loco inferendum putavi, epithemata ex  
roborantibus & leniter discutientibus parata, ex-  
trinsece regioni hepatis in ictero pertinaci &  
aliis hepatis vitis applicata robur & tonum huic  
visceri conciliando egregiam opem ac levamen  
conferre : quod crebriori experientia confirmat-  
um scribo.

#### OBSERVATION VI.

1. *Arctostaphylos*  
 2. *Arctostaphylos*  
 3. *Arctostaphylos*  
 4. *Arctostaphylos*  
 5. *Arctostaphylos*  
 6. *Arctostaphylos*  
 7. *Arctostaphylos*  
 8. *Arctostaphylos*  
 9. *Arctostaphylos*  
 10. *Arctostaphylos*  
 11. *Arctostaphylos*  
 12. *Arctostaphylos*  
 13. *Arctostaphylos*  
 14. *Arctostaphylos*  
 15. *Arctostaphylos*  
 16. *Arctostaphylos*  
 17. *Arctostaphylos*  
 18. *Arctostaphylos*  
 19. *Arctostaphylos*  
 20. *Arctostaphylos*  
 21. *Arctostaphylos*  
 22. *Arctostaphylos*  
 23. *Arctostaphylos*  
 24. *Arctostaphylos*  
 25. *Arctostaphylos*  
 26. *Arctostaphylos*  
 27. *Arctostaphylos*  
 28. *Arctostaphylos*  
 29. *Arctostaphylos*  
 30. *Arctostaphylos*  
 31. *Arctostaphylos*  
 32. *Arctostaphylos*  
 33. *Arctostaphylos*  
 34. *Arctostaphylos*  
 35. *Arctostaphylos*  
 36. *Arctostaphylos*  
 37. *Arctostaphylos*  
 38. *Arctostaphylos*  
 39. *Arctostaphylos*  
 40. *Arctostaphylos*  
 41. *Arctostaphylos*  
 42. *Arctostaphylos*  
 43. *Arctostaphylos*  
 44. *Arctostaphylos*  
 45. *Arctostaphylos*  
 46. *Arctostaphylos*  
 47. *Arctostaphylos*  
 48. *Arctostaphylos*  
 49. *Arctostaphylos*  
 50. *Arctostaphylos*  
 51. *Arctostaphylos*  
 52. *Arctostaphylos*  
 53. *Arctostaphylos*  
 54. *Arctostaphylos*  
 55. *Arctostaphylos*  
 56. *Arctostaphylos*  
 57. *Arctostaphylos*  
 58. *Arctostaphylos*  
 59. *Arctostaphylos*  
 60. *Arctostaphylos*  
 61. *Arctostaphylos*  
 62. *Arctostaphylos*  
 63. *Arctostaphylos*  
 64. *Arctostaphylos*  
 65. *Arctostaphylos*  
 66. *Arctostaphylos*  
 67. *Arctostaphylos*  
 68. *Arctostaphylos*  
 69. *Arctostaphylos*  
 70. *Arctostaphylos*  
 71. *Arctostaphylos*  
 72. *Arctostaphylos*  
 73. *Arctostaphylos*  
 74. *Arctostaphylos*  
 75. *Arctostaphylos*  
 76. *Arctostaphylos*  
 77. *Arctostaphylos*  
 78. *Arctostaphylos*  
 79. *Arctostaphylos*  
 80. *Arctostaphylos*  
 81. *Arctostaphylos*  
 82. *Arctostaphylos*  
 83. *Arctostaphylos*  
 84. *Arctostaphylos*  
 85. *Arctostaphylos*  
 86. *Arctostaphylos*  
 87. *Arctostaphylos*  
 88. *Arctostaphylos*  
 89. *Arctostaphylos*  
 90. *Arctostaphylos*  
 91. *Arctostaphylos*  
 92. *Arctostaphylos*  
 93. *Arctostaphylos*  
 94. *Arctostaphylos*  
 95. *Arctostaphylos*  
 96. *Arctostaphylos*  
 97. *Arctostaphylos*  
 98. *Arctostaphylos*  
 99. *Arctostaphylos*  
 100. *Arctostaphylos*

Uxor Judei quinquagesimum & quintum  
aetatis aetate annis, macilenta & imbecillioris  
naturae, antequam diuturno moreretur ob calamita-  
tes domesticas saepius perpessus valde macerata,  
colicis pariter ac cardialgicis doloribus saepius  
obnoxia, deterpere à purgantibus assuetum, in acutum  
& vix tolerabilem hepatis regionis firmius  
insistentem incidit dolorem, incurrerentibus in-  
testinorum cum alvo adstricta doloribus qui per  
intervalla remittebant & quiescebant. Accedebat  
septimo die icterus, foedo colore totum corpus  
perfundens. Quibus symptomatibus per  
mensem fere iactata, adeo privabar viribus,  
ut morti propinqua videretur. Nil proficiuntibus  
cupsis, & quae ab alijs praescripta erant medi-  
cis, penitus etiam à me fuit auxilium. Julii  
ergo primum, decoctum radices curcumae cum  
sale tartari & aqua paravam valde securatum,  
cum cerevisia poni dâti. Dein potissimum laxan-  
tem ex mannis unciis duabus, cremoris tartari  
drachma & dimidia, nieri purificati granis XII.  
olei amygdalarum dulcium uncia una semis pe-  
ratam, mane per vices hauriendum praeci, quo  
cuncto sedibus magna viscidiorum & biliosorum  
humorum colluvies effluebat. Tum regioni do-  
lenti vesica fulla, olei calidi plena, ad demul-  
cendam doloris fœtiam suâ admotâ. Post ali-  
quot dies dolores sensim miscebant & aegra cum  
sanitate in gratiam rediit. Hoc paroxysmo, mition-  
ibus tamen symptomatibus stipato, aliquoties  
postea per annum cum affligeretur, non praeslan-  
tius unquam ac in dictis remediis auxilium inven-  
nit. Incepsa renuit mihi aegra, quod inter excre-  
mentis saepius diuti globuli pisciformis instar in pa-  
roxysmo de extra cum prodirent. Ceterum Hal-  
berstadtum se conuulit, ubique, ut intellexi, va-  
lentudinaria perpetua degit.

*Epigrifa.*

Femine cachecticae quam facile in morbos hepatis, æterum flavum et nigrum incidunt; neque mirum est huc visceri calculus ingenerari, præsertim quando non amplius tributum lunare persolvitur et morore afficiuntur. Ex curam petendi auxilium in hoc affectu permosa fuit, ob huiusmodi, quæ legimus in *Clave Pharmacœmica* B. mei Parentis et sic audit. Cum Clariss. Dominus Christianus Guenzlin, mercurialis alius Gymasii nostri Rector p. m. abquando acutissimi dexteri hypochondrii doloribus usque etiam ad medicorum de speratione et refutatione in senectute plenum torqueretur. Medici reliquii consultantibus ultro citroque de remedio aliquo appropriato huic affectui adhibendo, tandem D. D. BENEDICTUS OHEIMUIS medicus sine pari *excepimus* p. m. froni drachmam radicum curcumæ in bawsta cervicis calide butyrica propi-

Frid. Hoffmanni Quer. *Ton. II.*

necesse, et cuius nifi elapso bithorio dolores dicitur non solum remiserunt, sed et per secessum ipsa salivæ lapilli autem subtile calce spiculantur in pulvis substatum excrevit fuerunt; quia quidem medicorum ex iustissimis, ego autem ex felici fallaculo fecisse iudicavi. Elapso duodecim et circiter annis post eadem perpetua symptoma, sed defuncto tunc laudato D. OHELMIO p. m. et nullis excrevit lapilli, in quo causam morbi refero, huius iter addit. Posuerim maniatum cum oleo amygdalarum dulcium fæpius conducibilem ad calculos etiam renales, si ureteribus finitus inhaerescunt, in vesicam promovendos deprehendi; qua non modo facies inestruellum, sed et flatus, qui symptoma augere et iter calculorum praecludit, bonis cum aegri tebus educuntur.

CAPUT IV.

*De Doloꝛe & spafmo iliaco.*

## 6. 1.

**I**nter graves genera nervosi morbos, qui mentem permolesta sententione & conyus periculosa pathemania excruciant, referendū omnino sunt levi intellinorum dolores, inter quorum numerum primas fere tenet, qui in ileo valde tener & sensilis tenuiore conditis & vulgo passio dicitur iliaca. HIPPOCRATES dolorem ilei, quia causa illi refidit, vocat: Graeci chordopon five morbum chordum appellantur; quia intestinum agrotans ad chordae similitudinem tenditur. Dicitur Latinis volvulus, quia intestina ex parte invicem convoluta apparent in defunctis. CORN. CELSUS tenuioris intestini morbum vocat.

## 6. IL

Est dolor intestinorum tenuium acutissimus facile in inflammationem transiens, sub quo peristalticus eorum motus secundum naturam ad inferiora vergens violenter invertitur, atque in intestinis contenta atque assueta vomitu rejiciuntur & extorquentur, ac nihil, neque flatus per anum fortiter claudum, descendere possunt, gravia post se trahens & (per funelia) hystericorum.

### 6. III.

Progressus laevis morbi una cum symptomati-  
bus ita adomatur. Praecedunt alvi obstructions,  
maxi acce & firmissimi prodeunt dolores, cum  
inflatione, distentione, duraque ad tactum ta-  
more regionis umbilicalis. Alvus protius est con-  
spicata & contracta, adeo ut neque stans nec ex-  
crementa per eam transmittantur; postea superi-  
ores erumpunt fluxus & primum biliosa & pin-  
tosa materia, antecedente nausea, crebro vomitu  
protrahitur, spiritus est difficilis & quiescenti  
cibi vel potione assuescit, tamen id cito descen-  
dendat, paulo tamen post, quia transire inferius  
nequit, iterum vomitu redditur, faeces subultrae,  
non absteriles stercoreis, cum foedo fere halitu  
ejiciuntur. Summa sequitur virium prostratio,  
calor praeternaturalis, pulsus durus & contractus  
cum immobida fici, urina rubra est & difficul-  
ter redditur. Cum ad extrema ventum est, acci-  
dit singulus, delirium inaeque nervorum disten-  
sio, sudor frigido perfunditur cortex, & atroces

convulsionem ac lipothymiam vix sapienter finem afferunt. Ipse HIPPOCRATES Lib. III. de morb. ita exprimit vulvuli generationem: *refectur intestinum & pra inflammationis caliditate obduratur, ut neque flatus neque cibi pertranscant, sed veniet durus fit, & quandoque vomens primam morsa, deinde biliosa, postremum steruus.*

## §. IV.

Anatomia  
illorum.

Per dissectionem hoc morbo defunctorum, ileum inter se convolutum, & in una & altera parte, ubi mali sedes, inflammatum ac sphacelatum puredine corruptum apparet, & supra inflammationem ilei pars magna ab hac labe libera, flantibus adeo turget, ut ipsum colon amplitudine interdum superet.

## §. V.

Ratio for-  
malis.

Ratio formalis hujus mali consistit in inverso plane intestinaliumunicarum nerveo-musculosa motu peristaltico, a fuerit coarctatione, angustia & clausura in intestino ileo facta, qua nihil ad inferiora transmittitur.

## §. VI.

Causam  
proximam  
hanc.

Plerumque hujus miseræ ac dolorificæ passionis causam præbet hernia scrotalis vel inguinalis, quando intestini ilei portio intra processus peritonei eo impellitur, ubi illi in viris ad scrotum abeunt, in feminis vero uteri ligamenta rotunda penetrant. Jam vero novum ex anatomis est, hos processus, dum musculos abdominis perforant & transeunt, certis quasi angulis aut gradibus hanc facere penetrationem, ita ut, cum unum musculum perforarunt, intra eum & sequentem aliquantulum progrediantur, antequam alterum pro ulteriori innere transeant; sapienti naturæ consilio, ut eo minus promte aliquid ad scrotum vel inguinalem regionem extra abdominis cavitatem prorumpat. Si vero cum violentia id fiat, ut eo ilei pars dilabatur, annulique nimium dilatentur; facile contingit, accedentibus præteritis aliis causis, ut pristinum locum repetere nequeat: atque sic firmius ibi inhaereat & incarcerationa fit, omnemque contentorum transitum plane impedit.

## §. VII.

Quæ in femi-  
nis per-  
iculosa.

In feminis res est majoris periculi, cum processus ibi sint angustiores & difficilior prolapsa intestini portio reponatur: & licet in nonnullarum inguinæ tantum exiguus tumor, ut vix sabbam aequet, protrudatur, tamen servilissimam hanc passionem invadere possit. In herniis scrotalibus minus est periculi quo major intestinum est prolapsus. Videmus non semel sed sæpius vel tertium intestinum partem miro & magno tumore in scrotum descendisse, sine ullo succedente passionis illarum periculo, quia transitus contentorum commodius & facilius tunc fieri potest.

## §. VIII.

Causam  
proximam  
hanc in-  
gressus.

Præter hernias, occasionem huic sevo malo producendo dat frequentius intestini ilei nimius ingressus sive insus susceptio, quæ per sectionem mortuorum venit in conspectum. Et unus nonnulli auctores hanc plane negare & pro impossibili habere velint, contrarium tamen testatur experientia & observationes: inter quas attentione plane digna est Cel. PEYER in *tratt.*

*de glandulis intestinalibus* relata de sectione formæ vulvuli extinetæ, quæ ita habet: *parefata abdomine ileum alibi plane confistit atque veluti injecto laqueo strangulatum videmus; nimirum portio ejus quatuor digitis transversis longa, plurimum vero contracta ac angustata intra proximam portum superioris cavitatem prorsus abscondita latebat.* Simile quid a Clar. SYLVIO in *praxi Medic. lib. I. cap. XV.* descriptum est. Et talis ingressus in puella simili morbo extincta idem PEYERUS tribus distinctis locis, præsentibus nobilissimis Medicis Hardero & Brunero, ostendit.

## §. IX.

Quomodo  
a crura  
marf

Genesis hujus phaenomeni, licet prima fronte paulo difficilior videatur; non tamen omnem conceptum transcendit: nam si una portio ilei vehementer contrahitur, fit ut in vicinam flaturum distentam cum impetu intrudatur. Talis ingressus modum maximi doloris, sed & inflammationis esse causa potest, quæ compressa & contractis vasibus ilei una cum mesenterii portione exoriri debet. Dein etiam sphacelus ejusmodi partes in sectione reperiuntur: & notabilis est casus quem LAZARUS RIVERIUS *Crit. III. Observ. 26.* prodidit; ubi in dissecto cadavere ileum in fine suo vixibus complicationibus convolutum & quasi compactum in unam massam deprehendit, quæ tota sic convoluta portio gangrena erat affecta, una cum mesenterii proxima parte; reliqua intestina erant amplissima & flantibus mire distenta.

## §. X.

Quæ ad  
ilei compres-  
sionem.

Ad funestum talem intestinoorum ingressum qui causam ilei præbet, plura alia implicata mala conferre possunt: & testantur diversorum auctorum observationes, a hemicis in ileo decretis & in dissectione cadaveribus reperiis, si mortui dolores efficiant, illicam passionem fuisse productam. HENRICUS ab HEER *observ. XXXIV. pag. 214.* puellam sicut ab epilepsia illolam factam vermesque evomentem, in cupis ileo, circa finem, quinque complicationes vermium invenit, quarum alie inferne sursum repebant, alie supra deorsum complicabantur. Et in M. N. C. *Decur. II. ann. V. observ. XIX.* de femina triginta annorum refertur, quod ileo correptæ cum sæpe liquida evomeret XVI. hemicis teretes robustissimos, & acutum sub frigido sudore efflaverit. In medio intestini ilei membranae cucullii instar extensa videbatur & foramen grossi magnitudine tenuissima membrana exteriora tectum. Uniusque vero intestinum unius digiti longitudine, duodenum autem duorum digitorum transversorum latitudine nigrum & gangrena corruptum videbatur. Eandem morbi causam etiam confirmare & adtribuere videtur LOMMIUS *lib. II. observ. Medicin.* dum ait: *si ad extremum ventum est, subinde hemicis evomuntur.*

## §. XI.

Intercom-  
muni etiam  
venena  
etc.

Neque inter causas antecedentes quæ ileum excitare possunt, atque non modo stricturn & coarctationem ipsa intestinis inferunt, etque ad inverlam peristalticam motionem irritant, excludenda sunt venena, item purgantia acris nec non emetica, præsertim si jam labe & vitio quodam intestina laboraverint. Iam CÆLIUS AURELIANUS, qui præter Hippocratem optime de acuto hoc tomento, quod Græci ileon

Nec non  
quæ intesti-  
ni ad hanc  
passionem

aut inter-  
veniens  
difficilis

reponit

ileon appellant, fcriptis, inter caufas, venenum potum aut cibo datum nec non fungos comestos refert. Et ALPINUS de medic. method. p. 313. de Gualandino memorat, quod à colico dolore à devoratis caespitiis & hiera ad feni unciam, in ileon, quo extinctus est, incidit. Neque nos tali in casu largiorem pilularum, quæ aloem recipiunt, ufum probare possumus, utpote quæ post operationem non modo intestina efficiant, sed & uberiores sanguinis ad illa affluxum procurant, ut hinc etiam, secundum nostram obfervationem, intestinorum in hac vel illa parte coarctationes, quæ liberum excrementorum transitum inhihent, & ad dolores colicos difponunt, efficiant.

## §. XII.

Ne non  
que inco-  
lis ab-  
tatis.

Neque ex numero caufarum passionis iliacæ obfervationes intestinorum præsertim tenuium omittenda veniunt, quas alimenta ficca, conftringentia, vel humido non satis diluta excitare confuefunt; inter quæ, testantibus obfervationibus à medicis paffim notatis, frequens panis fici & bis cocti, spirarum, caftanearumque efus, pyri & pomæ maxime cydoniata, fructus immaturi & acerbis, in magna copia si devorentur, magnam momentum conferunt; præsertim si vita sedentaria, moror animi, qui omnis robur & tonum ventriculi & intestinorum canali subtrahit, vel parvus potus, accesserint.

## §. XIII.

aut in-  
co-  
dis.

Præterea intestina crassa à scybalis diutius retentis obftructa & obftructa acerbam hanc passionem, dum nihil, quod ore assumitur, transmittunt, ingenerare possunt, præsertim quando ex pudore aut loci defectu, vel alia ex causa stimulus ad alvum dependendam reprimetur & cohibetur. Accumulantur hinc maxima excrementorum copia, quæ postmodum unicis intestinalibus tam violenter difflunt, ut vis earum elastica, systolica & expultrix plane cesset atque deficiat. Hæc dum cogito, in mentem mihi venit ante aliquot annos à celebri quodam Anchario Regio ad me facta relatio, quod nimirum Celsissimus Princeps, ex nimia cohibitione & retentione fecum, illicus factus fuerit; in cuius post mortem dissecto corpore intestinum colon scybalis tonum repletum & difruptum in una parte inventum est, atque tanta scybalorum moles deducta, quæ pondere circiter viginis libras æquavit. Neque attentione indignum est, quod HENRICUS ab HEER in obferuat. pag. 54. narrat, se prætere, dum ileo demorui abdomen difsecaret, sponte intestina crepisse cunctorumque aditannum velles insigniter commaculasse, cum impetu erumpentibus & explosis scybalis.

## §. XIV.

inque.

Ex ceteris vero omnibus caufis antecedentibus, affectus iræ, præsertim si vehemenior fuerit, ad illam passionem producendam, & quædam facilius in illis, qui vino quodam intestinorum laborant, aut hemiofi sunt, magnam habet potentiam. Neque deficit ratio: nam ea est natura ac indoles huius affectus, ut nervos maxime partes spafmice convellendo operationem suam exerat, inque paribus etiam inobedientibus, ad quas merito extra abdomen prolapfa intestini portio pertinet, quam facile, ob copiosorem sanguinis affluxum, stagnationem

Fréd. Hoffmanni Oper. Tom. II.

& flafin, ex qua demum oritur inflammatio, producta.

## §. XV.

Quæstio nunc occurrit curiofa ac non levis momenti: an nimirum, ut communis fert sententia & veterum etiam medicorum assensio est, in nostro morbo, præsertim quæ ab incarcerata hernia, vel à multo intestini ilei ingressu fit, stercora per os evomi possint? Dubitandi non levis ratio in eo posita est, quod primo per coli valvulam, qua ilei ingressus in cæcum & colon munitus est, faeces non possint relabi & regurgitare: dein, quod nulla ratione concipi possit, quomodo per contractam & summit inclusam in hernia tenuem ilei partem stercora penetrare queant. Ego quidem non in totum rejicere volo testimonium medicorum probabilissimæ alias fidei, sed tamen modo id, quod ipse in aliquot vidi & observavi subiectis hic adducere volo; videlicet resectam quidem vomitu fuisse materiam, quæ colore subrufo & externa specie liquidas alvinae faeces referebat: quandoquidem vero ipsa rejecta & collecta materia naribus fuit excepta, nullus plane fœtor vel gravis odor se prodidit, ut potius assumatur rerum odorem habuerit, præterea & ipsa quasi ebulliens cum spuma apparuerit. Nihil minus ego haud negaverim, quando nec ab incarcerata hernia, nec à convulsum intestinorum, sed à sola spastica ilei strictura dolor fuerit ortus, intestina vero crassa, rectum & colon, validissima simul spastica strictura laboraverint, posse hac ratione faeces valde liquidas, & ut alii obfervant, clystres per coli valvulam ad superiora penetrare. Ceterum hanc de stercoribus vomitu in hoc malo rejectis obfervationem ulteriori & accuratori medicorum animadversioni atque examini commendatam velim.

## §. XVI.

Quod attinet ad ipsam prognosin, spes salutis superest, quam diu non adit inflammatio & clystres in alvum recipiuntur & redduntur, dolores quoque locum mutant, neque dolor & vomitus alidius est, sed per intervalla urgent, atque malum ab obftructis intestinis à contentis facibus, emanat fuerit. Major adhuc spes est, si medicamentum ore sumtum laxans alvum perumpens dejectionis iniunxerit. Si vero inflammatio jam præsens, quæ ex febre, vehementia torminum, urinae suppaefione, pulsu duro & celeri, siti inextinguita, pectus corporis & summa virium prostratione atque extremorum frigore, judicatur, parum spei superest. Repentina vero & omnimoda doloris cessatio, summa virium lapsus cum pulsu debili, animi defectio, fœtor oris, inflammationem abfule in sphacelum certo denunciant. Quod restat, id sciendum est, quod grave hoc malum, si inter initia, ad avertemendam inflammationem & dolorem suspicandum congrua opponantur remedia ad duas vel tres hebdomades, antequam potius conquiescat, potius produci.

## CURATIO.

## §. I.

Si ullo in morbo temporis momenta attendere & obfervare juvat, profecto in morbo iliaco sanando id necessarium esse existimo: nam is ipse tantæ est vehementia, ut intra tres

Aa 3

de fluxu  
rumi que  
est f

Progreffu.

Temporibus  
quantum

quandoque dies satis validum hominem, nisi cita ope succurratur, enecare possit. Quando vero quævis momenta temporis præcipiti gradu aufugiunt, subinde javandi occasionem secum arripiunt; & valet hic egregium illud HIPPOCRATIS monitum prædictum, quod *lib. I. de morb. medicum* qui facient, graviter inculcat, his verbis: *Si aequum aliquis in illo morbo utilitatem autili, cum iusto tempore autili necesse est.* Quo circa, si illo in affectu cense in hoc dero, præcipiti & periculi plenissimo, medicus peritus statim accersendus est, cui nihil prius, nihil posterius curæ cordique sit, quam ut servissimo dolori, qui inflammationis & moris etiam causam præbet sufficientem, per convenientia tam interna quam externa remedia sublevando propiciat.

## §. II.

Qui in veterum medicorum Græcorum lectione paulum versatus est, is facile deprehendet, eos follicite & accurate admodum partium nervosarum affectus inque primis doloris, tum quod ad eorum historiam, tum ad curationem perinet, descripsisse; non ex alia sine dubio causa, quam quod ob regionum prædictarum, viæ, & vietus imtemperati rationem ejusmodi morbi sæpius occurrant & operam medici requirant. Videbitur inque quomodo & qua methodo HIPPOCRATES hujus mali curationem instruerit & adornaverit. Describit hanc ipsam *lib. III. de morb. §. 15.* Jubeat hoc in affectu alvi apertionem tentandam per glandem fasci longam ex melle paratam, quæ anteriori parte felle taurino oblinatur, & bis ac ter submittatur; quo combusta, ut inquit, *stercora circa rectum intestinum contenta educantur.* Post hæc chylum adhibendum docet. Et ulterius addit: *sive minus hoc opem ferant, felle fabrilis in ventrem induso statim immittantur, a quo & ventrem & intestini contractionem dissolvende oportet;* deinde extracto felle, chylum applicandum, qui non ex calefactionis, sed ex his qui stercora dissolvunt ac colligunt parandus est, suadet; postea obturata per spongiam sede in aquam calidam labaratas conficit, continens chylis infusum, & addit: *si hoc infusum susceptum & rursus dimiserit sanus evadet.* Atque citius quæ venerandus senex alibi scribit: *Supernum ventriculum quon cussime purgato, ac sanguinem de capite ac cubitis detractis, ut superne alicui calefere desinas; & porci supra septum transversum frige facias, excepto corde.* Infernas autem calefacio, homine in solis aqua calida collocato, ac semper oleo illis.

## §. III.

CÆLIUS AURELIANUS præclarus non minus Medicinæ scriptor *lib. III. ant. passion. cap. XVII.* in illo tormento, quæ sequuntur remedia proponit atque commendat. Per chylum neminem oleum calidum purum, vel aquam cum aquali parte olei dulcis & cum hybisco, per quem altius radicem intelligit, coctam donec aqua fuerit consumpta, ut olei pinguior natura mucilaginis radicis temperetur, ano infundendam esse proponit. Vescam quoque calidam ex oleo semplem, item medicorem vaporem pro mitigando dolore parti morboque applicandum jubet. Præterea si hæc nihil perficiant, *folliculo aris avaria immittendum, inquit, venam per podicem, quo distantia ventris*

*aque inflammationis replicatio folliculi fiat;* & tunc statim adhibendum chylum probat. Detrahit supra dicto folliculo, podicem cum spongia obstruendum præcipit. Ceterum hoc affectu laborantem fovendum esse loco medicoriter calido atque lucido, adhibita requie cum silentio & abstinentia cibi usque ad triduum, potum quoque parum dandum imperat; cavendumque esse monet, ne externa & caespilata apponantur, quæ gravitate & pondere dolorem inferant. Nos vero curandi hanc veterum methodum non possumus improbare, sed potius laudamus, modo convenienti tempore & ordine suscipiatur. Directa enim quam maxime est ad alvi secessum procurandum & ad strichuram intestini crassi spasticam, quæ huic obicem ponit, removendam, pariter etiam ad inflammationem in locis superioribus, à qua summum imminet viæ periculum, abarcendam. Nos autem omnia ad primam mali causam & originem in curatione administranda respiciendum ducimus.

## §. IV.

Igitur, quando causam mali incarcerata hernia præbet, quod ut plurimum fit, prima & præcipua cura esse debet, ut prius emollica intestini prolapsi portio, si non sponte retrocesserit, in suum locum reponatur. Quod ut facilius ac promptius contingat, primo chylis applicentur singulis biboris, ut flatibus abdomen depleatur; dem pinguis & oleosa pars affecta erit emollienda; quo sine vesica lulla axungia humana vel canina semplem, parti affectæ applicari & totum quoque abdomen omento ex animante ut virulo desumto, vel si non fuerit ad manus, linteo mundo oleo raparum vel lini calido immerio tegi possit. Postea supinus aeger locari debet, ventre & abdomine paulo eminentiori, capite vero decliviori; & sic cruribus diducta, chirurgus manu oleo amygdalarum ununcta, intestinum scroto prolapsum, molli contactu & ineropulsione finis digitorum adminiculo facta, in abdomen reponere tenet, ita tamen, ne intestinum compleretur, vel ullo modo laedatur: nisi enim tempessive repositio herniæ fiat, sive sit in inguine, sive in scroto, sive cruralis hernia fuerit, quam facile inflammatio in sphacelum deficiens supervenire possit; quando videlicet sanguis, nb coarctatus & oculi ac quasi à tendinibus abdominis strangulati ilei portionem, per vasa sanguinea compressa regredi nequit, in stagnat atque in sphacelolum putredinem abit.

## §. V.

Præcedenti non posterior in hoc affectu esse debet indicatio, ut atroces & intolerabiles dolores convenienti medicina sopiri conquirent. Nam ea est doloris vehementissimi vis ac potentia, ut lege consensu, quod partes nervosæ inter se habent, gravia illa symptomata, vomitus, singultus, anxietates, assidua vigilia, febris, delirium, virium exsolutio, inquietudines, neque minus stricture totius canalis intestinalis usque ad inferiora ipsumque anum, tremor quoque extremarum partium atque urinx difficultas inde pendeat: quæ cuncta sedato dolore niiscere & placari solent. Ego itaque in ejusmodi præcipiti casu cum singulari fructu & non sine summo levamine nullo non tempora aquam mentha leniter spirituosam, quæ etiam in se leni vi anodyna gaudet, cochlearum singulis horis cum

*Si causa  
ilei hernia,  
reponenda.*

*mentha*

X. vel XV. liquoris anodynæ mineralis, duobus vel tribus laudis opiatæ juxta Helmontii methodum parati liquidi, guttula remixti potrigere soleo. Exterius quoque ad singulum & vomitum compellendum epigastricæ regionis emplastrum ex thieracæ veteris & olei nucis moschate expressi equali portione, additis oleo menthae & camphora concinnatum, suavi imponendum. Sedam vomina vel etiam singula, scilicet cum fructu & succellu clematæ laxativa, ex manna, cremore tartari, amygdalarum dulcium oleo retineri & operationem suam exferre possunt; videlicet quando ex diutius retentis excrementis in intestinorum flexura, malum oritur.

## § VI.

Inflammatio  
in arteria  
de vena  
filiola.

Neque inter medendi indicationes neglectui haberi debet, quod inflammatio omnibus modis sit averenda, quia hæc tandem in sphaculum abit & mortem infert: siquidem testantibus id passim observationibus, nullus facile iliacus absque sphacelatione intestinorum perit, sive illa fuerit ex hernia, sive convulsione, & mutuo intestinorum ingressu suborta. Ad hanc vero declinandam, præter clysteres & externa emollientia, interneque data anodyna, quæ dolores, spasmus non modo, sed & inloquentis inflammationis fabros egrægie sedant & demulcent, venæ sectio magnam vim habet; quam ipsæ etiam HIPPOCRATES ad febrem sedandam & impediendam loco citato commendat. Et CÆLIUS AURELIANUS quoque *l. c.* phlebotomiam ad dolorem levandum magni facit. Uterque auctor in cubitu eam instituendam esse monet. Nos in pede, in flexu præferim sequiori, eam utiliter celebravimus. Est vero sanguinis missio eo magis utilis ac necessaria imo reitanda, quo major sanguinis abundantia in vasis deprehenditur.

## § VII.

Si jam ad  
fuerit, dif-  
ficilis.

Deinceps ad æstus febrilem & inflammationem reprimendam, sicut nunquam non tunc deparatur omnia remediis generis exspuerat, ita etiam in hoc morbo locum invenit commodissimum, si pro dosi VI. vel VIII. grana cum pulvere Marchionis permixta, addita intendantur quanta, pro dosi, camphoræ granis pariter, in decenti vehiculo per intervalla portigentur. Tum quoque quam utiliter pulvis nitrosus antispasmodicus in emulsione ex amygdalis dulcibus & amaris, semineque papaveris albi & aquis paregoricis composita, potest exhiberi. Exterius ad accendendam inflammationem partes dolentes, seimento, quod ex uncia auxungie humanæ & camphoræ drachma constat, debent intungi.

## § VIII.

Ultimum  
auxilium  
de mercurio  
vivo.

Postremo, si malum omnibus jam laudatis & expertæ virtutis remediis resistat, nec ullo cedere modo vellet, ultimum neque commendandum auxilium in uso argenti vivi reposuimus est; quo etiam ipse ego, ut in sequentibus docebit observari, his feliciter usus sum. Neque etiam ultimum facile reperiri hoc ipso præsentius & efficacius, quod munus intestini illi ingressus adfuerit, licet remedium. Plures quidem novi qui in exhibendo hoc remedio valde sunt timidi, sed citra metus rationem: modo opportuno & convenienti tempore id fiat. Sic etiam RHODIUS

Observat. Medicin. cent. II. observ. 80. testatur hydrargyri uncias V. cum melle rosaceo sobriovo haustis deploratum iliacum fuisse. Libram dimidiam mercurii vivi impune summat, illico alvum exonerasse, memorat HENRICUS ab HEER in *Observation. Medicin. p. 56.* qui plures mori viciosis hujus præsidio relictus. Quid? quod integram ejus libram ZACUT. LUSITANUS *Pr. adm. lib. II. observ. 35.* euidam Duci strenuissimo optimo cum eventu præscripserit. Ut taceam ejusdem libras atque in aqua sumtas, pluribus in iliaca passione periclitantibus, annotante PARÆO *Oper. Chirurg. lib. XX. cap. 38.* vinum kervallæ.

## CAUTELÆ

## § I.

Memori sane, circa hunc affectum, mente tenendum exitium, quod purgantia validiora alvum ducendi causa exulnere maximo perit sit incitum; dolorum enim pariter ac spasmus augmentum, nec non symptomatum omnium exacerbationem nunquam non inferant. Neque clysteres etiam ex valde calidis & carminativis concinnatis in usum trahere conducibile est; multo minus interne essentiae curmative stomachales vel vicia medicata peragenda: quippe hæc omnia ejus sunt natura, ut in colica quidem stultiora, & quæ a causa frigida, ut cum veteribus loquar, oritur, levamen afferre possint; minime autem ubi morbus est acutus, & omnia in vehementi motu ac impetu continuata sunt.

## § II.

Ubi vero vires defecere incipiunt, & animi de liqua imminet, temperata analeptica omnino possunt usui de præsidio esse, quæ videlicet ex aqua cerasorum nigrorum, mellis Turcicæ, liliorum convallium, mentha, cinamomi sine vino paratæ sunt; vel ipsum vinum generosum coctilem porrigi debet.

## § IV.

Si status plethoricus adest, venæ sectio statim instituenda, imo si opus est reitanda. Et plurimum quoque attendenda erit doctæ & circumspicte observatio Clar. PASCOLI quæ *Tom. II. Oper. pag. 199.* ita eleganter & prudenter scribit: *Si adju febr. si viscerum inflammationis indicia tametsi minuerint, vena statim severanda, in partibus potius inferius quam superius. Hinc bircidnes intestus præcipue recto admonet, mirum invadens profusum ad ileum sedandum balneum per se semper observandum; quoniam sanguis qui ex vasa hæmorrhoidalia in profundum, partem affectam proxime accret.*

## § V.

Quando usus argenti vivi internus utilis ac necessarius judicatur, ipsum prius probe depurandum, lavandum & per corium trapiendum est; dem non facile ultra libram vel dimidiam officii decet, quod optime fit cum juleculo pingui; tum, post ejus potum in laus dextrum aliquandiu æger decumbere, ut eo citius ventriculi orificio dextro egrediatur, & insuper, si vires id permittant, corpus ambulatione vel vestitione movere debet, ut eo melius ad inferiora descendere possit. Cavendum vero, ne inflammatione jamque præsentē de viribus dejectis, hoc me-

Hæc  
purgantia  
maxime  
cuius  
di admi-  
tendi.

De defec-  
tibus  
analeptis.

Ubi pletho-  
ra vena  
fuit.

Mercurius  
vivi rursus  
depurandus.

dicamento quæ utatur, ne vulgus & adfistentes, si pereat æger, ab hoc remedio, quod ab omnibus fere suspectum habetur, periculi sibi vane persuadent.

## §. VI.

*Clysteri  
Præpar.*

Magma vero salinis & convalescentia in miserando hoc malo spes in clysteribus est posita, modo illi convenienti tempore & quantitate applicentur. Hi enim, si vehementi spasmo conficta sunt intestina crassa, fibras eorum crebriori injectione relaxatas & flaccidas reddendo, inversionem perisplalici motus inhibent. Et præstat tanquammodo aquam calidam cum syrupo dialtheæ *Fernellii* permixtam non semel sed aliquoties, & si vires patiuntur, una die singulis bhoris, & quidem primo statim die, ano infundere, ut stercore etiam liquidiora fiant.

## §. VII.

*Cat. Anod.*  
*alra Topi-*  
*ca mani-*  
*stium.*

Quoad prudentem topicorum usum, perplacet mihi *CÆLII AURELIANI* supra jam citatum à nobis monitum: qui à gravibus cataplasmatibus abstinendum esse docet, ne pondere & asperitate passio & dolores incrementum. Sæpe enim tanta est ventris inflatio & distensio, ut nec tactum cum manu paulo validiorem ferre æger possit.

## §. VIII.

*Alra flu-*  
*mine clau-*  
*sa, fere*  
*confer.*

Quandocunque alvus ob spasticas stricturas ita clausa est, ut nec syphonem, multo minus solum admittere aut recipere possit, tunc præstat forum temperate tamen calidum applicare & blandam ac successivam puri olei tepetacti injectionem subili syphone tentare, quo tunice intestini recti valde coarctati & spasmo conficti hac ratione emollescat, eo facilius postea, majorem quantitatem humorum per clystia in se recipere queant.

## §. IX.

*In disten-*  
*sione mor-*  
*bi, balnea.*

Declinante & remittente morbo, lavacra, quæ etiam si vires ferunt pro circumstantiarum ratione primis morbi diebus adhiberi possunt, convenientissima sunt. Faciunt aut passionis solutionem & ad mortuos reliquias fibræ relaxatis facilius expellendas; siquidem iis frequenter admodum de optimo consilio *Metbodici* in morborum declinatione utebantur, quemadmodum ex *CÆLIO AURELIANO* videri licet.

## §. X.

*In disten-*  
*sione mor-*  
*bi, opia.*

Ad mitigandam dolorum severitatem, quæ fere præcipuum tot gravium symptomatum & motus inversi perisplalici causam præbet, minime est metuendus opiorum usus, modo fiat statim in principio si vires adhuc integræ, si plethoræ patiens soluta, & nullum sphacelationis subsuerit indicium. De quorum insigni usu egregie *B. WEDELII* observatio, quam in *M. N. C. Dec. 1. an. 2. observat. 238.* communicat, legi mereatur.

## §. XI.

*Si heresia*  
*supra me-*  
*ntis, lin-*  
*ta.*

Si causa iliaci mali est hernia cruralis, atque ob no sperandam intestini repositionem sphaceli & mortis periculum imminet, ultimum auxilium & spes salutis in incisione est, quæ, si dextre a perito chirurgo, adfistente docto medico, adiuvantur, sine omni metu est & ex ore lau-

cibus ægrotantem eripere potest. Talem sectionem non ita pridem in urbe celebri, in illustri foemina ex iliaci affectu in summo vice periculo versante, felicissime & salutiferè summa chirurgi dexteritate celebratam esse intelleximus. Sed in ejusmodi casibus ut operatio mature & in tempore suscipiatur, ac antequam indicia præsentem sphacelum denuncient, valde necessarium est.

## §. XII.

Plurimum etiam scire refert, malum iliacum ex eorum esse numero, quæ facile recidunt. Novi aliquot, qui secunda & tertia vice recurrente affectu demum exincti fuere, sed hi quod bene notandum hernia laborant. Ut itaque corpus à periculi plenissima recidiva vindicaretur, opus est, ut sollicita nunquam non hernie habeatur ratio: quæ hæc est, ut beneficio subligaculi intus retineatur, vel si id fieri non expedit, omni modo & cura à frigore defendatur, & inter cibos, qui inflant, ut sunt fructus horæ, pila, oleum ceparumque species, rapæ, maxime oculum vero quæ adstringendi & siccandi facultate præditæ sunt, evitetur, quo alvus libera & mollis servetur. Cumque ex multiplici observatione mihi compertum sit, nihil præter iram & purgantia acriora herniosos in iliacum passionem vel ejus recidivam præcipitare posse, sedula unguè opera data est, ut hæc ceu valde perniciosa declinemur.

*Recidiva*  
*pro scilicet*  
*decidenda.*

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Ante triginta annos, Vix spectata in hac urbe auctoritatem, cognatione mihi conjunctus sexagesimum jam annum supergressus, à vixine jam annis hernia laborabat crurali, quæ temporis progressu ita increvit, ut terna minimum intestinum pars, extra abdomen in scroto detineretur: si erectus flaret, insignis capitis magnitudinem præ se ferebat tumor, qui tamen in supino situ, relabentibus intro intestinis, minuebatur. Periculi quidem honoratissimus vir ab enormi hoc malo nihil passus est, præterquam, quod quinque vel sex ante obitum annos, tarde & parum cum succederet alvus, valde copiosos & molestos vomitus, aliquot horas perieverantes sustinere debuerit: quibus ingens copia humorum vitiosorum in intestinis collecta descebat, qui vomitus singulis fere novem vel decem diebus recurrebant, quos futuros tumor grandior & dolor pressior in scroto indicabat. Excretionem hac exantelata salvis & vegetis perficere, appetitu bono gaudens.

*Supra de*  
*heresia*  
*lin. in*  
*lin. in*  
*lin. in*  
*lin. in*

## Epierysi.

De hac affectus historia, hoc nostrum esto judicium; quod tantæ molis tumor intestinalis in scroto, extra periculum mali iliaci sit, quæ facies & status non possunt ita intercipi, ac id in hernia inguinali, crurali, vel scroali, ubi exigua eamque intestini portio prolapsa, incarcerationa & quasi strangulata à tendinibus abdominis hæret, acutissimis doloribus comitantibus, contingit. Dein nihil dubi est, quin in tam enormi intestinum prolapsu, non relaxatio tendinum & annulorum, sed potius disruptio locum habet: alias enim tam subito in situ supino, tota intesti-

*lin. in*  
*lin. in*  
*lin. in*  
*lin. in*  
*lin. in*



stinorum moles intra abdomen recedere non possit. Tum in praefata observatione hoc insignis momenti phenomenon non erit praeterendum, quod videlicet, praecedente dolore sensu in scroto, omnia propemodum quae ante tres vel quatuor dies assumpta erant, quod ex colore, odore & consistencia liquecebat, aeger evomerit, intus remanentibus quae in prandio tres vel quatuor ante infuleum horas comederat. Id nostra quidem sententia ita factum esse iudicamus: in verso videlicet morus perillalici in intestino ileo, in scroto quod detinebatur, incipit, sed non per totum ventriculum penetravit, fundo ejus tantummodo affecto, minime autem arcu majori sive sacco, qui in latere sinistro est locatus.

## OBSERVATIO II.

*Spasmi  
in scroto  
si repleatur  
in tumore  
malo.*

Honestus hujus urbis civis, suis vegetae & robustae constitutionis, annorum triginta & aliquot, ex hernia per multos jam annos sine offensa vel molestia laboravit: neque subligaculo intus tam detinuit. Autumno ingentem quantitatem mulsi bibit, atque nocte, in somno frigefacto abdomine, dum evigilat, tumorem valde auctum & dolorificum persequitur, qui nolebat, ut amica, intra abdomen subire. Dolores succedebant acerbissimi per integrum diem durantes, qui non in scroto tantum partem affectam, sed abdomen & totum corpus occupabant, cum insigni anxietate & conatu ad vomitum juncti. Anxio a me petit auxilium, mihi peritum chirurgum, ut paciemem inviseret & relationem mihi faceret. Ego itaque suasi, ut tumorem inungeret auxilia omni viulini recenti & desuper fomentum calidum continuo applicaret, quod ex lacte cocto cum floribus malvae, verbasci, chamomillae, croci, semine anethi & cymini constabat, & blande ac modeste reposicionem manu teneret. Interne per intervalla foetam aquam menthae cum aliquot granis extracti croci & jalapo rolarum propinavi. Peracta reposicione simul & semel, & omnes dolores & cuncta permoesta symptomata cessarunt & conquieverunt.

*Eperisio.*

Ex hoc jam clarissime apparet quam caute & provide se hemiohi circa dentium rerum non naturalium usum gerere & custodire debeant, cum levis etiam error funestis affectus causam & originem subministrare possit. Deinceps & hoc notari licet, quod solus acerbus dolor, qui partim nimia ilei intra scroto dententi distensione, partim etiam ejus intra annulos tendinum stricture & arctatione fit, tam gravium symptomatum quae illucum malum formant & quae saepenumero lethalia evadunt, vera & genuina causa censenda sit.

## OBSERVATIO III.

*Dolor &  
spasmi  
in scroto  
remota, in  
hernia,  
materia  
vive car-  
dine.*

Honesta foemina, uxor gravissimi in urbe consulis, cognatione mihi propinqua, annorum XL. in sterili vivens conjugio, utpote qui nunquam fluxere menses, tumore circa semoris curvaturam, in regione inguinali longo abhinc tempore correpta; in vinea ex unis tantum comestis, & sub coelo frigido ac humido refrigerata, persequitur mox tumorem duriorem, graveisque &

acutus in eo dolor, qui noctu ingravescebat. In consilium accersimus cum jam per bidentum nihil per alvum se deiecit affirmaret; prima statim cura fuit, ut alvus per clysteres iterata vice infusus aperiretur, & tam per externa quam interna remedia dolorum levamen afferrentur. Successerunt quidem excrementa, sed non adeo sufficienti copia: perseveravit tamen dolor, qui abdomen occupabat & summum pariter ac appetitum tollebat: nec quicquam fomenti, cataplasmatibus balneis proficientibus, tumore duro & dolorifico permanente. Nil igitur aliud agendum duxi, quam ut inflammationi vendicte perquam extinctae occurrerem: quapropter venam in pede secandam curavi. Interne vero pulverem Marchionis leniter nitrosum ex aqua appropriata mensuravit videlicet & cerasum nigrosum parva & reiterata dosi obtuli. Aestus quidem non adeo intensus erat, ruinationes tamen singultuosae & ad vomendum conamina permanserunt. Tercio ab invasione die copiosius infellebant, praecedente anxietate, vomitones & quidem materiam, tam sublevo colore quam spumescencia, liquidas, quae alvo deieciuntur, faeces referentis, conquecente etiam foetina de malo odore. Eiusmodi vomitus per tres fere continuabatur dies; quibus ingens corruptorum humorum illuvies fuit prostrata. Ego re paulo curatius pensata, materiam fletorem non habendam esse, ut adstantes volebant, judicavi, ob nimiam ejectionum quantitatem, quae in intestinis crassioribus non poterat colligi, cum isquodorum defensio, ob incarcerationem ilei positionem prorsus esset intercepta. Cum vero de alvi constipatione, & ventris tormina & vomitiones & vigiliae assidue, vires in dies magis deiecerent, & praesentaneum levamen utique eo usurpata remedia non adferrent, veni in hanc cogitationem, anne argentum vivum intero haustum possit in hoc casu opportunum habere locum? Ego, cum medendi haec ratio plane extraordinaria & pharmis suspecta sit, nolui solus hoc experimentum facere: ideoque petii ut medicus, quem ob candorem semper assimavi, advocaretur. Ille, cum meos perciperet rationes, idem sentit, asserens, quod sine omni periculo id fieri & forsitan desideratissimo cum successu possit. Mane itaque, dato prius pingui julsulo libram dimidiam rite depurgati argenti vivi uno haustu sumendum portemus, desuper bibendum brodium camis cum aliquot uncias olei amygdalarum dulcium. Proxime agra assumpti. Post horam, leniorem per conclave ambulationem suasimus. A medicamento sumto omnis prorsus desistebat vomendi conatus, & horas quinque post, in lecto, praeter opinionem, alvus solvebatur. Lineis inscriptis apparebat mucida gryki coloris materia multis argenti vivi globulis intermixtis, qui diligenter coliculi unciam praeter proper aquabant. Ex quo scilicet est, ut afflictionum omnium fere, quibus anteangebatur, facta fuerit remissio. Alvum semel sponte deiecitam postea clysteribus demulcentibus & emollientibus, paucio stimulo salino addito, eluere & crassa intestina purgare constitimus: interne quoque laxans thabarbarum & manna cum cremore tartari ex vino dedimus. Ita insignis copia progressu temporis materiae excrementitiae, permixta nunquam non portione argenti vivi, jectis, idque ultra duas fere hebdomades. Ex quo per DEI gratiam evenit, ut periculose aegrotans foemina meliuscule

scio.

semper habens ex oculi quasi faucibus hoc remedio erepta fuerit. Ultimo vero loco ad non praeterendum esse censo, quod, collectis licet viribus somnoque ac appetitu redeunte, tremorem in artubus, atque vacillationem & impotentiam in pedibus ultra mensis adhuc spatium perceperit: quae permolestae affectiones, dextro nihilo minus balnearum usu prorsus demum sublatæ & discessisse fuerunt.

#### Epilepsia.

Ex hujus morbi & curationis progressu, id demum in usum practicum deprimere licet, quod passio illa acuti alias periculi atque exitus, opportune data medicamentis quæ inflammationem arcent & dolores mitigant, in affectum quasi chronicum minoris periculi possit converteri. Deinceps non contentendum in hoc atroci malo, sed potius incomparabilem usum & efficaciam argenti vivi esse, ex hac curatione intelligi & edicti potest, licet modus operandi non adeo explicari facili sit. Ego tamen ita rem concipio: argentum vivum intro haustum, dum fundum ventriculi petit, pondere suo resistit ejus subversioni, sive inversæ ejus motioni peristalticæ, ut potius meo quidem judicio, eam ad inferiora, facta in contrarium compressione, rursus dirigat atque convertat: & hinc etiam ratio reddi poterit, quare globuli plumbei paulo majoris molis intra deglutiti, ad curandum hunc difficillimum affectum commendantur; de cujus remedii salutari usu quamvis multa mihi relata fuerint, nunquam tamen me experientiam fecisse ingenue fateor. Tandem hoc addendum esse existavi, quod dejectiones illæ spumantes liquidae & biliosæ, quarum materia partim per continuam humoris biliosi & lymphatici per glandulas in intestina secreti affluxum, in ileo, progressu temporis colligitur, non modo à vulgo, sed etiam à medicis pro veris stercorebus habetur; licet in totum negare nolum, per vehementiorem intestini colicam quæpiam ex eo puritidum liquaminis ad tenuia descendere & ibi contenta inquinare possit.

#### OBSERVATIO IV.

*Passio illa in infante ex terrore natiuitatis duci aucta fuit.*

Infans puer, unius anni, lac adhuc ex mammis sugens, ex terrore natiuitatis, continuo ejulatu ac clamore noctem insomnem debebat, absque dubio ventris torminibus, quæ parca alvus & viridescens atque coagulatae feces denuntiabant, per duos dies & noctes imo ultra excruciatas. Medicus ordinarius, cum ex clysterum applicatione & usu pulveris laxantis nullam conficeret levamen, duo auri fulminantis grana cum pulvere absorbente permixta præbere decrevit. Inde vero nihil secutum levaminis, ut potius sub majori alvi clausura, vomitus & quidem viridescens infusus fuerint; quibus demum convulsionibus epilepticæ jungebantur & mori. Concessa à parentibus, ad penum meum, abdominis aperture, cui etiam medicus ordinarius interfuit, offensum in medio ileo, mutuum ad articulum digiti, intestini ingressum. Supra quem tenuis intestina ileon, jejunum, imo ventriculus, in quo subviridescens puritidus humor inveniens, statibus valde erant turgida.

#### Epilepsia.

Graves & ut plurimum funestas, quæ per animi affectus inque primis terrores, à nutricibus in infantes derivantur, sunt afflictiones. Horum enim ex est indoles, ut perniciosam vim, motum in intestina tanquam patres valde nervosæ exerant, quarum totum & motum penitus subvertendo & pene infringendo, ventris tormina, alvi consipationem, convulsionem & epilepsiam quam facile accerfunt. Quibus infanum morbis ordinario fere dejectione virides conjunguntur, non aliam ob rationem, quam quod recens excrementa acidam corrosivam ob moram induant naturam, ut bilis permixta inde viridem colorem, non sicut ac fieri solet, quando spiritus nitri cum bile miscetur, contrahant. Ubi vero aurum fulminans vel mercurialis prosapia medicamentum, ab admixtis salibus valde corrodentem & virulentam indolem acquirit, ita summo perire cavendum est, ne infans ubi timentioribus, præsertim si acrum humorum copia obiecta sunt intestina, ejusmodi medicamenta porrigamus. Illa involutio que in conspectu venit ilei intestini, ab atrocibus torminibus & spasticis intestinorum contractionibus absque omni fuit dubio oborta.

#### OBSERVATIO V.

Honoriator femina, quadraginta & aliquot annorum, animi in affectu valde protus, corporis gracilioris, vitam sine metu amans quorundam, venæ sectionem ab aliquot annis, circa tempora æquinoctialia consuevit, vere præteritis anni intermisit, purgans vero intestum, quo post sanguinis missiorem circa hæc etiam tempora subinde fuerat usa, per tres dies usurpavit. Interea vehementiori commoveatur iræ affectu, quam inappetentia, virum languor ac annuum tremor sequebatur; alvus quamvis esset obstructa, nihilo minus ad eam exonerandam agra sæpius sollicitabatur. Mox acerbis in regione hypogastrica doloribus & tormina, cum præcordiorum angustia & crebris flatuum per os eructatione, periculis. Ego accersitus, ad alvum referendam, clysterem ordinavi emollientem, cujus tantum levis portio fuit admixta. Interne ad flatum discutiendos, liquorem meum mineralium anodynum cum essentia corticum aurantiorum bene preparata aequali miscui pondere & per intervalla præbea. Externe linum aquæ Regiæ Hungariæ & balsamo nostro vitæ ebrium abdomini applicari jubebam. Sedans doloribus agra quievit & coenavit; clausa vero permansit alvus. Sequenti ego die rursus vocatus sum, & cum dolores patiebantur prioribus longe acutiores & seviore tormina, cum ingenti abdominis inflatione, umbilici retractione, extremorum frigore & continuo ad vomendum conatu. Tum mihi aperiebat, quod ex laborioso partu, ante multos jam annos, in inguine sinistro contraxerat tumorem, qui sine singulari sanitatis incommodo modo prodiret modo regrediretur; nunc vero longe major & valde durus sine regressu persisteret. Ex quoniam nobilissima pariete omnia quæ ore assumerent vomitu redebant, illuc malum imminere non sine ratione judicavi. Prima itaque & princeps, cum flatum animadvertentem pædiorum, fuit intentio, inflammatio, quæ nihil sane in hoc affectu est perniciosius, avertere. Ad aliquot ignis lancin-

*Dolor & flatuum in femina puerili & venarum sectione & sanguinis missione.*

guinem è vena pedis detracti juffi. Dein ad alvum ante omnia referendum medendi confilium direxi: fed quoniam ob firmam claufuram, clyfterem non adminiftraret, decrevi ut fuccellive leni fiphunculo aliquot uncie olei raparum & chamomillæ codli immitterentur, quo poftea in teftino recto relaxato, eo facilius clyfteres infundi poffint; quod etiam confectus fumus, & duo applicati fuerunt, fed nihil educebant. Igitur quoni præfate afflicciones, vomitus, fingultus, inquietudo, vigilia, anxietas cum extremorum frigore perfifterent; vifum mihi fuit, fingulis bitorum, clyfterem ex fola poftia, oleo olivarum & fyrupo diaphæ FERNELII infundere & ad ponam aquam fontanam puram frigidam, aqua menthe correctam, cupis libræ falis abfynthii drachmam unam & fucci citri unciam falfis adjecti, commendare: abdomine cum linimento ex axungia humana, camphora, fpermate ceti, & oleo hyofcyami quod conflabat, calide inuncto. Poft fex clyfteres injectos, flatus fecerunt copiofi: quibus cotinuatis, in balneum aque dulcis agrum dimitti jubebam. Paulo poft egressa, alvum intra horam ter deprimebat. Cotinuatum fuit balneum, & interne infufum manarum cum aqua fenniculi, addito cremore tartari & nitro animoniato propinatam: ita ingens mucidæ, crassæ & liquidæ bilis materiei copia alvo fuit educta. Sequēbantur litæ flatus fufpurgatorum pæthematum remiffio, largique fudor cum virum & pulli augmento, quem promovere, exhibita mixtura fudorifica, ex tinctura animonii, liquoze anodyno miferata & fpiritu tartari compofita, fuduit. Sic pernoctata hæc afflicto, Divinæ benignitatis adjuvatio felicitè fuit depulfa.

#### Epiftola.

Ex præfata hiftoria id animadvertere licet, herniam, quamquam per longum tempus sine valitudine incommodo geri poffit, nunquam tamen tuam, fed formidandam effe. Hoc in cafu ad illaci morbi genefim, plethoricus ftatus, affluum purgans & demum fupervenientia gravitate affectus fymbolum fuum comulerunt: ut pote quæ omnia nervæ inteftinorum fubftantiæ funt infenfiffima, naturalem & placidam fibrarum inteftinalium verius inferiora tendentem motum pervertendo & invertendo; quod ex flatuum & excrementorum pertinaci intra inteftina retentione & inde pullulantibus cetera fymptomatibus judicandum eft. Sanguinis miffio, quam tantopere ceu fumum hujus affectus remedium veteres, ut HIPPOCRATES, CORNELIUS CELSUS & CÆLIUS AURELIANUS, laudant, in hoc cafu fumme proficua ac neceffaria fuit. Quoniam vero ob fpafmum vehementem, intra inteftina crassa confiftentem, fuperiora fummo cum dolore inflantur, ratio utique confenfaneum eft, hæc fiftoriam tollere: quod omnium optime fieri poffet, per oleofa humida in magna copia injecta, ut fifticæ inde fibre flaccidæ & relaxatæ evadant. Placuit mihi præ ceteris cura quam CELSUS Lib. IV. cap. XIII. his verbis proponit: Si dolor non quæfuit, etiam in alvum, ex parte inferiøre, tres aut quatuor cyathos calidi olei dare convenit. Et balnei ufum HIPPOCRATES ad fifticæ curam mirifice commendat. Cura abfoluta primum quod huic fœminæ confilium dedi, fuit, ut exquifi-

tam femper habeat vium & victus rationem, atque ab omni animi affectu fe temperet: multiplici enim experientia edoctus fum, his neglectis, malum quam promte recidivare; id quod præter HIPPOCRATEM ipfe CELSUS loco citato notavit: facile, inquit, id malum redire confuevit, & cum frigore fubito, fivè aliqua jaftato, nifi bene jam confirmata fuerint, revertitur.

#### OSERVATIO VI.

Berolini cum olim agerem, vir in Regis fœvitis confuetus, quadraginta & ultra annorum, gracilioris corporis habitus & nature cholericæ, ingenti femper gaudebat appetitu & varii generis edulis ventrem quotidie infarciebat, nec jejuni panem, vinum liberalius quoque hauriebat; alvus ordinario pigra erat & obftructa; vomitus fubinde piumti liquaminis marutino præfertim tempore experiebatur. Pofteaquam in folemnitate quadam, fupra modum, placentias, carnes affatas, acetaria, condita mala cydonia devoraffet, & alvus per aliquot dies claufa nihil egelfiffet, male habuit. Venter enim durus, refiftens, rugitibus & borborygmis hinc inde difcurrentibus nargidus erat, atque conditus ad vomendum aderat proclivitas. Opera medicalia ufus pilulas ad alvum aperiendam fumfit purgantes; fed fine fuccelfu. Augebatur potius anxietas circa præcordia cum continua naufea. Rurſus ab eodem fumfit pulverem purgantem, qui tamen nullam movebat fedem, fed decumbens omnia que affumferat ore rejiciebat. Supplicatoria & clyfteres omni effectu carebant. Uxor vehementer & anxie a me petiit confilium. Ego accedens agrum per decem dies nihil per alvum emiffille deprehendi. Venter contactu erat durus, inflatus, & magna inquietudo atque anxietas, vigilia quoque affligebatur. Bono vero cum DEO hac methodo mifer patiens eſt fanatus. Primum ad vomitionem componendam præſcripti mixturam Riverianam, quæ componitur, ex aque communis libra, fucci citri uncia & falis abſynthii drachma, quam per vices affumfit. Dein agrum chirurgico commiſi, cui injunxi, ut clyfteres ex decocto emolliente, in quo fufficiens faponis Veneti quantitas foluta, fingulis horis uno infunderet, & poſtea in balneum ex herbis emollientibus & leniſſe lini paratum agrum dimitteret. Veneri quoque applicare linimentum ex oleis expreffis, atque interne, cum juſculo oleum amygdalarum dulcium, addito pauſillo vini, præbere juſſi: quæ cura alternis vicibus aliquoties fuit repetita, adeo felici cum fuccelfu, ut brevi temporis progreſſu ingens copia fecum conglobatarum duriffimarum & piumti glænoſæ, quibus poſtea fuccelferunt liquidiores, multis ſedibus intra duos dies fuerit educta; quam excretionem, ſemel aperta alvo, ſeri lactis poti per vices ſumo, in cupis mentiora cremoris tartari uncia dimidia & manne electæ uncie tres ſolantæ erant, promovendam decrevi: & ita per DEI gratiam à gravi malo ager ſuis liberatus.

#### Epiftola.

A ſola divina ſecum alvarum retentione, iliaco morbum ſubacti poſſe, præſenti edocemur hiftoria; ex qua animadvertere etiam licet, tali in cafu purgantibus præfertim validioribus

*Epico poſſit  
ex ingluvie  
& jam  
valde per  
gredi*

intro funis nihil esse periculosius, utpote quæ frustra plane datur, cum summo potius detrimento: nam dum fortiter simulando intestina, materiam immobilem & feces aridas per inferiora movere & deturbare nequeunt, miverendo potius peristalticum intestinale motum, malum reddunt deterius, atque anxietates & vomitus augent. Balnea vero temperata, dum externe, & clysteres interne, fibras tensas emolliunt, feces dissolvunt & colligunt, non omnis intestini congruis laxantibus, convenientissimum præbent auxilium; quia ipsam causam & originem mali expugnandi efficaciam suis præstabilem possident.

## OBSERVATIO VII.

*Spasmo illico  
causæ  
nervosa  
hæsit.*

Puer septem annorum spongiosioris habitus & coloris albidioris, dulcibus & fructibus horarum nuntium usus, carnes ac panem supra modum appetens, qui aliquot ante menses unum vel alterum alvo dimilerat lumbricum, in tormina ventris, alvi obstructionem & inquietudinem incidit. Frustra applicati clysteres, & data fuerunt carminativa atque laxantia; augeretur potius cruciatus, assidui accedebant vomitus, & interdum per horam semi-mortuus in syncope miser infans jacebat. Fæces ex ore balitus & feces reddidit: subsequeretur singulus & epilepsia, tandem mors.

## Epiris.

Minime dubitandum est, affectum hunc fuisse iliacum, a lumbricis vel in intestino vel ventriculo residens subortum. Ut vero hi arrodendo & lacerando tunicas teneriorum intestinorum nervos, graves in universo nervorum systemate concitant passiones: ita etiam motum intestinorum peristalticum penitus subvertendi unque sufficienti vi ac facultate possent. Verique omnino simillimum est, lumbricos in ventriculo existentes hujus mali exitialis causam fuisse. Incidit mihi in confirmationem hujus rei historia, quam ex relatione BEATI MEIBOMII habeo: Helmsstadii studiosus, ante aliquot annos, supra umbilicum ferro vulneratus, concipio vomere corpi primum cibos, dein materiam stercoreis instar, sub finem secundi diei mortuus est. Vulneras quidem intestina arbitrans medicus, sed scitum facta plane ostendebat, ventriculum antrosum & retrosum esse lacerum, tam late penetrante vulnere. Ex quo discimus, læsi tantum ventriculo, salvis intestinis, eorum posse intestinorum causam inveri; nihil juvenibus suppositoris & clysteribus. Alias in tali affectu, aqua cum mercurio vivo puro decocta, addita vini quarta parte, remedium necio præstatur: hac enim & necantur vermes & alvus solvitur; sed tempelive, antequam ventriculi & intestinorum tunice sint laceratae, debet exhiberi.

## CAPUT V.

De intestinorum doloribus, atque in specie, de colica flatulenta & spasmodica.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Inter graves generis nervosi afflictiones, non immerito referri debent vehementes dolores, qui intestina seu partes valde nervosæ & sensibiles motuque propulsorio præditæ obident, atque per consensum alias etiam nervosi generis partes, in locis remotioribus consistentes, afficiendo, perniciosis subinde afflictiones pariunt.

*In dolore  
intestini.  
non nervosa  
seu partes  
passiones.*

## §. II.

Quemadmodum tenuia & crassa intestina, ratione texture, capacitatis, functionis & sicut differunt: ita etiam dolores, prout in eam sedem suam figunt, ratione vehementiæ, periculi & aliorum accedentium affectuum differunt.

*Quodam loco  
& quodam  
modo diff.  
sunt.*

## §. VII.

Observamus longe acerbiores & acutiores oboriri dolores in tenuioribus quam in crassis: id quod læculenter validiora purgantia & venena causticæ indolis testantur facere, cum tormina supra & infra umbilicum atque in medio etiam hujus compareant severissima. Ex hanc ob causam ab HIPPOCRATE in genere omnes intestinorum dolores, iliaci denominantur; nulla facta in monumentis suis doloris colici mentione: quam nostro tempore omnes fere qui intestina obident dolores, colici dicuntur atque habeantur.

*In tenuioribus  
acutius  
sunt.*

## §. IV.

Rectus inque iliaci censendi erunt illi, quod medium graviter affligunt ventrem, sive spasmodice illum confringendo, sive vehementer inflando; quum contra colici illi obineant, qui in hypochondrio dextro & sinistro hærent; & pressione ac distensione ingentes creant molestias. HOLLERIUS de morb. intern. Cap. XXXIX. ita coli dolorem descripsit: *inflexus in certo loco instar inflexi palii, subinde tamen vagus ad inguina, singulum & utrumque renem, sursum aliquando revolvitur, & locum mutat, ut suis flexus intestini coli, quod relicto recto in singulum inguine devertit. Ascendit inde ad singulum renem ubi angustus est, que angustia & fons ibi occurrent flexura, causa est, ut hac in parte dolor sit intensior. Hinc ad splenem latus intrat, ubi subitque hepar, atque aliquando in cystide fellis hæret; postremo in dextrum ileon descendit, ubi definit in cæcum.*

*Quodam  
de re  
ilicis qui  
colici.*

## §. V.

Nos omnem intestinorum tractum pro subiecto & sede dolorum agnoscimus, ita tamen, ut una ejus parte graviter affecta, totus nervosus canalus à faucibus ad podicem trahatur in consensum, sive rectius præternaturales motiones imo inversiones & lacerationes motus peristaltici, reliquis omnibus communicentur, adeo ut si vehementior causa fuerit, etiam totum universi corporis systema nervosum gravius simul afficiatur.

*Totum in-  
testinum  
nervosum  
subiectum  
colicæ præ-  
sent.*

## §. VI.

Affectiones & symptomata acerbiora, quæ intestini jejuni, ilei, coli, vel recti, ut apparet in hæmorrhoidibus coctis, dolores committuntur vel subsequuntur, à spasmo partium nervosarum, quam

*Symptoma.*

*Ratio  
malis  
est  
vel  
spas-  
mus,  
vel  
nervosa  
dile-  
ctio.*

*Diffini-  
tione  
colicæ  
dilectio.*

*à ratione  
spasmi  
est.*

*diffini-  
tione  
nervosa  
colicæ  
nervosa.*

*inter  
dile-  
ctio  
nervosa  
& colicæ.*

quam maxime oriuntur & sunt sequentia: horror, tremor partium exteriorum, sudor frigidus, virium omnium prostratio, inquietudo, corporis iactatio, summa anxietas & interna angustia, singultus, vomitus, alvus confusata, tensus, urinae suppressio, spasmi vesicae, febris, pulsus contractus, spirandi difficultas, quandoque delirium & convulsiones epilepticae.

## §. VII.

Ratio formalis est vel spasmus, vel nimia distensio.

Sicut ratio formalis five proxima causa omnis doloris est nimis vehemens tunicarum & partium nervosarum distensio, distractio atque expansio, vel earundem validior & spastica contractio & coarctatio: ita etiam ab istis causis intestinum proficiuntur dolor. Vel enim a flatibus retentis & occlusis, supra modum certi intestinum tractus distenduntur & divelluntur, ut quasi continui solutionem moliantur; vel ab humore mordaci caustico intra intestina vel etiam in eorum substantia membranacea contentis, spasmica contractio crispantur, coarctantur, cum valde molesta & sensibili passione: qua de causa etiam in scholis medicis distinctio inter dolorem intestinorum, sive colicam flatulentam & spasmicam, adhuc viget & locum obtinet.

## §. VIII.

Diffusio colica flatulenta.

In dolore tenuium flatulento, tunc abdomen inflatur & turgit; & tanta saepe flatuum vis est, ut eum ita distendat, ut dolor ipso tactu exacerbetur: neque exempla deficiunt, à vehementia flatuum herniam umbilicalem fuisse subortam. Dolores sunt acuti, alvus valde confusata, summa angustia, sique simul ventriculus inflatur, respiratio valde difficilis evadit, & eruptiones cum levi levamine subsequuntur; accedunt cardiacae passiones & inanes vomendi conatus.

## §. IX.

à colica spastica.

In colica sic dicta spastica & convulsiva, ventris actior fit compressio & umbilici interiorum retractio, alvus est confusissima, ut neque flatus trahuntur, neque clysterem facile recipiat. Adest simul ingens in lumbis dolor, ipsiusque peritoneum musculique abdominis violententer contrahuntur: extremorum adest refrigeratio, tremor, horror, pulsus durus & contractus, summa anxietas & quam facile animi deliquium supervenit.

## §. X.

differtur inter flatulentiam & colicam spasticam.

Nos hoc loco monendum ducimus, insignem esse differentiam inter flatulentiam intestinorum, & dolorem intestinorum flatulentum. Nam hic à sola aetonia, motu & robore intestinorum labefactato, in sensus possimum & qui cibis inflammantibus frigidis omnium utitur, item in corporibus à praegresso morbo labefactis nascitur. Illa vero nunquam sine labe intestinorum est, neque tam facile tollitur, & graviora habet accidentia, cum hic per ructus, per flatus & alvi solutionem facile terminetur.

## §. XI.

inter dolorem nephriticum & colicum.

Illud quoque monendum non est praeterendum, dolorem nephriticum & qui à calculo renali fit, non confundendum esse cum eo cuius causa in ipsa intestinis residet: de qua confusione jam olim à GALENO & ejus affectus imitata fuit

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. 11.

querela. Una vero ratione symptomatum & effectuum multum inter se conveniant; in eo tamen est differentia posita, quod dolor, si est à calculo, in lumbis fixior, peritior & acutior sit quam in colica spastica; in hac alvus longe confusior & fortius occlusa ac in dolore nephritico: dein quod, alvo per enemata soluta, remissio doloris colici fiat, quod non contingit in nephritide calculosa: ad urinam quoque emittendam major in calculo adest stimulus, eoque tenuis, in nephritide aquosa & subinde arenosa apparet. Ex postremo, dolor secundum ureterum tractum successively proceditur: id quod in intestinum non observatur doloribus. Longe vero facilius est in eo semel vel bis dolore ex calculo laborantem, notas ejus characteristicas discernere.

## §. XII.

In theoria vero dolorum intestinalium id maxime attendendum videtur, quod horum causa, à qua oriuntur, longe abiam sedem fixam habeat, quam ubi eorum exacerbatio percipitur. Haec nunquam fit inflatio intestini, nisi in alia parte vel tractu, cujusdam intestini strictura spastica, angustia vel etiam obstructio ab excrementis aut alio humore tenaci praecedat vel conjuncta sit: siquidem flatus in intestinum cauale, propter calorem & humorem aequum semper praesentem, nunquam defuit, sed nullam creat molestiam, quia liberum habent spatium & aequaliter se expandere possunt; simul ac vero obire possunt, non possunt transire, & interceptum, sed in certo loco coarctantur, occluduntur & quasi incarcerantur, tunc magna vi expansiva agunt in intestinum tunica, eas supra modum distendendo & distrahendo.

## §. XIII.

Quandocumque in tenuiori intestini quadam parte, sicut in hernia firmata, vel etiam à vermicibus aut serebibus induratis eventis, spasmus, occlusio vel nimia coarctatio produciatur, vel etiam quando in principio coli in dextero latere excrementorum copia stagnat, nec loco movetur, ingens & acerbè dolentia abdominis inflatio, supra, infra umbilicum & in medio ejus, oritur.

## §. XIV.

Quod si vero intestinum rectum vel inferius coli tractus vehementer patitur spasmum, mire inflatur coli magna flexura in sinistro hypochondrio versus splenem, una cum illo, qui infra ventriculum tractus protrahitur & juxta hepatis posita est. Quando autem, quod frequentius in malo sic dicto hypochondriaco & hysterico occurrit, principium jejuni, vel suis duodeni spastice afficiatur, ob vicinum & supra illud decurrentem ramum superiorum mesentericorum & intercostalem, ingens in lumbis oritur dolor, ipsiusque duodenum & ventriculus flatibus mire implentur, diaphragmatis quoque liber motus impeditur; unde ingens illa praecordiorum anxietas, spirandi angustia, & ructus cum impetu, frequentes & sere sine fine, erumpunt. Non semel ego sed aliquoties observavi in colica spastica inferiorum coli partem finis isalar coartatam & convolutam, tunc vero intestinum ad crassitiam brachii expansum fuisse repletum.

Bb

## §. XV.

## §. XV.

HILDANUM *cent. I. obs. 57.* legi atque conferri possunt.

## §. XX.

Neque puerperæ ab immanibus abdominis in purpura doloribus immunes degunt, præsertim quando lochorum fluxus deficit, & post partum abdomen non decenter ligatur, vel partium ventris accedat refrigeratio.

## §. XXI.

Frequentiſſimum etiam hypochondriacorum symptoma est atrox colicus dolor, isque maxime occupat latera, & vel in dextro hypochondrio infra sub illo illic, ubi principium colli flatus & stercoribus infarctum est, vel sub hepate in flexura, quam colon facit, flatus vel scybalis distensa, maxime omnium vero in sinistro hypochondrio sub diaphragmate & hene, ob maximam coli flexuram, sensus consistit, cum alvi obſtipatione, urinae difficultate, anxietate, angustia, interna inquietudine vizumque deſtione junctus. Nam, quis in sic dicto hypochondriaco morbo valde læsus & viciatus est intestinum peristalticus motus, nec flatus, nec stercora versus inferiora rite moventur & descendunt; hinc in flexura maxime intestinum, ubi diminuta est vis motrix contractilis & elastica, illa morantur, flagrant, & graves ac dolorificas ejusmodi distensiones pariunt.

## §. XXII.

Alia adhuc ratio & natura est eorum dolorum intestina torquentium, qui sunt à materia læta tunicas intestinales hærentes, sero videlicet impuro & acro. Et talis in corporibus scorbuticis ac purpura scorbutica vel scabie infectis, in arthritica quoque & podagrica sæpe numero observatur; quando viscosa materia, deficiente naturæ robore, retinetur, nec ad extremas partes transmittitur, vel etiam ab iisdem, ob varias externas causas, intra corpus per metallum transpiratione. Ad hæc species colicæ spasmi maxime se extrema, ad spasmodico-convulsivam spectat & sæva conjuncta habet symptomata, difficilis etiam est curationis, ac inflammationem minatur, neque facile conquiescit, nisi relegata materia ad extimas partes fuerit.

## §. XXIII.

Neque præterunda erit gravior & idemdem à sanguine spasmodico-convulsiva colica, à nonnullis sanguinea vocari solita, à sanguine nimium intra intestinum, coli præsertim tunicas congesta, stagnante & sensiles nervæ tunicas valde distendente. Et hæc fieri solet in feminis à mensium fluxu suppresso: tunc hysterica vocatur, vel etiam à consuetu hæmorrhoidum fluxu deficiente, vel violentè cohibito aut suppresso: tunc recte dici solet hæmorrhoidalit. Quæ sicut sæpius in praxi occurrit, ita etiam ejus causa medicis à plurimum incognita est. Hæc sæpiſſime homines boni, robusti & sanguinei, habuit euasari, qui laus & liberis, sub meri præsertim potu, degunt, onosam colentes vitam, afficiuntur. Cujus colicæ sanguineæ multa exempla & observationes Doctissimus CAROLUS PISO in egregio tract. de morbis à collicore feræa oriendis vid. Sect. IV. cap. II. posteritati reliquit.

## §. XXIV.

Immanis quoque est illa colicæ spasmodicæ

*Colica feb. ptilium.* Intestinelorum dolores adeo frequentes sunt, ut nulla ætas, nullus sexus, nullus corporis habitus & nullum temperamentum ab his sit immune. Infantem autem quam maxime infantes, feminas, atque etiam senes, & quicumque tenerioris, debilioris & sensibilibus sunt nature.

## §. XVI.

*Causa & generis colicæ feb. ptilium.* Acerba & torminosa hæc intestinalium affectiones diversis generis agnoscunt causas, & pro harum differenti natura, genio & vehementia, variant symptomata, variat etiam de intenditur subinde periculum. Frequentiſſimam vero alvi scybala retenta & indurata, in intestinalis crassia, interdum in tenuioribus hærentia, causam præbent. Atque multum hæc crudissimum acido-viscidum copia, cibi sicci, aridi, adstringentes, diuturnior somnus & vitæ genus minus ac laboris experti contribuant. Et quondocumque sub pigra & obſtructa alvo, cibi dulces, fermentescibiles, carnes pingues præsertim vervecinæ, cum potu frigido, vel refrigerationis pedum atque abdominis accedunt, initio abdominis inwenditur & dolor acerbior fit. Atque in eo colicæ potissimum standentæ, & quæ veteribus à causa frigida producta dicitur, raro & genis versatur: cujus generatio de crebra invalso imbecillitate & arotiam intestinelorum eorumque toni ac roboris deflectionem indicat atque supponit; hinc obesia, phlegmatica, senibus & debilibus admodum familiaris est, præsertim si frigus improvide ad pedes, dorsum & ventrem admittatur.

## §. XVII.

*Bilioſa.* Alia colicæ species est bilioſa, quæ secundum veteres, à causa calida subnaſcitur, atque ab humore bilioſo, acro, corrupto, in intestinalis tenuibus præsertim duodeno copiosius collecto & stagnante ortum suum trahit, a gravi frequentius alvi, præsertim in corporibus calidæ & siccæ constitutionis, sub ætate fervida & ætate juvenili, vel vitæ, aut ab assumtis potibus nimis spirituosus & calidis proficiunt, majorique tormenorum, post frigidum sumum potum vel transpirationem prohibitam, sepe prodia sævienti. Symptomata quæ hæc inſequuntur potissima sunt vox rauca, cardialgia, continuu ciborum fastidium, vomitus materie bilioſæ porraceæ, singultus, interperies æstuosa & febriculosa, inquietudo, sitis intensa, os amaricans, urina pauca & rufa, cui quandoque alvi deſectio bilioſa & crebra succedit.

## §. XVIII.

*Intestinalis inflamm.* Datur quoque valde atrox & torminosus intestinalium dolor in infantibus, à lacte stagnante per miscellam bilis valde corrupto & corrosivo reddito, unde fæces plerumque secedunt virides, paucæ & coagulatae, & ab æroſione tunicarum intestinalium subinde convulsiones epileptice læduntur tragediam ludum.

## §. XIX.

*In puris.* Pueris valde familiaris & frequens est colica, quæ fit à vermibus si convoluti in intestino illo hærent, cui sæpe febri continua & syncope, ventrisque lancinatio ac si verbera perforetur, jungitur. Qualia exempla, apud ZACUT. LUSTANUM *Fræs. admitt. Lib. II. obs. 33.* &

*Hypochondriaco dicitur feb. ptilium.*

*Colica in dextro hypochondrio.*

*Colica in dextro hypochondrio.*

*Colica in dextro hypochondrio.*

species, quæ à fumis lurcinis, ore hauritis & cum siliis dephatnis eorum suum ducit, æque in quæ minas Saturni igne tractant & calcinant, vel plumbum ab argento in docimasibus fumis separant, ut in Hecæia fit, familiarissima est, vulgo dicitur *der Hatten-Ratze*. Dolor est in intestinis inoperabilis, alvus confipantissima, nec chyliferilis neque laxantibus facile cedit, umbilicus fit inoriturus retractio, summa adest inquietudo & ænuum trahio, nausea & assiduus ad vomendum conatus, in parafin vel veram parafin vel affluia spasmoticum quam facile terminant, ac diu & melius saepius ægrotantes torquet. Eisdem generis dolori, figuli qui vasa figulina viro ex plumbo obducunt, vulgo *glaser*, obnoxii sunt. Testantur quoque observationes prædicæ, quod medicamenta quæ Saturnus ingreditur, ut tinctura antiphothica *Garmen* vel magisterium Saturni, quibus medicastri in gonorrhoea suppressenda frequentius uti solent, invincibilem alvi stricturam cum immanibus tormentis spirant relinquant. Quam gravis & periculosa valetudinis damna atque incommoda, à vini acidis lithargyrio immisso dulcificatis, ante aliquot annos in Suevia oborta fuerint, id exquise & docte in Dissertatione, Præfide *Clor. ZELLERO* habita, de *noxa vini lithargyrio mangansif*, id deducunt. Inde enim non modo dolores stomachi, abdominis, sinistri hypochondrii cum foris alvi strictura, item colica convulsiva, sed & affluia convulsivum oborta fuit.

## §. XXV.

Colica endemicia (prophætica).

Restat adhuc alia colicæ species, quæ relictis endemicia vocari potest, quia certis regionibus familiaris admodum est: ita Moravia, Austria, atque Hungaria incolæ atrocissimo colico dolore spasmodico & convulsivo creberrime divexantur. Cujus rei nulla mihi alia suppetit ratio ac causa, quam vinorum in hisce regionibus valde spirituosorum largior potus & abusus, præsertim si corporis accedat refrigeratio; ex quo fit, ut sanguis nimium ebulliens, & in concitiorum motum adactus, si neque per naturalem, neque per artificialem evacuationem invenerit exitum, in insectilia incubat & ibi accumulatus dira symptomata inferat. Cæterum hæc quoque jure referri ad colicam sanguineam & spasmoticam mereat.

## §. XXVI.

Colica ex morbo prophætico.

Dantur etiam atroces colici dolores, qui alios morbos prægressos excipiunt: ita extant passim observationes, & nota mihi quoque sunt exempla, ubi ex diarrhoea ab adstringentibus cito suppressa, item post dysenteriam, ab incauta dietâ, & alimentis insaniis & fermentescibilibus copiose admissis, graves & exitiales ventris dolores successerunt. A cydoniato largiori manu in diarrhoea exhibitio, severissimos ventris dolores atque toriones, ad stercoreis usque vomitiones letales vidit *FERNELIUS lib. VI. Pathol. c. X.* quod identidem a fortioribus purgantibus haud raro observavimus. Neque in qui in ætu exercitio frequentius versantur, obicium esse poterit, post interminentes, tertianam, quartanam, perperam curatas, prava præterea diæta accedente, severissima subinde in abdomine secuta fuisse tormenta: testantur illud *BINNIN-GERO cent. III. obs. 34. cent. IV. obs. 41. u. lib. IV. obs. 8. & 9.* quibus submovendis non tam

*Ed. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

facilis conceditur locus; siquidem in modo memoratis morbis ingentem labem & vitium jam contraxit intestinatorum canalis, ejusque functio, quæ maxima ex parte, à convenienti, ordinata & successiva contractione & dilatatione, sive peristaltica motione dependet, adeo læsa ac labefacta est, ut diu multo facilis vinolotorum humorum colluvies ibi consistere, & causam ejusmodi & aliorum prævorum affectionum possit ministrare.

## §. XXVII.

Porro colica spasmotica, frequens imo assiduam fere aliorum affectionum & dolorum effe-  
*Symptoma. hinc, à calculo puto causari.*  
solet symptoma: sic nihil frequentius contingit, quam quod dolor, ex calculo renum per ureteres descendente & ad vesicam inter faciem, gravis sæpius abdominis crucians, cardialis, nausea & vomitio adjungatur: idque maxime fit ob contentum harum partium, quam nervus intercostalis hinc communis prestat. Qua de causa nonnulli medicorum colicam dolorum cum calculo sæpe confundere, per rite discernere solent: cujus jam supra facta mentio. Observamus quoque in præxi, à dentitione infansum dolorifica, convulsivam colicam cum alvi forti distentione, quam detraum epispasiam sequitur, febrem; idque tantum ob mirum illam nervosorum partium cum aliis consensum.

## §. XXVIII.

A biliario calculo, in cystide fellea detento, & intesti-  
*ejus ductum lincianant, ventris dolorem subor- scilicet.*  
tum, præter alia, dysfunctionem digestivam testantur fecerunt. Ita in colicorum cadaveribus vesicam felleam lapidibus repletam *BALLO- NIUS lib. II. epidem. pag. 253.* item *M. N. C. ann. VL & VII. obs. 220.* fidem faciunt. Ex *HORSTIIUS lib. IV. obs. 47.* colicæ gravissimæ, *CCXXXIII.* calculorum medicorum magnitudinis è folliculo fellea repletionis sedate meminit. Quo loco non possum non peculiarem doloris colici causam insinuare, quam *Clor. NICOL. TULPIUS* discitis verba in *Observ. Lib. II. c. 37.* proddidit, ita habentibus: *Colicus dolor sapienter fit à bile fluxa, invasante hinc intestino, quæ sapienter ab anastomosis cum anastom- vertatur, verisimile est eam transudare paulatim per suaves folliculi fellei, hinc intestino quam alius viciniori. Quæ propter male hinc consulunt illi, qui præ nimio studio valdè comprimunt secer: exprimit quippe prona hæc flexi corporis incurvatio bilis.*

## §. XXIX.

Neque abstrum sed verisimile potius vide-  
*ab obfcuris intestinum exten- nit.*  
tur, ab acri humore tunica intestinalis externe arrodente, dolores in toto intestinorum volumine concitare posse. Quam sententiam clariorem faciunt observationes, quibus per sectionem dysfunction constat, ex abiculis mesenterii rupto, purulentam materiam intestini inhaerentem ante mortem fevros dolores & tormenta produxisse. Quales *WILLISIUS, BENIV- NIUS, & WARTONUS* scripsit suis passim insinuant.

## §. XXX.

Præter dolores autem intestinatorum, qui acutiores sunt indolis & vel in saltem vel in motum brevi terminantur, dantur etiam chronici qui sunt generis, & duritie insilunt, ac per

Bb 2

multas hebdomades imo per anni aliquando spacium excruciat, licet per intervalla sua habeat remissiones & exacerbationes. Horum post mortem demum fuit inventa causa, quae in eo consistit, quod in quadam parte intestinum foris angustatum, contractum, scirrhosum vel callosum fuerit deprehensum: quare in totum motus intestini aequalis destruitur. Ita KERCKRINGIUS *Spicilg. Anatom. Obs.* 50. in puero tormentis intestini qui obicit, cuncta flatu distenta, pylorum vero adeo exiguo foramine pervium vidit, ut flatus vix transiret; duodeni vero aequae recti parietes subsidentes, conglutinati & quasi filo contractos, ut nullus flatus ea perturbare poverit, invenit. Scirrhum colli HOLLERIUS *de morb. intern. Lib. I. cap. 41.* & RHODIUS *cent. II. obs.* 76. describunt. A callo quoque in intestini colicam productum BENIVENIUS conficit: vid. *Lib. V. de abd. cap. 30. & 34.* Intestini vero coarctum post dysenteriam RHODIUS *cent. II. obs.* 77. in 82. annotavit; de qua re BARTHOLINUS *cent. VI. obs.* 38. & *obs.* 2. it. M. N.C. *an.* 1672. confert possunt. Angustati quoque intestini & cartilagine obducti meminit BALLONIUS *epidem. Lib. I. p. 58.* Praeterea de angustia intestini, perdocta dissertatio Clavig. WALTHERI *Lippinsium Prof.* lectu dignissima est. Saepe quoque in sectionibus cadaverum colica spasmodica demorum implicatio ostendi observatur, manifesto documento, vigere etiam in hoc motu quandam spasticum. Ab hepate male affecto abdominis dolores chronicos abortos non raro vidimus, ita ut illud albicans induratum fuerit inventum, & cystis felles calculis repleta. Quandocumque enim liberis sanguinis per hepatis transiit impeditur, a biliosis fordibus non bene depuratur, & impetu quoque ejus ad intestina ruit; ubi ob copiam & nimiam distensionem valvorum tardius progredientes, stagnationes dolorificas in intestini membranis efficit.

## §. XXXI.

Anatomia  
colica de  
functione.

Ceterum, qui subito ex acuto intestini dolore percuti, in iis plerumque intestina inflammata & sphacelosa reperiuntur. Ita SPIGELIUS in *lib. de Semieris*, in dissectis hac febre extinctorum cadaveribus, qui ante immani dolore quasi colico fuerant excruciat, intestina inflammata & erysipelata detexit: & adjicit, his in casibus phlegmoniam omittere & purgationem, ut vulgus solet, substinere nefas esse. Sphacelatum quoque intestinum reclusum, ab haemorrhoidibus coctis male curatis, nos vidimus.

## §. XXXII.

Quando  
dolores  
intestini  
sunt  
salutares.

Salutariter vero saepe numero horum dolorum solvi solet atrocitas, per sudorem copiosum abortum, vel etiam per haemorrhagiam narium, aut haemorrhoidum fluxum supervenientem, item per expulsiorem purpurae ad extimas partes, aut per arthritidem & podagram succedentem, vel malarum scorbuticorum proveniunt. Crebra enim & perquam notata digna hinc inde reperiuntur exempla, ubi ex arthritide repulsa factae fuerunt pernicioses colicae, quae redeunt ubi illae cessant. Sic colicae saepe biliosae diarrhoea superveniente solvantur, quae putrida & nigra materia evacuantur. Spectat hac quoque insignis locus apud HIPPOCRATEM *lib. de hum. §. 11.* cui

*intestinum in dextra parte dolens & articuli morbo correptus, quiescit erat.* Neque parum salutaris promittitur, si dolores locum atque sedem mutaverint.

## §. XXXIII.

Minus salutariter, colicae inprimis spasmodicae & convulsivae, viribus plane dejectis & dissipatis, ac sudore, collapsoque suborto, vel in veram paralytin vel in notham sive parefin, vel in manuum & pedum stuporem terminantur; vel etiam si atrocior dolor urget, epilepsia, convulsiones, vel aliae graves capitis affectiones, ut lethargus, carus, apoplexia finem vitae faciunt. Multum vero periculi alit colica sive convulsiva sive biliosa, quae cum actuali invadit haerere & atrocitas affligit: nam designat inflammationem, quam, si non succurramus, sphacelus excipit.

Quando  
dolores  
intestini  
sunt  
salutares.

Si a flatu  
vel ex  
inflammatione  
causa.

## CURATIO CUM METHODO MEDENDI.

## §. I.

Sicut ex antecedentibus plenius perspicere ac animadvertere licet, causas plenas hunc affectum excitantes mirum variare: ita nunc eandem colligi poterit, medendi methodum, pro differentia causarum, quae intestinum dolores sistent, longe aliam atque aliam esse influendam.

Medendi  
methodus  
pro  
differentia  
causarum  
varia.

Si a flatu  
vel ex  
inflammatione  
causa.

## §. II.

Quando itaque consuetus haemorrhoidum vel mensium fluxu suppressio, in corporibus praeterit sanguine abundantibus, immanis abdomen infestat dolor, cum gravi aestu ac pulsa citioris junctus, venae scitio in pede inflata, clystina emollientia, pulveres antispasmodici leniter nitrosi & cinnabariis momento calidiori remixti, nec non liquor noster anodyni mineralis, ad nimiam effensa calidiori & spiritui salis ammoniaci vinosi, neque minus pediluvia, dolorum sevitiam mirifice mitigando, omne curationis in ipso paroxysmo absolvent punctum. Extra vero illud tempus, & praeservationis gratia laborandum est, ut mensium in foemina & haemorrhoidum in viris solentia resiliantur fluxui; quo maxime omnium facium conveniens acidularum, thermarum, balnearumque vernali compressis tempore fulcipes usus, praeter hunc, pediluvia, motus & exercitatio corporis debito modo instituta, dieta commoda, pilulae balsamicae, atque infusa theiformia ex herbis parvi carminativi, parum uterinis composita erant adhibenda.

Quid  
agendum,  
si a fluxu  
sanguinis  
causa  
suppressionis  
fluxus.

In colica  
sunt  
causae  
variae.

## §. III.

Quando dolor intestini cum copia bilis effertur & causae suae mutatur causam & originem, eadem prope procedente §. memorata remedia proficiunt. Palmam vero inter alia, pulvis nitrosus, una vel altera gutta olei melleosoli veri distillari commixtus, ex aquae florum chamomillae vulgaris uncis III. vel IV. propinquant, quae gravior adhuc & virtute praestantior redditur, adjectione syrapi papaveris albi & spiritus niri dulcis rite praeparati, hunc sibi vindicat: sicut autem hac aqua, in omni abdominis dolore vehiculum remedium praebet convenientissimum; ita multo felicitas operationem suam exerit, si ejus distillatio cum cerevisia triplex infundatur. Praeterea quoque in hac colicae specie medicamenta in vehiculo subfrigido quam calido exhibere, & abstinere a decoctis & infusis calidioribus pariter a regi-

Si a bile  
causa  
est.



regimine sudorifero & balneis calidis: eo quod hac ratione biliosus ferocior tedditur humor, & partes nervosae intimius penetrat. Hinc oblationibus praedictis edocentur, hujusmodi in casu, solum aquae frigidae potum, quo ipse GALENUS in colica biliosa usus est, optime profuisse atque malam depulisse. Majorem autem hoc monum attentionem meretur, si ex ira fuscitatus fuerit torminosa affectio.

## §. IV.

Si fixus & tensus in dextro vel sinistro hypochondrio vel infra ventriculum haerit dolor, certum indicium est, flatu vel excrementa coli flexuras incarcerata hanc scenam ludere. Tunc praecipuum curationis in eo positum est momentum, ut coemata emolliendi, discutendi & corroborandi virtute praedicta incipiantur; non omisissis externis linimentis carminativis & emollientibus, pari dolenti applicandis. Aperta sit alvo, flatusque difficultas atque propulsio, pilulae nostrae balsamicae ad Becheri exemplar composita, interpositio sale digestivo, vel decocto mannato, cremore vel terra sulfata tartari, & uno vel altero cochlcare oleo amygdalarum dulcium permixto, porrigi debent.

## §. V.

Ubi rectum & intestini coli portio, in sinistro praeteritum latere, fortiori spastica strictione afficitur, ita ut alvus nec flatu nec excrementis exitum concedat, neque chylus commotio ano immitti queat; tunc totum abdomen oleis calidis & pinguibus fovendum est; v. g. oleo chamomillae, anethi, ruae, coeli, pinguedine taxi, canis, vulpis, castorei, humanae, quae etiam per chyliferam ad spasticam illam strictionem relaxandam ano infundi possunt: quo facto, insitum mannam, quod supra memoravimus, citis ostendendum.

## §. VI.

Colica flatulenta ex atonia & imbecillitate ventriculi & intestinorum, à cibis crudis male digestis & inflammibus, enata, carminativa & paulo calidiora admittit, quorum censum subeunt aquae carminativae spirituosae, ex semine cymini & carvi, corticibus aurantiorum, floribus chamomillae vulgaris & Romanae ac cardamomo cum vino destillate, essentia carminativa B. H. edulsi, essentia corticum aurantium probe saturata, spiritu salis ammoniaci exhalata, liqore anodyni minerialis cum balsamo nostro liquido, quod vitæ audit, permixtus, vel sequens liquor carminativus: Recipe spiritus nieri dulcis vel liquoris nostri anodynus mineralis, essentiae corticum aurantium, tincturae tartari ana drachmas tres, spiritus salis ammoniaci drachmam, olei carvi destillati, cymini, de cedro, chamomillae vulgaris destillati, singulorum guttas VI. M. D. Desin constitutum gutta XXX. ad L. Haustus insuper vini sic dicti Hippocrati ex speciebus aromaticis, v. g. corticibus aurantium, citri, macere, caryophyllis, cardamomo & saccharo parati, sensibus praefatum & ubi ex refrigeratione abdominis & externarum partium malum traxit originem, insigne & praesentaneum soler levamen praebere. Perinde quoque est, abdominis regionem tegulis & marmonibus calidis, item fuculis avenae, sale communi, tollis, semine carvi, melli, bacis lauri atque juniperi repletis, subinde fovere.

-Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

## §. VII.

Dolores abdominis, ubi à retropulla materia exanthematica vel excretionis critica, scabie, purpura, podagra, arthride, rheumatismo, erysipelate proficiuntur, nihil aliud agere prudens & rebus suis satagens medicus debet, quam ut leniter diaphoresin promovere studeat; id quod ego nonnunquam, essentia scordii probe saturata cum spiritu florum sambuci non intense rectificato extracta, liquori anodyno nostro ad dimidiam partem admixta, si ad guttas XXX. vel XL. in infuso calido bis de die propinam, felicissime perfici: circa lecti vero introitum pulverem meum bezoardicum, paulillo nieri & cinabaris mixtum, adjecta facci citri recentis portione in idoneo vehiculo obrui; non praetermissis emollientibus & demulcentibus chyliferibus, atque corporis in blanda diaphoresi constitutione.

## §. VIII.

Quando ex vernibus intestinorum dolor in junioribus oboritur, ad dolorem sopientium primo decoctum ex emollientibus & paregoricis, floribus videlicet sambuci, chamomillae vulgaris, meliloti, verbasci, semine foeni graeci, anethi, anisi, croci, & lactis paratum, vel vitæ fuisse inclusum, vel linteis exceptum abdomini applicari potest. Dein chylifer ex istis speciebus in usum frequentiore ducendi sunt, quae etiam ex lacte recentem multo parandi. Interne vero tinctura thabarbari & tanacetii, quae herba vere specificum est anticholericum, alvus sollicitanda, & quandoque aquae cum mercurio vivo coctae usus est interpolandus. Non raro contingit, ut hac ratione vermium glomera, quae intestina obflescant & angustiant, ejiciantur, sedatis & placatis mox omnibus symptomatibus & gravissimis abdominis tormentis.

## §. IX.

Neque praeterendum est acerrimus ille & prope intolerabilis dolor, qui intestini recti tunicae nervae exquisitissimae sensationis subinde insidet & universi fere corporis partes in consensum trahit, à sanguine haemorrhoidali minima vascula obfidente ortum ducens, coarctum haemorrhoidum nomine notus: in eum peculiare curationis genus exposulatur. Veniam tunc ego non io pede, sed in brachio secari praecipio, ad meliorem sanguinis à partibus inferioribus ad superiores derivationem. Exteriores vero duo remedia expertissimae virtutis deprehendi, quorum alterum est linimentum, quod ex drachmis tribus spermatidis ceti, olei hyocyami drachma, camphorae granis VI. & croci granis X. constat, quo calide iungi tumores debent; alterum est episthema, quod ex aqua calcis vitae, cum aqua rosarum & florum sambuci temperata, sanum saccharo & spiritu vini camphoroso compositum, linteis repale applicandum.

## §. X.

In immensi illa colica sic dicta saturnina vere convulsivo-spasmodica, quae metallurgos afflicti & immaniter excruciat solet, non invenitur praesentius praeservativum, quam mane sumum jusculum pingue: in ipsa vero cura chyliferis mere oleosis in oleum amygdalarum dulcium in copia haustum, cum vel sine decocto mannato, omne exaurium praefectum. Ad praefin

Bb 3 vero

vero sanandam balnea aquae dulcis, & post eorum usum, unctio spinæ dorsæ & abdominis cum linimento, quod habet æruginem humanam, oleum nuciferae expressum, hyoscyami, crocum & oleum rosinarianum, vix datur præsentius & ceteris auxiliis.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ

### § I.

*De calice  
spinali  
progressu  
vitanda.*

In spasmodico & convulsivo intestinorum & abdominis dolore, ubi alvus firmissime est clausa, cane penis & angue acris purgantia, & ex istodem quoque parata chymata sunt vitanda. Novimus, hac ratione inflammationem & mortem fuisse productam.

### § II.

*Chylus  
plus uno  
die inji-  
ciendi.*

Ad alvum longo temporis intervallo clausam, si excremencia & scybalis indurata refera sunt intestina, referendam, non sufficit una chylus injectio, sed duos vel tres intra horæ sapientis spatium injicere oportet.

### § III.

*Nullo dolo  
scybala ab-  
silio sine  
consequenti.*

Aliquando accidit, ut induratum & compactum excrementum intestinum rectum occupans, statum ac scybalorum exitum penis impediatur. Tunc foribus emollientibus fovenda anus, & suppositoribus pinguibus & salinis stimulanda alvus, nec non unctæ aliquot olei lini vel raparum cum decocto emolliente, in quo prius sufficiens saponis Veneti portio soluta, ut durities scybalorum emolliatur, per syphonem immitte-nda.

### § IV.

*Penis ca-  
vus quid  
profigit.*

Solus tabaci fumus per accommodatam syringam immassus, ad aperiendam alvum, omnia fere alia remedia genera, testantibus id observationibus, suo effectu superare creduntur, unat ego certa de singulari ejus efficacia promittere nequeam. Id vero scio, quod experimentum hoc in equis ad alvum valide adstrictam aperiendam maximi sit virtutis. Novi etiam homines quosdam plebeios atroci intestinorum dolore vexatos, summi tabacini sola deglutitione, ab omnibus cruciatibus in instanti fuisse liberatos.

### § V.

*Alvus clau-  
sa, carmin-  
ativa ne-  
cessaria.*

In omni graviori intestinorum dolore, antequam alvus fuerit soluta, calidiora carminativa & sudorifera, balnea quoque nocentissima sunt. Nam, dum materiam biliosam vel corrosivam invehunt sanguini nec ad partes exteriores precipitant, anæsthesia augentur, & paralytes, contracturae, febres hecticae imo convulsiones epilepticae haud raro inducuntur.

### § VI.

*Optima in  
senibus  
causant.*

In senibus & imbecillis corporibus, si instans alvus dolore abdominis operta magis adhuc narcotica penis exulent, item quando acerbiores dolores diutius perseverantes vires admodum fregerunt. Quod etiam tenendum erit, si ex summa debilitate, nimis fuscioribus corpora perfunduntur: paralyfin enim tam veram quam spuriam inde fuscitatem fuisse, vel etiam iphacelum intermarum pariam inde productum fuisse meminimus.

### § VII.

Nihilominus in hypochondriaci & hysterici passionibus detentis, vel ubi simul affligit serena nulla, cum gravibus abdominis doloribus & erosionibus, pilulae balsamicae nostrae, vel alophaginae extracto punchymago *Crollii* acuatæ, uno vel altero grano laudari opati rite parati vel theriacæ coctileis adiecto, interpositis pulveribus nitroso-salinis & absorbentibus, insignis dolorum & spasmodorum levamenentum afferunt. Ita pilulas purgantes cum refracta dosi laudari opati mixtas, multi celebres medici, nominatim RIVIERIUS, POTERIUS, CRANIUS, HOLTERIUS & FORESTUS mirifice in abdominis doloribus deprecantur. Neque deficiat ratio utpote remanente dolore & spasmus, purgantis operatio longe promior & felicitior sacum alvinarum dejectio sequitur.

### § VIII.

Si atrox intestinorum dolor, certo temporis spatio recurrit; quod pluries mensibus Martio & Octobri contingit, statim & severissime maxime Borea vento, probabile est ejus causam sanguinem intra intestinorum tunicas congestum esse, quia sub tali tempestate ob regurgitantem sanguinem, ejus in sedis venis fit accumulatio. Qua de causa venæ sectio in pede, ad hæmorrhoidium fluxum, si natura ejus fuerit affluens, promovendum, præservantibus gratia, commodissime insinuat. Sin vero quis criticæ hujus sanguinis excretionis fuerit expertus, consultus ego semper deprehendi, brachii venam secare, quo sanguis à partibus inferioribus derivetur ad superiores, cum, si non invenit exitum per hæmorrhoides, major, per crebras sectiones in pede administratas, ad partes inferiores fiat impetus atque affluxus.

### § IX.

Hypochondriaci & hæmorrhoidarii flantibus ac ventriculi & intestinorum doloribus perpetuo se exercentur. Si itaque malum inveteratum neque domesticis, neque à pharmacis petitis obtemperare vult remediis; ego sine nec presentius nec efficacius, nisi in thesmarum *Carlsruarum*, vel aquarum mineralium temperatarum ut *Sclerianarum*, imo *Embsensium*, conveniens interno & *Teplienfium* externo per balnea usi, unquam deprehendi auxilium; præmissis, si decore & sui frequentis motu & exercitio corporis secundetur, diutius quoque seclatæ habeantur ratio.

### § X.

Puerperis intestinorum & lumborum dolores sunt familiarissimi, præsertim si lochia non debito modo, quantitate ac tempore procedunt, ex quibus postea doloribus febres exanthematicæ, quibus si ingravescunt puerperam tollere condecunt, oriuntur. Quas de re circumspicienda coarctatam advertere debet medicus, un convenienti methodo horum dolorum servitiam componat; quod optime fit, sanguinis lochialis promotione, quod si medicamentis motem gerere recuset, venæ sectio in pede tunissime celebratur, postquam statim fere numero prodeunt lochia, & dolores penitus sopiuntur: quod crebra me docuit experientia.

## METHODUS PRÆSERVATORIA.

Qui intestinorum & imi venteris doloribus frequenter recurrentibus infestantur; quod ego haud raro, in arthriticis, nephriticis, item hypochondriacis & hæmorrhoidariis animadverti; his ante omnia exquiesca diæta & accurato vice regimeis superveniendum est. Id quod in eo maxima ex parte consistit, ut primum sedulè & omni studio, quascunque occasiones ad nocentissimas animi perturbaciones, ut terrorem, iram & tristitiam, fugiant; nihil enim tepetur, quod generi nervoso adeo infensum, & morbos in eo deficientes tam confestim refutare magis idoneum est, quam vehementior animi commotio. Dein frigus Boreale, cujus ea est natura ac conditio, ut nervosi generis morbos revocandi & exacerbandi maximam vim habeat, omni modo vitetur, & regio lumbaris, præcordialis & pedes quoque ab eo diligenter defendantur. Tum præcipiendum est, ne legumina & inter hæc maxime pisæ, fabæ, brassica, caro pinguis vervecina, & frigidus præcipue hinc superingressus ponas, admittantur. Denique, ut corpus non diu otiosum maneat, sed frequentius exerceatur. Optime enim TRALLIANUS & etiam rectissime libr. X. in hæc morbis motus commendat remedium, ita perhibens: *motus quicunque, & omnis exercitatio insigniter in conferens, qui diutius tali morbo laborantes & frequentius eo corripuntur, si pedibus, si per equum, si etiam navigio movere corpus velint, item pedestris & totius corporis perfractio, locique mutatio & longa peregrinatio. Hac enim omnia extremam distentionem & totum corpus extremam libertatem reddunt, universum habitum corroborant, ut in postremo afflicta partes frigidum humorem colligere nequeant, imò ne diutius influentem promitte in se recipiant.* Postremo parciorem potum spirituosorum & præteritæ aquæ vitæ stomachalis carminativæ omnibus suadco, utpote qui plus noxæ & incommodi quam fructus, à copiosiori harum rerum ulu refutasse, crebro observavi: vulgaris quippe & damnaendus error est, ad meliorem ciborum dissolutionem & digestionem potus huius conferre; quum tamen hæc ipsa à lactice salivali potissimum dependeat, neque ciborum solutionem ullo modo spirituosiora prorsus attingat; sed potius & contrario, partes chylofas in intestinis præcipitando, incrassando, & poros obtundendo, materiam ad ructus & flatus subministrant.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Forma nobilioris conditionis erat; quæ quinqueaginta & ultra jam annos antea, flatuæ mediocri sanguine & succis plena. Per duos jam annos menstrualis fiebat purgatio; ceterum sana & vegeta. Vehemens afflicta ita, & elapsis aliquot horis, ob infortunium quod ipsi nuntiavit, summo & panico terrore atque tremore animæ & corporis percellitur. Nox erat inquietæ. Sequenti consensu die regionem lumbarem & ingens frigoris sensus & dolor tenuis tam acerbis corripit, ut in erecta statura corpus ægerime retinere poverit. Brevis post, horrorem & refrigerationem præsertim parum

externarum percipit; quam veneris dolores & tormina infolgebamus, cum ingenti præcordiorum anxietate. Persuasio fuit, spinam dorsii passim esse subluxationem. Unde spinæ facta fuit distractio; sed dolores magis ingravescebant. Die tertio, postquam noctem inquietam transigerat, cardiacæ accedebant anxietates cum summa spirandi angustia junctæ, inanisque urgebant ad vomendum conatus. Pullia erat celer & durus, pedes frigidi, alvus obdura, & ad urinam stimulus, sed ejus parcius fluxus, & dolor lumbicæ in dorso. In consilium ego vocatus quævisi, quia mater ejus per plures annos obnoxia erat renum calculo, an nunquam laboraverit hoc afflicto? Negavit id ipsum. Porro interrogavi, an sanguinis missionem neglexisset? Respondit annum esse elapsum. Aperuit mihi causam morbi supra taxam. Consilium antea omnia visum fuit, alvum injectis clysteribus solvere, qui parum tamen utilitatis amulerant. Postea venam pedis secari jussi. Eduximus sanguinem cum virum constantem & euphoris ad IX. uncias: atque ingens mox dolorum & symptomatum, cardiacæ præsertim & vomitionis sequebatur mitigatio; sed dolor circa hypochondrium dextrum lumbicæ regionis cum abdominis inflatione permansit, neque alvus flatuum vel steroris quicquam transiit. Clysteribus carminativis & emollientibus, ac fomentis ejusdem indolis abdominali applicatis insistere placuit. Interne vero nihil aliud dedimus, quam oleum amygdalarum dulcium in juleculo avenaceo ex quo flores chamomillæ vulgaris decocti, item pulverem marchionis & bezoardicum, adjecto nitro, cinabari & gutta olei chamomillæ veri, it. hiqueem anodynum nostrum, cui essentia calidiori quarta parti admiscebatur; potum paulo frigidorem melius tulit quam calidum. Alvus parum clysteribus: sed permanserunt dicta symptomata. Memorabile fuit, quod altera nocte abdomen minime fuerit inflatum cum tenui dolore, adeo ut tactum manus ferre nequivit. Alio tempore summa fuit umbilici retractio cum spasmodica ventris stridura. Urinæ difficultas permansit: dolor vero in dorso & hypochondrio dextero, ubi prima lumbicæ vertebra est, incipiebat. Hæc symptomata & meum & cognatorum animum tenuerunt dubium atque suspensum, num morbus ex calculo renali proveniret, an colica convulsiva hysterica sit? quæ tamen nunquam fuit correpta. Die quæ erat ab invasione septima, mixturam præscripti sequentem in modum. Rec. cinchuræ antimonii actis, liquoris anodyni mineralis, utriusque unciam dimidiam, spiritus tartari drachmas duas, essentia anodyne gr. XII. M. Singulis tribus horis sumit trigena guttas cum aqua florum chamomillæ vulgaris, florum sambuci & cerasorum rugroem. Ex inde obortus ingens per totum corpus sudor, duravit per totam noctem, ut lintea madefacta nimis mutare conveniens visum fuerit; ægra ceterum insignissimum levamen percipiente. Pullis à naturali vix delectare corpore. Appetitus rediit & somnus; non tamen cedeat dolor in dorso. Urina secedebat naturalis coloris, sed sine ulla arena vel crasso sedimento. Pilule datæ polychrestæ, interpositio sale digestivo: & alvus etiam respondit; ubi multa fecunda & putrida egesta fuerunt. Ex ista sensim collectis visibus, adfuisse Divina benedictione, ægra cum atroci hoc morbo rediit in gratiam.

*Epirrhoe*.

Hic affectus rectissime colicæ convulsivæ nomen meretur, quæ à bile per iram copiosius in intestinum duodenum, cuius finis ad dorsum reflectitur, quod primam causam ipsius morbi fuissebat, effusa oritur duxit. Unde cardiagice anxietas, vomitiones & angustia sequuntur. Quia vero à vehementia terroris, mox iram subsequens, sanguis ab exterioribus ad interiora maxime ad meieserium ipsaque intestina fuit repressus & compellus, flammata illa & spasmodica intestinorum affectio est secuta. Fixus ille in dorso dolor, nostra sententia, ramo menseserico nervi intercostalis majoris, qui ut nosum est anatomicis est, una cum ramo menseserico arterioso ipsum duodenum supergreditur, ab hujus inflatione & copia sanguinis, distento & compresso debetur. Neque vero hic gravior dolor & spasmus tantum, in intestinorum volumine sedem habuit, sed & peritonæo, ipsius abdominis musculos & lineam albam, ab plexum mensesericum & intercostales nervos paribus hic communes, in consensum traxit: à qua causa retractionem umbilici & abdominis ducendam esse arbitror. Sanguinis missionem in tali statu perithecico, vel tunc est spasmodum juncta atrocita, ad arcedam inflammationem, quæ, nisi sanguine vel sponte vel arte evacuat, promove sciquar, periculum imo necessarium judicavi: suadente id ipsum HIPPOCRATE in eoæ. *Scet. III.* ubi inquit, *dolores in lumbis sanguinis fluxum indicant, & spina doli ferientem ad spirandi difficultatem sanguinis fluxu sequeb.* Præter illa & hoc videtur notari dignum, quod hic dolor typam febrem tertianam, horrore & tunc accipiet, & sudore septimo die sublatu fuisse, ut adeo recte dolor intestinorum spasmodicus acutè indolis nunciandi esset.

### OBSERVATIO II.

Colica spaf.  
moderata  
chronica,  
hæmorrh.  
profusa.  
Cavalieri  
& Tord.  
1874-5.

Triennium est, & quod excurrit, cum vir honestæ conditionis, mediocri flaturæ & stridoris corpora habuit, vitæque sedentariæ & lubricationibus addictissimus, doloribus in dorso & abdomine cum inappetentia & virium collapsu torqueretur. Quorum causam medicus in molimina hæmorrhoidalia reiciens, ad hunc fluxum movendum varia præscribebat remedia; sed nihil sanguinis, multum autem tenacis & albidæ materię, per alvum, ætheris vicibus fecedebat. Inter cum susceperit Berolinum, exquisitos & pungitivos in dextro hypochondrio sub inguine, alvo simul valde adstricta, patiebatur dolores; quo protuberans tandem tumor excipit, qui procedente tempore ex inguine in ipsum scrotum defendebat, multum ægro molestimur faciens. Consultavit celeberr in eadem urbe medicum, qui pilulas suis & aliis adhibitis medicamentibus, id quidem effecit, ut semel sanguis per anum cum ægri quodam levamine eumpereret. At vero fluxus hic, quam per anum restitisset, nullo medicamento revocari potuit: sed dolores turculenti, quævis per venam pili sanguis eductus fuerit, repugnabat, & immaniter abdomen cruciabant; ingravescentes quando è lecto surgebat & leniter obambulant, vel auræ frigidiore se exposebat. Acutus in regione umbilici constitit dolor, & permolesta, quasi ingentis globi ibi hæretici & prementis sensatio, quæ tam gravi-

ter læpe torquebat, ut æger corpus in erecto sita  
vix fervare, sed incurvare debuerit, lamenta-  
bilis sæpius voce doloris exprimens sæviam :  
nam tum prolapsum intestinum cum dolore lan-  
cinatorio de ardente valde difflendebatur, aque  
in hypochondriis, dorso & femoribus tum do-  
lorifice rosiones & stricture urgebant, ut rigidum  
& contractum corpus æger plane à loco dimo-  
gere non poterit. Alvus firmiter erat occlusa,  
ut nec flatibus exitum concederet, nec cyste-  
rem introrotiret. Accessio doloris, ab hora  
octava matutina fuit, quæ ad meridiem duravit,  
vominaque deflavit, atque ingenti virium languore,  
et abdominali ad tactum incremente dolore,  
nausea, ciborum inappetentia, sudore nocturno,  
tussi sicca, præcordiorum anxietate, marcere,  
urina suppressione comitatus ægerum mire  
miserat. Misit ad me huiusmodi morbi. Susci-  
pi ad levandum malum, pulveris insipidissimi  
usum, qui ex lapidibus cancrorum, turo, cin-  
nabari & castoreo erat compositus, item liquo-  
rem anodynum cum refracta dosi scianis bezo-  
ardici. Balsi remissum, nec non chior viscera-  
lem inter cibos assendum : balneum etiam aquæ  
dulcis & hirsutum ad anum applicationem, at-  
que ut, loco citatim, aquam Selæranam cum  
passillo vini vel pterisanis biberet, & alvum cly-  
stare oleo & emolliente apertam servaret, ordi-  
navi. Proximo autem vere, meo ex consilio,  
thlasia Carolinas adit, & absoluta cum in cura  
balneo Terebinthi, opio & sperato cum  
succello ex levamine, usum est.

**Epilepsy**

Dolores intestinorum spasmodici & flatulenti, si chronici sunt, plerumque originem suam fangui-  
nem intra tunica intestinales namque congestum  
& flagrantem, ob impedimento per mesenterium  
& hepatis circulum, sub vita ad otium & qui-  
etem composita, debent. Neque hic corpus facile  
defructum, nisi natura sponte sanguinem per fed-  
vas emittat, si videlicet naturalis quardam ad  
hunc fluxum addit dispositio; qua deficiente nil  
periculosius est, ac sanguinem commotoremibus,  
aleocis praefertim, & pilulis balsamicis, cuf-  
cumque etiam fuerint generis vel Aulioris, ad  
hunc fluxum naturam coegere velle. Tannum  
enim abest, ut symptomata inde remittant, quin  
potius a commoto & ebulliente inter tunicas  
nervae stagnante sanguine, spasmi & dolores  
exacerbentur, cum tanta saepius vehementia, ut  
etiam nervus mesentericus magnus intercostalis  
& omnes partes ad quas ille ramos suos disper-  
git, peritoneum quoque & musculi abdominis  
cum intestinis in contumeliam rapiantur: atqui ex-  
inde herniam inguinalem & postea scrotalem  
fuisse subsecutam aliquoties notavi; quemadmo-  
dum finalem effectum a validissime operantibus  
drafticis & emeticis enatum vidi. Tunc vero  
semper deoritur fit agrotantium ejusmodi con-  
ditio: nam ubi labem notabilem vel vitium  
quoddam intestinum vel tantum pars ejus con-  
traxit, sicut in herniis contingit, colica non mo-  
do affectus, fed hypochondriaci quoque gravissi-  
mi luere perpetuum fere est; excrementa quip-  
pe in ejusmodi tumore intestinale quam facile con-  
geruntur & fistuntur, atque ita totum morus pe-  
nitentia adeo necessariam negocium perturbat.  
Per remedia diaetetica & accuratum vitae  
regimen, moderationem animi affectuum, san-  
guinis decentem per venas evacuationem, aqua-

Quinta-feira  
sexta-feira  
domingo, 11  
segunda, 12  
terça-feira  
quarta-feira

rum mineralium quae temperie gaudent tam externum quam internum ulum, melius & citius, quam per multa medicamina nervina, calefactio & purgatio ad desideratam sanitatem agrotantes perveniunt: sicut ego quoque in ejusmodi morbis abstinentiam ab omni cerevisia, & potum quo purior & simplicior eo praestantior commendando.

## OBSERVATIO III.

*Colica biliosa in  
compensa ex  
frigore, spi-  
rituosa  
&c. curata.*

Quadragesima abhinc circiter annis, cum officio Physici Mindae fungerer, vir honoratior annorum XL. cholericus & in iram valde proclivis naturae, ingenii vero acuti & vividus, cibos insuavissimos & saltos in delitium habebat, & libenter quoque vino & spiritu vini utebatur. Hyeme, sub aera valde algida, ex itinere domum reversus, de dolore lumbi, acerbis ventris torminibus, alvo dura & contracta, quae trium clysterum injectione elusa, conquerebatur. Aderat calor praeternaturalis, fumma sitis & vigilia. Admissa clysteribus primo emollientibus, deinde carminativis, in tum summo decocto mannato cum oleo amygdalarum dulcium, & mixtura ex aqua menthae, spiritu niri dulcis, syrupo papaveris albi & pulvere praecipitante nitrolo propinata, malum fuit depulsum. At vero elapso vix duarum hebdomadarum spatio in eundem morbum agrotans incidit, qui profligatus, etiam tertia vice repetit, tam vehementi gradu, ut ego & medici adhaerens summum timeremus vix discrimen. Nam atrocior dolor afflicto affluebat, cum intento calore, siti inexhausta, animi defectione, ingestorum & medicamentorum per superiora rejectione, praeter aquae simplicis frigidae potum cui quippiam calidi panis injectum, quem retinebat: alvus nulla clysteribus vini poterat: illicum morbum aere oculis conspicebamus; neque ab ullo medicamento tam externo quam interno quicquam levaminis recipiebatur. Aeger vero, quia per quinque continuos dies, assiduam vigiliam & jactationem corporis desinebat, in extremum virum lapsum coniectus erat. Ignem, ad finem conciliandum, sequens excoquivi episthema, Rec. florum rosarum, sambuci, lavendulae ana pugillos tres, seminis papaveris albi, hyoscyami, anisoli, nuciferae, nucleorum Perficorum, singulorum drachmam unam semis, croci drachmam; quae species concitae & confusae, postquam in lacte ebullierant, applicatae toti capiti fuerunt. Hujus tam felix erat operatio, ut per totam noctem placide miser agrotans dormiverit: à quo tempore omnia praetera symptomata, conatus vomendi, dolor vehementis, inquietudo & anxietas conquieverunt, alvus quoque admodum supposito respondit. Datis postea convenientibus & temperatis stomachum & intestina roborantibus integre restitutus fuit. Ad praecavendum vero tam atrocis morbi vim & recursionem, consilium dedit, ut, quia non afflicta erat ventris sectio, eam bis vel ter quovis annis admitteret; deinde ut durissem victum & largiorem vini, adhuc magis vero, spiritus vini potum evitaret. Mixtura quam ad stomachum roborandum praescripsi, ex effluviae carminativae *Wiedlii* uncia dimidia, effluviae calcitratae drachma & dimidia, spiritus oleosi *Sylvii*, guris LX. constabat; quam, ante & post cibum sumtum, per annum usurpavit. Pro potu aquam simplicem commendavi, cui panis calidus recemer ex fumo extractus inficiebatur. Ita a recursu hujus mali plenarie fuit vindicatus.

## Epirisus.

Ex hac morbi histria & curatione paulo perspicillius considerata, evidenter apparet, primo, sub omni graviore dolore in parte quadam nervosa fuscitatu, universum nervorum systema in consensum rapi & aetia in variis partibus induci posse pathemata. Deinde quod ingens illa capitis membranarum cum ventriculo & intestinis consensio, ex ea evincitur; cum capiti cum parti a dolore valde remoto exterius tantum applicatum sedativum remedium, in diffusis partibus graviter affectis, vim suam & efficaciam exsternit. Sicut vero omnes affectus nervosi generis, ita etiam intestinarum & ventriculi dolores, facile ex neglecto vitae regimine, inque primis per affectus animi immoderatos, per frigida & ventum Borealem exterioribus improvide admissum, nec non cibum & potum minus convenientem, recidunt: ad quod facillime, in cholericis & ad iram proclivis temperamenti corporibus evenit; quibus aquae frigidae potus vix multo est convenientior: docente id ipsum *GALENO Lib. X. method. cap. VII.* De cujus etiam salutari usu *AMAT. LUSITANUS* testatur, se atrocem intestinatorum dolorem, aquae frigidae exhibitione, subito & incantamenti instar fuisse.

## OBSERVATIO IV.

Anno circiter supra millefimum sexcentissimum, octogesimo quinto, cum Halberstadii Provincialis medici nomine dicerem, ad mortuarium Hammenkientse, cui medicus alius ordinarius praerat, ob plures religiosus ita graver laborantes, sui vocatus. Offendi ibi numero plures qui per longum tempus atrocibus ventris torminibus cum alvo pigerrima & contracta conflictabantur, de frigore quod sustinere, horas primo mane in templo frequentando, debebant, contraxerant: quidam ex his hieniam inguinalem & scrotalem sibi contraxerant: alii qui liberati erant, paralyti & stupore manuum affecti. Erant homines repleti, eufasci, sanguinea complexionis, qui ventris sectionem in auro vix semel adminebant, laetique viennes in auro non parum indulgebant. A dictis vero malis liberi permanserunt, qui tenuiori victu & cerevisia simpliciori se sustentabant. Ignem cum ex nimia sanguinis abundantia ejusque stagnatione inter intestina morbum prognatum judicaret, consilium dedi, ut impossitum sanguinis missionem frequentius celebrarent, & priusquam cum vini portione remissam biberent: datis medicamentis magis refrigerantibus & leniter carminativis, spiritu niri dulcis praeterem, & ipso niro cum lapidibus cancerum & croco permixto, quom valde calida, quibus amena erant usi. Suaves quoque sui, ut vere approximatae acidulae Pyramontanae vel Egranae regimine cum convenienti liberent. Ad paralyti vero tollendum, post balneum aquae dulcis, linimento ex aqua Anhaltina, spiritu & sale volatili humbericorum terrestrium, oleo nucis expressu, camphora & castoreo parato, partes affectas ut probe inungrent fuisse & eduxi. Neque exiguum inde levamen consecutus sum.

## Epirisus.

Sicut colica vulgo & in schola medicis in bilio-

*Colica san-  
guinea ex  
dietsa aqua  
& vino  
&c. curata.*

biliosum & pinuosum distingui solet: ita etiam sanguinem, in plethorica praesertim, ab eis rebus, quae sanguinem nimium in vasis accumulant, excitari posse experientia nos crebrior docet. Nam ex mensium, in foeminis, in viris, haemorrhoidum suppresso fluxu, acerbos abdominis dolores gravibus symptomatibus stipatos oboriri, nostro tempore non novum est; licet veteribus haec morbi species videatur incognita. Equidem apud HIPPOCRATEM *Lih. III. de morbis haematia* illi nomen occurrit: sed si penficulae, quem describit morbum consideramus, longe alius est quam illicus, cujus signa in eodem loco proponit: adeo ut nihil fere cum hoc habeat commune. Nam ilea, quo nomine omnes dolores ventris complectitur, vera historia *Lih. III. §. 15.* cumulae & perfecte traditur. Reliqui, optimus HIPPOCRATIS interpret FOESIUS in *aromonia* suis, ac non sine ratione, suspectum esse hunc locum, & defectum atque mendam subesse iudicat. Neque etiam in regionibus calidioribus, in quibus venerandus Senex egi, tam frequentur ex plethora vel fluxu haemorrhoidali oboritur aegritudines, quam in nostris meridionalibus & temperatioribus. Solem vero humilitudi dolores esse & longiores & atrociores, maxime quando caecochymia concurrit: hinc fit, ut, debilius valde genere nervoso, in paralyti, epilepticum vel alios morbos nervorum & capitis terminentur, praesertim, si non rite, per calidiora videlicet interna & externa, anodyna immoderate sumta, tractentur. In regionibus praecalidis in Italia & praesertim Romae, item in Hungaria, superiori Austria, Moravia, ob abusu vini generosi, sanguinea & bilioze colicae frequentiores sunt. Neque ibi datur ad eas tollendas, praeter ukum refrigerantium & praesertim aquae frigidae, praedium facile convenientius & efficacius. Et ob hunc rationem non modo AMATUS, sed & ZACUTUS, LUSITANI *hyst. 295. pag. 371.* colicam à bile factam, aquae frigidae potu, & *Lih. II. obs. 25. praex. adm.* rite curantur meminerunt. Conf. hac de re M. N. C. cent. V. p. 193. 194. cent. X. p. 273. item *Devar. II. Aet. VIII. obs. 13. de Anno Xobser. v. 39.* Vidi quoque in paralyti ab eadem causa exorta, balnea paulo frigidiora, plus efficacie quam calida praestitisse.

## OBSERVATIO V.

Anni propemodum sex elapsi sunt, quum Bear. D. D. NABOTH me Lipsiae degentem, ad seminariu mercatoris primatu viduam, quae gravissimis abdominis doloribus, ex mensibus per vehementem terrorem suppressis torquebatur, duceret. Deliberatione invicem habita, primo sanguinem à vena emittendum, dein chyliferas emollientes & oleosis cum stimulo salino injiciendos curavimus, & mixturas carminativas ac sedativas, quarum princeps ingredienti spiritus nistri dulcis fuit, propinavimus: sed sine effectu. Ipse affeverat, se modo in hac ipsa aegritudine, valde sanguinea, quae aetate dimidium anni eodem morbo fuerat correpta, miro cum effectu & dolorum levamine, solo aquae frigidae usum fuisse poni. Nolu prius in ejus descendere foveantiam, quum inflammationem videret: sed ipse cum affectu & promissu suis insisteret, nosli moeroris repugnare: & res etiam felicia, ac putaram, fuisse. Hic itaque aquae frigidae simplices potum ad II. cyathos de die per vices sumendum, tecto prius probe corpore & pedibus,

curavit. Subsecuto largo sudore, postea placido somno, omnes dolores abdominis conquieverunt. Affirmavit quoque, quod linca aqua frigida madefacta, scilicetissimo saepius cum effectu, in tali casu applicasset.

## Epiçrifu.

Quod in aqua frigida summa lateat medicina, ego multa experientia, qui ipse: *de aquae medicina universali*, dissertationem scripsi, edoctus fui. Sed uni omnia magnae efficaciae remedia, quae à medicis sagacioribus heroica audiant, exquisitum iudicium ac prudentiam, omniumque causarum considerationem desiderant; ita id ipsum de aquae frigidae interno & externo usu, maxime valere existimo. Nam imprudenter & inexpectative data, praesertim ubi metus inflammationis est, non potest non summum periculum, imo necem afferre. Nihil minus ad calidam acrem materiam emperandam, nimium sanguinis ebullientis fervorem reprimendum, ad vicia ab immodico collapsu resistentias, ad roborandum partium tonum, & systolen cordis & valorum augendam remedium efficacissimum utique praebet. Vidi ab ejus potu in cholericis passione miraculose plane effectus. Neque indignus animadversione est locus apud LUDOV. SEPTALIUM, quem *lib. VII. animadv. p. 248.* insinuat, & huc ineger adduci meretur. *Coningit, scribit, aliquando in colici dolores adeo vehementes fuit, ut omnium medicamentorum operam eludat, ut quocumque auxilio adhibito potius augeatur. In quo casu erit ad contraria transfundenda. Quum enim colici dolores majores ex parte, à materia frigida fiant aut à fluxu dissidentibus; fit aliquando, ut aut ratione vigilantes, dolorem, aut metus ob contumaciam aut invalefcentiam nimiam, aut inefficaciam, accedentibus etiam calidis & foris oppositis remediis, aut phlogosi quodam tenentur, aut etiam vera inflammatione cupiant affici, aut multa praexistens bilis ibidem transfundatur. Unde ad contraria erit transfundendum & ingenser refrigerandum. Quod mihi praeterea cum coningit, in nobili quodam Hispano, qui cum colici doloribus per aliquot dies acerrime fuisset constitutus, ut jamjam mori esset praesentis, nulli perfrueretur arteriarum, pulsus, sudores effusus resoluti, nulla denique supervexit spes salutis, ne quidem apud medicos etiam praestantissimos: accersens & ego, cum suis inextinguibilibus, lingua scabritiem, nigrorem acri duriorem; peractum autem hypochondrii & ventris inferiori, calorem illum in partibus affluentem adeo observasse. Hispano aquam multam nive etiam refrigeratam, bibendum exhibui, cum natura abstinent esset. Et multa aqua potaret in fontem prolapsus est, & quatuor horarum spatio cum dormisset, dolere quodam inferioris ventris, à primo maxime, ut ipse referet, diversis, excitatus à somno, miram bilis flavae copiam evasit & à doloribus liber evasit. Unde colligi, medici, qui illius curantem susceperant, in causa morbi illius longe decrepiti fuisse, cum calidis remediis curacionem insituerent, à frigida materia morbum factum iudicant. Neque in colica flauenta, à causa calida, frigida exterius applicata penitus improbanda veniunt; quia in re auctoritate eximiorum medicorum CRATONIS, item VALESCI & TARANTA nudi licet, qui linca aqua frigida madefacta & ventri imposita in colici doloribus sedandis magni*

colica sanguinea, ex mensibus morbo suppressa, aqua frigida curata.

Colica sanguinea, ex mensibus morbo suppressa, aqua frigida curata.

faciunt. Cui experientie, adftriplantem quoque habemus rationem: nam flatus qui valide & mirifice nuncias & parietes intestinorum distendunt, nihil aliud sunt ac aer calore rarefactus, elatere ejus valde adaucho; frigida igitur, ut experientia mechanica compertum est, cum aërem nimis rarefactum condensent, atque in angustius spatium cogant, nec non floris nimis relaxatis tonicam vim reddant, ut calefacto corpore lingua majori velocitate propellatur, efficiunt.

## OBSERVATIO VI.

Juvenis XXII. annorum studiis operam navans, gracilioris corporis structura, ex impura Venere, gonorrhoeam sibi contraxit; ad quam curandam Chirurgi opera usus est. Hic primum fortiter corpus purgabat, dein adstringentia, tincturam sulphuris vitrioli, anisophobisicam *Græmianus* & pulveres ex magisterio Saturni, terra sigillata, luccino & osse lepie composuit, ad sistendum fluxum copiose adhibuit. A quorum usu per septimanam continuam hæc mala infecta: atroces cruciatus in abdomine, quod durum tensum & tenens erat; aborti, alvo proflus obstituta; adeo inappetentia, inquietudo, & tremore ac tractionibus artus, femora, pedes torquebantur. Enixe meum exposcebat auxilium. Neque infeliciter succedere curatio, quæ chyliferis emollientibus & oleosis crebrius ingesta, infuso mannato, ex fero lactis, quod stimulo salino erat armatum, & pinguioribus juleulis, blandisque internis carminativis, & balneo aque dulcis, ultra novem dies absolvebatur.

## Epiçrifi.

Quantam noxam improvide cura adstringentia, ventriculo & intestinis cum partibus valde nervosis & membranosis inferant, totum de motum corpori plane turbando & invertendo, dici vix possit. Atque innumera exemplis, quam perniciose ea, in alvi, sanguinis, scimiis fluxu sistendo, effectus exerant, confirmare & illustrare possemus. Ex horum vero numero peioris adhuc notæ sunt, quæ ex Saturno deprimuntur. Hæc ut exterius non careat sua laude & virtute: ita interius usurpata, fibras nervosas intestinales costringendo, veri veneni naturam & vim habent; adeo ut ipsa, cum per se quidem non damnosa, tamen quoad usum internum damnanda, è re publica medica, jure meritoque exterminari debeant. Memoratus morbus recte dici possit colica convulsiva, quæ ab HIPPOCRATE *lib. de vitu acutor. §. 81.* cholerae siccae nomine vetat; quæ hunc in modum ejus naturam & curationem peritæ & optime exponit: *In cholera sicca venter inflatus est & strepitus insens. Dolor lætrem ac lumborum: fecerit autem nihil deorsum, sed alvus adstricta est. Talem observato, ut ne vomant, sed alvus solvatur. Infusum hinc calidum ac pinguissimum quare cissime per chyliferum immittit, & oleo situm in aquam plurimam calidam paulatim affundens, & si calidius ipsi alvus suberit, morbus solutus est, à visu vero adstricta: sique non remiserit dolor, assiduam lac bibendum dato, donec purgatus fuerit.*

## OBSERVATIO VII.

Vir quidam plebeus fortis, robusti & obesi corporis, XXX. circiter annorum, cerevisia ebrius, fixando in diversorio cum sui similibus, domum

brumali tempore revertitur, & carnem suillant pinguiorem cum magna panis copia ingerit. Alvi fluxus cum torminibus iniquebatur; sed, cum sub coelo frigido alvum deponeret, sistebatur. Unde dolores terribilissimi totum occupabant abdomen, lumbos, hypochondria: æque alvus erat valde obstituta, artus frigida tremicebant, summa aderat anxietas & inquietudo, internæque præcordiorum angustia & constrictio; demum ipsius & dolor genus intestinale etque consurrebat. Curatus fuit juleulo avenaceo, in quo flores chamomille & sambuci cocti, quod cum salis Ebbionensis & niri dosi atque oleo amygdalarum dulcium per vices sumit, non omnia chyliferis oleosis & emollientibus, atque internis carminativis & anodynis. Postea crebro balnei aque dulcis usu, ad convulsivas artuum tractiones leniendas, sanatus est.

## Epiçrifi.

Ad subitam atrocis hujus veneris doloris generationem, variæ, sed valide concurrebant causæ: ebrietas, affectus iræ, & post hanc ingesta pinguium & viscidiorum ciborum copia, frigus, & ab hoc alvi fluxus suppressio. Non mirum hinc est, ex fluxibus intra intestinorum cavitatem excitatis à spasticis nunciarum intestinalium contractionibus, intra retentis & incarcerationis, tam atrocis dolores & gravissimas nervolorum partium adhesionem fuisse productas. Et quia obstructio alvi proxima causa horum malorum fuit, cum rursus aperiri expediebat. Quod vero non promissæ per purgantia & fortiter stimulantia, quæ dolores & spasmos potius excitant, fieri debet, sed per salia oleosa & demulcentibus mixta, quæ nomine sal Ebbionense laudamus, quod ad unciam in aqua solum & excremента provocanda, præ omnibus aliis laudem & commendationem promeretur. Balneo aque dulcis ex emollientibus & roborantibus paratis, ad robur partibus externis conciliandum, quod a vehementi dolore & spasmo plane lædunt & destruiunt, in fine ejusmodi morborum nil est convenientius, nil efficacius; cum veteris, inter quos HIPPOCRATES, CÆL. AURELIANUS, TRALLIANUS, ARETÆUS, usum eorum mirifice tollant atque commendent.

## OBSERVATIO VIII.

Serenissimus S. R. J. Princeps ante aliquot annos per Archiatrum adversam suam valetudinem, solutare consilium suppeditandi causâ, ad me perscribere jussit. Is cum in florente ætate constitutus, boni & sanguinei corporis habitus, ingenii valde vividi & alacris, narum hæmorrhagiæ in juventute valde obnoxius esset; per integrum fere annum febris doloribus, & atrocibus intestinarum torminibus fuit affectus: quo factum est, ut in ingentem virum lapsum atque in corporis tabescentiam contractus fuerit. Ad fluxum hæmorrhoidalem quandam aditus suspicio; qui tamen non rite & ex voto procedebat. Ad hunc promovendum & dolores mitigandos varia usitata fuisse remedia, & hæc quoque pilularum polychrestarum & ad exemplar Becherianarum paratarum frequens usus intercessit: qui parum tamen profecit. Quæritum itaque ex me fuit: utrum thermæ Carolinæ convenienti regimine usurpare, nō & exoptato cum festu possint adhiberi? Ego responsum dedi, quod tam ad ardeatentem quam

*Colica convulsiva, ex gonorrhoea adstricta, alvus sigillata.*

*Colica fluxuina, ex ha & f. peringula, alvus soluta.*

*Colica fluxuina, ex ha & f. peringula, alvus soluta, ex ha & f. peringula, alvus soluta.*

quam ad dolores ventris spasmodicos, nec tutius, nec praefertius, harum thermarum usu, cognitum mihi sit atque perspectum auxilium: quod multis exemplis confirmare valerem. Huic consilio multi, & medici quoque, ob anceps remedium & verendum periculum, sese opponant; dubio procul ex hac causa, quod nullam prius de huius salubritate foribus, ratione ingrediturium de virum, habuerint notitiam & experientiam. Serenissimus Princeps autem, pro eo quo pollebat iudicii acuminis, utpote omnia haecenus destituta fuerat auxilio, sententiam meam amplexus, iter suscepit, per hanc civitatem transiens: & fatigatus ex itinere hic advenit, sed in uno pede tumore erysipelaceo ingenti correptus, qui fano vel triplo grandior erat. Altero die intolerabiles abdomen invadebant dolores, tanta cum ferocia, ut clamores & lamentationes exprimerent, & omnem somnum adimerent. Ad quos supinatus & ego & alia loci huius medicus accersibamur, sed praeter clysteres emolientes & carminativos aequo linimentum externum, pulverem ex antimonio diaphoretico, niero, sale absinthii & lapidibus cancerum paratum per vios dedimus; sanguinem quoque & pedis vena emittendum curavimus; sed parum inde levaminis percipit. Per tres & ultra dies dolorum perliti atrocitas. Tandem consultum duximus, praemisso senu, hirudines quinque ano applicare, quae sanguinis aliquot uncias extrahebant: quo facto insignis dolorum remissio & sensim plenaria sanatio restituta, Divino sub adjutorio est secuta. Data instructio de usu harum aquarum decenti, adiit Carolinus & per IV. fere hebdomades in interne usus est: balneum quippe interdicti; pediluvium vero pro diluisione sanioris in dies adhibuit. Quae cura ex voto successit: & ad nos sanus & iucundus exhiberi potest vehiculo. Sed opera danda est, ut cibi fermentescibiles inflaves, pingues & qui difficilioris sunt concoctionis, atque ante omnia frigus evitentur. Praeterea & id quod complures in praxi mea annotavi, quod dolores colici & flatulenti, cum borborismus & ructationibus, interna angustia atque gravitate circa praecordia sensu, & sola spinditæ ani valida constrictione & angustia producti, haec vero à copiosiori sanguinis vel feri afflusu ad ejus venas internas vel externas haemorrhoidales suborta fuerit: ex quo fit, ut nec sanus, nec excrementa liberum habeant exitum, sed repleta resiliant & versus superiora ferantur, plurimum molestiae & incommodi procreando. Tali in casu, quando fortior fit ad excernendum alvum nifus, is plane inanis est: exprimit quippe mucum instar aluminis ovi & quandoque prolapsum recti efficit; imo vidi herniam unguaalem inde productam, siquæ hæc, vel krocælis jam praesens fuerit, eam longe grandiorum factam. Atque hic tenendum, quod suppositoria, praesertim stimulantia, & acriorem dolorem & majorem affluam excitando, malum exasperent: quin potius clysteres emolientes & interne pulveres absorbentes nitrosos, item infusum mannae cum cremore tartari, & interdum si plethora urget, venae sectionem, commodissimum invenisse locum testari possum.

## OBSERVATIO IX.

Post crebriores ex calculo renali dolores, post alvi fluxus atque intermitentes perperam curatus, saepe numero ego in praxi intestinorum tonum & motum naturalem labefactum & destructum notavi. Nam ab eo tempore, & alvus non rite respondit, & flatulenti, borborismus & assidua eructationibus, concurrente praeterea sedentaria vita, per longum temporis spatium decumbentes affecti fuerunt. Ad quas molestias & incommoda averrenda & tollenda, sequenti methodo haud infeliciter saepe numero usus sum. Phala meae compositionis leniter laxantes balsamicas, bis in septimana ad grana XV. vel XX. mane sumendas ordinavi, ubi praecedente die circa lecti introitum, falsi aperitivi dosis, quod e.g. ex tartaro vitriolato, nuro, sale Eboracensi, terra foliata tartari concinari potest, praemissa fuit. Dein ad labefactum intestinalem tonum & labem restituendum, essentiam carminativam B. *Wredli*, quae ob spiritum nitri, ejus compositionem ingredientem, singulari stans discutiendi facultate potest, quando cum dimidio essentiae cascariillae, item una parte spiritus de tribus miscetur, ego non facis diluere possum: cujus medicamenti conveniens pro circumstantiarum ratione dosis, bis de die, mane scilicet & sera post prandium concoctione, in idoneo exhiberi potest vehiculo. Sed opera danda est, ut cibi fermentescibiles inflaves, pingues & qui difficilioris sunt concoctionis, atque ante omnia frigus evitentur. Praeterea & id quod complures in praxi mea annotavi, quod dolores colici & flatulenti, cum borborismus & ructationibus, interna angustia atque gravitate circa praecordia sensu, & sola spinditæ ani valida constrictione & angustia producti, haec vero à copiosiori sanguinis vel feri afflusu ad ejus venas internas vel externas haemorrhoidales suborta fuerit: ex quo fit, ut nec sanus, nec excrementa liberum habeant exitum, sed repleta resiliant & versus superiora ferantur, plurimum molestiae & incommodi procreando. Tali in casu, quando fortior fit ad excernendum alvum nifus, is plane inanis est: exprimit quippe mucum instar aluminis ovi & quandoque prolapsum recti efficit; imo vidi herniam unguaalem inde productam, siquæ hæc, vel krocælis jam praesens fuerit, eam longe grandiorum factam. Atque hic tenendum, quod suppositoria, praesertim stimulantia, & acriorem dolorem & majorem affluam excitando, malum exasperent: quin potius clysteres emolientes & interne pulveres absorbentes nitrosos, item infusum mannae cum cremore tartari, & interdum si plethora urget, venae sectionem, commodissimum invenisse locum testari possum.

*Tunc notandum est, quod cum ex medicis praesentibus nonnullis,*

## Epiris.

Quin arthriticus & colicus spasmodicus dolor nimiam sanguinis abundantiam, ejusque impedientem per mesenterium & viscera abdominis transitum, pro vera causa agnoscat, nihil dubitandum est. Minus recte, sed perperam horum malorum, per promotionem fluxus haemorrhoidalis tentata fuit depressio. Permulta ego exemplis compertum habeo, quod si natura non inclinet ad hunc fluxum, & meatus ad egerendum sanguinem non satis sint dispositi, epistoda calida gummoso-resinosa & aloetica, urgendo sanguinem ad intestina, colon & rectum, detrimentum potius quam emolumentum afferre. Jam vero ipsa distincta ratio, quod longe rarior & certior huius malis medendi sit via, si per viscera abdominis inque primis hepar, liber sanguinis motus & circuitus promoveatur: quod omnino per convenientem aquarum mineralium & maxime Carolinarum usum praestari & confici potest; cum multa mihi huius sanatorum morborum obvia sine suspicabilissimi successus exempla. De cetero singularis & plane admirabilis, in sedandis ejusmodi doloribus, ex admotione hirudinum effectus meretur animadverti.

## Epiris.

Ad tonum & motum intestinorum labefactum, qui obstructionis, fluxum, dolorum & aut-



multorum aliorum incommodorum causa ac fons est, reparandum & confirmandum, ego non modo remedia interna, sed etiam clysteribus accommodatis & idoneis usus sum felicissime. Ex tales sunt, qui ex speciebus, quæ non tam evacuant sed & roborare efficacia pollent, parantur; cujusmodi sunt herba salvia, ruta, flores chamomillæ Romanæ, bacce lauri, juniperi, semen anethi, carvi, myrti, quæ leni facta ebullitione, in vini Gallici & aquæ communis aequali portione, extrahantur & injiciantur. Quandoque portionem balsami noster liquidi vitæ, clysteribus carminativis adiciendum curavi. Sed necessarium est, ut ante horum usum, alvus aperta & à flatibus libera sit. Præterea, de hoc loco id monere consilium duco, quod, ubi tumor in extremitate intestini recti, flatuum & incommodorum in tino ventre, obstructionis quoque alvine causa sit, pilule purgantes, item quæ aloem recipiunt & motum sanguinis ad intestina crassa dirigunt, nisi malum exacerbare & revocare velimus, plane non, vel cautissime exhibenda sunt.

## OBSERVATIO X.

*Curatio  
colicæ, ex  
motu  
exacerbata,  
maricæ,  
vel non  
moderata,  
vel non  
exaltata.*

Placet in genere quædam adhuc insinuare observationes prædictas non exigui momenti, quarum anterior consideratio medicis junioribus haud parum utilitatis & adjumenti, in sanandis intestinum dolorificis affectionibus asseret. Nam sæpius annotavi, familiarissimo nostro ævo qui feminas præcipue corripit morbo, purpuræ videlicet, intestinum dolorem sæpius adijungi, idque maxime evenire, quando incausa victus ratione, vel importuna medicina, materia viscosa non satis ad habitum corpora prosruerit, sed inus retinetur, aut à superficie corporis retrocedit: quæ ad intestinum tunicas delata, subito tormina, aliaque gravia accidentia incidunt. Neque vero tam facili labor est, peccantem humorem ad extremam rursum cutem prolicere, sed moderatius, temporis & patientiæ beneficio opus est. Lenissima vero & æqualis est procuranda diaphoresis, per crebrius datos pulveres diaphoreticos cum tunillo nitri & cinibaris: liquor etiam anodynus mineralis paucioribus liquoribus Bassii gustulis animatus, ad foras excludendam pestiferam indolis materiam, plurimum valet. Ubi vero in hoc morbo potius cerevisiæ nunquam non noxius; ita plus detrimenti, si retrocedens materia interiores nervas partes obidet, certo asserit. Commodum itaque, ex demulcentibus & scrimoniis temperantibus placideque diaphoreticis speciebus decoctum cum aqua paratum, per totam morbi decursum offerendum. At vero cum ex frequenti observatione compertum habeam, dolorem colicum in iis qui purpuræ scorbuticæ sunt obnoxii sæpius repere & gravibus accidentibus aggroantes torquere, sine ullo in extremis paribus apparente exanthemate; ego quidem ad averenda hæc mala non efficacia remedium, præter usum acidularum temperatarum cum tercia lactis vaccini, vel quod ego protulerim, asinini parte facta miscela, verno tempore susceperim, reperire potui.

Deinceps frequentius id in praxi mea observavi, quod dolores intestinum paulo acriori, ubi in extrema ætate constitutos adoriuntur, & paulo diutius insistant, vialibus viribus valde attritis lethaliter plerumque exitum post se relinquunt. Cujus eventus ratio, mihi hæc videtur, quod jejunio ordinario, ob virium languorem & dyscrasiam humorum intemperantem & scorbuticam, ex

levi etiam partis externa læsione, in sphacelum sine proclives. Quod multo magis evenire potest, quando à dolore & spasmō intestina, velut partes texture prostræ necesse & flaccidæ, paulo acrior infestantur. Ex quo intelligitur, quam caute & provide, circa res diæticas infirmi senes se gerere debeant, ne quicquam admittant, quod dolores & spasmos in intestinis excitare aptum sit.

Neque dum in hac materia versamur, quæ non minoris in praxi momenti est, hæc observatio nem præterire possum ad decoctum, quod biliosa colica, ea præsertim quæ ex gravi progignitur ira, tertianæ sive continuæ sive intermittentis superveniens, magni non experti sit periculi, upote quæ perperam per purgationem, emetica aut sudorifera, vel nimium calorem externum tractata, quam facile in intestinorum tenuium inflammationem lethalem, præcunctibus anxietatibus & convulsionibus, transeat, & die paroxysmi morem plerumque accersat. Ex quo discere tyrones possunt, quam provide & caute tractare debeant tertiana alias benigna detentis, tam gravi symptomate incidentes. Ego in demulcentibus & temperantibus portioibus ac lenioribus laxantibus, cujus generis sunt serena lactia bene depurata, decoctum avenacum, ex floribus chamomillæ vulgaris, emulso amygdalarum dulcium, papaveris & seminum IV. frigidorum majorum cum pitana preparata, pulvis Marchianæ, vel ex lapidibus cancrorum, nitro & shabarbaro confectus, atque clysteres emollientes, optimum & præstantissimum auxilium deprehendi.

Exempla adhuc legamur in *Consult. Medici. Scil. III. cas. XIII. XXI.*

## CAPUT VI.

De acuto dolore & spasmō ex calculo renali.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

**D**olor, qui ex calculo renali firmius urinæ meatibus impaëto proficitur, uni omnium quidem passionum, quæ genus humanum misere torquens, est acerbissima: ita sæpius fit, ut is, si quis prima præsertim vice ex hoc laboret, difficillime ab aliis, quæ circa regionem lumbarem consistunt dolorificis affectionibus discernatur.

*Dolor ex  
calculo re-  
nali diffi-  
cilius dis-  
cernitur.*

## §. II.

Communis sed pessimus morbus invaluit, ut, si non antea quis circa regionem lumbarem doleat, statim ex calculo renali se dolere existimet; cum tamen ibi complures valde sensus indolis & dolori obnoxie sint partes, ut musculi lumborum externi & interni, ligamenta vertebrarum lumbiarum nervæ, plexus nervorum superioris mesenterici, ramus arteriæ mesentericæ superioris, & circa viciniam, flexuosus intestini duodeni finis, neque minus sigmoides coli flexura; quæ singulæ, quando à visco ibi stagnante, sive sanguine, sive seroso impuro humore, vel nimis distenduntur, vel comprimuntur, dolorem sibi gravem exhibent. Fit etiam quandoque, ut à insuamitismo has partes occupante tantus exurgat dolor, ut quasi lumbis per medium scissis incurvatus incedere debeat æger, nec surgere queat. Quod indem fieri solet, si à casu, vel à magna onctis levatione, ventriculi cum nervis tan-

Cc stillum

tillum à propria sede recedunt. Neque tam raro evenit, ut à sola sanguinis copia, circa plexum mesentericum, & circa arterias emulgentes stagnante, in plethorica vel hæmorrhoidaria, vel à neglecta conducta venæ sectione, ingens circa lumbos oboritur dolor, qui vulgo pro calculoso, sed perperam, habetur: dum vel solius venæ sectionis in pede beneficio, vel pulvere nitrolo diffinitione subito sanæ definit.

## §. III.

Id vero frequentius contingit, ut dolor colicus cum nephritico calculoso confundatur: nam, quando flexura colici circa lumbos quæ jacet, vel flatus nimium distenditur, vel spasmodice contrahitur, non modo atrox in regione lumbi fit dolor, sed & ipse ad præcordia transit, nauseam ac vomendi conatum efficit, urinae fluxum impedit, alvum contrahit, imo totum abdomen cruciatum turquet, non secus ac à calculo fieri solet. Sed tamen, qui hic dolor spasmodicus, non assiduus, non fixus, sed magis vagus est, ac chyliferis emollientibus alvo insulis magnopere levatur: hinc peritus unicus medicus, hunc à calculoso, non adeo difficile distingueret potest: cum hic magis pressior sit, quod germanice exprimunt: *Es drücke sie, als ein Klötz*, atque vires non tam intense destruat, per intervalla etiam remittat, ut egrotantes sæpius surgere & ambulare possint; quod in acerbis intestinorum dolore non accidit. Descripsit vomitus & nausea, à calculo si dolor est, jejuno ventriculo magis urget, ac in utero imo ipsa glande testiculari de sensu punctioris percipitur, urina sabulo repleta, testiculi quoque retractio ac femoris stupor & contractus eisdem lateris fit, quod in dolore intestinorum vix observatur.

## §. IV.

Notabile est, quod calculi etiam prægrandis magnitudinis & ramis insignibus prædij in renum substantia, placide sine ullo doloris incommodum, per aliquot annos quiete delitescere possint; simul ac vero è sede sua dimoveantur, & in angustos nervo-musculosos canales, ureteres dictos descendunt, perque hos in vesicam exinum moventur, mox gravissima invadunt symptomata: adeo, ut hi ipsi canales veram & fixam dolorum ex calculo sedem ac domicilium constituant, qui tamen pro differente calculi magnitudine, asperitate, ac figura, tunicas nerveas plus minus distendentes & lancinantes, vel intensiores vel leviores evadunt. Quandoque tam crudeles sunt, ut præter extremorum horrorem & refrigerationem, nauseam, vomitum, spasticam præcordiorum contractionem, difficilem urinae mictum, alvi stricturam, spirandique angustiam, stuporem crucis, retractionem testiculi ad os pubis, inqueundem, ingentem virium lapsum, syncopen, convulsiones etiam epilepticas concitent, vel plane fatalem ichthuriam inducant. Vidimus aliquando egrotantes conqueutos fuisse, se non alium sensum percipere, ac si qui cultro acuto vulnus profundum, secundum longitudinem spinæ, versus vesicam continuo intelligere; ubi, in desensitis, ureteres instar sarcinam à copia urinae, cujus in vesicam influxum calculus circa introitum ureteris in vesicam hærens interceptat, extensi & turgidi comparentur.

## §. V.

Res est experientia confirmata, quod interdum longo tempore lapsi in uretrem, sine singulari do-

lore sine mictus interceptione hærent & conquiescere possint, ubi tamen mox subito & ex improvviso dolor revertitur acerbus, cum ciborum subsistentie fastidio, nausea, vomitu & urinae interceptione; forsitan quod ab incommodo motu situm suum mutaverit lapis, & sic asperitate sua, tunicae nerveæ fibras magis offendat. Neque etiam semper iidem symptomatibus hic affectus supputatur: nam, ut ERASMUS de fun calculo loquitur in *Epistola ad Perchmeyerum, subinde se movet, ut plane credatur aliud esse malum, quod maximum partem inde prouet, quod alia symptomatica sint ab initio, alia in progressu, interdum quiescat, interdum se moveat & locum mutet.*

## §. VI.

Atqui etiam illud attentionem excitare debet, quod calculi finitrum renem, præ dextro, frequentius obfident; quo fit, ut dolores ex renali calculo longe crebriores in sinistro, quam in dextro latere observentur: id quod confirmat CAROL. PISO in *tract. de morbu ex fersa colluv. urinae. c. II.* dum scribit: *ex tenui calculosa nephride laborantibus oblongata & amplius renem finitrum dolent.* Neque hujus eventus ratio, adeo in obscurum posita est: in rene enim dextero, quia hepatis amplo viscere tegitur & majori præ altero calore fovetur, promior multo atque expeditior evadit sanguinis per hujus renis vala progressu, fieri iidem urinosi separatio: hinc non tam facile sanguinis & urinae fieri in hoc possunt stagnationes, ac in sinistro, qui colli flexura obfistit, ob frequentem suorum refractionem magis premittur; ex quo fit, ut inferior sanguinis per vala compressa intercepsum cursu, difficultatem laticis urinosi per tubulos translocationem, atque promiorem ibi stagnationem & materiae tartareæ feculentiam & coactionem reddat atque efficiat.

## §. VII.

Notabile idque experientia pariter sussultum est, quod calculus diutius in renum parenchymate vel polvi desitescens, pluribus modis ac causis, è loco suo dimoveri atque in ureteris principium propelli possit: & inter has, primas fere tenent, formor animi per iram conurbatione, corporis subita & vehemens per vestituram sive equestrationem commotio, inque primis penetrans, quod venit à plaga septentrionalis præbet, frigus improvide lumbis admissum, item diureticorum, cujus generis sunt terebinthinacea, juniperina, cetera, quibus subinde sed perperam medici ad præservandam à calculo uni solent, liberalior usus: Non semel quoque, sed iterum iterumque observavimus, quod dolores colicæ statulent, item spasm hy pochondriacis, hysteriacis, hæmorrhoidariis familiares, nucleos calculos papillulis renalibus inhaerentes protrudendo, occasionem ad crudeles istos dolores subministraverint.

## §. VIII.

Quod attinet ad causas remotas & sic dictas naturales, quæ ad gignendos in renibus calculos & inde provenientes dolores symbolum suum conferunt; temperamentum sic dictum sanguineum, inter has non ultimum tenet locum. Nam corpora molliora & spongiosiora texturæ, seminini præsertim sexus & quæ copiosum alunt in venis sanguinem, diata laeta & vinosa utantur, onioque & vitæ sedentariæ indulgent, nec non placentis, lacte, casio delectantur, post quinquagesimum maxime annum, tributo lanari cessante, doloribus ex-

dure & p.

Blutrenen  
renum pa  
desensiti  
fesse.

Calculus  
de polvi  
fere mict  
maxime  
hæmorrh  
vii.

Calculus  
non nisi à  
sede sua  
dimoveat  
aut deorsu  
effluat.

Causa mox  
à rene di  
mota.

Renem  
mole cal  
calculos  
trahunt.

Causa re  
motæ cal  
culi renal  
is.

In acuto  
sape sine

calculo sunt obnoxia; à quibus plerumque libera & immunita, fluxu menfium rite fe habente, perfiftunt. Ex Viris it, qui in adolefcentia hæmorrhagis narium, capitis doloribus frequentibus fubjefti fuerunt, item qui hæmorrhoidali fluxui funt affluvi, hoc ceffante vel imminuendo, calculofis & podagricis affeccionibus, fub provectioni ætate, fubinde tentantur. Senilem vero ætatem frequentia & calculo renum & veficæ infeftari experientia docemur, quia humores funt craffiores & cibi in ventriculo accedunt, alvus fit pigrior & oñium quoque calculorum generatio multum paucimatur. Quo fortaffe refpicimus ERASMUS de fuis malo ipfe ita jocular. *Illud mirum videri poffit, cum fenuis fterilefcat ætas, nec feneftus fecit facundiorum: nam iudici crebrius parturo.*

## §. IX.

Accedit etiam hoc, quod vix ullus affeetus tam crebro ex parentibus in liberos transfugare obfervetur, quam calculus & podagra, quippe quæ cum illo, ratiæ difpofitionis folidorum & fluidorum plurimum ætinnitatis habet, quia uterque affeetus non modo hominibus fanguine plenis, & qui vulgo dicuntur fanguinei, eft infeftus, fed ambo etiam in quadam nativa debilitate & ætonia folidorum, videlicet in nephriticis, renum; in podagricis ligamentorum quæ articulos vinciunt, fundati funt. Crebrius quoque animalivertimus, morbos rheumaticos, arthriticos, podagricos quam facile transfugare in nephriticos & hos rursus per metaftafin in illos transformari & de transporti, adeo ut etiam, fi a dolore ex podagra quis diu immunitus fuerit, in calculum nephriticum facile incidat, & vice verfa. Neque raro contingit, utrumque affeccionem conjunctim & uno tempore atroci dolore hominem torquere.

## §. X.

Quod attinet ad generationem calculorum in renibus, hanc tali modo concipere licet: quando, à nimis vehemens fanguinis appulfus, ejulque regressus per vias difficiliori, vala renum fanguinea nimium diftenduntur & infarciuntur, fit tandem, ut minima arteriolarum, ubi in papillulas & fiphunculos urinosos abeunt, aperiantur ac diffruantur, & ita a flammæ de extra valato fero fanguine, primum parvi abfceffus atque ulcercula generentur, quæ fucceffive majora funt; in quibus, quando ferum urinum mulis tartareis humoribus paribus refertum fubfiftit, particule graviores & acuminate fecedunt ac invicem concrefcunt, ita quidem, ut materia primo craffior ac rudior fabulofa, dein etiam grana compaétiora gignantur, quæ urinx copiofus fecretæ beneficio facile eluantur, & faryus non fine dolore foras propelluntur: ubi igitur tale craffum atque grave fabulum, in urina fubfiftit, haud dubiam calculofæ nephritidis indicium præbet. Quando vero hi acini, vel nuclei calculofi, fubftantiæ renum ulcerofe infeftantes, fucceffiva accretione majores & duriores faéti, alluvione feri urinosi tartareis partibus referti, vel alius ex caufis ad pelvim & principium uretrum feruntur, majores utique cruciatus, & ætatis fymptomatum concufus omnino metuendi funt, fi videlicet, per anguftos hos exquifitioris lenis meatus, iter fuum verius veficam conficere debent; ad quam fi fuerint delapfi, protinus omnimoda fymptomatum, cum illis uti decumbentis gaudio & viam refituntur, fit tubulatio.

## §. XI.

Quod calculi autem in ipfo renum parenchymate ex ichorolo vel fanguineo purulento quodam flagnante humore generentur; id inter alia vel hæc evincunt, quod in nephriticis fupie quippiam purulenti vel fanguinei, ut olim à CÆLSO jam notatum, cum urina fecedar, calculofis etiam mictio cruenta familiaris fit, & renes poft mortem valde magni flaccidi, atque exulcerati inveniuntur: quid quod curatio id ipfum teftetur, quæ omnium optime, per abftergentia, vulneraria, confolidantia, leniter constringentia perficitur. Neque vero ego inficias iverim, citra præviam fubftantiæ renalis læfionem, in pelvi vel majoribus renum fiphunculis, ex urina flagnante, materiam etiam tartaream five arenulas aggeri & concrefcere fenfum paulatimque in infignis molis lapillos pofti. Provi vero materia illa, five fit ichorolo, five tartarea, ratione coloris, craffos & confiftentiæ differt & accretio major vel minor eft; varii generis etiam lapilli concrefcunt: alii quippe funt prope laxi, dura conflantes fubftantia; alii friabilis & male compaéti, alii pallidi cinerei rubri ac Sanderachini; alii majores, minores, plus minus anguloſi & afperi deprehenduntur.

## §. XII.

Omnes morbos nephriticos, ut funt renum infarctus, inflammationes, exulcerationes, dolores ex calculo, difficiliori in fenioribus fanari experientia confirmat; quæ etiam HIPPOCRATIS teftimonio, quod aphor. VI. Scd. VI. extat, ulterius ftatuitur. Nam ficut læfiones & exulcerationes internarum partium, propter humorum intemperiem & accretionum abundantiam, quæ in provectioni ætate increfcit; ita etiam, quæ renibus & veficæ uhhærefcunt, propter urinx ingentem acrimoniam, difficilime ad fanationem perducantur.

## §. XIII.

Si quando dolor atrox per plures dies & noctes non remittit, fed affidue torquet, & vires valde artrit ac nullis viis medicamentis expelluntur aliis virtutis cedere, omnimoda quoque urinx accedat fuppreffio, cum extrenorum frigore & convulfione tendimus, mortem in propinquo effe, indicio eft. Maxime vero omnium, dolor ex calculo, ita, etiam atque periculum minatur, qui antea diuturno animi morore maceratus, vires amiferunt: nam major virium mox fequitur defectus, partiumque internarum fiphacelatio. Neque res boni ominis eft, quando lapis, longo tempore uretri continuo inhærefcit; perit etiam ciborum inappetentia ac digestio, nauſea vero, & firmet conatus ad vomendum, anxietate diutius perſiftens, tandemque katus hæcticus calor, virium & carnis fubftantiæ penitus confumens, mortem accelerat.

## §. XIV.

Poſt mortem miræ fæpe magnitudinis valdeque compaéti & ramis majoribus inftruéti calculus in renibus, qui toti per exulcerationem confumati & membrana duarum teſti compauctur, reperiuntur fuit, cum de dolore per viam nunquam quis fuerit conqueſtus: & tali malo affeéti tabe moriuntur, quæ renalibus vocantur. Quidam vero ex calculi doloribus brevi tempore fuccumbunt, & morbo acuto perirent, dum acutiffimum dolorem, ventriculi vel inſularum, tandem inflammatione ſubſequitur: quidam ad totalem urinx fup-

Renem affe-  
ctum diffi-  
cilius in  
fenioribus fan-  
natur.

Quæ mor-  
tis præſa-  
gium.

Totus rei  
necis præ-  
ſagium.

Ita inflam-  
matio ſup-  
puratio.

pressionem, in hydropem pectoris, lethargum vel convulsiones incidunt.

### CURATIO.

#### §. I.

*Indicatio-  
nes curatio-  
nis.*

Momentum profecto omne curationis possum esse videri, tum in facili & ab omni molestia immuni calculorum exclusione, tum in impedienda sabuli excrementi generatione tanquam occasione & objecti facillimi doloris & aliorum symptomatum. Longe enim alia medendi via ac ratio est in ejus accessione; alia extra eam, quæ præservatoria est.

#### §. II.

*In paroxy-  
smo dolor  
est spasmi  
scindendi.*

In ipso paroxysmo, ubi symptomatum ingens est exacerbatio, & ab atroci dolore tota oeconomia functionum vitatur turbatur, primo omnium eo respiciendum est, ut dolorum vehementia idoneis remediis minuetur, atque spastica strictura, quæ non modo partes vicinas, sed totum subinde revolvatur partium systema lege condensationis afficiant, idoneis remediis componantur ac sopiantur; idque maxime eam ob causam, quia sub tanto spasmorum, qui meatus urinarius costringunt, imo; et calculi nec per uteretur in vesicam aperiri, & erigant. Inter probate vero & spectate virtutes remedia, quæ huic intentioni satisfaciunt, non possum non liquorem meum anodynum minuerem, eo efficacem & securum usum, dislaudare; quippe qui parciore sed repetita dosi sumus, spasmos circa primas vias sedando, molestiam illam sensationem, nauseam ac vomitionem egregie tollit. Qui hujus autem medicamenti copia caret, huic spiritus niri, rite, methodo nostra, quam præscripsimus in *Observat. physico-chym. præparatum*, plurimum commendamus; hic enim nullo amplius acore imbutus, blanda sulphurea exhalatione, & flama discutis, & spastica strictura relaxat. Commodissime vero hic spiritus cum aquis sedativis, ut sunt, cerastorum nigrorum, florum acacie, sambuci, papaveris rheodas, nilæ, primulae veris, liliorum convallium, ulmarie, & præcipue omnium florum chamomille & summiarum millefolii, adjecto syrupo papaveris rheodas vel albi vel etiam in brodio carnis, cum aliquot cochlearibus olei amygdalini recentis & purissimi, sine tollione prævia parati, exhiberi possunt. Spectant huc quoque emulsiones, ex amygdalis dulcibus, semini- bus IV. frigidis, papaveris, milti solis, semine dauci, cum jam dictis aquis præparatæ, & syrups papaveris albi sufficienti quantitate edulcoratæ. Quando vero lenior hæc, dolori mitigando non sufficit, ad paulo validiora transeundum, & quidem opiatæ, per aliorum additionem valde correctæ & securæ redditæ, cujus generis sunt: massa pilularum *Widgenstii, Stærckii*, laudanum liquidum *Sydenhamii*, & celestis thieraca; item trochisci de *Alkekengi*, qui ob virtutis præstantiam & ingredientia dolori mulcendo apertissima, laude omnino dignissimi sunt.

#### §. III.

*Laudanum  
ut natri.*

Præter hæc dicta, nirosæ, & inter hæc nitrum tantum pusillanum & crystallisatum, vel artificiale ex spiritui niri & sale tartari composuit, vel nitrum antimoniatum, in compescendis præcalida gravibus & acutis doloribus cum sanguinis & humorum exstimationibus junctis, certe omnibus aliis remediis generibus, virtute ac securo usu, superiora sunt, atque in morbis nephriticis

laudem insignem promerentur. Quam optime vero cum cancorum lapidibus, cum cinabari, vel pulvere Marchionis & aliquot granis trochiscorum alkengi vel massæ pilular. *Widgenstii* miscetur, & cum emulsionem vel sero lactis dulci propinatur.

#### §. IV.

*Cystis.*

Enim vero, ubi dolorum & spasmodum vehementia fore intolerabilis est, sola interna hanc sedando non sufficit, sed externis etiam occurrere oportet. Inter omnia autem desideratissimi effectus chylister sunt, ex emollientibus floribus, præsertim malvæ horensis, sambuci, papaveris rheodas, millefolii, chamomille vulgaris, & verbasci, cum sero lactis decoctis, adliquo syrupo diathæze *Ferneti*, nitro & sale Eboliense collectis. Quando inferior recti & coli pars contractilissima est, ut flatus transire nequeant, sed ad superiora vergentes, anxietas angustæ, cœnata ex oleis & pinguedinibus, auro injecta, mirabilem anulilem opem, non una sed pluribus vicibus a nobis observatam. Alvo aperta, flatibusque sic extra parato, stomachi vomituade inversiones, cum anxietate præcordiorum intentionibus, protinus remittunt.

#### §. V.

Deinceps, in mitigandis hisce doloribus, veterum inque primis HIPPOCRATIS methodum, uti amiquissimam, ita optimam maximam habendam esse censuimus, dum lib. V. de interna. *afflictio. hæc tradit: cum dolor in rebus præteritis, multa calida lavato, & sepius altera, qua pars maxime dolet, adhibere. Idem rursus in TRALLIANUS lib. IX. cap. 3. his verbis valde commendat, cœnatis opem esse habere, ut quod non solum mitiget, sed & curare possit: nam calidus si frequenter solvendo lenis, nephriticus vero miraque rursus juveni, manent vero ægri loci immobilitate, & amano, in balneo & dimittit morantem, non semel tantum in die sed bis vel ter lavare expedit. Ex profecto balnea & isidellæ ex aqua dulci, præsertim plusvis temperate calida, in silendia acerbissimis tormentis, vix habet sui similia, si modo crebrius repetantur. Atqui linimenta, ex aunguina humana, cati lyssuri, canis, castorei, unguento diathæze parata, vel etiam vesicam decocto florum emollientium area recentiorum, ex lacte, repleta, ac parti intente dolenti applicata, singularem plane exere virtutem & efficaciam, maluphi usu confirmatum habemus.*

#### §. VI.

Quandocunque, legitimam horum usum notabilis spasmodus sequitur remissio, pulsus sedatur & mollior evadit, calor medius ac æquabilis totum corpus occupat, & flatus probe ex ano descendunt; protulso calculi idoneis remediis, sub debita tamen adhibita cautione, tentanda venit. Vidimus ad obtinendum hunc scopum varia præsentissimi fuisse effectus, atque inter hæc largissimum assuumum insulsum herbe veronice & petroselinii, vel ex seminibus dauci, felleri, feniculi, bacis alkengi, radice glycyrrhizæ, summitatibus millefolii, paratum, cœnium anulile levamen, cumprimis si ponas quadammodo spirituosius, ut malvacum juniperum, horum usum exceperit. Mirabilem quoque, in educendo ex viarum angustis calculo, decocti aninethici *Forstii* largientem ponam, adjuncto corporis motu, efficaciam subinde præstidile, a nobis observatum est. Sed interdum paulo fortioribus

*qui non  
habetur ma-  
gis effica-  
cia sunt.*

*In balneo.*

*ut*

*Spasus fa-  
dan, calculi  
est præstidile  
remedia.*

pel-

## De acuto dolore & spafmo ex calculo renali. 301

pellenibus opus est, quæ inter eminent ac tutissima sunt mater perlarum, vel cochleæ aut telluræ ovorum usque cum succo citri in convenienti vehiculo exhibite.

### METHODUS PRÆSERVATORIA.

#### §. I.

*Præservatio in præservatorio.*

Præservatio perniciosissima hujus mali, uti in principio quidem facilissima, ita in progressu, si ex reum magno virio & exulceratione, calculorum prognata fuerit uberius, dolorumque crebrior recurrit, multis sane difficultatibus implicita ac circumscripta est. Nam quia, complures, ut supra exposuimus, ex sanguine vel præter naturam exsurgente, vel morum incongruorum viscidiorum ac acidorum alimentorum assumptione crudiori ac spissiore reddito, quam facile in hoc malum incidunt; cere sanguinis decemsi missione, motu & exercitatione corporis sufficiente, nec non potionibus diluentibus, aquis medicatis præsertim *Salterianis*, item sero lactis dulci & acido, ad arcendum moleculisimum hunc & exitalem morbum, nihil facile præstabilis ac efficacius reperire licet.

#### §. II.

*Quando præservatio in præservatorio.*

Ubi vero continuus fit calculorum parvus, quæ est, uti in usum ducatur, quæ virtute traumatica leniter consolidante & adstringente gaudent; quare a malis retro temporibus est observatum, imo plebis & domesticis constat experimentis, decolorum vel etiam infusorum, ex herbis vulnerariis, & aqua vel cerevisia parorum, ac cum butyro infuso, vel cum melle mixtorum benigniori usu, quodam penitus a malo hoc calculoso fuisse liberatos: cujus generis præcipue sunt, equisetum, virga aurea, hedera terrestris, fragaria, marrubium album, veronica, parietaria, millefolium cum summitatibus, malva, cortex radicis acariæ, lycopodium, bacce juniperi toste, fraga exsiccatæ, acini & fructus cynobati tosti; ex quibus speciebus, cum melle Prussico albo, quod identidem consolidante & balsamica sua virtute reum morbis admodum amicum, electuarium paratum & mane ad cochleatè dimidium usurpatum, superbibendo infusum Thæe, ingens solamen sit, qui per multos annos nephridie calculosa laborant, amulisse, observatum est.

#### §. III.

*Quando præservatio in præservatorio.*

Alia jam, præservandi a calculo, via ac ratio suppetit, per alcalina, quæ acidum & glutinosum, tanquam præcipuum calculosæ concrecionis fundamētum, domant atque destruant; & hinc est, quod cancrorum lapides, mater perlarum, testæ ovorum, conchæ & cochleæ simpliciter paratz, vel etiam usatz, lapis lyncis & judæus, nec non pulvis famigeratissimus *Pothhammeri*, qui ex lapidibus preciosis calcinati consensant credere, vel simplex tantum oleum tartari per deliquium, liquor cinerum clavellarum, vel nitri fixi, nictura tartari, autimorii acris, frequenter in idum ducta, calculorum generationem egregie impediunt, & ab atrociori dolorum concursu corpus vindicant.

#### §. IV.

*Quando præservatio in præservatorio.*

Sunt quoque adhuc plura, non minoris ad præservandum efficacæ, præstidia, quorum legimus usum calculosæ admodum observari proficuum. Et hæc sunt quæ oleosis, pinguisculis ac temperatis & quodammodo anodynis, demulcentibus particulis, spiculisum salinorum unionem, quæ ad

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

concrecionem solidescētem est necessaria, impediant; quantum enim pinguis, exigua etiam dosi admixta, crystallisationis negotium impediunt, ex chymicis perquam notum est. Ad hanc classem merito referre possumus, fructus & semina quæ blando & dulci oleo gaudent, ut sunt, semina IV. frigida majora, milii solis, fixifragæ, papaveris albi, cardui marie, amygdalæ dulces & amaræ; nuclei cerasorum & malorum Persicorum, quæ vel in pulverem cum saccharo vel in emulsionem redacta, frequenter usurpata, non satis ab his, qui huic adfectui obnoxii frequentes sunt, dilaudari possunt. Neque vero, inter optima de speticis ad reum visum corrigenda præstidia, radix glycyrrhizæ, silentio prætereunda est, cujus pulvis vel infusum in demulcentibus & temperandis acris salum particulis, in detergentibus mucositasibus, magne efficacæ est. Atque etiam ex compluribus aliis millefolium equisæ summitates in reum visum specificam plane & mirabilem edunt efficaciam, quando ejus infusum vel decoctum per longum spatium tempore quotidie usurpatur. Vidimus hoc modo aliquot ab omni calculosa affectione, cui datus obnoxii erant, prius liberatos: nam hæc herba multiplici ratione proficua est, & præter virtutem consolidantem & demulcentem, ob oleum vere anodynum, quod exacte cum oleo florum chamomillæ ratione colitis & virtutis convenit, dolores & spasmos sedandi efficaciam pollet.

#### §. V.

Ante omnia vero, si cum in cunctis morbis chronicis, ita etiam in calculo præcavendo, ventriculi & ejus digestionis, nec non alvine excretionis, ut hæc singula se recte habeant, ratio habenda est. Placuit mihi hac in re insignis plane locus AETII, quem cap. XVI. p. 177. prodidit, ita se habere: *præservat a calculo moderatus cibis bonæ concoctionis; nam cruditates non solum exasperant morbum, sed etiam pigriunt; unde abstinere agri, a sature, a cæcis, saporum & abstinere admodum bibant, ac per certum tempus per venient se purgent. Cibos sumant, & quibus neque sature neque cruditates exsistunt. Urinam etiam cruentam utantur, postquam in dies edentes valde percolatam, fæculum, pulegium, calaminem; ex maribus strombus, locustas, gammaros; per plures autem dies radicem eryngii decoctum bibant, similiter dulcam. Oportet aquam per omnem vitam esse purissimam & percolatam, vinum tenue album, urinum cicutæ, exercitioribus utendum modicis & fructuosis in balneo, ex auro alato, ac fere vini usque & pumice. In quo genere TRALLIANUS quoque audiendus, qui l. c. hanc dietæ rationem præscribit: probe faciant, quibusvis aquam & constant omnia quæ ex pipere constent, & non solum acres, sed & crassi succi cibos, ut similitudinem, ova dura, placantes & quæ ex lacte parantur, ipsam lac & casum, item vina admodum nigra & aspera. Ad hæc cavendum, ne agri culicibus induriam ex asperum pluvio confectu, hæc singula rene valde calfaciant. Præterea, ne multum stent; magis vero studeant, ut vel moveantur vel conficiant. Ex paulo ante: bibere oportet, ante amnem cibum, aquam tepidam: nihil rene enim ad recrementum magis vacuo temperatissime reddit, ut non amplius calculus procreare possit; nam temporis spatio igneus coram calor ac sepe aqua exstinguitur. Exinde dubio omni procul prodit secretum illud exitum ZECCHII reatum in suis Consultationibus, nempe haustibus aquæ calidæ ad libitum unam circiter, statim ante prandium. Et CAROL.*

Cc 3 FISO,

PISO. multis ante Zerebiam annis, hoc idem aquae calidae remedium comprobavit, dicens, quod post primum excrementum calculum, nunquam in posterum alii generis fuerint, si quis ulum hunc aquae calidae multo tempore conuenerit.

## CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

### §. I.

*Applacandum ad corpus degremat.*

At vero, cum ad perscrutandum aequae ac potellandum hoc malum, potissimum medici momentum in eo sit repositum, ut pro differenti corporum constitutione, ratione aetatis, temperamenti, lesionis functionum, nec non sensibilitatis aliarumque causarum, alia atque alia medicamenta, debito tempore, & convenienti ordine adhibeat; & re unique duos, quosdam cautiones & observationes, in praxi utiles atque necessarias, hoc loco subnectere. Primo omnium, attente & pensitate considerare oportet: remedia, quae praeservationis vel curationis gratia in usum veniant, non aequae omnibus convenire, neque semper eundem effectum ac levamen praestare, ob differentem valde & mutabilem corporis, ratione fluidorum dispositionem, & solidarum plane peculiarium texturam & inde pendentem sensationem; quae Graecia idiosyncrasia vocatur; quare interdum variari debent medicamenta, siquidem successu temporis, etiam ipsa natura ista affluere solet, ut effectus laudato, quem ante ediderunt, nunc cedere observentur.

### §. II.

*Sape natura sponte calculum protrahit.*

Observatum quoque saepius est, ex improvviso, naturam nullis remediis coactam, sed sibi relictam, se ad calculum protrudendum accingere & feliciter id praestare. Simile quid subinde in partu animadvertimus, cum non ante facile remedia proficiant aliquid, quam in subsidium venerit natura: quae de causa sit, ut empirici saepe suis inanibus remediis gloriam reportent. Solent itaque & in sananda morbis occupati medicus, id probe attendit, quod natura saepe sola, nulla remedium ope adjuva, à violentia spasmus, doloribus & moribus vertat & conqueat; (id quod tamen non intellectui imaginario vitali adscribendum est; cum causae ac rationes physice subsint,) siquidem magna prudentiae medicae pars in eo consistit, ut temporis illud momentum, quo natura se ad agendum & corpus à morbo liberandum armat, sedulo restimetur. Hinc consilium quandoque est, ubi ad tempus frustra adhibita fuere medicamenta, subsistere ac ferias agere, ut quies quasi naturae concilietur, quia ipsa saepius sua sponte & praeter omnium opinionem, plus praestat, quam medicus cogendo & stimulando.

### §. III.

*Quando curare calcidum de l.*

Quemadmodum diuretica & urinam pellentia, eaque paulo actiora & vehementiora, ut sunt terebinthinacea, jutiperina, succinea, allicata, portacea, &c. ex peroselino parata, neque ad praeservationem in plethorici, neque in paroxysmo nephritico, siue in simplex tantum sit, siue simul calculosus, unquam proficiunt, sed malum deterius reddunt atque symptomata exasperant: ita prudens eorum usus non plane damnandus & interdiciendus est. Quare in plebeis,

robustioribus, humidioribus & segrioris naturae corporibus, praesertim ubi praeservandi sine exhibentur, non modo tonum valorem renalem roborando, sed & copiam feri impuri tartari, per renes, ejiciendo, commodam collocare operam possunt.

### §. IV.

Ut tempestiva, modica ac aequali motio siue vectio, naturae in calculis pellendis admodum idonea, & congruorum pellentium ulum, diluentia, praesertim quae mole operantur, ut acida, thermæ, lactis serum egregie secundat, ut celeriter saepe calculi, & sede sua, quam occupantur fixam, dimoveantur: ita etiam observatum fuit, intempestivam vectiorem vel equitationem, plurimum damnum attulisse, quia & sede sua non incommoda calculum expulsum, in transversum egerunt, ut nunc acutis suis angulis membranae sensilis nervae magis fuerit allicita; subsequente inde majori spasmorum levitia, imo lethali quandoque ichthura.

### §. V.

Tempestiva & sufficiente venae sectione non modo ad praeservandum à calculo, non facile superius ac efficacius reperitur praesidium, praesertim, ubi corporis natura ad excruciantem nimiam sanguinis quantitatem est disposita; sed ejusdem quoque remediū utilitas, non raro in ipso paroxysmo sese commendat, nimirum, ubi plethora cum pulsu ceteri, magno assu ac intensa sit associata est. Doloris enim vehementioris ea indoles ac vis est, ut, spasmus liberiosem sanguinis circuium per venas maxime impediens, cum impetu ad alia incongrua loca copiosum sanguinem adducendo, epilepsiam, convulsiones, lethargum, delirium, apoplexiam sanguineam, mictum cruentum, febres inflammatorias & hujus generis alia, de quibus nobis exempla sunt nota ac obvia, conciet; quae singula prudenti sanguinis missione averti possunt.

### §. VI.

Quando nephritis calculosa incidit in corpus scorbuticum, siue impuris excrementis humoribus repletum, & nostro tempore, purpurea grassanti chronica obnoxium; sub ipso paroxysmo, concurrente simul insuperate scorbutica, varia & terroris plena se insinuant symptomata, quae insignem, in praescribendis medicamentis, medici prudentiam requirunt ac desiderant. Neque enim facile assa, nisi diluentia, ac demulcentia, ut serum lactis acidulum, vel dulce, praestanda sunt; ab omni cerevisiae & vini pota abstinendum; serum lactis vero calide, vel temperate frigidum sumum, cum temperatis diaphoreticis, tali in casu maximi usus fuisse observatum.

### §. VII.

Balnea, una quandoque praesentissima levamentis & magne necessitatis sunt; abstinendum tamen ab eis primum, in plethorici nimis repleti & pinguis corporibus, ubi simul spirandi angustia ac difficultas adest. Ante itaque horum ulum, solvenda plethora, alvus laxanda, & dolorum vehementia compedienda.

### §. VIII.

Non raro jungeri affectioni calculosae colica ex haemorrhoidum vitio, convulsiva; prudentis

*Clara nota cum calculo.*

*Profectus alium in paroxysmo non immittitur.*

*De fortiori calidum, allicata, demulcentia, calida.*

*De fortiori calidum, allicata, demulcentia, calida.*

*Clara nota cum calculo.*

Ubi  
quidam  
sunt?

hinc medicus est, huc omnia probe discernere, & acute in prognosi & curatione procedere: maxime omnium vero, ratio est habenda atrocis intestinum doloris, ut vel venae sectione, vel hirudinum applicatione, vel alvi, per clysteres commodos, aperitione, ei succurramus. Saepe fit, ut, quando calculus uno & maximo impetu ferat, per ureteres, intolerabilis per dorsum & totius abdominis regionem, cum magna virium lactura oboritur dolor, qui tamen proutis uno quali momentum conquiescit, quando videlicet celeri insere calculus in vesicam delatitur.

## §. IX.

In  
vitiis  
progre-  
ssu  
spas-  
mus  
fugit.

Ubi diutius torquet dolor & virium adeit prostratio, aetas quoque scilicet vel animi moror praecessit, pulsationque observatur debilitas; opiatum instat veniendi esse fugienda, inter quae pessima massa pilularum de cynoglossa, & ratione, & experientia multiplici confirmatum habemus. Praestit tunc potius naturam analgetica leniter spirituosius aquis, ut sunt, aqua menthae, melissa, liliorum convallium, cinnamomi sine vino, additis uno vel altero grano ambrae & extracti croci, modico quoque vini ulu, erigere, nec non exterius, nixis debiliatum membris intellonum, lentissime spirituosius balsamicis, quantum fieri potest, resiliere.

## §. X.

In  
vitiis  
progre-  
ssu  
spas-  
mus  
fugit.

Ex aquis mineralibus & quidem thermalibus, nullae sunt, quae, ob calorem qui possent terram, potentius calculosum tartareum materiam resolvunt & exturbant, quam ipse *Carolina*; cum quibus tamen providere agendum. Vidimus, post hanc usum interitum, inter mentis symp- tomas, quingentos & ultra calculos, leves, qui lenis & cicicris magnitudinem aequabant, successisse fuisse excretionem. Sed postea blande consolidantibus & temperate balsamicis opus est, ut cavitas repleta calculi inclusi exhaulet, in se coeant & carne replantur: omnium vero securissimum, & usatissimum praeservatorio quatin curamini, aquilinum esse fontem *Selteranum*, qui praeter subtiliorem aquam, sal alcalinum in suo foveat, neque nimis in vinis & lesionibus vesicae reliquis omnibus remediis superior est, innumerabili experientia evictum habemus & scribitur. Deinde quoque, ubi magna scorbutica humoribus inhaeret impuritas, atque simul adeit partium exulceratio, dictum fontem cum lacte, debito modo miscere, & sufficienti spatio temporis spatio adhibere, consiliosissimum est.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Vir  
generosus  
in  
dignitate  
Consilarii  
Car-  
neae  
constituitur,  
quinquagenarius,  
complexionis  
admodum  
robustae,  
quandem  
jam ante annos  
a tertiana  
febre,  
indignem  
sibi  
coneraxit  
venen-  
culi  
intestinarum,  
cum  
fluentia  
abdominis  
& crebrioribus  
ructibus  
conjunctam.

Vir generosus in dignitate Consilarii Carneae constituitur, quinquagenarius, complexionis admodum robustae, quondam jam ante annos a tertiana febre, indignem sibi coneraxit venen- culi intestinarum, cum fluentia abdominis & crebrioribus ructibus conjunctam. Ante X. annos verogo caput crebris corripuit, quae superveniente & naribus haemorrhagia mox cessavit. Postquam vero circa aequinoctia venae sectione in admittente corripuit, immunita praeterea ab hoc affectu permansisset, nisi venae sectione fuerit omissa, ubi brevi post insiluit quendam de novo est expertus, Seximum elapsum est, ex

quo graviores saepe numero a calculo renis si- nistri passus est dolores; postquam nempe virum magis sedentariam coluit. Major doloris atrocitas in regione inguinali sentitur, calculo circa introitum vesicae persistente, & tunc pauca cum ardore prodiit urina: acerbior in lecto dolor est, minor, si ambulare potest atque etiam sui motu & largiori infusi Theae potu; ita calculi descensus in vesicam cum insigni levamine saepius procuravit. A clysteribus & linimentis anodynis, item ab oleo amygdalarum dulcium inter- ne summo, insigni percipit levamen. Si dolor urget, facies flava evadit, corpus sudore frigido perfunditur, adit nauses, vomitus & praecordialis anxietas. Debet sedulo sibi cavere a cibis qui inflant atque etiam a frigore boreali: ab his enim paroxysmus facile resuscitatur. Extra accessiones urina multum temper sublimi continet. Colica etiam flautentia saepius ipsum affligebat. Consilium quod a me exegit, dedi, ut mutaret potum, qui erat domestica crassioris substantiae cerevisia: & nostram *Labyrisensem* diuretica & anephrastica virtute celebratissimam libere- ret. Dein iusti, ut singulo mane insulum sum- missum mellisoli cum radice glycyrrhizae las- pius paulo sumeret, & ter in mente pilulas meas balsamicas mane usurparet, summa prius, praece- denti die circa totius horam, laeti mei aperiivi drachma. Filientiae quoque carminativae *B. W. delii* cum liquore anodyno mixtae usum interpo- landum, ad flautum discussionem ordinavi. Qua methodo per aliquot jam annos a dolore ex cal- culo prostratus liberatus est: neque a flatibus & ructibus tam molesta, ut antea, sunt incom- moda.

## Epigris.

Et veriginem & nephritidem calculosam in hoc agro, tum a nimia sanguinis & humorum exundantia, tum a pravo primarum viarum statu originem suam accepisse, extra omnem dubitationem collocatum est, ubi concursus vira- lidentaria & potus cervicis crassioris & minus diureticae, ac flautum in primis viis, praeterit quae hypochondrii sinistram occupant, coepit, ad calculorum ortum & generationem, in sinistro praeterit rene plurimum contribuit. De cerevisia Lohesjuncti, quae ex aqua valde levi & subtili, festinante ex petroso tractu, coequit, insuper valde tenuis, minus spiritusosa & alba est, ac cito per urinam decedit, hoc memorandi dignum est, quod & a calculo & a podagra omnes fere immunes sint, qui ordinario eam bibunt. Maximum profecto & curationis & praeservatio- nis a calculo momentum, in quotidiano congruo potu positum est: hinc qui dispositionem, sive haereditariam, sive adiciam ad calculum habent, cerevisias inebriantes & crassiores omni studio vitare debent: laudantur vero cerevisiae tennes, albae, valde diureticae & quae non flatu ingenerant. Ubi non salubris haberi potest cerevisia, ego decoctum, radicis eryngii, graminis, asparagi, chinæ, feroculi, cichorei, glycyrrhizae, addito pauxillo nitri ad potum, non sine insigni subsequente succellu commendare solent sum. Neque omne vinum calculosum utile est: Mostellum ad praeservationem, quia citius per alvum & urinam rediit, omnium est opti- mum. Ubi autem calculi parvis ex labe tenum inveteravit, vinum multum bonae noxae vel recens Hungaricum moderata dosi sumum est val- de proficuum.

## OBSERVATIO II.

*Dolor & spasmus  
in calculi  
renali in  
placenta.*

Vir in L. ætatis anno confectus laute semper ac vinoſe diſcite affuevit, ſanguinis ac ſucci plenus, ceterum ſatis ſanus, inopinato in ipſo itinere, per aliquot miliaria curſu quo vehabatur ſacculuſ, dolore in regione lumbari valde acerbato afficitur; domum reverſus dolor increſcit, & ad umbilici regionem ſe protendit. Accedit niſſa vehementi, alvus conſtipata & urina guttatim cum ardore exit. Remittunt per intervalla dolores. Niſil ad ſopindum dolorem & quod ad ſacilem calculi excluſionem pertinet ex remediis diureſis & pharmaceutia fuit omiſſum: ſed citra præſentateſum effectum. Ex conſilio amici ſumit inſuſum Thée, cum aliquot olei amygdalarum dulcium uncias, ad menſuram & ultra. Inde excitatus eſt vomitus & cum magno niſu multa eiecit aqua & pinuſola: non ita multo poſt, dolores & alia ſymptomata quieverunt, & altero die inſignis magnitudinis calculus cum urina excrevit eſt. Penit a me ad recidivam præcavendam, remedium. Suavi venæ ſectiōnem iter in quovis anno celebrandam & inſuſum herbe veronica, ſummitatum millefolii & radicis glycyrrhiæ multa in quantitate ſumendum. Et nunquam abſtine ruſus a calculo moleſtiis perſentiſ.

## Epiſiſ.

Non ſemel ſed ſæpius, a motu paulo fortiori per curſum vel per equitationem, calculum propterea deſerpente acerbiffimas paſſiones produxiſſe novimus. Evenit hoc, quando in pelvi concretus calculus latitat, ſalvo renum parenchymate. Annotavi quoque aliquoties, & a motu corporis validiori, & fortiori in vomitu niſu, lapidem ex anguſtiis mearum, inſerzato in veſicam elicium fuiſſe, præſentato mox ſequente levamento & ſymptomatum mitigatione. Venæ ſectiōnem, ubi ſanguis abundat, ego ad præſervandum & calculum arcendum, maximi ſemper feci & facio: nam ſicut hæmorrhoidum fluxus, reſtante id Hippocrate veſuſſimo medicinz patente, ab hoc malo præſervat: ita ubi hic fluxus deficit, vicariarum venæ ſectiōnem præſtare optam poſſe, & ſanæ rationi & experientie contentaneum eſt.

## OBSERVATIO III.

*Dolor nephriticus  
in calculi  
renali in  
ſcintilla.*

Vir qui vix quadrageſimum annum attingit, ſanguine conſtitutionis, texture mediocriſ & macilentioriſ, nullo unquam morbo nedium calculo correptus fuit, conſeſſionibus & poculis ſæpius interſuit; deſerpente in vehemenſem circa regionem lumbarem incidit dolorem, cum horrore & refrigeratione extremorum. Succedit vehementer ætus cum pulſu celeri & magna ſiti: alvus eſt dura & ſtans diſtenta. Quidam morbum pro ſublatiōne venerarum doſſi, ad quam tamen deſuit occaſo, exiſtimarunt; alii habebant ym febre ardente. Sed quum conatus addeſſet ad vomitum, & urina pauca cum ardore profluere, circa vias urinas vium ſubſeſe judicavi. Dedi, præmiſſa clyſteribus & foramenti extremis, liquorem anodynum, decoctum hordei cum amygdaliſ dulcibuſ in emulſionem redactum; cui porio niſu ad aſſum reſtingendum adjecta fuit. Sed levamenti inde niſil liquebatur. Quum vero ſiti, ætus & dolor urgerent, die quæ erat quarta, ad arcendum quam veretur inflammacionem, venæ ſectiōnem in pede ſuavi, & ſanguine ad ali-

quot uncias educlo, non ita multo poſt magna remiſſio omnium dictorum ſymptomatum ſequenar. Continuvimus cum ante dictis remediis, alvus clyſtere aperta, urina liberalius profluat, dolores ſopiti, ſudor occupat totum corpus, & ſeptimo ab invaſione die, per urinam, arenacea tantummodo grana, ſplendida & acuminata, nullus vero calculus prodibat.

## Epiſiſ.

Dolores ex lumbis acrores quando repente invadunt, febrilem interdum typum ſervant: quo ſæpe factum eſt, ut morbus pro febre ardente habitus fuerit; quod maxime fit in ſanguine repletiſ, quando plexus nervi meſenterici vel ſtatis in duodeno vel cælo ſtagnantibus, vel poſius ab adjacente arteria interſeſa ſuperiore ſanguine valde diſtenta fortiter premitur, & denum ipſi renes & ureteres nerviſ per conſenſum ſive ſecundario compatiuntur. Redius vero ſecundum meam ſententiā hic morbus, dolor nephriticus noſtus vocari poſſet, ubi videmus in *Krækeri obſ. 58. cent. II.* Fruſtra tunc ſola anephritica opponuntur, quæ niſi per venæ ſectiōnem, ſanguinis in locis affectis congeſſio tollatur, omni propemodum effectu carent. Niſlo ſanguine clyſteres carminatiſ alvum ſubducunt & quæ nimium ſanguinis ebullitionem ſedant, præſentaneam opem niſiſle obſervavi: quin imo in dolore valde acuto a calculo, venæ ſectiōnem ad arcendum inflammacionem in corpore ſanguine pleno ſubterit, & ſcliciorum ſemper medicamentorum operationem animadverti, quo ex *TRALLIANO lib. IX.* inſignis locus reſpicit: *Si ſanguinis capium ſubſeſe aut inflammacionem una cum calculi obſtructione ſuſpicieris, venæ omniſo ſectiōnem prius adhibeto: ita nempe haud deliquit, ſi medicamentum offerat; laxante enim ſelle, & meatibus rarefactis multo magis auxilia quæ adhibentur propriam vim opſeſſent. Quæ ſententiā obſervatione *XV. cent. II.* a *RIVERIO* notata magis adhuc confirmatur: vidus dolor nephriticus vehementiſſimo vexatur, qui a rene ſuſtro ad pubem uſque, ſecundum longitudinem interiori exporrigebatur, cum urina arenacea & frequenſi milturitione: huic neque clyſteres cum aqua benediſta neque cum terebinthina; neque cum laudano, neque vomitus ingens qui ſponte veniebat; neque ſemiſcupum; neque laudanoſum ſſantium quicquam profuere, dolore clamoſo per biduum perſeſſerant. Tandem aperta ſunt venæ malleoli, & ſtatis ſanguine niſſo dolor ingens quæſu, ſuſpiſſus tamen dolore obſuſiſ.*

## OBSERVATIO IV.

Fœmina annos quæ habebat XL. a parentibus nephritic calculoſis nata, ante viginti jam annos, bis minimum in anno tormento hoc cum conſueſſis ſymptomatibus comitato, excruciatu fuit. Singula novitius alii quædam fruſtrata cum ſpirina vini ad præſervationem ſumit. Venæ ſectiōne rariſa uſa; ac jam modo per annum & ultra eam omiſſerat. Per ſex meſes permolleſſus in lumbis ſiniſtro continuo afflicto dolor, qui protenſus ad inferiora, ejuſdem pedis in eodem latere movendi potentiam & contracturam induxit. Perpetuus in urina emittenda eſt ardor. Afflicto laeri incumbere ægeriſne poſſet: nam increſcit ſemper dolor & fit acerbior. Abdomen ſtatibus turget, appetitus languet, liquida plus juſto appetit, pedes ſemper frigidi, ut ab admoſ valde calidis integumentis vix incaleſcant. Menſis quidem tempus ſuum ad-



## De acuto dolore &amp; spasmo ex calculo renali. 305

huc servant; sed quando imminens atrox dolor & spasmus totum abdomen pervadit. Quæritur à me fuit, anne hoc malum tolli penitus possit, & an thesæ Carolinæ proficere sint?

## Epistola.

Plura sunt in hoc casu, quæ & observationem & censuram merentur. Primo ut omnes aggritudine, quæ à parentibus ad liberos transimantur: ita etiam nephritides calculosæ difficillime evelli & eradicari possunt, & mox in adolescentiæ vel juvenutis ætate sese sistunt, æque accuratissimam viæ rationem exposcunt: nam *calculus hæreditarius dispositionem*, ut eleganter dicit ARTEUS lib. II. cap. III. *faciendam, sterilem nemine reddere potest: facilius enim est curam à pariendo prohibere; quæ si non observantur & morbus per multos jam annos inveterat; nulla convalescentiæ spes superest*: ob hanc potissimum rationem, quæ affectum hæreditarium ratio in solidarum partium nativa labe & vitio posita est: quod in acutum deductum crescentibus ætate majorem vim acquirit. Quam perniciosa sit, in tali affectione hæreditaria, jellennium ut alibi & aliorum præmarus usus, exprimi vix potest: nam causticis ejusmodi rebus plus adhuc renam substantia læditur, quam ob rem non mirum est, in valde mulierem agram non solum fluxum fuisse coëctam, cum procul omnino distat in rene sinistro insignis ulcera jam præcis fuit corruptio: ubi ab æquarum mineralium & præsertim *Carolinæ* potu, qui si proficere debet, largissimus sit necesse est, habens abstinere, qui sufficiens aquæ solidae partis corruptionem magis augeant. Ego sub tali statu ad mitigandos dolores balnea aquæ dulcis commendare soleo, sique acerbiores sunt, trochiscos de alkekengi, qui modicior, ad scrupulum, dosi, præstare solamen afferunt. Extra paroxysmum decocta de infusa ex minimis traumaticis, omnium convenientissima sunt: inter quæ radix altheæ, eryngii, herba hederæ terrestris, venonica, virgæ aureæ, urtica mortuæ, summitates millefolii, bacce alkekengi, cortex radicia acaciæ, semen dauci, feniculi, item bacce juniperi testæ, si ex his paratur infusum & adjecto melle Prussico alio dulcificatur, longo & præstabili usu & efficacia se admodum commendat. Huc pertinet etiam decoctum anaphrasicum *Forski*, quod ob insignem aptitudinem ingredientium virtutem non laude sua defraudandum est, pariter syrupus diathæsæ *Ferneli*: atque decoctum herbæ equiseti ex cerevisia alba, adjecto butyro infusio & melle, plebeium & domesticum quidem, sed non spernendum remedium. Plus enim semper efficaciz & securitatis à temperatioribus istiusmodi Galenicis & simplicibus, quam à præiosis exoticis, ut sunt acemella, parera brava & id genus alia, & activioris indolis chymica sperari potest. Nam, ut ingenue fitear, uti victus quo simplicior, eo gratior & salubrior: ita etiam idem de medicamentis valere existimo. Ego quoque in tam inveterato malo, non sine insigni fructu, medicamentum leniter alvum subducens, ex manna atque rhabarbato, per infusionem paratum, vel rhabarbarum cum terebinthina in pilulis redactum commendat & usurpare soleo: nam qui calculus & non integros habent renes, si quam maxime sibi providere debent, ut intestinali excreto probe respondeant.

## OBSERVATIO V.

Dolor nephriticus cum hæmaturia & calculo.

Illusterrimus Comes, sex supra quadraginta annos natus, sanguineæ & robustæ constitutionis, à primis annis integra valetudine gavisus, in deliciis

semper habuit venasiones: ex quo factum, ut interdum imum usque venetum in piscinas & aquas stagnantes se demitteret. A longo inde tempore pedes habuit valde frigidos, ut servidus panis vix ad calorem naturalem reduci posset. Per decem annos usque eo hæmorrhoidalem excretionem passus est, singulis ut plurimum mensibus, quæ vero per duos aut tres quandoque resisterunt. Imi ventris doloribus, quos ipsius & fluxus excitant, nunquam fere obnoxius fuit: inopinatum autem acerbissimos dolores lumbum sinistrum, ubi ren situm observari, invadens, qui interdum ita asperati sunt, ut summus hic vir nec ambulare, nec se erigere, posset; atqui stationem suam nonnunquam delevenerunt & imum venum occuparunt, juncto simul vomitu & ciborum fastidio. Duobus abhinc annis, longinquo itinere peracto, rigida duos calculos cum acutissimis doloribus supinas, per urinam una vice excrevit; quorum minimi magnitudinem feminis carnibus æquabant. Ex ita immanis illi dolores simul & semel expirarunt. Interea dolores circa lumbos in sinistro latere insisterant sæpius, quandoque comite summo cruciata, qui excretis calculis, cum multa pinna remittitur factus. Hoc non obstante fluxus hæmorrhoidalis omni biestri spatio permansit. Sub equitatione quicquam etiam cruciatus noctu reddidit. Missus est ad Carolinæ; a quantum potu per XXII. dies sub debito regimine continuato, per vices, decem, viginti & ultra ducenti, cum urina, albi & cinerici coloris calculi emissi sunt; cupis sedimentum erat valde tenax & viscidum, igni injectum odorem foetidum volatilis & urinosum fignens. Peracta cura, consilium dedi, ut balneum *Toripense* per quatuordecim dies in usum duceret; & optime inde se habuit. Penit à me, ut præservationis gratia curam inflamaem, quæ sequens fuit. Ordinavi infusum, ex speciebus leniter traumaticis, quarum in superioribus facta fuit mentio, mane loco Thæ sumendum. Dein tertium minimum quotannis, præmissio peluivio, venam pedis secandum fusi. Tum pro potu ordinario, decoctum ex radicibus scorzonere, graminis, chinæ, cortice ligni salicis, semine feniculi, & pulvis præscripti. Posthæc, usum pulveris antinephritici bis vel ter in septimana, cum emulsione amygdalina sumendis, commendavi, ex hac formula. Recipe lapidam cancerum unciam sextam, cochlearum usularum, feminis hyopodii, aranci duplicari, niiri purpurati ana drachmam, olei macis guttas VI. M. f. Pulv. D. Demum, quæcumque pilularum, quæ alois ingreditur, quarum insignem antea quantitatem sæpius devoravit, item purgantium usum, studio & non sine fundata ratione, splendido hæc viro, non secus ac alius qui renem vitio laborant, præsertim si sanguine corpora superabundans, penitus interdixi, & chylitres injucendos esse præcepi. Quorum remedium diutius continuato usu, & studiose simul servata accurata victus ratione, summus hic vir tortura & tyrannide tam immensum dolorum à tam frequenti calculorum parva provenientium, liberatus, jam sanus & incolumis, per Summi Numinis gratiam degit.

## Epistola.

In hac mediæ enarratione & ejus curatione, plura occurrunt præctica momenta paulo curatius observanda. Primo, quod & fluxus hæmorrhoidalis & calculus simul in uno subjecto obvenire & incidere possunt. Quod quibidam paradoxum videri possit, qui sanguinis per venas fides profusum, pro censuismo, adversus calculum & podagram, periculo ac præservativo agnoscunt. Verum aliquot

aliquot mihi obvia fuerunt exempla, eorum, (in quae primis celeberrimi medici B. *Dolei* recorder) qui nephritici & podagrici, fluxui haemorrhoidali, his alternatim graviter infestantibus, obnoxii fuerunt. In praesenti casu considerationem meretur, quod refrigeratio, pedibus à longo tempore à defensu in stagnantes aquas inducta, sanguinis motum versus abdomen nimium urgendo, in corpore praeteritum plethoricum flagrationibus cum in renibus in intestinorum volumine, à quibus hi dicti morbi propulsi sunt, ansam praeberit. Secundo, tam copiosa calculorum per unam vicem, exclusio, parenchyma renis sinistri, à copiosiori sanguinis concretionibus, plane viriatum, labefactam & destruetum arguit; quandoquidem sine valculorum urinariorum ruptura & extravasatione humoris, tam larga accretio lapillorum fieri nequit: sed notandum quod hi calculi minus compacti, valde friabiles & tophacei fuerint, qui longe facilius & citius ex mucosae quodam viscido terreo, generari possunt, ac duri & compacti. Tertio, mirabilis plane thermarum Carolinarum in est effectus, ut miris, ex, sale suo alcalino, flos viscidus resolvantur, exulceratas partes munden & canaliculos mucosae obstruere ageriant, quo postea roborantia & traumatica meliorem & auspiciorem operationem exerere queant.

## OBSERVATIO VI.

*Nephritis calculosa cum podagra, in Senio, ex massae pilularum de cynoglossa usque.*

Incidit in memoriam casus quoad ab usum anodynorum memorabilis, qui in principibus Halberstadiensi, olim mihi obijt. Erat vir venerabilis religiosus, dignitate Abbatis ornatus, LXX. & ultra annorum, sanguineo cholericæ complexionis, staturæ macilentioris, ingenii præcellentis, calculi & podagrae doloribus jam diu vexatus. Hic ipse suas sibi erat medicus. Praedicabat mihi sapientum balnearum aquae dulcis, cum, si nimium urgeteretur calculo dolor, pilularum de cynoglossa insignes ad dolorem soporandum virtutis. Ad excludendum vero calculum, oleum amygdalarum dulcium cum succo citri, item succum citri cum matre perlarum, se usurpasse affirmabat. Extra paroxysmum liberali infusi Thée erat potator. Per plures annos hæc praesidia non sine felici successu se usum fuisse memorabat. Sed ob quosdam fortunæ insectos sibi obtingentes casus, & inde consecutum animi mororem, vires cum appetitu non parum languescere & corpus cum facie lurida marcescere coeperat. Post aliquot tempus, calculus consuetum more renem sinistram adoriēbatur, & diutius paulo ac ante dolor lumbis & ureteribus inhaerens persistebat. Ipse pro more sumebat pilulas de Cynoglossa ad X. grana, usum earum aliquoties repetendo. Sed in ingentem conjectus virium prostrationem meum consilium requisivit. Ego accedens, ipsum offendi omnibus viribus dejectum, cum pulsu valde debili & fornicatæ, qui proximam mortem significare solet. Analeptica probatissima virtutis externæ & internæ in usum ducebam, sine tamen effectu. Dolorem quippe nullum amplius percipiebat, soporque cum extremorum frigore eum opprimebat; ita ut secunda post accessiōnem meam de placide obiret.

## Epirrhia.

Quæ dolorum soporantia atrociam remedia, quæ inter palmam opiatæ tenent, minime è praxi medica exterminanda esse, ego quidem persuasum sum. Aequi idem nobiscum sentire tenentur ii, qui medicos opio utentes impolitæ publice accusare non dubitaverunt, cum nihilo minus in praxi sua pi-

lulas de cynoglossa, quæ, præter opium, semen hyoscyami habent, ad sistendas enormes haemorrhagias frequentem in usum ducant & plurimi faciant. Ego, ante quam liquoris anodyni mineralis præstantia, quæ virioli sulphuri debetur, in compocendis & lidandis enormibus haemorrhagiis de doloribus, mihi innotuit, non infelicitè opiatæ rite correctæ me usum fuisse, allevero. Sed uti omnia magnæ activitatis remedia, ita etiam hæc, pudicum & circumspectionem medici, qui omnes circumstantias probe pensare & ad rationem subducere didicic, desiderant. Ubi enim ætas juvenilis, facies adhuc adit virium, pulsus magnus, & dolorum ac spasmodorum immanitas virium & motuum vitalium destructionem minatur, divinam certe possunt operi: sed ubi perædolorum atrocitas & à morbo præcedente, vel ex morore, jam atritæ vires fuerint, in ætate præteritis senili, ipsa sana, qualem omnibus medicis prædictis appareatur, ratio distictat, ejusmodi remedia summe exiustia esse. Neque distitendum, medicis sanioris præcox præceptis destitutis, sæpe numero ingens damnum & periculum miseris aegrotantibus inferre: id quod probe animadvertit CAROL. PISO l.e. lib. IV. c. 2. inquit: *incredibile est delictum, quod unum credulas imperitæ aut vel laudari nostræ ævo celeberrimi vel pilularum de cynoglossa usum, Thermarum & circumforanei mirantur in urant.*

## OBSERVATIO VII.

*Rheumaticum renem & viarum urinarum affectionem, cum dolore, pedis pollicem sinistæ obfidemque contraxerat, qui venæ sectione admittit atque diagnosticæ internis discutebatur. Post novem dies crucians hi lumbos acriter invadebant, cum magna mingendi difficultate & ingenti circa inguinalem regionem pressio & æthiante dolore, qui invalecent omnem urinæ profusum plane impediēbat. Ad quod symptomata tollendum, nec balneum aquæ dulcis, nec fomenta externa, neque medicamina interna antinephritica cum anodynis refracta junctæ, quicquam profuerunt. Illa quando manu fortiter comprimebatur, urina effluēbat sed parcius, multum tophaceæ albae & renacis materiam continens. Alvus erat obstruēta, & sub frequēti deſcendi cupiditate nihil redibat. Aquam Scheræenæ quæ ad manus erat, post aquæ dulcis balneum, in lecto per duos dies largitè bibendam suavi. Postea tres manæ uncie cum drachma & dimidia cremoris tartari, atque grana sex trochiscorum albandi, in infuso ex aqua fuerunt exhibita; cujus tam felix erat operatio, ut non modo ingens excrementorum copia per aliquot sedes deſcēta, sed & largior urinæ fluxus, non sine insigni levamine, secutus fuerit.*

## Epirrhia.

Rheumaticam renem & viarum urinarum affectionem, si quis prædictam pollicem denominare velit, mea quidem sententia non erabit: nam sæpius observavi, subito eos qui arthritici & rheumatici fluxionibus obnoxii sunt, dolore in lumbis & mingendi difficultate corripit, cum serum impurum tophaceæ & tartareæ materiam referent, ad renale cribrum copiosius ferunt, & in uretere, præsertim ubi introitus est in vesicam, collectum ac stagnans, gravem dysuriam parit: quia propter dolorem, alvi excretio supprimunt, ab intestino recto excrementis saturis, magis adhuc vesicam comprimunt, & dolor & mingendi impotentia augentur. Sub ejusmodi morbi circumstantiis, unque non conventionis

auxilium, præter balnea, aquas medicatas & laxantia, inveniri licet. Ego profecto, si à tali causa ichthuria proficiatur, mirabilem eorum quæ alvum efficaciter aperiunt, sæpius opem expertus sum: nam expedita alvo, & expurgatis sordibus, uberior est urinae ad vesicam aditus, & lege consensio, quam nervosæ partes inter se alunt, ipsa etiam vesica cum ureteribus simul afficitur & ad contractionem atque urinae expulsiorem sollicitatur. Neque temi hanc in rem debet monium CELSI lib. IV. cap. 13. in rem afflicta oportet solvere alvum, si aliter ea non respondet.

## OBSERVATIO VIII.

*Admota  
quadam  
sine anti-  
septimo-  
rum signis.*

Cum maximum curationis & medendi methodi momentum in convenienti, ratione temporis & ordinis, antinephriticorum usu repositum sit; non abs re, sed operæ pretium mihi visum est, generalia quædam eximia in praxi usui, ex longa experientia mihi enata monita proponere atque subiungere. Primo omnium, plurimum scire refert temporis rationem: num recens sit malum; num per plures jam annos quis eo laboraverit; an valde inveteratum? item qualis sit renum status & conditio? num saltem flaccidi & à tono & robore naturali dejecti; an eorum substantia corrupta exulcerata; & seri vel urinae aut etiam sanguinis extravasatio adfuit? Facilius curatio est morbus inter initia, præsertim quando à nimia sanguinis ad hoc viscus in plethoricis fit congestio, vel etiam quando rheumatismo rene sufficitur. Tunc omnia quæ urinam pellendi facultate possint, & quæ acrimoniam salinam causticam conjunctam habent, vel sanguinem renium commovent, perniciossima sunt: sed potius sanguinis missio, per sectionem venæ, hæmorrhoidum apertioem, atque subjectionis diluentium, seri lactis, & aquarum medicatarum temperatarum, item microforum pulverum usus, omne abolivere curationis punctum possunt. Ubi vero jam malum radices egit in renibus, iique late affecti, vel eorundem vascula disrupta, ut latex urinosus subsistens tartaream gravem materiam dimittit, & calculorum frequenter jam fuit excoctio: tunc abstinendum unique est à fortioribus acriteribus & sanguinis massam valde commoventibus diureticis. Nihilominus, quæ urinæ fluxum inter alimenta & medicamenta placide promovent, & majorem materiam tartaream in magnæ molis calculos accretionem impediunt, egregio usui sunt: qualia sunt, præter serum lactis dulcis & acidulum, præter lac asinum purum vel cum sone Selterano mixtum, pariter ac acidulas; jussula ex radicibus quinque apertientibus parata, infusum baccharum juniperi & acinorum cynosbati rostorum, ex medicamentis arcanum tartari, tinctura tartari, liquor nitri fixi, & id genus alia. Prostant tunc etiam, ad ulteriorem corrugationem renis arceandam temperatiora traumatica supra recensita, in infuso vel decocto exhibita.

Si vero malum jam inveteraverit, substantia renum valde corrupta & exulcerata, ætas quoque senilis fuerit; abstinere præstat ab omnibus salinis, & potissimum acerbis diureticis, item nitrosis refrigerantibus, sanguinis missionibus, fortiori corporis motione, equitatione: sed infusa traumatica, cum syrupo dialtheæ *Fernelii* edulcorata, mel Fruslicum cum rob juniperi mixtum, item mel cum pulvere radicis pimpinellæ, si ad illius libitum, uncia hinc adjuvatur, malvaticum juniperinum, moderatus vini Hungarici, Canariensis potus, eleosacchara terebinthinæ Venetæ, balsami de Mecha, de Capsaiva, quando videlicet sacchari unciæ

horum drachma admisceatur, item balnea temperata ex aqua dulci, omnium tutissima & convenientissima sunt. Malum enim est incurabile & usque ad mortem comitatur; hinc non nisi mitigantia & vires resistentia desiderant.

Cum vero nihil utilius nihil salutaris nephriticis & calculosis unquam, præservandi imprimis scopis, deprehendum fuerit, alvo libera atque aperta, & primis viis à sordibus & excrementis probe expurgatis; præcipua omnino medici intentio esse debet, ut, si natura hac in re deficiat, commodis & idoneis alvinam excretionem promovere student remedia. Sed ego hoc in genere, nec tutius, neque convenientius aut efficacius scio & reperti laxans, ipso rhubarbaro electo & optime notæ, quod in pulverem cum absorbente & abstergente sale, vel in pilulas cum terebinthina Veneta redactum & circa lecti introitum usurpatum, leniter & citra virium læsionem, roborando potius renem viscerum & ventriculi tonum, sordes altero die egregie subducit.

Postremo, hanc, circa antinephriticorum & urinam cientium usum, cautelam omnibus mendicibus commendatam volo, ut neque nimium urinæ fluxum promoveant, neque etiam tum tardiores & pauciores reddant: utrumque siquidem noxium; nam si à sanguine, quod fluidum, tenax & albidum est, in nimia quantitate segregatur, remanet crassius, quod obstructions efficit & facile coit; si vero illud in coagulum redactum non abstergiatur & educitur, successive in majorem molem accretit.

Coronidis loco ad illustranda & confirmanda hæc à me suppeditata non inusitata monita, egregium & observatione dignum locum, ex CASPARO HOFFMANNO, huic tractationi antecellere haud dubitavi: siquidem lib. II. medicam. official. cap. 102. p. 483. ita perite scribit: in curatione calculi semper bene distinguere opus est remedia: nam ita pauciores habemus calculos. Qui enim perpetuo inuntur propriis dictis diureticis, præcipue non purgatis primis viis, ad locum officium materiam calculosam adducendo, malum facimus pejus: tanto melius illi facimus, qui præservantibus gravis singulis anni quadrantibus evadunt premis sic dictis viis, dem lacte amygdalino per aliquot dies utuntur. Pro curatione autem aut omnia leniter purgandum; postea utendum domesticis & improprie dictis frigidis, quæ tenem reddunt renibus: Nam in quovis corpore adeit quidem materia calculi, quæ tamen non ita statim coit & concretit, nisi tonus & vigor renum expulsiuus vitietur; unde altero rene bene habente, alter calculosus esse solet. Et hanc ob causam CELSUS lib. IV. c. II. p. 207. renes ubi affecti sunt, & diu male habent, abstinere etiam ab omnibus salis, acerbis, acidis, & liberaliter bibere & mollior solvere alvum jubet.

## CAPUT VII.

De gravi spasmo & dolore vesicæ & adjacentium partium.

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

Vesica, seu pars corporis nervoso-musculosa, desinitur frequenter & ex facili obnoxia est spasmo, per quem, intensiorem & præternaturalem corporis

vesicæ,

vesicæ, nec non sphincteris constrictionem, sive strictionem, coarctationem & fibrarum crispationem intelligimus, & ex quo postea, seu fonte, plures aliæ morbosæ affectiones & symptomata pullulant ac deducuntur.

## §. II.

Grave illud tormentum, quod vesicæ diu inherens calculus læpius excitat, cum assiduo mingendi stimulo & difficillimo ac dolorifico mictu, nonnisi spasium seu causam arguit. Propter spasmum enim strictionem, quæ non modo vesicæ tunicam musculoso-nerveam, sed & ejus sphincterem ipsamque urethram vehementer afficit, dolorum urinae fit stillicidium & tantus nixus in pube, ut urina vix cohiberi posse videatur, quæ tamen, ut primum stillare cœpit, modo iterum penitus retinetur. Accedit dolor in toto coli tractu, qui gravissimus sæpe glandem duodenam occupat, ut annotante HILDANO lib. III. de lûbarum. vef. & BAGLIVO Opp. pag. 343. Ingens hæc doloris, pruritus & continuæ irritationis in glande penis & virgæ extremitate, in adultis æque ac pueris obvia sentia, merito inter pathognomica calculi signa referendus sit. Jungitur quoque crebrior desidendi stimulus, sive tenesmus, ob arctam recti cum vesica connexionem, nervorumque commotionem. Prodit sub hac dysuria urina plerumque alba & turbida, cum sedimento mucoso, eo quod ipse strictionis fibrarum muscularium, fortis strictionis & compressionis, ex interiori mucosa vesicæ tunica copiosius lymphæ exprimit mucidam, glutinosam, quæ immixta urinae, sedimento illud quod fundum petit mucidum suppeditat. Sæpe vero tenuis aquosa minus colorata, sub ejusmodi gravi dolore, & ipsa urina emittitur, qui spasmi mutua consensione & communicatione etiam ad tubulos renum urinarum penetrat, ut non nisi tenuis & æqualem ex sanguine per emulgentes adducto transmittant. Præterea æger sub mictu sæpe gravissimus patitur dolores, crura bina transversim complicit, coxas comprimit, caput ad terram inclinat, manique altera, interdum etiam ambubus, venem juxta pubis regionem quantum potest coarctat & sub ejusmodi dolorifica mictione, tremuli interdum & quasi convulsi totius corporis motus, ut probe observavit VIEUSSEN in Neurologia pag. 203. concitantur. Nam vesicæ nervuli acerrime a quocunque etiam causa vellicati & spasmo afflicti, eundem tremulum & convulsivum motum per nervos intercostales nervis spinalibus communicant & sic ceteris omnibus paribus inferunt. Observamus etiam sub stranguria & vehementi dysuria, alvum obstrui & flatum cum fecibus retineri, qui conquelescente dolore, promte iterum cecidunt.

## §. III.

Constat quoque observatione, hæc omnia recedisse symptomata, & adhuc acerbiora, non tantum a calculo vesicæ, verum etiam a sanguinis stasi & stagnatione intra vesicæ vasa sanguifera, quam læpius sequitur gravis inflammatio, fieri. Vulgaris enim error est, quo hæc pathemata tantum vel calculo vesicæ, vel urinae acrimoniae adscribuntur, cum tamen observationes & dissectiones cadaverum abunde doceant, ægros non modo iisdem symptomantibus, quæ calculus in vesica habens profert, sed & majoribus fuisse affectos cruciatibus, nullo plane post mortem invenio calculi vestigia. Nam quemadmodum à mensium vel hæmorrhoidum fluxu sufflammato, sanguis regur-

gitans ad vasa ventriculi & intestinorum, & intra eorum tunicas sensibiles stagnans, distractione & compressione vehementia tormina, anxietates, dolores, convulsiones ac spasmos concitat: ita etiam, quando vel ex vino & emanatione fluxus hæmorrhoidalis, vel alius ex causa, sanguis ad vesicæ corpus magna copia delatus ibi stagnat, non mirum est, quod in hac sensibili parte, spasmos & quæ ab eis proficiuntur symptomata producat.

## §. IV.

Simili modo à suppreffo hæmorrhoidali fluxu nonnunquam fit mictus cruentus, quo cohibito, dolor, spasmus & inflammatio vesicam infestant, ejusmodi atrox spasmus, qui demum funestam progignit inflammationem, interdum quoque à mensium plenario defectu, & eorum post quinquefimum annum emanatione in foemina plethorici ortum ducit. Ann qui morbis vesicæ moriuntur, inflammatione & liphacelo, ob sanguinis in vasis peritæncæ & fixiore stasim, vasa minima nimium distendentem, percunt, ita plerumque, ut hæc inflammatio non modo vesicam, sed & rectum intestinum afficiat, ubi simul hæmorrhoidalia vasa sanguine nigro infarcita, cum penis livore, & venæ cervicis sanguine admodum distenta & varicose comparent, fident faciem BONETO pag. 673. Observat. 22. & pag. 664.

## §. V.

Est vero unica funestæ ejusmodi inflammationis causa, eaque principalis, validus vesicæ spasmus, qui, quo validior est, eo vehementius sanguinis stasim & incarcerationem in vasis auget, & resolutionem ejus ac dissolutionem impedit, urandem vel in abscissum & ulcus transeat, & chronicum fiat malum, vel in sphacelum brevi tempore perimentem concedat. Ex profecto vehemens ille vesicæ spasmus, qui præterite inflammatione augetur, causa est plurimorum gravium illorum symptomatum, inflammationem vesicæ signant, quæ inter, teste AETIO & ORIBASIO, referenda potissimum continua febris, magnus æstus, dolor, ardor ac tumor infra perinæum & supra pectinem atque pubem, urina ægerima & cum magno conatu & dolorifico ejulatu gurritim facta emissio, frequens desidendi stimulus, quibus demum accedunt bilis vomitus, dolor capitis, sitis, difficilis anhelus, faciei cum oculis rubor, lingua ardens cum nigritie, immodica vigilia, delirium, inquietudo, extremorum frigus ipsaque mors. Dignus memoratur est de funesto morborum vesicæ eventu HIPPOCRATIS locus lib. prænotion. pag. 464. ita habens: *Vesica dura & dolens penitus quidam horrenda & perniciofa sunt, perniciosissima vero que cum febre continua sunt. Eorum dolores (qui utique ipsorum effectus sunt) ab ipsi vesicæ ad occidendum sufficiens, & alvi non erant nec tempore, nisi darent quoddam, & hoc coacta. Solvit autem urina purulenta micta, quæ albam ac livam subsidentiam habet. Si vero neque ab urina quicquam remiserit dolor, neque vesica molliatur, & febris continua fuerit, in prima circuitibus morbi ægrius moriturum esse, timor est.*

## §. VI.

Sunt certe hæc vesicæ inflammationem quæ committitur, inque variis corporis partibus conspicitur symptomata gravissima; omnia tamen paulo curatius considerata, vix aliam causam, quam vehementem ipsorum, qui in vesica, seu parte affecta, incipit & per universum net vasorum partium

*Sæpe enim  
causa  
est  
inflammatio  
vesicæ  
per  
spasmos  
hæmorrhoidum  
vel  
menstrualem  
fluxum*

*Causa præ  
cipua est  
spasmus.*

*Inter  
causas  
sunt  
etiam  
spasmi  
vesicæ  
causa.*

*Quod  
hic  
dicitur  
de  
spasmo  
sanguinis  
stasi.*

*Quod  
pro  
datur  
&  
aliter  
explicatur.*

*Aliter  
enim  
dicitur  
de  
spasmo  
stasi.*

genus inde propagatur, agnoscunt. Nam quando fortissima stricture, de crepatura fibras vicinæ partium, intestini videlicet recti & sphincteri aniprehendit; vel assiduam desidentia calcar, vel adeo impensa adest ani constrictione, ut nec flatui, nec faeces transmittat, neque etiam chylorem admittat. Quomodo saltem valdior spasmus partem cui diutius infestis debet, demum & in ea relaxationem relinquat, fit, ut ani etiam incidentia, præsertim in senibus & infirmis, consequatur. Quandoque vesicæ gravior spasmus ad superiora porrigitur, & quidem ad intestina, borborygmos & tormina causatur, & ubi ad ventriculum pergit, inappetentia, mala digestio & vomitus sunt: de quo consensu vesicæ cum ventriculo præsertim sunt qui habet CELSUS *lib. VII. cap. 27. pag. 486. non quoniam, inveniunt, orio vesicæ vultu, sepe affligi stomachum, cui cum vesicâ quoddam consensum est, ex quo eo fit, ut neque retineant cibum, neque si quis contentus est, concoquant, neque corpus auriat.* Idem porro spasmus vesicæ sub inflammatione, quem nauticam diarrhæam & nervos tunicæque nervos pulmonum ac bronchiorum efficit, agram & difficilem cum anxietate præcordiorum relinquit spasmationem: ad cordis vero mucus & tunicas arteriarum multo magis delatus, duriores, contractos & celiores efficit pulsuum ictus, cum febre continua & siti inextinguita, quæ indem spasticæ stricture mollium & glandularum in lingua & faucibus partium debetur. Majoris vero periculi est, si ad memoratas cerebri & nervorum principia peringit; nunc enim assidue vigilæ, mentis alienatio, convulsiones, extremorum frigus ac horror, inæqualis & intermittens pulsus, mortem significant imminentem.

## §. VII.

Quamvis vero gravis & serpius lethalis symptomata sint, quæ inflammatoria sanguinis, sive sinceri & puri, sive impari flasi in vesicæ vasculis suboriuntur: nihil minus tamen minora minusque funesta sunt illa vesicæ vitia, quæ a sero salio, impuro, corrupto vesicæ tunicæ firmius inhaerente eaque lancinante subnascuntur, cuius generis sunt illi dolores cum valde difficili & guttati succedente mictu. Passim ejusmodi patheum in observatis medicorum fit mentio, imprimis tamen memoratur dignus DRAWITZUS, qui jam ante seculum omnium fere optime, germanico idiomate de *scorbutico* integrum scriptis tractatum, in quo *pag. 350. & seq.* plura asserti observationes & casus agerunt, qui de doloribus sævis sub urina emissionem conquesti, quorum causa non vesicæ labes ulla aut calculus fuit, sed humor tantum impurus scorbuticus, è quibus memorabilis maxime, quem consignavit de latione, qui quomodo nunquam antea ex calculo laborasset, subito atroces in pedibus perdidit dolores, qui hinc depulsi, urethram invaserunt, cum intento ardore & difficultate gutturum vix minigendi, applicatis tamen discutientibus cessarunt quidem, sed ad pedes redierunt, consequente eorundem tumore.

## §. VIII.

Neque minus multoties observavimus in senibus, vesicæ vitia, maximeque dysuriam, tum ob vitam sedentariam, tum ob dyscrasiam humorum scorbuticam, quæ in hac ætate fere perpetua est, imprimis tamen quod cellaribus rheumaticis, arthriticis & podagricis doloribus, difficili acco-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

dere solet mictus, qui repetentibus pristinis doloribus, sponte discedit iterum. Crebrioris quoque observationis est, scorbuticos, quibus purpura chronica nostro jam tempore admodum forlemis, hac, ob refrigerationem corporis, vel alias causis, ut venæ sectionem crebrius influebam, retrocedente, vel in seculo remanente, experiri ingentem mingendi difficultatem cum præcordiorum anxietate, inquietudine, vigilia & interno aestu, quæ, expulsa rursus ad superficiem corporis purpura, dispersant iterum ac evanescent.

## §. IX.

Sed alia adhuc ratione spasmus & dolor vesicæ introducitur, ex renum videlicet vicio. Interdum enim ex his paralitica & viscida materia, interdum calculi per ureteres in vesicam delabuntur. In utroque casu, nisi peregrinus hospes tempelive foras ejiciatur varia bonica mala & in his vehemensissimum spasmus citere valet. Quod si enim tenax & acrior materia est, parietibus vesicæ, imprimis circa collum adheret & stranguriam, dysuriam, teneurum inflammationemque excitat, vel membranas vesicæ clandestine ac lente magis erodit, neque ita hanc exulceratam reddit. Si vero aliarum causarum accessione in calculum tandem illa transformata fuerit, vel si jam factus in renibus ad vesicam migravit, asperidine sua vel pondere hanc continuo licet illi eademque mala quæ modo recensuimus, producat: in posteriori autem casu fundas quoque vesicæ & latera, præsertim ubi calculus fuerit grandior, exulceratur.

## §. X.

Interdum vesicæ collum irritatur, tenditur ac spasmo alligatur, diversæ ab his quæ hæcenus enarravi causæ, e. g. quando gonorrhœa, sive benigna sive maligna fuerit, diutius in hospio suo, hoc est in glandula binis proflatis collo vesicæ appositis, commoratur; mora hic veneris inquinamentis corruptus humor deterior redditus, ulcera nunc leviora nunc graviora, & inflammationes in parte affecta parit, & si horum quoque vinorum curatio perverte peragatur, simili labe alias sæpe paries imprimis proximæ adjacentes afficere, subinde observant. Mingit tunc urina purpuracea, & vesicæ scabies, imo & exulceratio præsertim circa cervicem frequentius accedit. Argue hinc est, quod gonorrhœa virulenta laborantes urinam sæpius turbidam & quæ multum viscidæ & saniosi ponit sedimenti reddant.

## §. XI.

Causarum, unde gravior vesicæ spasmus proficisci non nunquam solet, censum quoque subire videntur, inflammatio intestini recti vel ejusdem ulcus, eadem eorundem vitia, partium omnium interiorum abdominis abcessus, ex quibus ruptis, pus in abdominis cavitatem effusum, vesicæ vesicam tandem progredietur; corruptio imprimis omenti longius protracti, sanguis quancunque de causa in abdomine effusus, aqua in hydropo ad vesicam libere rostra, inflammatio & ulcus uretri maxime ejusdem cervicis, & id genus alia; quorum omnium exempla passim, apud BONETUM & alios occurrunt.

## §. XII.

Devolvitur nunc ad causas externas à quibus vesicæ spasmus provenire possit. Pertinetur vero ad

*Dd* hac

*Inter causas remanentes scorbuticæ.*

*Materia activa & podagrica.*

*Inter causas remanentes scorbuticæ.*

*Inter causas remanentes scorbuticæ.*

*Inter causas remanentes scorbuticæ.*

*Inter causas remanentes scorbuticæ.*

*Inter causas remanentes scorbuticæ.*

huc confusiones & ictus graviores in pubis & perinaei regionibus, scilicet calculi imprudenter inserta, in qua vel a cultri ineptiori administratione, vel à calculi, praesertim majoris & asperioris extractione, vulneris a sectione facti curatio perversè instituta, calicet ad explorandum calculum vel in urina suppressione vel alia de causa incuriosius intrusa, iphincere praesertim vesicae arctum constricto, aut à tumore, caruncula, scirrho vel alio vitio via praecula; fistulae in ano exsistit, in qua aut sphincter arctum cum vesica collo connexus incaute nimis vulneratus, qui ejusdem vulnus negligentius habuim fuit. In foeminis huc referri debet parvus difficilis, in quo vesicam & hujus imprimis collum ita saepe premi asquique, ut inde ulcus & fistula proveniant, MEAURICEAU aph. 285. confirmat. Ceterum hic notari meretur singularis cantharidum malignitas, quae vesicae infestae sunt. Eas enim sive intra corpus affluunt, sive externe tantummodo applicatae, spasmus, inflammationem & ulcera internum clere satis observationibus constat, quarum exempla exhibentur in M. N. C. Dec. I. An. II. obs. 105. An. VIII. obs. 88. Potum denique frigidae post dissolutionem calculi, vehementer spasmum concitare, aut letali gangraena, qua fistuloso ulcere occasione praeberet, ex observationibus practicis constat.

## §. XIII.

Cur spasmus  
vesicae  
per  
men-  
struam  
fistula.

Hic quoad causas quae spasmum vesicae cient, expostis; ratio porro reddenda peculiaris istius phenomenon, cur symptomata, uti difficilis & dolorifica mictio & quae ipsi juncta sunt mala, causa materiali, ut calculo vel dyscrasia scorbutica, perpetuo praesente, per intervalla tantum infestent & tantopere affligant? Ita vero hoc explicandum videtur: omnes aereos in parte nervosa sensibili dolores, paulo diutius obhaerentes, inducant demum & relinquunt in ea, quam tenuerunt, sed debilitatem & anoriam, quae praesente, dolores quidem non amplius percipiuntur, sed propter ipsam hanc imbecillitatem, ibi de novo successive succedentes in corpore impuri humores colliguntur, flagnant & subsistunt, novaeque sic ad resuscitandos paroxysmos gignuntur & enervatur materia. Debilitas enim, teste CELSO, omnibus morbis opportuna; ideoque instar universalis pathologici canonis tenendum: languidas à praegressa morbi violentia partes, quam facile recipere morbosum humorem, qui sensum congestus, vel spiritus, vel à levi causa exagitatus, novum adducit insultum; & hinc merito periodicorum affectuum origo repetenda.

## §. XIV.

Quomodo  
in calculo  
cur.

Pluries observavimus, calculum in vesica existentem, per certa tantum intervalla multa incommoda, ut mingendi crebrius & difficilem conatum, cum ardore & dolore, ventris torminibus, extremorum frigore & virium languore excitaſſe, idque maxime ventis ex bores flantibus, velſi inflantes cibi aut cerevisiae minus desecatae fuerint, aut insolita animi commotio praecellat, aut corporis partes externae nimis refrigerant, vel etiam sanguinis consueti missio diutius omiſſa, hanc procul dubio ob rationem: quod haec omnia ejus naturae ac indolis sunt, ut partem excretionem salutaris supprimendo, partem etiam copiam humoris impus augendo, eum ad vesicam tanquam partem debiliores propellendo, movenda & revocanda novis insulubus oc-

casione praebeant. Crebrioris quoque observationis est, colicas flantes junctas esse vesicae vitio, praesertim ardenti & dolorifica mictioni. & omnia alimena, quae instant, hoc quoque exacerbare, & carminativa contra, sive flatus discutiensia, optimo esse praedidio.

## §. XV.

Ad vesicae morbos qui spasmus stipati sunt referri etiam incerto debet cruenta mictio, quae tamen non omnis, ut vulgi medicorum fert opinio, ex renibus & vasis emulgentibus fit, sed saepius proxime & immediate ex vesicae vasis sanguiferis, praesertim tanta venae haemorrhoidalis externae perruptione, succedit. Cognoscitur sanguinolentus ejusmodi ex vesicae vasis mictus, quando difficultas mingendi conjuncta, ardor cum teneſmo circa anum, spasmus circa glandem & dolor pungitivus à glande ad perinaeum affligit, cum rigida penis tensione, nec non ubi simul adfuit borborygmi & flatulentiae in abdomine, inaspiratione, ructus quoque frequentes juncturum; item si mictio cruenta & stipantia ipsam symptomata post sanguinis missionem in pede, post hirudinum applicationem circa anum, remittunt & cessant. Ex quavis ejusmodi species mictionis cruentae ex vesica non adeo familiaris fit & frequentis, annotata tamen non nunquam fuit, & praestitit observatio HOECHSTETTERI Decur. I. si bol. in cas. 2. M. N. C. Decur. I. an. VIII. observ. 2 j. Mingens interdum sanguis fuscus una cum urina, vel loco hujus urina bruni coloris, instat coctus, ut vidimus in senio octogenario quodvisque equo vetulus fuerat: frigidissima urina sedimentum ponebat densum, rubicundum. Gravissima vero quoque incidere solent ex sanguine intra vesicam concreto, symptomata, quae recenset LOMMIUS in observ. p. 195. crebro enim anima deficit, agra fit spiritatio, & pulsus obscurus, parvus & frequens, oritur multa nausea, animi anxietas & frigida sudor, hinc totus homo fit imbecillus & pallet & extremis partibus refrigerat, qui quidem omnia vehementer spasticae fistulae, quae per totum systema nervorum propagatur, recte ascribenda. Fium tamen etiam a sanguine in vesica condensato maximi crucians & anores vehementes, in ima pube & circa virgam, qui referent observat. jam causa M. N. C. in momento quasi evanuerunt, postquam aeger magnos & oblongos sanguinis gramos, influxu hepatis lucii piscis, mingendo rejecerat. Sed de curatione hujus mictionis cruentae, quae nascitur ex vesica affecta, recte judicat LOMMIUS i. e. quod tardius curetur, quam illa, quae a superioribus locis proficiat.

## §. XVI.

Neque etiam praeterendum, quod vesicae spasmus qui stranguriam & dysuriam parit, ab urethrae etiam, praesertim in senibus, scorbuticis & cacochymicis, valde falli, acritus, tartareis fassa-sulphureis & limosis excrementis partibus referta, nascatur. Tani falli enim quandoque deprehenditur urina, ut linguam ardeat & ex urethra stillans vicinas partes excoerit, quae ungue diutius in vesica stagnans, vellicando fibras nervas, spindenter claudat, urethram angustat, & laceratione & arrosione tunicae ingestes dolores parit. Si vero in urina cum dolore excreta mictus furraceae & exilia ac copiosa filamenta apparent atque subditi; veteres affectum vesicae scabim appellaturae,

tunt, quia mucidam & villofam tunicam arro-  
fam arguunt.

## §. XVII.

ex plethra  
in vita fo-  
detur ac  
mutilatur.

Diximus fuperius, quod quidem calculus in  
vefica continetur occafione fapies præbeat ad  
vehementes & dolorificos cum dyfuria junctos  
fpafmos, per intervalla infefantes; monendum  
tamen & illud eft, quod fpafmi veficæ, etiam  
alii ex caufis proficifcentes, ad ipfius calculi in  
vefica generationem & concretionem primam  
originem & fundamentum frequenter fuppedi-  
tem. Contingit hoc quam maxime in fenibus ple-  
thoricis, vite fedentariæ adfictis & qui ob per-  
forationem languidiorum urinam ordinario valde  
finctam & fcoris tartareis limofis faturatam  
rtingunt. Nam ob fpafmum dyfuria fit, & liquor  
urinofus paulo diutius retinetur, mora deponit  
tartareum glutinofam materiam, quæ falibus  
tartareis involuta, unique principium ad fuccelli-  
vam concretionem calculofam fuggit, nifi con-  
gruis medicamentis opportune fubducatur, &  
urinæ, fublato fpafmo, liber pareatur exitus.

## §. XVIII.

Spafmus  
veficæ  
quando in-  
fubatur?

Inter morbos veficæ utique vehementior ftri-  
ctura, graviffima & fæpe mortifera eft, præter-  
tium ubi cum vehementiori dolore febriß aguta;  
veficæ durities pæna pubem obfervata, alvique  
& urinæ fuppreffio juncta eft. De qua in *Prognofis*  
& *in eorum præfag.* ita fcripta HIPPO-  
CRATES, *vefica dura ac dolentes omnia mala,*  
*peffima frive cum febre continue: non qui dolor in-*  
*de eft, necando bonius fari eße poffet, atque si al-*  
*to non multum deperit.*

## §. XIX.

Quando  
in vita, ve-  
ficæ urina  
natur?

Mixis inflammatio eft, fi dolor atque durities  
eft moderata, fine acuta febre. Varios vero exi-  
tus habere folet, aliquando cricice, eryfipellate in  
cute oborto folvitur & fenfim hacratione difcu-  
titur: vel in fuppurationem vergit; & tunc urina  
eft purulenta quæ album habet & leve fedi-  
mentum: quod fi pure ita erumpente, urina in  
copiâ profundatur; tumor fubfidet, vefica remol-  
lefcit, febris immittitur atque excrementorum  
exitus patet. Peffimum eft, quando in fphace-  
lum leditum mutatur.

## CURATIO.

## §. I.

Plethora  
fubducenda.

Videmus quot & quam gravia mala atque in-  
commoda, ex dolorifico veficæ, urethræ & vi-  
cinarum nervofarum partium fpafmo, eaque fe-  
cundum variz indolis caufas oboriuntur. Nunc  
brevis etiam ftrictimque explicandum erit, quæ  
opportuna via ac methodo hifce malis per con-  
venientia remedia fuccurrendum fit. Quod fi igitur  
ex nimia fanguinis copia vegete nature le-  
nibus præterit, qui vitam diu fine fufficienti  
corpore motu egerunt, hic morbus vel ingruit  
vel faltem verendus eft; omnino maxima præfi-  
dii & auxilii fpes in tempeftiva & fufficienti fan-  
guinis miffione, erit preponenda. Idque eo ma-  
gis quando ex fuficiente tentionum vel hæmor-  
rhoïdum fluxu, aut omiffa & diutius affueta ve-  
titæ fectione vel fuffocatione, mali caufa fuborta  
creditur: tunc monente jam HIPPOCRATE  
*aph. 36. Sect. VI. in urina difficultate fecare oportet*  
*interd.*

Fréd. Hoffmanni Oper. Tom. II.

## §. II.

Ubi feri impuri, fcorbutici, acrioribus, falu-  
nis partibus turgidi, copia peccat, & ab ejus  
colluvie & decubitu in veficam & partes pelvi  
inclusis irruente, aut à fcorbutica purpura; quæ  
noftro tempore frequentior fubeft, malum fuum  
duxit originem; tunc vigili cura laborandum  
eft, ut ab illis heterogeneis impuris partibus re-  
ferta fanguinis & humorum maffa depuretur, &  
nimia feri copia per congruas emulfores educatur.  
Cui fcopo obtinendo, diluente temperata,  
fatis larga quantitate & longiori tempore ufur-  
pata, cujus generis funt acidule temperationes;  
quæ puriori & leviori aqua ac tenero fale alca-  
lino imbutæ funt, qualem prærogativam, præ  
reliquis omnibus aquæ *Spadane* & *Seltzeræ* fi-  
bi vindicant, quippe quæ convenientiffimæ funt  
de apertis pectoris, ænium & veficæ vitiis, ubi  
labem ac vitium hæ partes receperunt, fpecifica  
quadam virtute opifuntur, egregie fani facere  
poffunt. Longe majorem vero utilitatem in pur-  
pura fcorbutica præftant ac fenerant, quando  
per mifcelam cum lacte præteritum affumit, ho-  
rum fontium ufus fulcipiatur.

## §. III.

Sicuti vero dicitur tam in præfervando quam  
in curando malo primæ funt partes, adeo, ut,  
qui leges medicorum afpernantur atque rejiciunt  
& abfurdo fuo vivunt, nunquam à calamitofis  
ejufmodi malis liberari vel faltem levanten reci-  
pere poffint: ita in tam diuturno morbo, ubi  
nervofæ & valde fenfibiles partes affectæ funt,  
maxime id neceffarium eft; eo quod levem in  
victu errorem, nervofæ fufam partem hære de-  
bent. Sedulo itaque monendi agerantur, ut à  
cibis falutis, acris, acidis, inerti vegetabilibus,  
quæ inflant, quæ adstringunt, nec non ab om-  
nium cerevifarum & vini acidi aufferi pona præ-  
fius abftineant: moderatus vero dulcium, imprimis  
Hungarici, ufus, non modo non nocet, fed egregie  
prodeft. Meretur hic allegari locus ex AETIO  
*Serm. XI. c. 22. de fcalvofa vefica; à mordacibus*  
*igitur & quæ humores acres ac falfiores reddunt,*  
*abftinendum. Exhibenda autem vina dulcia, lac,*  
*& gallina, aut badarian, aut aguellorum fufcula:*  
Et quamvis motus & exercitatio corporis, ad  
aveniendos ejufmodi morbos, dum & nimis fan-  
guinis multitudinem refilit, & liberum per vafa  
humorum tranfitum confervat, magnam vim ha-  
beat; tamen, fi dolore & fpafmo affectæ partes  
nervofæ in venter, quæ magis quam motus  
faluarius evadit, qui tunc maxime nocet, præter-  
tium ea motus fpecies, fub qua fanguis magis ad  
inferiora pellitur, ut nimia vocis elevatio & lon-  
gior ac intensior oratio, fuperiorumque partium  
agitatio, geflatio & oneris lubervatio.

## §. IV.

Porro, ubi paffio fpafmica cum ingenti cruetu  
& mingendi difficultate urget, nihil præftamus,  
clyfteribus emollientibus oleofis, balneis atque  
femicupis eße, crebrius deprehendi experien-  
tia; & idem quoque paffum obfervata medico-  
rum confirmant, nec turesque hinc in retu legi  
elegant obfervatio DRAWITZII in libro de *for-*  
*buitro malo* pag. 153. Sunt quoque in paroxyfmo  
ex ufu vapores, ex floribus emollientibus & anody-  
nis, ut funt flores chamomillæ vulgaris, mellio-  
li, fambuci, malvæ, verbafci, milk folii in lacte  
decoctis, debito modo admiffi ad patrem affi. Clam-  
quap-

Si præterit  
de partibus

In paroxyf-  
mo præftamus  
de præftamus  
de præftamus

quippe qui leniendo & muciendo, spasmos & dolores egregie complicant. Interne vero liquor anodynus nollet mineralis, sive solus, sive cum cammarina mixtus, nec non pulveres antispasmodici, ex pulvere Marchionis, specifico cephalico *Michaelis*, nitro purificato, addito pauxillo croci & callores, cum emulsione feminum quatuor frigidiorum majorum propinati, reliquis certe omnibus palmam præcipiunt. Ex eadem hæc remedia, etiam si inflammatio imminet & febris adest, locum habere possunt, modo dosi nitri adaugeatur.

## §. V.

Si ab acris  
transcurren-  
tia materies  
fasciata,  
si, decolla  
prejunc.

Quando denique ex rheumatica quadam partium excrementarum fluxione retrocedente ad interiora, vesica morbum patitur, vidimus fonticulis brachiis inusitos fructum non peritendum præstare. Quo in casu decoctum demulcens ac leniter diaphoreticū ciet, ex radice scorzonæ, farfaparillæ, chinæ, rasura cornu cervi, radice glycyrrhizæ, graminis, cichoræ, ac semine foeniculi concinnatum, nec non liquor nollet anodynus mineralis cum spiritu bezoardico *Bussii* permixtus, nunquam frustra adhibentur.

## §. VI.

Adhuc  
cruciat.

Si mictus cruentus in vesica ortus, spastica vesicæ afflictio jungitur, vel exulceratio supervenit, externe discutiendi & robotandi sine aquam vulnerariam, *Feau d'arquebuse*, vulgo dictam, pubi & perinæ, haud frustraneo sæpe effectu, applicari jussit, vel sacculos ex mentha, melissa, foliis myrti, lauri, floribus rosarum, chamomillæ vulgaris & Romanæ in vino rubro decoctus crebrius externe vesicæ regioni apponi curavi. Interne vero, ne sanguinis grumi in vesica forte relictū cum mico tartareo ibi hærentes coire & calculum producere queant, commodissime, absfurgentia & traumatica leniora, quæ inter emittunt virga aurea, alchymilla, fumariæ hyperici, mellefolii, radix caryophyllæ, altheæ, glycyrrhizæ, ficus, cetera, sub insula vel decocti forma, cum primis si hæc ipsa, melle Præstico, vel syrupo è dialthea *Fernelii* probe edulcorentur, in ulum vocari possunt: sicut non minus decoctum *Fernelii*, item sperma ceti, sanguinis grumini in vesica hærentibus resolvendis remedia aptissima præbent.

## §. VII.

Adhuc  
aperien-  
dum.

Quando inflammatio in abscessum, qui ex symptomatum exacerbatione & sensu quasi ponderis in perinæ & pubis regione dijudicatur, abiit; ut ille manere aperiantur & pus è vesica deriveretur necesse est: diutina enim mora acrius semper hoc redditum, vicinas partes atrox, similique modo afficit atque exodit, fistulas aliæque pessima symptomata introducit. Ad quod gravius malum averendum, injectio lactis tepidi, cum speciebus emollientibus cocti, tenenda est, ac si parum illa proficiat, ultima spes in operatione chirurgica est reponenda, quæ per cultum in eo perinæ loco, ubi sectio calculi, cum magno quæm vocant apparatus, peragi solet, infirmatur. Quam in rem annotationem meretur bins, quæ ex *RIOLANO* desumpta exempla *BONETUS* in *sepalch. Libr. III. p. 634. segg.* In foeminis res aliter cedit, neque in hoc auxilio opus est, eo quod orificium vesicæ amplius possident & liberius ad ipsam accessus patet. Ulcere autem aperto ac probe expurgato, eadem quæ modo memorata sunt in §. præced. remedia, erunt proficua.

## CAUTELE

## §. I.

Quando multitudo sanguinis, sui depletionem exigit, confusius est, per venas superiores primo, ob revulsionem sufficientem, ejus copiam detrachere; altero vel tercio die, derivatoria grata appendendæ sedis venæ, si tumescant & prominent, vel si id commode non fieri possit, in malleolo vel poplite sectio possit infirma. Sub habitu corporis spongiosiori sanguine ac succi pleno, in sexu præterum lequiore, ad revocandos versus exteriora sanguinem & humores, cucurbitula paribus superioribus & inferioribus applicatae plurimum utilitatis afferre possunt.

Sanguine  
derasit,  
que rursus  
infirmum  
da.

## §. II.

Sed monendum hoc loco est, quod hujusmodi sanguinis detractiones ubi plethora urget, in principio, ad inflammationem vel arcendam, vel ubi jam accesserit, ad eam discutiendam, aut majorem impediendam multum valeant & profut; ubi vero non satis est virium & sanguinis, atque exulceratio præsens, plus nocere: quia virium robur detrahunt, cujus tamen præsentia ad expugnandum & solvendum morbum impendio est necessaria.

Quando in  
prole.

quando  
necesse.

## §. III.

In omnibus vesicæ doloribus & spasmis, à purgatione quacunque etiam causa proficiantur, validiora purgantia nunquam exhibere convenit, neque in principio, neque in progressu: metuendum enim est, ne exagitati humores ad partes affectas magis impellantur & præcipitentur. Remittente vero dolore & spasmō, atque morbo inclinante, alvum solvere, & intestina à stercoreis sordibus, quæ per dolores & spasmos plerumque retinentur, liberare, utile omnino, non necessarium subinde est. Sed benignioribus id semper præstandum erit; cujus generis sunt mannata, thubarina, syrupus rosarum solutus, cum sero lactis vel lacte asinino propinata.

## §. IV.

Ad spasmodum ferociam mitigandam præter externa linimenta & fomenta, clysters ex lenientibus & emollientibus confecti, sunt injiciendi, eo quod blando suo calore ac tepore rigidas spasmō affectas vicinarum partium fibras molliendo & relaxando, insignis dolorum solatium atque allevamentum afferant, sed exagria quantitate, ne comprimantur inde vesicæ partes, applicandi erunt.

Clysterum  
non profi-  
ciunt.

## §. V.

Ubi ingens vesicam & ei connexas partes corripuit exulceratio, quæ ex copiosa vitæ materia sedimento, & lenta quadam vires & carnem depalcentem febre apparet; ab interno & largiori *Carolinæ* usu abstinendum esse, ex damno, quod inde emerit, maximo didici: ob flagrantem enim aquam & corrupto & febris intenditur.

In exulce-  
ratione ve-  
sicæ Caroli-  
na non  
prodest.

## §. VI.

Injectioibus anodynæ, ad temperandam humorum acrimoniam, neque minus ad effertatos dolores sopiendos, commodus unicus locus concedendus. Parati ille possunt ex albumine

injec-  
tio.



ovorum no. IV. conquisato & in aquam redacto, addendo lactis feminini uncias duas, butyri recentissimi drachmam: vel etiam emulsiō artificialis ex semine cucurbitæ, papaveris albi, aquaflorum sambuci, rosarum & ceraforum nigrorum concinnari in talem usum & finem potest.

## §. VII.

*Ab omni-  
bus.*

Ab omnibus diureticis, acrisque in spastica hac affectione maximopere abstinendum: nam ubi viæ urinariæ exacerationem passæ sunt, ab adhibito eorum usu dolores & spasmos exacerbantur atque longe crudeliores reddi, nullum est dubium.

## §. VIII.

*Ubi.*

Ubi dolores sunt vehementissimi atque exinde gravia metuenda sunt symptomata, anodyna quæ valde dolorem seruinum compescunt, ne vires nimium frangantur & febris cum urinae difficultate augeretur, vel amenia provocetur, usui possunt esse. Eæ vidi a trochiscis de alkelegeni ad drachmam dimidiam pro dosi summis, agrotantes insigniter sublevatos. Cavendum tamen maximopere ab eorum usu est, ubi ab ætate senili, ab affectu animi, morore præsertim, virum adest proflatio.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Spasmus  
vesicæ  
duratus  
seu spasmus.*

Vir circiter quadragenarius, casusarum patronus, per aliquot jam annorum spatium, immanes plane ac intolerabiles dolores juxta pectinem & pubem, cum summa urinae difficultate & quandoque suppressione, vigilia, virium dejectione, extremorum frigore, & tremore, per intervalla passus est cruciatus, ut lapsus ad desperationem alacritas, viæ sibi finem propter atrocissimam tormina, gladio procurandi sanus duxerit. Tormenta hæc per aliquot hebdomades assidue affligebant, postea remittebant, quamvis non protius cessarent, ita tamen ut officio suo quadrenarius fungi poverit; dein post unam vel alteram, eodem insultu revertentibus. Urina pauca & turbida effluat, viscidum deponens sedimentum. Cumque per aliquot annos hoc malo affectus esset, viribus tandem consumtis, in quadragesimo ætatis sue anno obiit: omnes per totam civitatem in auxilium vocaverat medicos: quorum alii causam tam immanis cruciatus in vesicæ calculum; alii in ejus ulcus rejiciebant. Sed aliud longe partis affectus post mortem docuit scrutinium; vesica quippe integra, omni vacans inflammatione, fuit inventa, nec vestigium sabuli aut calculi in ea reperiunt. Ipsa vero vesicæ membranacea substantia præter naturam valde crassa & densa erat, copiosis amplis ac distictis sanguiferis vasculis, quorum nonnulla calami scriptorii capacitatem aequabant, obfusa, & sanguine crasso & atro repleta.

## Epirisus.

Dolor & spasmus partium nervosarum atque membranacearum, ab humore vitioso, vel intra cavitatem, vel in ipsa textura & compage nervorum nervo-fibrosarum hærentes progignitur. Posterior causa, quamquam minus à medicis usque eo fere cognita, atque in eorum scriptis ta-

Fréd. Hoffmanni Oper. Tom. II.

ta sit, frequentissima tamen: testatur id inter alia, cardialgia, dolore ilei & coli spasmodico, à sanguine intra tunicas ventriculi & intestinorum nervas stagnante subortu. Simili ratione, in vesicâ, quæ ex meris tunicis & membranis nervo-musculosis, subtilis sensationis constat, à sanguine intra vasa nimium congesto & nervas partes divellente ac distrahente, vehementer laborari posse spasmodum, non modo vero est simillimum, sed & sectio in prædicti casu inflata, id luculenter apertum reddidit. Neque mirandum est, quod calaminosi hi interdum cruciatus inducias egerint & ad tempus quieverint, hoc videlicet contigisse, quando ex variis causis sanguinis ad vesicam appulsi quodammodo diminutus & retardatus fuit. Medicamenta, quæ ad dolores levandos, ad acrimoniam humorum obtundendam, ad exacerationem mitigandam, ad urinae fluxum provocandum fuerint exhibitâ, supervacanea & nullius usus fuisse, jam quicquid sagacioris ingenii & judicii medicus ex facili intelliget.

## OBSERVATIO II.

Vir generosus, militem præfectus, LX. & ultra annorum, podagrica doloribus subinde vexabatur, & complures ante annos, fluentes habebat hemorrhoides, quæ tamen per magnum temporis spatium siluerunt. Autumnum dolere incipiunt pedes cum spasticis tractionibus: sed in minime hæc curans, inter aliquot miliarium, sub cæli temperie valde humida & frigida succipit. Dolores quidem evanescebant, sed postea incidit in mingendi difficultatem cum ardore & dolore circa pubem & radicem penis, virium dejectione & coactu ad vomendum, alvo obstituta, horrore artuum & æstu intercurrente intensiori junctam. Ego in consilium accitus, venæ sectionem in pede, quam per integrum fere annum cum neglexisset, fusi. Interne pulveres diaphoretici, nitroso-cienabariis, item liquorem anodynum cum spirite Bullii remissam, ad transpirationem placidam promovendam exhibui. Exteriori regioni dolenti linimentum applicari jussi, ex aqua Anhalina, camphora, croco, oleo nucisæ expresse & pauillatim opii compositum; nec non, ad alvum aperiendam, clysteres emollientes, ex floribus anodyna quadam virtute imbutis, injiciendos curavi. Et intra septem dies, morbo per copiosiores sudores soluto, sanitas fuit restituta.

## Epirisus.

Hanc urinae, cum stranguria & febricula, difficultatem, ab humore seroso acri, qui pedum digitos obidebat, retro pulso, subortam diducavi, & rheumatisum erysipelaceum vesicæ substantiam occupantem pro causa agnovi. Ea quæ propter equalitatem remedia cum intrinsicæ tum externæ usurpanda duxi, discutienti quæ potest facultate, & quæ cum insigni alii fructu in erysipelate affectis vanissima & convenientissima deprehendi. Ex quo, prætex medicæ fundamentis initiati discere possunt, quantum inserit, ad expeditam & felicem sanationem morbi faciendam, veram ejus causam investigare, & statim inter initia, ad eam amovendam congrua & idonea remedia in usum advocare.

## OBSERVATIO III.

*Spasmus  
vesicae, &  
maurina  
fervens  
purpurea  
representat.*

Theologus magni nominis hujus loci sexagesimum aetatis annum supergressus, sanguineae constitutionis, vitae sedentariae, lucubrationibus & mentis saeptionibus nimium deditus, doloribus subinde gravatissimis & pressoribus circa os sacrum & regionem pubis corripiebatur, atque num maxime, quando fetum fecerit sacrum alta voce diutius paulo protraheret; qui, corpore quiescente & sanguine misso, quodammodo remittebant. Purpura scorbutica saepius eum afflixit, tandem in gravem primum per intervalla dysuriam incidit, cum dolore & febricula alternante, & ingenti circa pulem dolore. Demum superveniente paresi manus dextrae: quae quamdiu peristit, remissior fuit dysuria; illa vero evanescente, atrocior vesicae spasmus & dolor cum alij quo urinam mittendi stimulo illico repperit. Duravit hoc malum per aliquot septimanas. Varii generis tentata a medicis remedia. Nullas aliquoties intra morbi decursum, & pedis vena, sanguis: sed circa scrotum. Tanta enim doloris & spasmi in pube & pectine secuta est atrocitas, ut appetentiam ciborum, somnum & vires penitus depercerit, atque urina pauca & cum summa difficultate efflueret, purulenta quippiam matris conserens. Inductus quandoque dolores agere videbatur: sed mox redierant. Tandem vesicae inflammatione, ex parte exulceratione, febreque acuta purpuracea supervenientibus, vitam cum morte, non sine summo totius civitatis luctu commutavit.

*Epirrh.*

Quando in hac gravis morbi historia enarrata phaenomena de circumstantiis probe ratio subspiciat, & paulo attentius consideramus; abunde constare arbitror, causam fucilli hujus mali neque in vesicae calculo, neque in humore acri intra cavitatem vesicae detento, sed in decubitu sanguinis fetosi scorbutici intra membranas ejus delincentis esse querendam & constituendam: quem polica inflammatio cum febre acuta & purpuracea exariosa infecta est. Mea quidem sententia nullum dubium superest, quin a purpura retrocedente, ob usum paulo, intra morbi hujus decursum subinde admissum frigus, & crebrius celebratae venae sectionem, quae distillationem humoris morbifici per exitum cutem valde moratur, vis morbi multum increverit. Flacet vero hoc loco similem quandam notatu dignam observationem, M. N. C. illustratam, adijcere, quae abunde docet, à sero impuro intra vesicæ tunica stagnante lethales fieri posse vesicae inflammationes. Ita enim legimus, *Dec. II. ann. VII. observ. 143.* quendam sanguineo-cholericæ constitutionis a juvenute stragula afflictum, increcente aetate commalsisque in diata enoribus, frequentius ac dolorifico paucæ & pallidae urinae, singulis fere vel vix dimidiæ horæ quadrantis cruciatum fuisse mictu, una cum tenebris. Quod malum posteaquam ultra annum frustra omnibus datis durasset, octo ante obiit hebdomadibus accessisse in urina reddenda impedimentum, brevi tamen iterum cessans, innumisse, doluisse pedes, ac irupisse passim in dorso & pedibus pustulas, cum ardore, subsequente spontanea rupeura, exulceratione, tandemque leniori quasi gangrana. Ma-

ture quidem topicis hac fuisse abacta, in regione pubis autem intolerabilem dolorem subsecutum tam incredibilem, ut ager ejularet, mens alienaretur, parsyli lana sinistram afficeretur, tandemque moribus convulsivis ipsa mors accederet. Exrema post mortem vesica, interior totam nigricantem conspectam fuisse, sphacelatam, sine ullo tam fabulo quam calculo.

## OBSERVATIO IV.

Honestæ femina, in urbe vicina degens, quæ annum superavit quadragesimum, mediocriter sanæ & sanguineae ut vocant complexionis, menstruum fluxum ordinatum perstitit, venae sectionem etiam aliquoties admisit; aliquot abhinc menses, supra vires aliquoties facta onem elevatione, insignem gravitatem insuper ponderis circa regionem pubis & os sacrum percepit dolorem; quo praesente menstruum etiam fluxus parior. Demum ex terrore accedente, spasmus ad lingua acutissimus redditus est, ita ut, agra id ipsum faciente, longe superaret dolores, quos formine in partu etiam laborioso sustinere debent, cum summa urinam emittendi difficultate & continuo mictus & desidii desiderio spant. Excepta urina crassum semper depositum sedimentum, fibrosa quibudam moleculis in ea natantibus. Ciborum perit appetentia, atque somnus, ob urgentem urinæ stimulum, difficilis & interpolatus. Auxilium à me petiit. Ego sanguinem ut in brachio mitteret, & loco cervicis decoctum ex speciebus emollientibus & leniter carminativis biberet, auctor fui. Incidit autem vinum Rhenanum, & ut in quæte corpus servaret suavi liquoris quoque anodynum nostrum cum croci essentia mixtum, at ulum internum commendavi: neque minus insiduum Theiforme, quod herbarum veronicae, virgæ aureae, floris malvae, summitates millefolii, radicem althææ, eryngii, glycyrrhizæ, nucellam & semen fœniculi habebat, mane hauriendum præcepi. Dedi quoque consilium, ut vesicæ regioni frequenter episthema, quod ex vino rubeo cum floribus larentulae, chamomilla Romanæ, sambuci atque rosarum rubrarum decocto, parabatur, applicaret. Hæc quidem usurpavit agra, & quamvis nondum ex toto malum fuerit depulsum, levamen tamen eam exinde recepisse mihi scripsum est.

*Epirrh.*

Affectus qui ex læsa vesicæ substantia oritur, praesertim si per aliquod jam duraverint tempus, curatu non tam faciles sunt ac esse forsitan putarant. Possunt tamen opportunit adhibitis remediis mitigari, ut per plures annos trahere adhuc vitam, licet cum molestia, possint hoc vinio laborantes: cum alias incauta victus ratio, vel importuna per medicamina tractatione, lethalem facile eventum formentur. Perquam enim ardua & difficilis res est, vasa vesicæ sanguinea, a fortiori impetu & appulsu sanguinis in eadem, nimium relaxata, ad pristinum tonum reducere, & motus naturæ aliquoties eo directos avertere. Ex hac porro morbi historia illud in usum convertere possumus, quod à sola causa externa, videlicet corporum gravium sublevarione & gestatione, in sanguine abundantibus, impetiosa ad partes inferiores in abdomine contentas, quæ quo nobiliores & sensibiliores eo gra-

*Dolor vesicæ, ab onere elevationis, ut terrore acutissimus, quædam redditur.*

*Urina superflua et gravitudo.*

viis

vius luunt, sanguinis enasci quæst congestio; quæ certe mulerum, nisi citâ opæ succurratur, funestorum symptomatum fons atque origo evadit. Neque ullo modo mirandum est, congestione illam in nostro casu vehementiores turbas excitasse, quum terror supervenerit, cujus ea indoles ac facultas est, ut universum humorum massam, motu vice plane contrario atque insensibilissimo, ab exterioribus ad interiora cogat atque repellat.

## OBSERVATIO V.

*Urina sup-  
pressa ex  
gonorrhœa.*

Vir annorum XXXVII. sanguineo-choleerici temperamenti, halitus corporis macilentioris, prima statim in juventute, Venetiæ atque Bachi hostis assidue inlaverat, lauto insuper usque vice & victus genere: sinus alias atque robustus, nisi quod aliquoties gonorrhœam dignam facili mercedem deportaverit, quæ semper brevi fuit sanata. Ante aliquot annos, improvise quodam horrore & frigore cum alternante actu corripitur, ac inde in totalem incidit urinae suppressionem. Medicus calculum vesicæ subesse ratus, iussit balneum, & cuncturam ex cantharidibus præbuit; ac applicato cathetere restituta urinae fluxus. Exactis tribus mensibus, idem malum reverteretur, idque aliquoties. Postea aliorum medicorum consilio usus est, qui ordinavit emulsionem refrigerantem & antispasmodicam, quibus uberior & liberior redditus urinae cursus. Anno atque prior morbus denovo cum horrore, frigore, alternante actu, & totali urinae suppressione reperit. Meam vero opem non modo ob præsens malum, sed etiam ob impotentiam quâ laborabat, poposcit. Ego insulam Theiforme, pulverem antispasmodicum, & mixturam ex tinctura tartari, liquore anodyno & balsamo Peruviano commendavi: quibus naturalis urinae fluxus restituitur. Postea urinae non penitus quidem suppressa, sed huius tenuissimi instar, præcio semper horrore per certa intervalla prodit. Semper quando vult maculari, ad orificium urethrae subtilis, postea sensim exillit & indutum madefacit. Notabile adhuc, quod urina subsistat prius, dein cum impetu prorumpat, præcedente sonitu, *als a enn eine Rube zerbrochen wird.* Sanatus fuit, diuturno per aliquot menses fontis Sclerani usu, pro potu ordinario. Et ad alvum laxandum quæ sæpius erat stricta, pulvis magnesiæ cum sacaro duplicato & nitro mixtus conducit.

## Epiirijis.

A gonorrhœa venerea perperam & nimis citò curata, ego in praxi mea, morbos vesicæ & vicinarum partium post longum sæpius tempus demum succelsisse, multoties observavi. Et ratio ex anatomicis quam facile petenda est. Notum enim est glandulas proflatas, quæ plerumque eidem gonorrhœæ constant, collo vesicæ, adeoque quod si quidam de urethrae principio esse annexas. Quod si itaque hæ glandulae vel nimium relaxatæ & tumefactæ, aut hæthosæ, comprimunt vesicæ collum, vel acriter exsiccantes humorem sphaeriterem & urethram spasmo ac dolore afficiunt, mictum difficilem & ad tempus penitus suppressum, imo interdum cum dolore & spasmo consequi, misime mirandum est. Et tale vitium quoque in præfati casu, dictis partibus inherere, symptomata

fatis perspicuum reddunt: nam propter compressum vesicæ collum, ejaculatio lemitis non modo impeditur, sed & urina tenuis quasi filum prolicuiat, & quandoque ejus fluxus penitus intercipitur; quod si vero, ob molem tandem prorumpit, orificium urethrae cum vi aperitur: unde talis sonitus, qualis in casu enarratur, emergit. Ego pro potu ordinario fontem Sclerani usui, cujus eximiam virtutem ac facultatem in renem & vesicæ morbis, ad leniendos dolores & spasmos, urinae fluxum promovendum, cantharides obstruendo aperiendo, atque mucum vitidum detegendum non satis dilaudare possum. Ex quoniam in gonorrhœa in veterata, & in morbis vesicæ & urethrae ex hac procedentibus, per aliquot exempla, mirabilem thermam Carolinarum ponam, & eam quæ saluifera in membrum injectionem crebriorem, deprehendisse; non dubitavi ejus usum & fructum de meliori commendare.

## OBSERVATIO VI.

Quondam in Principatu Halberstadiensis me confabulat magnæ dignitatis vir quinquagenarius, sanguineæ complexionis ac venæ sectionis odor, ob stilinos & immanes fere spasmos & dolores, quibus, præteritum Borea flante, in pubere, perinaeo & radice penis torquebatur. Junctâ simul aderat urinae difficultas, stranguria aliisque pignicis, cum horrore extremorum, atque vigilia. Remittebant sæpius huiusmodi dolores ad tempus, post revertebantur majore vel minori impetu. Quum morbi huius pertinacis & insensibilis primam investigarem originem; accepi, Dn. ægrotantem aliquoties in juventute laborasse gonorrhœa: quæ quidem a chirurgis curata, sed ab eo statim tempore, difficultatem in urina emittenda, cum sensu constrictionis circa has partes ipsum percipisse. Ipse jam a multo tempore, propter continuas in officio occupationes, vias sedentariæ nimium indulgebant: nihilo minus data occasione, quæ crebro utebatur, vinum liberaliter bibit, a victu quoque duro & infumatis carniibus, quibus assuetus erat non abstinuit. Ad levandos dolores, si nihil melius & efficacius inter omnis generis remedia deprehendisse referebat, ac pulcra, in quibus herbae emollientes, ut parietaria, malva cum floribus atque alba decocia erant; quæ etiam cum aqua calida infusa, & cum syrupo dialtheæ Fernelii edulcorata, insigni allevamentum tulerunt. Ego, morbo & ejus causis probe in examen vocatis, eum vix esse sanabilem, propter magnam lesionem in vesicâ & ejus collo, edoci. At quia urina lenam viscidam ac arenosam depohebat sedimentum, vel jam rudimenta calculi præsentia, vel futura, ipsi prælagium feci. Ut itaque morbi ferociam lenares & a gravioribus vesicæ morbis se præsumerent, interdixi cibos salios & infumatos, omnique cerevisiæ & vini genus; ac ut fontem *Waldungensem*, quem jam olim usurparat, pro potu ordinario hiberet, balneis frequentius uteretur ex aqua dulci, decocta memorata ex emollientibus continuaret, ad roborandum vero imbecillum ventriculum, qui perperam fere continuorum dolorum comes est, vini Hungarici opami & recentioris haustulum intra cibos sumeret, ac intra mensis spatium, pilulis ex pulvere rhabarbari, extracto rhabarbari & theberebinthina Veneta paratis, alvum ter minimum subducet, auctor sui iussuque. Quibus

bus monitis, vir summe prudens quam obtinere, ad sexagesimum & tertium annum, nunquam tamen ab omnibus doloribus prorsus immunis, vitam protraxit.

### Epirisus.

Gonorrhoea ex impura venere contracta, quo familiarior juvenili aetate est, eo minus recte ejus sanatio suscipitur; quia affecti non periti & circumpecti medici consilio, sed chirurgorum ope uti consuevit, qui fluxum perurinae adstringentibus nimis cito compescunt; ex quo fit, ut vel statim in graviora incurant mala, vel disposito quadam prava in locis affectis relinquatur: quae demum in propehiori aetate, concurrentibus aliis erroribus vel exurit, atque variis pathemantibus ac vitiis praesertim circa vesicam manifestat. Nam, post quinquagesimum annum, lentior ac difficilior incipit fieri sanguinis in partibus inferioribus & extremis, ut sunt, quae in pelvi parent, per venas recursum & reditus; praesertim in sanguineis qui vitam sine motu & exercitatione, atque in occupationibus agere debent. Quando itaque sanguis non exitum habet, neque per sedis venas, neque per artificialem evacuationem; in vesica & vicinis partibus imbecillioribus facile sublevis, & minimum ibi collectus, propter viciositatem tunicarum nervearum distrahentem & divulsionem, graviores excitat spasmos ac crispantissimas si hinc inde ac utrinque; quia difficultatem moriendi relinquunt. Urina autem mingitur turbida & viscosa, non aliam ob rationem, quam, quod a stagnante intra vesicam substantiam sanguine, humor insular albuminis ovi viscidus magno ritu exprimitur, simili ratione, ac fieri solet in haemorrhoidibus quae vulgo vocantur albae; qui mucus postea cum paribus tartareo-terreis urinae paulo diutius in vesica deinceps commixtus, calculos quam facile in vesica procurat, & non raro ejusmodi affectibus quo laboravit noster paucis adjungitur, nisi congrua vitae, diutae, & medendi ratione id praepediatur. Quod vero levissime Boerhaave spasmi & dolores partium internarum ingravescere soleant, ventis vero ex contraria plaga flantibus minuantur; id a nobis saepius animadvertum est: & quanta vis ac potestas sit ambientis atmosphaerae, quae, à venis, testante Barrotero, nitricae modelatur, partes corporis nostri maxime nervosas distendendo ac strictiores reddendo, inde luculenter demonstratur.

### OBSERVATIO VII.

spasmus  
vesicae, in  
vires seden-  
taria addi-  
ta, sum-  
ma.

Clarissimi nominis vir, magnus literarum, sexagenario major, sanguineo-melancholici temperamenti, qui continuas lubricationibus, medicis laboribus & sedentaria vita maximam suae vitae partem peregerat, ante tres annos mingendi difficultate, cum pondera cuspidam pressorio sensu in regione inguinali corripitur. Urina non modo viscidum sedimentum, sed multa concretamenta calculosa cinerici coloris deposuit. Quae si innotata, succedente tempore, semper propter dolorem & spasmodum, siccitatem, dysuriam, urinae incontinentiam, aut procidentiam & tenebrum, vigiliam quoque, sequentes per annos incrementa, ita vires ejus paulatim attriverunt, ut sexagesimo tertio aetatis anno extremum spiritum redire debuerit.

### Epirisus.

Morbos qui vesicam infestant, ut sunt calculi, exulcerationes, mictus cruentus, dysuria, stranguria, recte de perite sunt, primis aris nostrae conditor Magnus Hippocrates inter aetatis senilis affectus reulit. Ad quorum generationem difficilior sanguinis regressus, tum per venas haemorrhoidales tum per hypogastricas, sedentaria & motus experta vita, sanguinis intermissa detractione, & immixti feri visciditatis tartareae, ob excretionem per cutem, urinam, sub hac aetate labefacta, cumulatulo multum omnino conferre possunt. Sed hos morbos, si ingruant, difficilioris sanationis imo insanabiles esse, gravissimus idem Auctor pronunciat. Piacet nobis hunc in finem ex M. N. C. Dec. II. an. IX. similis argumenti casum adducere, cui finis aetate eodem morbo defuncti anexa prostat. Fuit autem Matrona sexagenaria, per viginti annos vidua, sanguinei temperamenti, quae a deambulationibus plane abstinens, sedentariam solitudinem querebat, ob mororem lacrymis velis sanguis, doloribus ad os sacrum, pariter ac colicis afflicta, aliquando & stranguria; denique etiam pedum tumore: hinc magis motu corpus destituitur. Ingravescere ad os sacrum malo calculos ad pilorum magnitudinem cum sabulo egerat: tandem viribus fatigentibus, appetitu debilitato, crucianibus ita angustiae gravioribus, & accedente tenebris, parum salubri cum fortido & purulento muco excreto, placide animam exhalavit. Aperto corpore intra vesicam rugosa & ad magnitudinem pomi contracta conspiciuntur, & non tantum ulcerata interior ejus tunica, sed vala etiam nigra in ipsa prominens se offerebant, utrinque nimis ampla ut manubrium cultri anatomici fortassis traxi posset, vesica fellis colore insular rob cerasorum cum calculis minutis nigrissimis conspectus se prodidit.

### OBSERVATIO VIII.

Incidit in memoriam casus, quem, ante quinquaginta propemodum annos, cum Mindze Weisphalorum ut Physicus Provincialis medicinam facerem, annotavi. Vir erat sexagenarius, qui, cum ob copiosi spiritus vini ingurgitationem & victum duriorum, vitamque otiosam, rheumaticis & nephriticis doloribus plures per annos obnoxius fuisset, tandem in febrem lentam cum mictu difficili quodque puerulentum dolore gravativo & ardore in humbo sinistro sitapatam incidit. Corpus macie erat consumtum, & vires in dies decredebant. Tandem intolrabilem circa regionem pubis passus est cruciatum, cum totali fere urinae suppressione junctum. Ad quem subleandum, neque externa neque interna probatae virtutis anodyna & discutientia remedia quicquam opis conulerunt. Ex quo factum, ut viribus paucis omnibus deesset, exacto aliquot hebdomadam spatio diem supremum placide subivertit. Concessa à cognatis defuncti corpora sectione, reperi finistrum ulcere penitus consumtum & exulceratum, in pelvi autem insignem, aliquot unciarum, crassi, fortidi puris copiam complexi, vesicae tunicae valde laceratae atque atrosae. Dexter ren satis erat magnus, cujus interius pollicis distensus: ventericulus valde parvus & contractus, eo quod ultimis diebus nihil assumserat, deprehendi.

### Epirisus.

Quid ex-  
stiterit  
vires f-  
ret

Spasmus  
vesicae, re-  
sistens vi-  
ni & c. alia  
vis aetate  
summa.

quid re-  
stiterit  
vires f-  
ret

quid ex-  
stiterit  
vires f-  
ret

## Epieris.

Ex dissectione hoc affectu defuncti cadaveris, id discere & animadvertere licet, servillum vesicæ dolorem & spasium cum urinae suppressione, à causa externa, purulenta nempe materia, quæ ex erosa tenui substantia in inferiorum vesicæ sedem descendit, nervosam membranam extrinsecus corrodingo, contingere posse. Lethalis vero ischuria ex eo secuta fuit, quod non modo collum & sphincter vesicæ ab accretione materie hujus purulenta coarctatus, sed etiam ab urinae copia compressus fuerit: unde factum, ut ulius cadaveris immitti plane fuerit frustraneus. Anqui hic recordor sceleris nobilis aulici ante viginti fere annos infirmæ, qui gladio vulneratus ex lethali ischuria, per decem fere dies durante, *Delitui* quæ est civitas Maineris, sub summis dolorum tormentis animam efflavit. Reperimus, abdomine aperto, in cavitate pelvis uncias aliquot sanguinis coagulati, qui paulatim sensimque ex vulnere non adeo insigni vasis sanguinei in omento stillavit in ipsam pelvim, & valde comprimens vesicæ collum, non modo vehementissimos dolores, sed etiam urinae suppressionem insanabilem reliquit.

Notabiles adhuc erant casus in consulti. medic. sect. III. cap. XC. XCIII.

## CAPUT VIII.

De doloribus & spasmis externarum partium rheumaticis & arthriticis.

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

*Quid arthriticus dolor sit?*  
**V**ETRES medicorum omnis generis dolores, qui vel externas partes musculotas, vel ossium juncturas & articulationes infestabant, arthritidis nomine comprehenderunt atque sic in monumentis suis proposuerunt, ignorato vocabulo rheumatismi. ARETÆUS lib. II. cap. XII. de arthritide ita scripsit: *quibusdam in omnem corporis ambitum vagatur, & deinceps transfusus quoque in dorsi thoracisque musculos sit, incredibile est quam late molimur serpat: vertebra dorsi cervicisque datus & in sinu sacri ossis dolere incipit, & paulo post cum rebus & vesicæ communicatur.* Superiorem vero seculo, Clarissimi Gallie medici, quos inter primas omnino partes, CAROLUS PISO, RIVERIUS, BALLONIUS, CHESNEAU, tenent, dolores, qui medio arua & mulculos cervicis, brachii alterutrius, thoracis antici & pollicis, humeros, scapulas, femora, manus, obident atque affligunt, rheumaticos vocant. Arthriticos autem dixerunt eos, qui in articulis tantum & juncturis ossium resident; ita tamen, ut pro diversitate partium afflictarum differentes etiam denominationes sumpsit fuerint: si enim dolor in pedum articulis consistit podagra; in manibus chiroagra; in cubiti onagra; in dentibus dentagra; in vertebra dorsi lumbago; in articulationibus ossis ischia, dolor ischiadicus audit. Verum nostrum etiamnum tempore, incipientem & facilius transcurrentem arthritidem, chirogram, &

podagram, rheumatismi nomine insignire consueverunt.

## §. II.

Cum vero insignis ratione partium dolentium, causarum, symptomatum & methodi medendi inter rheumaticos & arthriticos dolores sit differentia, cum sufficienti & stabili ratione, medicorum & sagaciorum & peritiorum non affectus specialiori tractationi & explicationi submittere haud dubitarent. Neque est exigui in ipsa praxi medica momenti, arthritidis recentis & incipientis à vera radicata & inveterata differentia.

## §. III.

In rheumatismo, musculi cum eorum membrana communi & tendinibus ubi omnibus infestantur, gravi dolore & spasio hinc inde in artubus atque corporis regionibus affliguntur; in arthritide vero ipsa ligamenta tendinolo-nervæ, quibus invicem ossa conjunguntur & combinantur, quatenus illa peritioribus coherant vehementer affliguntur. Sed uti in arthritide ac podagra incipientes dolor magis in superficie ligamentorum hæret & urget: ita in inveterata, humor vitiosus, dolorum fomes, profundior est situs, & spasmus magis inter cavitates articulorum occupat. Deinceps quoque in eo differentia arthritidis veræ & rheumatismi continuanda venit, quod illa sæpius recurrit, homines misere exerceat, atque longiori tempore insiliat, difficilioris quoque sit sanationis; rheumatismus vero quandoque semel vel bis tantum per omnem ætatem adorianur, neque tam diu inhaerescat, facilius transeat & sanationem promtior em admittat. Variat quoque sæpe ipse dolor: nam in rheumatismo magis est tenivus, pressior, gravatus cum frigore junctus, sine conspicuo tumore ac rubore; in arthritide vero lancinatio, divulsorius, pungitivus & quasi rupturam minans cum insigni tumore & rubore percipitur.

## §. IV.

Sicuti omnia permolestæ sensationis causa est humor five copia five intemperie peccans, itura vasa minima tunica & membranarum nervosarum flagrantia atque congesta, quæ violentia quadam eas distendit, vellicat, divellit, atrodit: ita etiam eandem causam in rheumaticis & arthriticis affectionibus locum habere extra omne dubium esse videtur.

## §. V.

Attenta constat experientia, non modo ætate florescentes, juveniores, sanguineæ, & sanguineo-florescentes complexionis, spongiosiora corporis habitus, ab improbitate admisso frigore, vel veno boreali impetuosis in partem irruentes; sed etiam plethoricos five formosos, five viri vegete alias naturæ, omnia consensum venæ sectione vel scarificatione, post probatam cum primis transpirationem, rheumaticos e.g. in cervicæ, scapulis, humero, dorso, sterno, thorace, dolores vel leviores gradus arthritides experiri: cum natura debiles minus fibrosi & laxioris habitus, à parentibus arthriticis & podagricis genitis, de qua immoderato Venere vel vini usu, comestitionibus, mensis fastigationibus & vehementioribus animi commotionibus, toto & robore valde imbecilles redditi fuerint, veta profundiori & magis perniciosa arthritide.

arthritide imprimisque podagra afficiantur atque excrucientur.

## §. VI.

Quod cum  
principio ar-  
thritidis.

Qui graviore praefertim inveterata arthritide laborat, ita, conqueſcente hac, quam facile in nephritidem calculosam dilabuntur, & cessante hac, in arthritidem alternatim quasi recidunt: insuper quorundam docetur experientia, arthriticos & maxime podagricos digestionis vitio plerumque laborare, & primas eorum vias ractibus, flantibus, spasmodicis & illuvie viscosorum humorum, sub alvo pigriori esse turgidas: quin imo observamus plurimos podagricos esse haemorrhoidarios, sive insultus ac motus, quamvis inaniter & sine bono successu & exitu, haemorrhoidales experiri, doloribus in ossa sacro pertinacius insistentibus & quandoque venis circa sedem tumefcentibus.

## §. VII.

Discrimen  
doloris inter  
rheumatismi  
genia, quod  
arthritici  
rheumatici  
sunt, etc.

Quatenusmodum non una eademque humorum, qui dolores sistent atque ingenerant, in dolores atque condicio est: ita etiam ipsi dolores ratione gradus, genii, & symptomatum rheumatici & arthritici multum habent discrimina. Nam ubi sanguis tantum copia peccat & nondum multis impuris particula est inquinatus, minus solent affligere dolores: id quod in rheumatismo simplici, & incipiente arthritide plethoricorum occurrit. Longe vero gravior horum dolorum species est, quando à feri impuri & excrementici colluvie fovetur & sustentantur. Si quidem ego multos observavi, ut in omnibus doloribus; ita etiam in iis qui partes externas & nervosas graviter afficiunt, rarius solum sanguinem bene temperatum & purum peccare, sed ferro excrementum ut plurimum esse suspensum: ita tamen, ut vel nimis sit tenuis & ferolus, exigua rubicunda consistente portione repleta, vel ferro viscido glutinoso tenaci imbutus delinquit; ipsa etiam excrementicia & impura salia multum ratione acrimonie volatilis fixae salis & tartareae in crasso differunt, quae diversa hinc symptomata producant: ut adeo pro dissidente inter se harum causarum natura & indole, rheumatismus non male à medicis exercitatus in sanguineum, in cacoehymicum, scorbuticum, fixum & vagum, distingui possit.

## §. VIII.

Si autem  
venae  
sanguis  
diff.  
ferat.

Ex quo fit, ut sanguis in diversi generis doloribus à vena emissus, & ratione coloris & consistencie multum differat. Nam, quandoque in aquam calidam immixtus multo tenaci mucro ex fibris varie intertextis constanter abundans conspiciunt; interdum serum quod supernat, mox insulas glutinis vel corii concrevit, non secus ac in peripneumonia graviter affectis evenit; alio tempore serum valde tenue est, & sanguis coccinei coloris, quod fit saepissime in rheumatismo vel arthritide vaga, indicio non incerto, sal ad alcalinam volatilitatem naturam vergens ei admixtum esse. CAROLUS PISO in libr. de morb. ex collect. fers. orindus. Sect. V. cap. III. p. 433. in doloribus externi habitus massam sanguinis tanta serosa colluvie scaturisse observavit, ut seposito in pelvi vigesima vix pars in fundo subsideret, quae sanguinis colorem & consistentiam retinebat, reliquo liquore supernatante penitus aequo, sed obducto pellicula viscida & alba. BALLONIUS quoque libr. de rheumatismo,

Si purior  
serum  
quodam.

aliquoties sanguinem, quem magna copia è brachio detraxit, impurum & in puridum serum resolutum vidit. Ego vero non semel sed multoties annotavi, quod in principio horum dolorum sanguis bonae consistencie, longiori progressu, vel quando malum altius radices egit, admodum ferolus, corruptus & pellicula tenaci imbutus fuerit emissus. Nam sanguis abundans primam quidem causam & originem hinc doloribus praebet, sed sub longiori morbi decursu, motu intestino calido per continuam agitationem in viscosum serum convertitur: quae de causa ipse modo laudans CAR. PISO, eruditissimus scriptor, omnes arthritidis & rheumatismi species inter morbos à colluvie serosa ceteros reuult: id quod etiam urinae copiosae tenues, neque minus limosae & turbidae, atque copiosae foetidi sudores, qui hinc doloribus adungi solent, commensurare videntur.

## §. IX.

Quaestio nunc haud exigui in theoria medica momenti solvenda incidit: quomodo & qua ratione feri viscosi à sanguine qui jugi per vasa & tubulos moni circumvolvitur, separatio, stagnatio & decubitus in partibus exterioribus nervosis fieri possit? Ut vero veterum theoria, subditi physici & anatomici plane desinitus in evolvens morborum causis ac generatione imperfectissima sit, nihilo minus HIPPOCRATES libr. de flatib. ratiocinio mere physico mechanico harum fluxionum dolorificarum causas & modum generationis pulchre exponere amissus est; ubi §. 13. 15. 16. meminit: sanguinem ipsa natura calidum vi coactum, per angustam viam, celeritè, propter obacula & opilationes, transire non posse, & hinc tenuissimum per venas excludere, atque id ipsum tenuissimum liquidum, cum coarctetur, per alios meas fluere, & ubi tandem in loco consistit, fluxiones & dolores in partibus fieri.

Rheuma  
vici, in  
Nippon.

## §. X.

Nos vero, ut genesis horum morborum ad paulo clariorem concepum redigamus, primo causas occasionales & antecedentes, deinceps modum quo invadere hi dolores solent spectare debemus. Jam autem per constantem & indubiam experientiam notissimum est, quod dolores artuum rheumatici incidant frequentissime in ea corpora, quae praecedente intensiori motu, labore & exercitatione aut balneo calido vel aëre nimis fervido calefacta, inclementiori frigido coelo, aut vento boreali subito exposta fuerint; ubi non ita multo post, cum prava quadam horripilatione & lassitudine, dolor gravissimus pressoris & contractoris, hinc inde in partibus v. g. in cervice, scapulis, humero, dorso, lumbis, genibus vel in eo latere quod vehementia borealis venti profundius penetravit, interdum etiam in universo corpore oboritur: qui eo gravius affligit, quo corpus majori sanguinis copia urget. Ego insuper plus vice simplici observavi, permultos à largiori sanguine per venam sectam missione, vel feminas post sanguinis menstrui copiosioris profusionem, vel post eandem ex abortu factam, quin etiam post nimias alvi à purgantibus acrioribus vel sponte à natura inducias dejectiones, penetrant frigide boreali vel humido frigide nocturnae aëre ubi corpora paulo diutius commiserunt, in graves rheumaticas affectiones incidisse: idque non alia ex causa, quam

Ex notis  
feminae.

quam quod frigoris in poros corporis penetrantis vehementia, tubuli minimi venosi, arteriosi, lymphatici, sanguinem revehentes, & ad substantiam partium pro nutritione adducentes, compressi coarctati de oclusi fuerint: quo factum est, ut, cum serosus latex vasis suis amplius contineri de circulari non posset, insul fluxu sese alveo effunderet, in ipsam partium substantiam modo hic modo illic magis exundaverit, sive extra vasa & circulum posuisset. Omnis vero humor extravasatus, cum per ipsam moram à crasi blanda naturali deficiat de indolem plane alienam acquirat, partimque glutinosus tenax, partim acris salis evadat; fit, ut à tensione, compressione, laminatione, & vehementi strictione partium fibrosarum & nervearum mollescentissimi & acerrimi dolores sepiissime cum frigoris glaciari sensu obortantur: sed quandoque etiam accidit, ut serum extravasatum, non secus ac albumen ovi fieri solet, in tenue & corruptum liquorem quod amplius à calore fortiori non admittit coagulatum, faciliat, & ex uno loco praefertim superiorem ad inferiores per porosam partium substantiam de habitum carnosum transeat; nihil enim frequentius in praxi occurrit, quam quod rheumatismus locum suum mutet de ex capite in cervicem, in scapulas, humeros ac pedes praefertim in aetate minoribus transeat, in adultioribus vero in dorsum, coxendicam regionem & femora descendat.

## §. XI.

Constanti insuper experientia confirmatum habemus, rheumaticas atque ac arthriticas affectiones frequentissime circa vernum tempus & mense Octobris, sub insignibus aeris & tempestatum ex calido in frigidum de ex frigido in calidum mutationibus, ventique repente ex emetaria plaga se invicem excipientibus, corpora tam sanguine quam sero impuro plena impetere atque lacerare, de quidem cum febriculosa quadam commotione sequentem in modum: Praecedit spontanea lassitudo de gravitas artuum cum extremarum partium refrigerentia, horripilatione & quodam rigoris sensu; subsequitur anxius interitus aëlis praefertim circa praecordia, concitator de strictione pullus, inquietudo, sitis, inappetentia, alvi obstructio, quandoque spirandi angustia; dolor postea gravis acutus vel gravativus, tendivus, has vel illas partes occupat, qui noctu exacerbatur, non secus ac in fibris catarrhalibus fieri allolet: de una febrilis hac commotio alios gravius alios mitiori gradu affligit, de facilius transeat, nihilo minus dolor in affectu partibus adhuc relinquitur, easque lacerando diuinus saepe perseverat. Cum vero omnis febrilis commotio ejus sit generis de indolis, ut partes exteriores de nervosis ipsam afficiat, de recussissimas valorum radices de apices coarctando de comprimendo, sanguinem de humores in vasibus majoribus de interioribus accumulet, atque in corde de arteriis celeritatem systolen efficiat; fieri aliter vix potest, quin cum magno impetu sanguis in laterales arteriarum ramos, qui sanguinem coloris coccinei non vehunt, intrusus, tandem serosum sui extra vasa porosorem dimittat: de inde dolorum origo fit. Sed monendum hoc loco est, quod dolorificae hae partium sensuum spasticæ strictiones non tam à sero tenui in eas irruente, qui pars maxime distenditur, sed potius a viscidioribus ejus partibus, spiculique de aculeis salino-acribus relictis de incune earum poris de insi-

nuantibus proficiantur. Hinc etiam fit, ut non tam prompte de facile, ob materiam viscosam partibus aëlis impactam, hi affectus medicamentibus cedant.

## §. XII.

Ex dictis itaque luculenter constare potest, impedimentum sanguinis circulum de regressum per minima vasa, proximam de evidentem causam ad generationem ejusmodi rheumaticorum dolorum constituere: id quod clarius elucescere de demonstrari potest exinde, quod, ut ego ipse aliquoties observavi, à pulso strictione ligatura, post scilicet venam, ob infistum paulo gravius vulnus in pedibus intra XXIV. horas relictis, dolor ipsos pedum de maxime pollicis articulos non secus ac in podagra fieri solet, per multos dies cum molestia durans invasit. Idem non ita pridem contingebat celebri medico, qui in ipsa suta certas fore ob causas venam perpendendam curavit, ubi fortiori ligatura ob profundior venae situm opus fuit; sed factum exinde est, ut altero mane, atrocis dolor cum tumore non modo suram, sed ipsos quoque pedum articulos infestaverit, cujus per interna de externa remedia discutientem, ne deterius succederet malum, magna cura de sollicitudine moliri de procurare distulimus. Videmus etiam ex dictis, propinqua admodum cognitione rheumatismum cum morbo articulari conjunctum esse, huncque sepius ita mentiri, ut à quibuscumque arthritidis universalis de vagae nomine insignitur: nam de hac quandoque repente in plures intrat articulos, de spinae vertebrae de juncturas ossium gravius excruciat doloribus. Neque ignotum in praxi est, quod rheumatismus fixus ac vagus in iis qui sepius ac iterum eundem patiuntur, praefertim si aliunde debilitatem contraxerunt, in veram tandem arthritidem transformetur. Et quia hemiplegia pleuritide de hepatitis spuria, de quibus supra actum, item odontalgia species rheumatismi sunt, cerum ac nihil dubi est, quin etiam earum generatio sub iidem causis atque eodem modo procedat.

## §. XIII.

Ceterum illud crebra animadvertione communitum est, nulli aetati, nulli sexui rheumatismum parcere: quos alioquin ab arthritide fere immunes HIPPOCRATES *Dei. VI. aphor. 29. & 30.* pronunciat. Maxime vero omnium videmus, eos, quibus in juventute haemorrhagiarum frequentiores fuerit de dein cessant, rheumaticis esse obnoxiosos doloribus: quod idem ab Hippocrate *lib. II. praerit.* notatum est, ubi nos docet, quod in his, quibus circa articulos tumores de dolores fuerit, viscera plerumque magna subsint, quibus in pueritia de juvenute sanguis à naribus fluere delirari: ac proinde interrogandum esse admonet, de sanguinis eruptione, factane in juventute fuerit; item an pruriginosae, veluti ab urtica puncturae vel in pectore vel in dorso subsint, utpote quae impuritatem feri abunde arguant. Sed quod Hippocrates de haemorrhagiis narium innuit, id intelligendum quoque esse arbitror de omnibus aliis sanguinis salutaribus excretionibus. Nihil enim magis in praxi occurrit, quam quod femine praefertim sanguineae complexionis, post quinquagesimum aetatis praeteritum cessante sanguinis fluxu, nisi tempestive venae sectionibus occurrant, vagis de gravibus hinc inde in partes irruentibus dolorum

Rheumatismus  
est  
arteriarum  
venarum  
autem  
omni  
tempore  
effligit.

Eximio  
pro  
est.

Rheumatismus  
est  
omni  
aetate.

praefertim  
haemorrhagiarum  
effligit.

tormensis afficiantur. Neque amplius incognitum esse potest in arte exercitaria, hæmorrhoidalem fluxum confuetum, si debito modo & tempore procedat, à doloribus & rheumaticis & arthriticis viros immunes præstare posse; quibus sub ejusdem fluxus defectu vel suppressione tandem obnoxii sunt. Neque tamen mihi ignota sunt exempla, ubi in debilibus & cachecticis, præsertim hoc fluxus nec dolores arthritici nec nephritici desierint.

## §. XIV.

*Quid sit hic  
afflictus  
liberit*

Denique quod ad generationem horum dolorum pertinet, non prætermittendum esse arbitror, eos qui corpus valide movent & exercent, qui parcius vivunt, & aquam potant, liberos plase ab ejusmodi afflictionibus permanere; cum contra qui vitam agunt otiosam, vinis & spirituosius potibus & comestationibus nimis delectantur ac Veneri intempestive & nocturnum matutina ætate nimium dediti sunt, gravioribus rheumaticis & arthriticis doloribus crebrius exerceantur.

## §. XV.

*Consequenter  
afflictus  
monet*

Neque hoc loco omittendum est, quod ab aliis præcedentibus & diu inhaerentibus morbis, febribus maxime intermittenantibus, præsertim si male tractas fuerint, insignis ad hos affectus dispositio accedat. Ita BALLONIUS lib. de rheumatismo plurimos vidit, qui, quartana chronica laborantes, sub finem morbi, in graves acutum imo totius corporis dolores inciderunt. Novimus etiam doloribus ventris & colicis diu affligentibus artuum dolores vagos certis periodis infestantes suis acerbos succedisse.

## §. XVI.

*Rheumatismus  
afflictus  
fœdissimus*

Datur etiam rheumatismus scorbuticus, in quo universa lymphæ & feri massa impuris excrementis salino-sulphureis acerbis particulis, que subinde per exanthemata, maculas & purpuras sese manifestant, infecta est, atque ex pæava dura salia diutè, vita otiosa & sedentaria, familiariter acris gravidi & vappidi usura, diuturnaque tristitia, originem suam ducit: & exinde in colicis regionum marinarum soletus & frequentissimus esse solet.

## §. XVII.

*Finem.*

Gravior vero est rheumatismus venereus, qui horrendis dolorum tormentis, noctu præsertim intensioribus, certis nervosis paribus perinaciter inhaerescens, eos qui ex impuro comu, virulento & putrido miasmate universam lymphæ & sanguinis massam contaminantur, misere excruciat. Quæ omnes commemoratae huc usque causæ eo collinere videntur, ut serum sanguinis adaugeant, intemperant ac impurum reddant, robur ac vires paribus solidis subtrahant, excretionem salutare imminuendo, ut postea ejusmodi feri stagnationes, fluxiones ac acerbæ & dolorificæ passionis inde resultent.

## §. XVIII.

*Solventes  
et mox  
per sudorem  
rem.*

Atqui ex hiis jam clarius patet ratio, quare hi affectus salutariter copiosa urinis & sponte sudoribus obortis, nec non hæmorrhagicis excretionibus solvantur, vel cur a variis cum efflorescentiis multum kvamiciis ægrotantes accipiant? quorum pericet aphorismus Hippocraticus LXXIV. Sect. IV. quibus sper est ad articulos

sanctum et fixum, eos liberam urina multa, crassa & alba producit, quæ in leberis febribus quarta die quibuscumque exire incipit. Si vero sanguis à nervis profusus sit brevis admodum sit solutio. Per laboriosas vero labores nonnulli et illius rheumaticas intelligunt, quæ cum sensu doloris & lassitudinis in toto corpore accidunt. Annotatum quoque à nobis sæpius est, artuum dolores, ulceribus sponte subortis in pedibus, conquiescentibus, qui, postquam arte consolidata fuerint, mox resuscitantur. Novimus pariter, immanes artuum dolores, oborta psoæ vel scabiæ lepræ altæ naturam habere, penitus subactos. Nam sicut metastasis matris viriole à paribus interioribus ad exteriores subactissima est, ita contra, quæ ab externis ad interiora & ipsa viscera vergit est perniciosissima.

## §. XIX.

Affectus rheumatici, & incipientes podagrici quam diu in externis partibus versantur, neque perversa tractatione humor vitiosus interius ad nobiliores partes repellatur, omni vacante periculo, nec facile hominem à medio tollunt. Quæ admodum vero in primis annis, atque in adolescentia ejusmodi molestia ac catarrhosis fluxionibus in capite, & rheumaticæ in partibus musculosis cum crebrioribus narium hæmorrhagiis insignem naturæ imbecillitatem sive tonum & robur solidorum deperitum designant: in plures chronicas in juvenili & virili ætate, ratione causæ & genii cum hiis affectibus correspondentes agnoscuntur prælagunt, præsertim quando ex parentibus morboles & hypochondriaci progredi fuerint.

*Asperit  
712. 272.  
Bianco,  
pencille m.  
1696.*

## CURATIO.

## §. I.

Ex hiis omnibus, quæ jam in medium à nobis prolata fuerint, satis abunde intelligi posse arbitror, totum curationis caput & methodum medendi rationalem in eo consistere, ut probe & pensiculate individui laborantis naturam, differentes causas: num incipiens sit, & a sanguinis copia & nimia mole, num à colluvie impuri feri proveniens, & jam malum radices egerit? considerentur, & secundum has circumstantias & differentias indicationes therapeuticas primum formemus, apta dein & convenientia remedia in usum proponamus.

*Indicatio  
mer obor  
pencille.*

## §. II.

Quandocumque igitur corpus evidenter est plethoricum, & rheumatismus universalis omnes propemodum corporis artus cum febriculosa quadam motione graviter impetit atque infestat, adeoque secundum veterum scholas sanguineus est, omnino in venæ sectione & quidem statim in principio administrata, celeritimum & præstantissimum est reponendum præsidium. Id quod jam olim medicorum peritiora agnovimus: quæ de te insignis locus extat apud ALLEX. TRALLIANUM qui lib. XI. ita scribit: si hæmorrhæm, qui in articulo confusus sit sanguinem esse suspicemus, ubi quidem nihil præbet, vacuamentum quæ per venæ sectionem addibetur tentato: hoc enim ratione multos nervi aut in istum morbo liberatos aut raro fluxionibus correptos; eo, quod non neglexerint, sed veris statim initio sanguinem sibi detraxisse curant, non solum vacuandi,

*Vena sectio  
statim in  
principio  
administranda.*



cuandi, sed etiam praeservationis causa id facientes. Id quod etiam nos confirmamus: nam plurimum sanguine ac succis plenus, qui a causa externa transpirationem universalem suffragantur in immensas totius corporis dolores cum stupore & immobilitate partium repente coniecti, unice fere manna sanguinis missione eaque interpede & tuto, urgente necessitate, circa quantum diem repetita prius convalescerunt. Novimus etiam homines sanguineo-cholericis vel melancholicis constitutionis, consistentis aetatis, in dolores choreicos & podagricos mitioris naturae prolapsi, venae sectione circa equinoctia, vel interdiu etiam circa solstitium aetivum admitta, ab istis & praeservatis & immunes redditos fuisse.

## §. III.

Ex qua rheumatismus sanguineus in nulla regione familiarior ac in Gallia est, ob sanguineam incolarum complexionem & victum copiosum sanguinem ingenerantem; non mirum est, praerariatissimos Galliae medicos, qui primum & optime de rheumatismo quicquam solidi & effato dignum literis prodiderunt, hoc remedium genus maxime perit artimare ac collaudare. Ita BALLONIUS *libr. de rheumatismo* inquit: *laudamus impendit phlebotomiam in hoc morbo, quam salutare remedium esse testamur*. Patet etiam CAROL. PISO *l. c.* plurimum momenti tam in curatione, quam in praeservatione rheumatismi, in repetita sanguinis missione sinum esse affirmat, multaque notari perquam digna in eam rem exempla subiungit. RIVIERUS *Cent. III. obs. 42. & Cent. IV. obs. 42.* septem vicibus in juvene, atque in alio viridem insinuat venae sectione, adhibitis paucis aliis remediis, consummat rheumatismum feliciter absque observavit. Maxime omnium vero spectandus LEONH. BOTALLUS primus ille venae sectionis in Gallia auctor, qui *libr. de curat. per sanguin. missionem. cap. XII.* pluribus & rationibus & exemplis confirmat, quantum utilitatis & levaminis praesentissimi in doloribus rheumaticis etiam repetita venae sectio attulerit. Ex Anglia SIDENHAMUS in *Oper. p. 170.* curationem non aliunde ac a phlebotomia petendam esse asseverat, eamque aliquot dierum spatio repetendam. Lectu quoque dignissima est observatio, quae in M. N. C. *Dec. II. an. IX. obs. 120. p. 290.* extat, de rheumatismo universali, sola venae sectione reiterata felicissime & brevi tempore curata. Multo vero magis hoc auxilii genere opus erit tam ad sanandum, quam ad averendum hoc malum in foemina mensuum defectu vel plenaria emanatione laborantibus, vel in viris quando confluxa haemorrhoidum fluxus fuerit suppressa.

## §. IV.

Praeter sanguinis missionem in affectione rheumatica & arthritica calida incipientie & cum febrili aetuatione juncta, temperatiora diaphoretica cum nictosis moderate mixta, mediocri sed saepius repetita & continuata per tempus dosi oblata, ad aetum, fervorem & orgasmum sanguinis temperandum, atque etiam ad humoris visio si lenem & succellivam discussionem aequaliter per universum corpus promovendam, praesentissimum levamen conferre & ratione & experientia suffulsi asseveramus: quo in genere ceteris omnibus palmam praeripiunt, pulveres ex lapidibus cancorum, unicorui fossili, cornu cervi line ig-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. 11.*

ne vel uto, antimonio diaphoretico vel ejus ce-  
russa, succino, conchiis preparatis, cinnabari, ad-  
jecta sufficiente quantitate nitri purificati vel me-  
lus artificialis confecti, qui cum aqua diapnoici  
& leni anodyna virtute conspicui, ut sunt aquae  
florem sambuci, acaciae, ulmariae, lilae, cerastorum  
nigrorum, cardui benedicti, mariae, scabiosae,  
propinandi sunt: neque inutile, sed valde commodum  
erit, ad febriles volaticos aetum melius com-  
pescendos, succi citri quappiam, vel ad grauiam  
lyrupum acetosum citri in convenienti quanti-  
tate adijcere & haec singula in mixturam redigere.  
Pro potu ordinario ferum lactis cum succo citri vel  
cremore tartari acidulatum, aut tamarindinatum,  
vel aquam decodam cum rasura cornu cervi, ra-  
dice scorzonerae, cichorei, glycyrrhizae, grami-  
nis, semine fenniculi, commendamus.

## §. V.

Quandocunque vero rheumaticus ejusmodi af-  
fectionis non tam sanguinis puri & consistentis  
copiam, sed feroci impuri pleuritidem & collu-  
viem, in corporibus praeterit debilitatis sero-  
sa & phlegmatica constitutionis pro causa ag-  
noscat, tunc omnino cautissime, praeterit in  
ipsa curatione cum sanguinis missionis agendum  
est. Recte hinc GALENUS *libr. VI. apor. 47.* scribit: *illius, qui pleuritidem passibus  
subjacentur, per venae sectionem succurrendum  
esse, qui vero corruptus succus in corpore fovet  
puritatem exhibendam, seque hac ratione non  
modo plurimos servasse sanos qui longo ante tem-  
pore singulis annis eam caperentur, sed & po-  
dagram & morbum articulare adhuc incipien-  
tem ex tali evacuatione multis jam annis fieri pro-  
hibuisse. Qui vero jam saepius cum huius fluxio-  
nis conflictati sunt, plus noxae quam auxilii ex  
sanguinis detrachione sunt consecuti, praeterit, si  
corpore sint imbecillo & frigido ac in aetate senili  
continui.*

## §. VI.

Ex quibus jam liquido constare potest, quod  
veterum medicorum peritiora, differentiam dolorum  
maxime arthriticorum secundum causas in  
curando probe observandam esse animadvertit.  
Nam alia ratio est curandi rheumatismum  
vel etiam arthritidem incipientem eumque uni-  
versalem in corpore plethorico, qui a sanguinis  
praeternaturali redundantia ob transpirationem in-  
terceptam proficiuntur; alia medendi ratio est,  
ubi atrox dolor certe tantummodi parti perma-  
nentior inhaerescit, cum ingenti frigoris sensu spi-  
ritus & a vehementia hujus imprudenter admissi  
in corporibus serofiosis excitatus: alia me-  
dendi via inveniunda, quando stans plethoricus  
longiori sub morbi decursu vel inprovida medi-  
catione in flammam cachecticam vel cacochymi-  
cum degeneravit, & putum sanguinis boni &  
consistentis, permixtum vero liquamini serosi &  
excrementis in vasa continetur: quibus in casibus  
ea, quam maxime remedium genera indi-  
cantur, quae feri visio illiuvium blande sed suf-  
ficienter tamen per congrua emacioria, per al-  
vum videlicet, per subcutaneum cribrum & per  
urinas evehant.

## §. VII.

Quod ad usum evacuantium attinet, nullo  
modo hic viagendum, sed paulatim & successi-  
ve biliosa & viscidiosa ferose peritiora & per  
temperatiora medicamina educenda. Cui corpus  
E e ob-

*Alia in  
Gallia  
autem vel  
de aetima-  
tione.*

*Pulveres  
diti di-  
aphoretici  
cum aqua  
diapnoica  
propinandi  
sunt.*

*Quandocumque  
non tam  
serosa  
est causa  
mores  
candunt*

*Cura pro  
differentia  
sanguinis  
puritatis  
debilis*

*Nulla  
biliosa  
viscidiosa  
ferose  
peritiora  
educenda.*

obtinendo, ex nostra quidem experientia, egregie satiasiacum, infusa ex aqua dimidia vini parte remissa, cum radice cichorii, pimpinellae, polypodii, thabarbaro, foliis fenae sine stipitibus, herba cardui benedicti, fummaribus centaurei minoris, agarico, corticibus aurantiorum, cieri, cortice ligni falsasfras, passulis minoribus de tartaro tartarizato leniter decoquenda. Ubi quoque est thabarbarum mansum ad scrupulos duos vel drachmam cum uvis pinguibus vel Corinthiacis : nam nostra certe experientia thabarbarum in substantia sumum abundantius multo & duplo plus quam si in decocto de infuso denat, educit, quippe simul tonum intestinorum & viscerum insigniter roborat. Bis autem minimum vel ter in hebdomade ejusmodi evacuans exhibere convenit, ut fordes ex primis viis à prava digestionis relictæ evocentur, quæ alias ad morbum fovendum & sustinendum, ejusque vim augendam permultum conferunt. Atqui hujus generis alterantibus & evacuantibus, in doloribus periodicis, sive certis horis incurrere atque infestare solitis, nunquam carere non posse multoties edoctus sum.

## §. VIII.

1) Finissem  
serum per  
animum  
diaphoreticum  
evacuans.

Primis viis sic probe evacuatis, vitiosi seri motus, per decocta liberiorum transpirationem quæ expedit & leniter sudorem movent, educere & utilissimum & necessarium est : qualia ex radicibus de lignis, ut radice chinæ, falsaparrille, cichorei, glycyrrhizæ, scorzonera, ligno de cortice falsasfras, ligno satiali citrino, guajaci, ficibus & passulis minoribus parari possunt. Si malum quodammodo radices egerit de inveteraverit, antimonium crudum cum dupla portione pulveris bezoardici & diaphoretici supra descripti, convenienti dosi & tempore exhibitum opem non sperandam præstisse à me pluries observatum est. Ceterum liquor qui diuretica diaphoretica & simul tonica efficacia insigniter sic commendat, ex tinctura tartari, antimonii acris cum liquore anodyno minerali & spiritu tartari decenti proportionem permixto componendus, & commodatissimum remedium est, & præsentissimo cum fructu usurpatur.

## §. IX.

Rheuma  
tymus cor  
poris foveat  
tum infu  
sione dilu  
entibus &  
demulcenti  
bus obli  
gendis.

Quandocunque rheumatismus sive fixus sive vagus scorbutico corpori insidet, & evidentibus se signis ac symptomatibus prodit, curationi paulo longius insistentium erit. Neque enim tam prompte & facile totum lymphæ & seri massa intemperata, corrupta & salinis excrementis partibus deturpata, in nativam & pristinam dulcedinem & consistentiam reduci poterit. Conveniunt tunc maxime diluentia demulcentia, paulo majori copia de longiori tempore exhibita : inter quæ, serum lactis dulce maturnum, vel acidulum tamarindinarum, aut purum cum succis herbarum antiscorbuticarum permixtum, item aquæ minerales temperiores : *Seltzeræ, Wildunger, Transilvanicae*, vel in robustioribus, *Pyrmoniana*, *Egeræ* cum dimidia lactis almini vel vaccini parte maritata, & sub convenienti diætetico regimine usurpatæ, omne fere curationis exoptatæ punctum complent.

## §. X.

Si ex his  
Gallia  
peruenit,  
dantur

Si rheumatismus ex his veneret reliquis in sanguinis massa contentis, ut non raro evenit, originem suam ducit, duriori cuncto opus est,

utpote, nisi decocta lignorum sudorifica, per *liquor. c. an.* antimonii crudi vel etiam mercurii dulcis additionem armata & nobilitata, prudentem in usum *dent.* provocentur, raro speramus & salutaris effectus ob-  
*stant.*

## §. XI.

Quod antem ad ipsa topica, quæ ad humoris certam partem obducenda placidam & succellivam diffusionem quidpiam conficere valent, magna etiam cautio in eis eligenda & exhibendis opus est, ne plus detrimenti quam emolumenti asistant. Si rheumatismus est sanguineus, præstat penitus ab eis abstinere, & tantum moderato & æquali lecti & tegumentorum calore paries dolore affectæ fovendæ sunt : siquidem tali modo longe felicius blanda materies quæ in vino est diffusio & exhalatio promoveatur, ac si variis externis tam adjuvare velimus. Si vero spissus, immobilis & frigidus humor paulo altius & perniciatius, cum frigoris sensu ac strictione pororum, paribus insidet; tunc omnino frictions cum panis asperis & calidis insilant, è sedibus suis fixis humorem tenacem potentissime evocant. Post frictions cucurbitulæ cum vel sine scarificatione applicandæ; ubi tamen animadverti illud debet, quod cucurbitulæ cum scarificatione dolentibus ejusmodi paribus appositæ, cum profundiori etiam vulbusculorum infiltratione, parum admodum sanguinis eliciunt : luculento suis documento, valorem sanguineorum ramulos a spastica strictione ita coarctatos & compressos esse, ut sanguinis circula-rem motum respuant; atque adeo non tam à sanguine nimium ibi congesto, quam ab humore viciato & acri stagnante, hos dolorem facies accendi veri sit simillimum.

## §. XII.

Ubi igitur altius insidet humor & immanes artubus dolores inducit, nunc omnino externis præstidis ex toto carere vix possumus. Licet vero plura hunc in finem magnis ab auctoribus hinc inde celebrari soleant laudibus : ego tamen in nullo majorem juvandi efficaciam deprehendi ac in nostræ inventionis termino invenimus, & sequenti modo conficiendo : rec. aquæ Anthalline uncias duas, balsami Peruviani drachmas duas, theriacæ veteris drachmam. Infunde & per digestionem extrahe : colaturæ adde essentia croci, calicet, nucisæ ana drachmas duas, camphoræ drachmam, M. f. linimentum, quo dolentes artus læpiss inungi debent. Si vero a diutius partem affligente dolore rigiditas, immobilitas cum stupore remanet, quæ affectio paresis nomine venit, linimentum quod habet æxurgiam humanam, cujus duæ uncie cum balsami Peruviani & olei caryophyllorum drachmis duabus permiscetur, mirabilem plane præstisse efficaciam, per crebriorem usum a nobis animadvertimus est.

## §. XIII.

Balneorum quoque tam naturalium quam artificialium caute administratorum usus est insignissimus. At vero nequaquam in principio aut in statu morbi, sed in declinatione potius, nam ad reliquias morbi ex intus sedis suæ penetrabilis moderato sudore eliciendas, tum ad membra per spasticas dolorificas tractiones & agitationes immobilia reddita roboranda & rigida emollienda, usurpari debent. Inter alia vero balneum ex fonte *Lauchbadensi* in Milina, quæ tenerimus Martis crocum alit, atque natura admodum sub-

Thyricum  
sive si  
causæ.

Quando  
mucositas  
est

Quando  
mucositas  
est

Quando  
mucositas  
est

Balnea in  
declinatione  
aut morbi  
conferunt.

subtilis ac levis est, pararum, innumeris exemplis hoc sine & scopo adhibitur, opem desideratissimam tulisse ego religiose possum asseverare: qua de re dissertationem nostram de hoc fonte germanico & latino idiomate conscripam ad legendum atque conferendum commendo.

## CAUTIONES ET OBSERVATIONES CLINICÆ

## §. I.

*Cura vena  
fellestem  
cautela.*

Quantumvis sanguinis missio etiam paulo largior, in externarum partium doloribus, qui à sanguinis spiritibus abundantia & salutaribus excrementis impediis proficiuntur, maxime quando in principio administratur, divinum plane sit remedium: sed tamen, si dolor diutius perseverans, digestionem atque laxabilem chylicitationem ipsasque vires destruxerit, ut serosa magis quam sanguinea plenitudo corpori sit insensa, ipsumque corpus annis jam confectum fuerit, provide certo cum ea mercandum est. Idem remedium est, quando ipsis in paroxysmo cum febrili commotione affligente, metastases materie viscosæ ad externos artus natura molitur; quo tempore, non aliter ac in erysipellate, negotium naturæ salutare turbare & subvertere minime convenit.

## §. II.

*Proferenda  
est cruda  
branda.*

Non semel ego sed aliquoties observavi, venæ sectionem rite ante æquinoctia inlithuram corpora striditiora habuisse, sanguineo-melancholici & sanguineo-cholericæ temperamenti à catarrhalibus distillationibus, item rheumaticis & arthriticis passionibus, quibus crebro obnoxia fuerunt, egregie præservasse, adeo, ut ad avertendos hosce afflicus, præsertim si fastidiosi corporis morio ac labor, abstinentia à potibus spiritibus, à diætâ lactea & carnæ, accesserit, non facile excellenter denar remedium.

## §. III.

*Cura laticis  
quando va-*

Diætâ & cura lactea, ut in doloribus artuum vagis & ubi acrimonia subtilis & biliosa peccat, luo quidem usû & fructu non destinatur: nihilo minus tamen, ubi vasorum, vel à sanguine confusione, vel à nimis serosis adest plenitudo, & ventriculus cum intestinorum tractu atonia laborant, ne inde viscerum infarctus emerget & ad cachexiam via pandatur, abstinere ab ea cautius erit.

## §. IV.

*Si à sup.  
perforis ha-*

Quando sufflaminatus hæmorrhoidum fluxus ejusmodi dolorum causam præbet, consultius est oportune eum procurare. Cavendum tunc, ne venæ sectio in partibus superioribus influmatur, quam in pedibus celebrare expedit. Postea vero, que moderate hunc fluxum movere & clere valent, ad quorum classem referenda pilule *Avicennæ*, *Berberianæ*, nostræ & his similes, interposita pulveribus temperantibus & nerosis, qui æstus internum ad suppressendum fluxum multum conferentem infringunt, subjungenda sunt; que si non proficiunt, & tormina ac vomitiones dolorum externorum comites evadunt, ad applicationem hirudinum, mirabilis nonnunquam efficacitæ remedium, omnino confugiendum erit.

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

## §. V.

Caveat sibi porro studiosissime omnes qui catarrhis rheumaticis & arthriticis passionibus tentari & affligi solent, & quorum natura ad motiones spasmodicas, præsertim ac sanguinis & humorum coctiones parata & disposita est, ab omnibus fortioribus, calidioribus, diureticis, sudoriferis, acronibusque purgantibus, nec non ab omnibus spiritibus ballastis sic dictis que sanguinem in organum concitant medicamentis, item à potibus spirituosus & generosis, post quorum ulum urina valde tinela & rubra apparet: caveant quoque sibi, quantum fieri possit, a potu cerevitiæ, nisi ea sit medicinalis, quali est que non caput gravat, bene per urinam secedit & digestionem adjuvat: sed pro potu vel puram aquam fontanalem vel mineralem temperatam, aut decoctum gratum nullum pariem salubrium sibi eligant. Idque eo majori sedulitate sit observandum commendamus, qui purpuram fortioribus noctri ævi quasi endemum & familiarissimum morbum, vitiabilis succis inmixtam & immertiam surrent atque reconducunt.

## §. VI.

Quando dolor & atrox & pernix inferioris corporis partes ut ossa illichi & onexia diutius obidet, & individua ægotantia paulo sunt robustiora ac firmiora tenentur, medicamina potentiorum efficacitæ & varietatis chymica, ut mercurius dulcis, præcipitatus solutus bene preparatus, regulus animatum medicamentis, que etiam decoctis sudoriferis addi possunt, ad crassum & limum tartarum & vellicatorem humorem & salibus suis intus dimovendum, auxilium utique pollicentur spectantissimum.

## §. VII.

Quando dolores immantier urgent, quod in sensibilibus fieri solet, ita ut vires, appetentiam, omneque sensum adimant, & neque sanguinis distractiones, neque nerosæ & temperantia, neque liquor nocet anodynus in mangina sufficiens, non incoactum est, a lenioribus, videlicet emulsionem seminis papaveris albi & eja syrupo, ad fortiora paulo anodyna trahere, usque ad massam *Galienæ*, *Widermanni*, vel pilulas *Starchi* aut de styace, imo ad unum vel alterum laudanti opiatum granum, addendo croci extracti pauculum confugere: cum alias opiatum non temere in ejusmodi affectibus usurpanda sint, utpote que, ut crebrius observatum, tam continuas ejusmodi affectus reddunt, ut postea omnia alia remedia etiam efficacissima sperant, efferatque habendo & medicis & ægotantibus plurimum negotii faciant.

## §. VIII.

In rheumatismo scapularum incipiente, nihil est præstantius velicatorio intra scapulas posito. Si vero in plethoricis accidet, quod sæpius observavi in formis post ebriantem circa annum quinquagesimum mensium fluxum, cucurbitule cum scarificatione paribus inferioribus singulis mensibus appositæ, juvenum amulorum insignissimum.

## §. IX.

Quemadmodum illa corpora, que ad anomalas solidorum & fluidorum motiones, & ad hominum translationes live coctiones à natura distolunt, & ad anomalas

*Animas ab  
omnibus  
afflictibus  
liberant.*

E o 2  
posita

posita sunt, & vulgo sensibilibus indolis vocantur, mobilissimi sunt animi & ab eas affectibus, qui præcipuum huius morbi causam ac fundamentum subministrant, facillime offenduntur: ita servata animi quies & tranquillitas, sufficiens etiam corporis motus, & abstinencia ab iis rebus quæ multis modis animum turbare atque disponere ad affectus possunt, in iis morbis commendatissima esse debet.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## CASUS I.

*Affectus  
rheumatici  
calcule in  
femore  
pilonica.*

Formina quinquaginta & aliquot annorum; post plenariam mensium cessationem, ante biennium per uterum æque ac per alvum enormes quandoque sanguinis experta est profusiones: quibus medicus suis opportune venarum sectione & medicamentis organum sanguinis temperantibus antispasmodicus leniterque diaphoreticus subvenit, insulam insuper ex millefolio comis, quæ herba maxime sanguinis nimis effusionibus compellendis dicata, subiungens. Quibus adhibitis, factis diu hæmorrhagiæ tam uterinæ quam alviuæ disparuerunt: procedente vero tempore dolores valde graves circa regionem lumbarem & pungentes tractibus circa ossa coxendicis ægra experiebatur. Ad hos mitigandos, licet præter venæ incisionem & leniter laxantia, temperata diaphoretica & nerosa usurpata fuerint, nullum tamen levamen attulerunt; sed persisterunt dolores, fixum quasi locum occupassent. Postea mox ad scapulas & pectus, mox ad genua, reliqua priori lumbi & ossis ischii sede vagabantur, quæ tamen expirante superiorum partium cruciatu densius repetebant. Calculorum quoque interendum excretiones cum urina non sine molestia successerunt, calculos & rheumaticis doloribus crebrius alternantibus: qui tamen acerbiores semper ab animi affectibus & tempestatum varietate redditi, ægram ita excruciant, ut cum viribus penitus omnibus caro quoque consumerebatur, præteritum quam jam per annum & ultra cum hisce malis consistari debuerit. Notabile vero quam maxime id fuit, quod, quam ægra ad constantem & graviores dolorem, qui lumbarem & ischiadicam regionem indefinenter infestaret, aliquo modo leniendum, situm dorsi curvum sibi selegisset, inferiorum dorsi verberarum ligamenta adeo fuerint relaxata, ut è suo quodammodo promissæ prominuerint, & sine dolore crecta incedere vix posuerit. Interca ad dolores tam rheumaticos quam nephreticos sedandos, & sanguinis missiones & anodyna cum diaphoreticis mixta, & aneuphratica temperatoria, aut singula immo plane effectum, præcipere fuerunt. Petii ergo à me salutare quoddam, adversus pertinacem hunc duplicem affectum, consilium.

## RESOLUTIO CUM CONSILIO.

Ex hac morbi descripti historia, plura notanda digna ad usum tam pathologicum, quam therapeuticum accommodanda elici possunt. Primo quidem, quod mensium totalem suppressionem, quæ ordinario circa quinquagesimum annum contingit, in fecundis phtoricis vite sedentariæ addictis & quæ sensibilibus animi atque exterioris etiam corporis sunt tenaxior, graves sæpius hæmorrhagiæ per uterum vel etiam per venas hæmorrhoidales sequuntur: ubi summa cura æque

cautione in applicatione remedium opus est, ne forte adhibitis fortioribus stypticis & opiaris plane stantur, neque etiam modum excedant & sic corpus valde debilitatis alius ex debilitate oriantis morbis anam porrigant. Secundo, in nostra ætate, effusiones sanguinis per hæmorrhoides, quæ haud infeliciter sæpius mensibus deficientibus succedunt, humorum stagnationes in aliis locis & quidem maxime circa regionem lumbarem & ischiadicam, cum per vicinas alvi venas vitium fuerit exitus, exasperant. Ab ejusmodi vero sanguinis & humorum stagnatione circa majora vasa, & progressu in circulum eunte impedito, fieri fit secessio, quod tartareis salibus & rudioribus terreis particula onustum in tubulosa renum substantia facile concrevit in calculum, atque etiam ad ligamenta tendinosa & glandulosa quæ ossa coxendicis cingunt atque ligant, delatum, graves atque diuturnos cum impotentia motus efficit dolores. Eadem quoque fieri à sanguine in inferiori corporis regione stagnante copiosior secessio, luxationis verberarum lumbarium omni procul dubio fuit causa; ad quam plurimum utique sensus incurvatus, qui doloribus in hisce partibus leniendis quodammodo inservit, conatibus: laxatis enim à feri exundantia ligamentis, facilis est ossium è sede sua profusio. Tercio attendi etiam in nostro casu meretur, conversio motuum sanguinis de dolorum è regione lumbi & ischiadica ad partes superiores scapularum, pectus, manus, quandoque etiam genua, quæ ut plurimum aëris & coeli intemperiem & variationem vel gravem animi affectum iram præteritæ de terrore pro causa agnoscit: quorum utique ea est natura, ut partibus præcipue membranaceis firmiter contractis motum humorum invertant & ad alia loca transponant. Methodum autem huic malo medendi quod attinet, eam ita instruendam esse arbitrari sumus. Primo omnium sanguinis missionem insistentiâ curavimus: quippe hæc dolores semper leviores efficit ac priora mala ex sanguinis congestione in affectibus spasmodicis ad nobiliores partes procedentia impedit. Deit insulam Theriormæ ex chamomilla vulgaris floribus, summitibus millefolii & semine foeniculi compositum, somno peracto sara larga copia mane in lecto hauriendum præscripsi: cujus utique virtus in omnibus affectibus chronicis & spasticis, non sicut deprecanda, eo quod humoribus fluxuantem sœnerando de acrimoniâ hostilem, quæ spasmus generit est, temperando, liberorem sanguinis cursum & ab eo dependentes utilissimas sordium excretiones egregie promovet. Tum pro potu ordinario, ob eandem fere efficaciam, decoctum ex radice gæzerone, chinæ, sarsaparillæ & radura ligni sassafras, atque abstinencia ab omni cerevisia vel aliorum potulentorum genere, quæ similis & integris quidem corporibus non adeo facile nocent, aut valeudinariis & imbecillis nunquam proficua observantur, impende commendavi. Demum, pulveres leniter diaphoreticos abstergentes & qui spasmi resistunt, humorumque acrimoniæ temperandæ idonei sunt, quorum censum subiecit, qui ex cetrulla antimonii sive materia perlata *Crygerii*, lapidibus cancrorum, cinnabari, adjectis, nitro, pauillo extracti castorei, vel etiam, nisi alius oblectum oblet, theriacæ scissis aut sulphuris nostri antem fixati, consociantur præscripti: qui vel sub lecti introitus vel etiam mane, adhuc regimine blande diaphoretico, ex aquis antispasmodicis v. g. florum acaciæ, alia, prout veritas ætatis nigrorum porrigi

possunt. Injuncti denique hæc medicamina non per solum, sed per gradus & procedente tempore virtutem suam existeret; quare usum eorum diutius protrahendum esse edixi. Ex quoniam alvine excretionis semper habenda ratio, clysteribus pariter ac alimentis lenientibus ex passulis & pomis Porcioribus eam expedare convenit. Subluxationi unguento ex axungia humana & oleo lavendulæ occurrendum esse statui. Hoc itaque consilio quam per hebdomadam aliquot spatium ægrotæ uteretur, & aquas *Seltzeranas* postea quæque usurparet, adsipiente Divino favore, cum sanitæ in gratiam rediit.

## CASUS II.

Insignis hujus urbis artifex, in re pictoria clarus XXXIX. annorum, vitæ sedenariæ valde addictus & Veneri plus jullo deditus, ante biennium die sereno mensis Septembris iter facit Lippiam, quæ caput coryzæ tenebant. Nocturnum somnum capiebat, ex improviso aperta fenestra, frigidior ventus dextrum capitis latus non suis tectum impetit: postero die circa aurem ejusdem lateris perentiu dolore valde acutum & asubantem, ita ut quasi ignitis clavus aurem transforederet videretur. Is porro ex aure dextra ad sinistram etiam se protendebat, & plenarium non modo auditus, sed etiam gustus & odoris sensum adimebat; quo acerbo dolore accedente per duas & ultra septimanæ ita excrucians fuit, ut ob assiduas vigilas in lecto decumbens infania propemodum correpta fuerit. Accersitus medicus in chirurgica ære exercitissimus, causam infolentioris hujus affectus, abscessum intra cranium & cutem, vel intra cranium & cerebrum reputans, trepanationem proponebat, quam patienti autem refusabat. Ex nostro igitur consilio abrasum fuit totius capitis capillitium & applicatum emplastrum leniter diaphoreticum & vesicatorium cum resecta cantharidum admixturæ dosi. Quo effectum est, ut ex aure dextra, ichorosa multa sensim paulatimque efflueret materia, per aliquot dies inter intervalla persillens. Unde in hæc aures audius quidem restitutus est, quod postea etiam in sinistram contigit; nihilo minus tamen observabat, quod inter hæc tempus dolor ad dextrum humerum, ex eo in ejusdem lateris regionem ischiis, postea in ipsam genu & tandem in pollicem pedis descendente, ut sine baculo vix incedere posset; licet nunquam antea podagra fuerit vexatus. Nihil autem amplius ex medicamentorum classe ei, præter insulsum theiforme ex speciebus lenem diaphoresin promoventibus, nec non pulveres diaphoreticos cum paucillo natri & cinabari nobilitatos, præscripsimus: quibus per Dei gratiam intra dies octo perfecte sanitati fuit redditus.

## Epicrisis.

Peculiarem fluxionem dolorificam sive rheumatismum speciem prædictus casus exhibet, acque clarius commonstrat, quomodo humor serosus in capite, ex coryzæ, ob accessum inclementioris & penetrantioris frigidae auri, spissior, immobilisque redditus & extra vasa constitutus, hostili subitque per moram acrimonia imbutus, ex partibus superioribus successive ad inferiores ejusdem lateris per porosam membranam nervosarum musculis communem substantiam descendere, in articulatione parium ad tempus decum-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

bere, graviter affligere & ad extremos usque pedes iter & progressum suum abolvere possit. Et quoniam tale quid à medicis etiam antiquissimis observatum fuit, non mirandum est, eos credidisse quod omnes fluxiones serosæ ex capite tanquam fonte proveniant originemque suam trahant, & inde in subjacentes partes deriventur. Commode etiam hic casus ad rheumatismum aurium sive otalgiam referri potest, qui ut sæpius observavi, abscessu salutariter solvitur. Denique, emplastri diaphoretico-vesicatorii operatio animadversionem quandam meretur, quod videlicet hujus efficacia morbidus humor fixationem sedem occupans, & loco suo in alium demigrare debuerit: id quod facilis in capite quam in aliis partibus muscularibus & pinguis, ad quas vix ac ne vix quidem ejus energia pertingere potest, si ejusmodi dolorifica fluxionibus affligantur, effici & præstari potest.

## CASUS III.

Judeus habitus corporis spongiosi in quadragesimo ætatis anno constitutus, temperamenti mere sanguinei, assiduis animi parum deditus, temperate semper vixit & bis annuatim vicibus circa æquinoctia sanguinem à brachii vena detrahi curavit. Sex jam præterlapsi erant anni, quibus vere semper & summo podagra laborabat, quæ pedum pollices dolore, ardore & immobilitate exagitans, vix ultra decem dies duravit, & nullis in usum vocatis medicamentibus, se sponte evanuit. Ab hæmorrhoidali fluxu plane fuit immunis. Mensis Augusti, alvi fluxu maxima ex parte crenato cum doloribus lancinantibus circa hypochondria subito corripitur. Adjungebantur tenesmus, ut æger vicies sellam petere debuerit, sæpius non nisi mucos albo depositis. Decem hic fluxus dies continuavit, sub quibus fieri quidem sanguinis circiter mensuram deperit. Licet vero valde debilitatus fuerit, vires tamen non ita multo post recuperavit. Ceterum dolor podagricus in principio Septembris invadere sileus jam penitus sinit: acutus vero dolorificus sensus oculos ita affixit, ut lacrymas stillare debuerit. Hic quidem inter aliquot dies cessavit, sed ad dextrum ossis ischiis latus delatus ad os quoque sacrum & coccygis protensus fuit: qui per mensis fere spatium durans, circa proximum æquinoctium ita invaluit, ut tolerari prorsus, noctu præferendum, nequiverit, atque omnem somnum ademerit. Accessit vero hujus doloris vehementia per paroxysmos, & quidem circa horam tertiam pomeridianam cum frigore, subsequente postea pulsus celeri & æstu corporis. In principio hujus affectus ante V. hebdomades venæ influsæ fuit scétio, sanguinis valde crassî & nigri sex uncias emissis: sed in cassum. Accessit in consilium: ubi ægrum vehementi dolore & languore excruciatum invenî, utpote qui nihil ex alimentis expetiret, nec dormire posset, de nocturno æstu conquegens. Porrexî itaque pulverem præcipitantem nirosum una cum liquore anodyno minerali: & inde altero die mestucale se habere cepit, mitigata doloris quodammodo særvia. Febricula tamen rursus accessit circa tempus confectum. Sequente mane quam pulsus validius æstus micaret, venam perandi jubeo: quæ scéta in pede fuit. Ex quoniam sanguis cum impetu proflueret, decem minimum uncie cum vinum constantia emissæ fuerunt. Hac autem evacuatione id consecrari sumus, ut simul & semel omnis dolor ex ossa sa-

Ee 3

cro & ichthi qui etiam ad genus sese extendat, evanuerit; quin imo æstu febrili penitus cessante, nocte inquiete placida quiesce gavisus est, & abhinc vires amissas rursus colligere cepit.

*Epistola.*

Plura notata digna postrema præctica præfata ex casu ætate non sine fructu possumus. Primo videlicet, quod fluxus qui à medicis habitus est dysentericus, hæmorrhoidalis potius censendus sit: in dysenteria enim non sic simul & semel feri & sanguinis copia deponitur, neque etiam sine acerbissimo dolore & torminibus abdominis, quibus patiens noster caruit, id contingit, sed dolor magis hypochondriacam regionem ferit, intra quam, ut notum est ex anatomia, intestinum colon situm obinet: atque hoc per ipsum affectu, sanguinis liber per vasa ejus sanguifera circums impeditur, & hinc per minima vasorum hæmorrhoidaliolum oscula in anum effusus est. Dein etiam notandum est, dysenteriam non adeo cito evanescere, quæ nunquam sine febre affigit: tuncmas vero, ut ego non semel observavi, non modo dysentericos, sed hæmorrhoidibus cecis quoque laborantes vexare solet. Interea animadvertendum dignum est, ægrum, qui nunquam alias fluxus hæmorrhoidalis vestigia expertus est, jam modo insigni cum impetu & quidem satis largiente eum passum fuisse. Quod autem quævis inde dolor confusus podagricus, id sine dubio ob naturæ immixtum robur factum fuisse judico, upore sub quo serum viscidum ad partes externas cum energia protrudi non potuit. Relicta interim arthrica materia primo oculos invasit, & dein ad ligamenta & membranas ossis ichthi, coccygis & sacri delata est. Ibi vero propter vehementes ipsiusliberem sanguinis circulum ac progressum quam impediverit, ingens ejus circa has partes stagnatio hoc modo inducta fuit. Quapropter non sine sufficienti ratione, largiorem venæ sectionem in pede influendam iussi, videlicet ad flagrantem sanguinem à loco affecto derivandum & ejus circulum æquabilem resistentiam. Id quod etiam felicissime successit.

CASUS IV.

*Rheumatismus ex hæmorrhoidibus superfluo. Genitum ex Tæpiteris. Ius dignum.*

Vir generosus gracilioris & sanguine constitutionis annuum ducentis trigessimum, aliquot ante iustia, gravatim circa os sacrum perferens dolorum, qui vero mox sanguinis ex venis sedis profluxu sedatus fuit. Intra anni spatium, sanguine hac excretionem propter crebras animus valde exagitantis occasiones cohibita, & neglecto omni remediorum usu, atrox dolor junctus simul cum tussi valida brachium sinistrum tam molesto cum sensu laniabat, quasi acutis cultris eato dilanderetur. Exactis aliquot mensibus dextro quoque brachio eundem doloris insulsum & impetum experiebatur, citra omnem salutisrum tot adhibitorum remediorum, venæ sectionis, purgantium, sudoriferorum, vesicatoriorum, cucurbitularum effectum. Nulla presens erat constructura, quia brachiorum motus sanus rectus remansit, sed talem modo percipiebat sensationem ac si ingens ex plumbo pondus ipsi inhaereret, cum adeo ingenti manuum infirmitate, ut nihil quod grave erat apprehendere vel retinere poneret. Per intervalla etiam ipsius manus occupat perquam moleste atque atro-

citer ut somnum ægre capere poneret. Hos ita acerbos dolores postea excepti gravior aurium & fere intolerabilis dolor, qui sensum cum cephalalgia lancinante, valde acuta & vehementi vires & appetentiam ciborum enterante ipsam corporis carnem consumeber. Hac symptomata non quidem continuo infestabant, sed per intervalla, imo certis periodis præferim pro atmosphæra dispositione revertebantur & exasperabantur. Experitis à me consiliis. Suasi, ut rite prius preparato per venæ sectionem in pede & per nodulum laxantem corpore, thermas Carlsruæ adiret, inique cum convenienti regimine uteretur. Quarum cura absoluta, ut in ulum extremum thermas Tæpiteris, & ad imbecillum partium robur confirmandum & resistentiam duceret, auctor fui. Cui consilio cum morem gereret æger, ex voto sanitas successit: nam ab eo tempore hæmorrhoidalis fluxus reversus, corpusque ab hujusmodi doloribus diu immune perstitit.

*Epistola.*

Quandocunque confusus hæmorrhoidum fluxus inordinatus sit, vel plane suppressum, multa non modo valetudinis sequuntur incommoda, sed maxime omnium ad morbos ex corrupto & viciolo sero qui originem trahunt, corpus disponitur: in quorum classem dolores externarum partium sive dolorifici rheumatici & itaum passiones merito referre debemus, upore quæ ab humore seroso excrementis hinc inde in partibus sensibilibus & nervis flagante & sedecente oboriuntur. Sanguis enim quando per vasa mæterica & viscera abdominis inque primis per lienem & hepatis non jugi & perenni motu ac cursu libere ferunt, sed restagnant atque moram nectit, intestina & calida agitatione, in liquamen putridum corruptum fitit; quod do in sanguinem permixtum & ad debilitata loca translatur, dolores & ulceras sæpe fluxiones efficit. Ex eodem fundamento ac fonte purpura scorbutica, quæ intra recentia causam farsissime graviorum in artubus dolorum præbet, genesis derivanda venit; eo, quod confusus & laxatus sanguis in foemina per uterum, in viris per hæmorrhoides vacuationes cohibitas & compressas hos ipsos pede infectos fuisse, multoties à nobis observatum est.

CASUS V.

Ante aliquot annos, generosus vir in sexagesimo & sexto ætatis anno confusus, post lebreu quantanam, quæ per dimidium anni cum exercuerat, vagis doloribus hinc inde in artubus & partibus externis quam maxime circa lecti interosum exacerbatis vexabatur. Cum aliquando mense Maio, mantino frigori caput paulo incautus exponeret, durus & lancinans cervicem ipsasque scapulas dolor invadebat, qui per intervalla adeo essetans erat, ut nec caput ullo modo flectere poneret. Nunquam integerrimus vir admittit sanguinis missionem, neque per venarum sectionem neque per scarificationem; quam tamen esset sanguinis & succi plenius, appetitu integro & pulsi magno gauderet. Suasi venæ incisionem; quam, licet natura non respueret, omnibus qui fieri possent rationibus detrectabat. Cum vero gravioribus assidue torqueretur doloribus nullumque à præsidio exhibitis

*Rheumatismus ex hæmorrhoidibus superfluo. Genitum ex Tæpiteris. Ius dignum.*

per-

perferret levamen, tandem ad infantiam meam chirurgus accinus, & celebrata venae sectione, crucura octo minimum unciae detracta fuerunt. Ab eo mox tempore insignis dolorum allevamentum percepit, & quod notabile erat, post scilicet venam noctu copiosum semper profudit sudorem præter modum & consuetudinem: quo dolor non modo penitus abactus, sed & omnes corporis vires pristinam incrementum receperunt.

### Epicrisis.

Similem fere historiam apud LEONH. BOTALLUM lib. cu. cap. XII. p. 201. legere licet, quam ad verbum huc recensere nobis è re vilius est: *Domusum de Varrone*, inquit, à Regis cubiculo, annos ut minimum quinquaginta natum, dolor afflicto & lentus ad cervicem & humerum à multis mensibus deinceps, quem medici frequentius medicamentorum purgantium usu & calefactantibus lenibus curare studuerunt: à quibus ille cum parum aut nihil levaretur nos consulit, qui salutarem diximus futuram sanguinis missionem. Ille contra obijci inconscientiam mutendi sanguinis, frigiditatem, inchoantem huiusmodi morbum fieri à frigido humoribus & flatibus: quæ omnia, testantibus aliis medicis, tale auxilium deborabantur, quare non posset intrepide acquiescere nostra sententia. Diebus aliquot post, morbi perseverantia & incremento impulsus, ad nos rediit, sic animo afflicto ut polliceretur, se post hoc nulla in re à nostris consilio recessurum. Muti sanguinem iussimus, ex brachio afflicto parvi, ad uncias decem: post aliquam diem parum modum ex adverso cum maxima utilitate, tandem iterum ex altero, & sic liberatus est. Non tamen interea contentissimus purgationis & lenium calefactantium & discutientium usum. Ab eo tempore dictus paucis familiarissime & cum maxima utilitate pedum, quibus vix poterat insistere, visus & totius corporis, primum bis & ter in anno, postea quinquies & sexies meo consilio sibi sanguinem mitti, firmiter incedens nunc, quam ægeret ab illis decem annis.

### CASUS VI.

Dum hæc scribissem, transmissa nobis est ab Excellenti Uratavienfium medico historia, quæ accuratam morbi rheumatici generationem, progressum & medelam quoque complectitur. Circa cujus ulteriorem curam, quam meum consilium requiretur, id ipsum hoc loco recensere non inconsummum mihi visum est. Dominus de H. LXVIII. annos natus, fibra forti aque elastico vasorum robore natura instructus. Olim innoxium incommoda & æra variis injuriis adfectus: jam sedentario vixæ generi, in publici, quod obit mueria gratiam addidit. Ante hos viginti annos apoplexie impetum expertus est, crure ex ratisnis sponte larga copia erumpente solutum. Inde aliquoties arthritidem periculis, quindecim postea annis non amplius observatam. Versus autumnum superiora anni intrepere sensim ventriculi flatuque pressione, thoracis constrictione, brachiorum, maxime circa cubitum, tensivi dolores. Hæc omnia usque adeo tandem invalluerunt, ut missio licet sub finem Septembris à brachii dexteri vena media sanguine (qui tenax erat, & præpingui mucro abundans, seroque destitutus) die XXVI. Octo-

bris novum apoplexie metum incuterent. Complicari ea die cum febre continua coepit malum, hac fere ratione, quavis vespera, modo levius, modo gravius affligens: Posti repertam aliquoties oitationem & perceptum brachii ut plurimum finistri gravium dolorem, ingruit spasmus dolorificus cubitum utrumque, præcipue finistram infestans, mox pectoris musculos in consensum trahens, præcordia stringens, suspensam respirationem producus, sudorem universalem exprimens, manibus interea algentibus. Remittit & intendit per vices talis impetus, donec tandem elapsis aliquot horis cesset pedetentim, lassitudine, corpore, & rheumatici doloris sensu relictis. Hic talis totum thoracem ambiens asthma stipans rheumatismi, ubi in summo vigore continuata erat, durum, cicatum, febrilem pullum, aliquoties oculorum hebetudinem, titillum, veriginem, suspectumque soporem comites habebat. Aliquando distentum flatu hypochondrium finistram indolebat, serpius nucha, scapula, dorsum. Quandoque in ipso somno ægrum nostrum obruens spasmus, loquelam præpediendo, siderationem comminatus est. Febris scia, in lentam & marasmoden abire visa, sub tertio die tum lictentia finem acquievit, postquam duplex comparuit solutiois modus. Præterquam enim quod lotum primo febrile & biliosum, à quarta febris die turbulenter, sabulolium, pure quasi & subcruento tabo remissum vicelima die in naturale mutatum est; copiose etiam & per totam corporis superficiem diffusæ militares pustule rubræ comparuerunt. Rheuma interim spasmis socium silente febre continuavit, ita tamen ut sensim misceretur, post quadragesimum diem penitus tandem visum fuit se recepisse. At vero post repertam per vices intonationes, die morbi octogesimo quarto novus malorum impetus subit: moris meum omnibus incussit, urgente inter summas præcordiorum angustias exterritorum frigore, mæcore, stertore, faciei livore, extrorhæque cum nulli aliore quæ spumoso ex aspera auricula & florido colore ad drachmam fere unam vel alteram. Quod si hæmorrhoidum ulla ante advascularum molimina, sanguinis illam per os effusionem, cum medicis solas hæmorrhoidales veras in deliciis habentibus, pro fluxu hæmorrhoidum anomalo habuimus fuisset. Visus autem postus è glandula per interiorum fistulæ spiralis membranam disseminatis & spasmorum vi dilatatis, aut etiam miliaribus ibi quoque hærentibus pustulis disructis extravasata cruet. Angebamur tunc imminenti vel asthmaque convulsi vel apoplexie, vel denique, fluente iterum subida & subcruenta urina, lenæ consummationis metu. Saltem suspicio erat morbum in consuetudinem abituum virium collectionis obstruere. Sed hæc, vix post scilicet altera ab impetu illi die venam (quæ sanguis non adeo tenax è brachio educatur) ita paulatim Divino auxilio adjectus est æger noster, ut non nisi rheumatis illius chronici rudera superesset. Postunt tamen & hæc quotidie se manifestantia maturum adultæ experientie consilium, ne tertium ferociter malum omni auxilio magis experiamur. Inter remedia quibus obsecratum fuisse visum est rheuma cum asthma complicatum, eminebat oleum amygdalarum dulcium, sub emulsionis forma largiori copia copiosius, chamomillæ cubobana decoctum, frictio, abluio externa frigida caudilla & frequenta. Nec sine omni effectu in usum

vocata: liqor mineralis anodyn. D. Hoffmanni, specificum cephalicum, pulveres solares, lumbricorum succus, pulvis antipalmodicus, & quæ demulendo malo apta credidimus. Quibus tamen certa & fida magis desiderantes, rescire avertis, quæ cum de morbi, tum de curæ influenda ratione Excellentissimo Hoffmanno videantur. Interque alia præcipimus, ut si forte præparata Vin Prædictorum ex ballamo Peruviano, ex amaricantibus extracta sub forma elixirii viferalis, aut genuinus liquor mineralis, tanquam nervis & viceribus amica pharmaca, facere in rem nostram videamus, eorum apparatus simul nobis concedatur.

### EPICRISIS CUM CONSILIO.

Accuratius paulo descripsit hæc morbi historia, quanta valetudinis incommoda genus vitæ valde mobile & laboriosum subito in quietum mutatum adferat, luculenter suis demonstrat. Vidi sæpiissime splendidas personas, venationibus cum celerissima equitatione conjunctis, vulgo *Par force Jugdens*, quotidie sere affluas, si eas ob urgentes quasdam causas omiserint, in graves diutinas passiones, quæ à stagnationibus intra viscera abdominis & exinde subortis valde imperperatis impuris & corruptis humoribus, originem suam traxerunt, delapsos fuisse: cuiusmodi fuerant fluxiones & spasmodicæ intestinelorum constrictiones, cum pigra alvo, angustia præcordiorum ac pectoris, dolore & arum lassitudine, spirandi difficultate, febrequæ lenta confociata. Non mirum hinc est, idem experiri fuisse prædictam generosum ægrum, in quo, ob inclinam ætatem, impuriore adhuc redditi humores, fibræ ac nervorum mobile & sensibile systema ad spasticas stricturas acque febiles commotiones sollicitantur; unde ex nimia hinc oris ad partes sanguinis congestionibus, in capite insulus apoplectici, in pectore infarctus asthmatici, in artibus dolores vagi tensivi, producti fuerunt. Quam difficultè vero, quando vitium tum solorum tum fluidorum in habieum quasi degeneravit, ejusmodi chronicæ affectiones, quæ accuratam vitæ regimen & assiduum remedium valde salutarium per plures fere annos exposculant usum, sanescant, his qui in artis opere diutius versati sunt, quam optime cognitum perfectumque est. Et quoniam ex intermissione motus, laboris & exercitationis corporis, quæ alias optimum est sanguinis deputatorium, & juxta Hippocratem nervosarum & muscularum partium cibis ac nutrimentum, præcipua horum patheumatum causa fuit subtrahita, utique secundum nostram experientiam & sententiam, tum ad ejusmodi chronicum æstetum mitigandum, tum ad peiora mala averrenda, motus, modo commode hic fieri possit, v. g. per ventionem, vel equitationem, omnibus modis fundendus est. Præterea in talibus casibus ab omni generis cerevisia abstinendum, poranda decocta ex speciebus demulcentibus parata, vel fontes temperati, ut *Selteræ*, aut serum lactis; & quoad cibos, ab omnibus acidis, salis, viscosis, acerbis, est abstrahendum: inter remedia vero solum elixirium temperatum bullanicum, ex amaris temperatis cum menstruo aquoso paratum, sapus & diutius, moderata tamen dosi usurpatum, spiritusæsceriam blandam fluidis & tonum solidis conciliando, omnibus aliis medicamentis longissime præferendum esse, experientia fida & crebriori edocui su-

mus. Denique iteratis vicibus, aut per scarificationes aut venarum incisiones, sanguinis nimiam copiam demendo, promoci & expeditior circuitus promoveatur. Et hæc fuit mea de cura hujus mali sententia, quam ad Doctissimum Virum transcribere non dubitavi.

### CASUS VII.

Vir robustus, sanguine & succis plenus, annorum quadraginta, acerbis scapulae dextræ dolore conflictatus, sine præcedente sanguinis missione, sine primarium viarum per laxantia abstersione, à medico pro sudore ebienti bezoardicam tincturam, aequali pondere cum spiritu cornu cervi succinno permixtam, largiori paulo dosi assumsit. Sed ne ullus quidem inter sudor, nec nocte nec mane secutus, licet corpus probe stratis munium & involutum fuerit. Scapularum vero dolor postmodum non solum longe acerbior fuit redditus, sed etiam colli musculum in consensum pertraxit, ut in nullum laus caput flexere æger posuerit. Accessit præterea ingens capitis in latere dextro dolor, quem acris & calida oculorum defluxio cum rubore diutina excepit. Administrata venæ sectio, & alvo per convenientia temedia successively depleta, usurpatis quoque infusis herbarum Thucisomibus atque pediluvii, hæc symptomata quadammodo quidem remiserunt: ab eo autem tempore defluxio serosa in palato cum continuo uvulae delapsu per annum & ultra permansit. Cui tandem vitio amovendo frequens tabaci fumus egregie inferebat; licet diutius adhuc, tempore præhumida regnante, in faucibus & uvula nimia relaxatio observata fuerit.

### Epicrisis.

Ex præsentis casu praxeos medicæ tyrones discere possunt, quantum detrimenti invehere possint medicamenta alias satis apta & innocenta, quando non debito ordine & tempore usurpantur. Nisi enim prius demta fuerit valorem plenitudo per sanguinis detractionem, quæ motum circulatorium liberum, & transpirationem quoque auctiorem impedit; nisi etiam ante horum usum, cruditates copiosæ & vitiosæ ex prima regioe idoneis laxantibus eductæ fuerint, sudorifica positive sic diosa, quæ calida & expansiva vi agentia, cum impetu quodam crudos & rudes humores in angustias valorum & glandularum protrudunt atque accumulanti, ut inde non tantum dolores in vicinas partes se propagent, sed & acres defluxiones, dum, ubi sanguis stagnat, serum fecedit & dephat, hinc oboriatur, nunquam qui cum ratione curam suscipere aruitur, exhibere debet.

### CASUS VIII.

Non ita pridem accessit ad me quidam hujus loci causarum patronus, trigefimum ætatis annum superans gracilioris quidem sed fibrosi corporis habitus, qui mihi aperuit, quod per quindam & ultra annos singulis fere mensibus sanguinis fluxum per sedem expertus fuerit; ad quem disposita tota eius familia, quæ in Thuringiæ oppido adhuc degit, ita ut non solum pater & mater continuo hunc fluxum passi fuerint, sed etiam in liberos imo ipsas sterminas circa annum duodecimum & decimum quintum, mensibus

hæc quæ  
scapulae  
dolor, colli  
musculum  
in consensum  
pertraxit, ut  
in nullum laus  
caput flexere  
æger posuerit.

hæc quæ  
scapulae  
dolor, colli  
musculum  
in consensum  
pertraxit, ut  
in nullum laus  
caput flexere  
æger posuerit.



hæc rite fluentibus, idem ille redundaverit. Consequas hic fuit, quod per quatuor fere menses, ex causis minus sibi cognitis, hæmorrhoides cessaverint. Ex ab eo tempore non modo insigni animi & corporis languore, sed etiam dolore tenso & contractivo in sterno, toto thorace, cum frigoris quodam sensu, atque respiratione præsertim post modum difficiliori atque pigriore correptus fuit. Quæter ex iusta pedis vena, consilio celeberrimi hujus urbis medici, sanguis largiter emissus: sed omnem citra salutarem effectum. Indicavit simul æger, postquam, à fortiori corporis motu antea aliquot septimanas susceperat, hæmorrhoidalis fluxus, sed exigua in quantitate comparuisset, omnem dolorem & molestiam simul & semel conquievit & sensum calidioris fluidi à thorace ad ipsam pelvim successively descendens, scilicet animadvertit; sed mox cessante fluxu superiorem pelvis locum dolores repetiit. Ipse quidem non sine ratione affectum hæmorrhoidalem inde metuens, auxilium meum efflagitavit. Ego nihil aliud suasi, quam ut motu moderato primum, dein intensiori, corpus quotidie ad lenioris sudoris eruptionem usque exerceret, & mane in lecto insulsum Theriacum, ex herba veronica, cardui benedicti, radice glycyrrhizæ & aniso stellato bibere, quo pediluvia antea lecti interitum negaret; circa illud vero tempus, quo alias ipsæ hæmorrhoides fluere solebant, pilularum Becherianarum aliquot doses, præmisso pulvere digestivo nitroso sumeret. Quibus non juvenibus, optimum inter alia esse consilium, hirudines ani venis applicare, edixi.

## Epirisus.

Rariora certe sunt fluxus hæmorrhoidalis exempla, liberos in prima ætate per dispositionem parentum hæreditariam insistentia: qui uni hoc in genere quasi naturalis, familiaris & criticus habebatur, ita omni cura & sollicitudine per paulo exquisitiorem victus rationem conservandus, neque ullo modo impediendus, nisi mox difficiles & subitaneas morbosas afflictiones expectare velimus: inter quæ sunt illæ præcipue, quæ à translocatione sanguinis ex partibus inferioribus ad superiores facta pulsant, & rheumatismi nomine veniunt. Sicuti vero effluem illam & incoercibilem sanguinis mittendi hodie epidemice quasi regnantem methodum, in sanandis maxime chronicis affectibus valde improbamus: ita etiam ad solennes & criticas sanguinis evacuationes, per uterum vel per intestini recti venas provocandas, sæpius tepetum venæ flectionem plus damni quam commodi tulisse, certa & multiplici experientia confirmatum habemus.

## CASUS IX.

Subit jam animum historia femine ætatis trigessimæ annuum accedente, sanguineo-cholerice complexionis, quæ gravi iam supra modum exarscens, brevi post ingentem anxietatem & circa præcordia angustiam, cum tremore artuum, appetitus dejectione & ciborum tardio persensit. Summis hæc de re ab amico volatilen cornu cervi spiritum liberaliori dosi, & ad efficiendum sudorem corpus in lecto composuit. Incaluit inde quidem frigus, sed nec ulla nec sudor sequebatur. Ab eo tempore in artibus, cruribus, brachiis, scapulis, gravativos pressorios dolores, & in universo corpore languorem cum lento calore

perpeffa est: quibus symptomatibus nostra adeo fuit afflictata, ut caro penitus consumta, & hinc phthisi imo hectica ipsa laborare videretur. Lactis tandem caprini cum insulo veronica diluti usu, diutius per septimanas aliquot continuo, insulo ex farina & cremore tartari interposito, atque etiam pulveribus leniter diaphoreticis ac nitrosis, cum acido citri & aquis temperantibus analepticis usurpatis, præstare valitudini patienti fuit restituta.

## Epirisus.

Casus recensensus præclarum nobis documentum suppedit, quam perniciosum sit, materiam naturæ hostilem per minus convenientia loca, contra monitum *Hippocrati aph. I. Sed. 21.* educere. Per vehementem animi exarscenciam, non modo motum systema nervosum & vasculosum vehementer præter naturam motu agitantur & concutitur, sed & insuper plane singulari modo ductus qui in hepate consistunt & ex eo prodeunt biliarii nervolo-fibrosi, convulsivo quodam motu afficiuntur, ut biliosus omnis peptorum humor in duodeni cavum effundatur, qui ibi ob hoc ipsum spasmus identidem per consensum affectum paulo diutius subsistens & retentus, graviorum quæ iræ affectum ordinario insequi solet pathematum causam materialem & luminem præstat. Ad hæc itaque averenda prudens & purus medicus us utitur remediis, quæ motus effluens nervosorum partium sedandi, biliosas excrementitiasordes contemperandi & leniter per alvum educendi facultate possint. Nihil autem a vero medendi scopo magis alienum est, quam medicamento calido & valuti motus solidorum concitiores reddere, illuveniente corruptum biliosum ad sanguinis massam & ad interiora sensuum & nervosorum partium invitare atque adducere.

## CASUS X.

Præfati in opere dum occupatus sum, occurrit mihi casus, dignus qui commemoretur: quare ipsum huic tractationi subnectere operæ pretium duxi. Vir erat sexagenario major, firmiore & animo & corpore, atque elasticæ fibrarum robore instructus, qui raro per vitam adversa valetudine tentatus, bennoo alhinc circiter, colicis quidem atque cardialgicis passionibus per vices affligentibus, attamen convenienti remedium usu statim mitigatis atque depulsis correptus est. Mense Januario hujus anni vicinam urbem tendis, judiciales quidam composuimus lites. Quam autem impetrata judicis sententia voto minus responderet, vehementer & supra modum animo commotus est, corpus dein multis modo laboribus & vigiliis fatigatum, inter discursum per plateas, frigora vehemeniora improvise exposuit. Hinc statim ciborum perit appetentia, & alvus signum reddita fuit, ita ut perpaucas feces ano protraheret, imo per aliquot dies officii sui oblitus fuerit. Domum reveritus patienta de languore universi corporis, doloribus abdominis ex uno hypochondrio in alterum divergentibus, nec non de anxietate & cardialgicis præcordiorum strictibus circa scrobiculum cordis, cum perinacis alvi clausura stipatis conjuerit cepit. Rebus sic stantibus, mihi in consilium vocato, primo cennium, strictiorem alvum per cenna emollientis nec non frictionem manuum cum oleo amygdalarum

*Albume ex  
seris in  
capis, par-  
tes non in-  
ternas,  
quam ex  
seris effi-  
citur in  
vagina.*

*Albume  
ex  
seris in  
capis, par-  
tes non in-  
ternas,  
quam ex  
seris effi-  
citur in  
vagina.*

eum dulcium permixtum relaxare fecesque refistat educere visum fuit. At vero pauca in quantitate durissima scybala nigricans & quasi adusti coloris fecerunt: doloribus moribusque in abdomine persistentibus & per certa intervalla acris affligentibus. Suasi dein, ut lactis serum cum cremore tartari acidulatum atque manna nobilitatum, per aliquos hebdomades mane ad mensuram biberet. Postea quum sanguinem redundantem & ejus millinient neglectam adverterem, pedis venam percutiendam curavi: ubi emissae aliquot sanguinis unciae, satis bene quoad cetera constituti, nisi quod permulsum lentae & viscidae puitae, aquae calidae immerfus deponerat. Unde aeger parum levaminis percipit. Interim tamen alvus quinquies vel sexies de die fuit soluta, multumque puitae atra cum durioribus excrementis educit. Sed dolores cum cardinali cum colici, licet aliquando minuerentur, continuabant, dorsum & lumbos saepe repentes. Quibus aeger tandem ita enervatus fuit, ut assidue in lecto decubere cogeretur. Ex medicamentis internis nihil innotatum vel omnium, quod ad discutiendos flatus, ad sedandas spasmodicas stricture, ad acrimoniam temperandam & infringendam, atque aequabilem transpirationem conservandam commodum proficuumque visum fuit: & tamen parum adjumenti inde percipit aeger, nisi quod observatum sit, dolores hos acerbiores magis ad artus & externas partes, interiori sede relictis, conversos esse; quandoquidem mox scapulas, mox lumbos, mox pectus, mox praecordia invadebant, capite tamen ab his libero relicto. Somnum interdum placidum capiebat, cibosque concoctus faciles ingerebat, alvus vero rarissime sponte libera fuit & urina nunquam non parce profusa. Inter ea cum jam per duos & quod excurrit menses hoc malo conflictatus fuisset aeger, non parum vires exhaurebantur. Percipiens vero pulsum adhuc valentem & plenum, pedis venam iterum secundam praecipi, & qua longe alia facie emanavit sanguis quam prior erat: nam vix sexta ejus pars rubicunda erat, quae sero placentali instillat innotabat, superius leno, viscido moco obducta. Sed neque etiam inde adjumentum quoddam percipiebat aegrotans. His rebus ita constitutis, necum constantissime cum domesticis suis efflagitavit auxilium, rogans, morbum, ejus naturam, tonumque progressum paulo accuratiori meditationi & acriori judicio subicerem. Ad hanc itaque rem incumbens, ex inspecto sanguine judicabam, vitium non, ut antea forte existimaveram in solidis esse, ubi angustia vel scirrhositatem quandam in intestinis praesentem divinare, sed feri excrementitii coluvium non tam partes internas quam externas adfigentem, horum dolorum causam & fontem existere. Hanc itaque non commodius nisi per alvinam regionem educi posse credidi. Nolebam vero in corpore viribus valde fractis atque intestinis spasmodicis & torminibus jam exurente debilitatis acie quoddam purgans per superiora exhibere. Itaque cum in consiliis *Roverianis* me aliquos legisse meminerim, aquam benedictam *Riccardi* ad aliquot uncias in enemate, optimo cum fructu ad serosum colluviem educendam adhibuit fuisse, sentare de hoc auxilio genus constitui. Ex cum ad manus non esset aqua illa benedicta, tartari emetici solutionem hac substitui, atque in talem formam redegi: Rec. tartari emetici in aqua menthae soluti grana VIII. vini Hispanici unciae sex M. Hanc mixturam cum

clysteris emollientis domesticis tribus partibus aequum infundendum juberem, mox inde largissima viscidiorum humorum secuta est excretio, magna secum liquidarum copia stipata, quam postea tres sedes exceperunt, sed cum paucioribus excrementis: quo facto iucunda quaedam analeptica porrigere jussi. Et bene se habuit aeger. Sed tertio die post, cum intolerabilibus per IV. dies abdominis cruciatibus cum diarrhoea & tenebrio copulatis, corripere, interne theriacae veteris dosin, item oleum amygdalarum dulcium ter, vel quater per diem cum sero lactis, vel infuso veronicae exhibui, & exterius abdomen inungendum linimento, ex theriaca in aqua Anhalina soluta, cum balsamo Peruviano commixta, jussi. At qui inde & alvi dejectiones & tormina ex voto conqueverunt ac remiserunt. His peractis mixturam diaphoreticam, quae ex liquore nostro minerali, syrupo croci sanarato & quarta parte spiritus tartari composita erat, propinavi. Unde placido secuto sudore, vique dolorum mitigata sensum paulatimque ad se redire videtur aegrotans.

#### Epirifu.

Chronicus hic gravis morbus, ad dolores rheumaticos ab excrementitii feri copia originem suam trahentes, nervosaeque partes internas atque ac externas infestantes, reteri debet. Senes vero quam maxime ad ejusmodi morbos a sero vitioso oriundos dispositi atqueque habent corpora, quia ob bilis lenorem & inertiam, vacillatentemque intestinorum totum alvus pigrior fit, atque adeo a fecibus retentis corruptae fontes ad sanguinis massam feruntur, quae ob languidiorem perspirationem senis aetati familiarem & communem magis magisque succrescunt. Credibile igitur est, eodem modo hos dolores fuisse excitatos. Ex qua per ipsius morbi paulo longiorem decursum, in corpore omni motu & exercitatione vacante, ipse sanguis & humores boni atque laudabiles in corruptum serosum liquorem conversi sunt, vero est simillimum, contumaciam hujus affectus inde esse petendam. Denique notabilis hac observatio non praeterenda est, quod emetica & paulo fortiora insula per clysterem, ad copiosas serositates & corporis latibula eliciendas & exurbandas, tutiori longe modo ac validiora purgantia ore assumenda adhiberi possint.

### CAPUT IX.

#### De rheumatismo odontalgico.

#### THESES PATHOLOGICAE

##### §. I.

**O**dontalgia, sive densium acutus, gravis & perquam molestus dolor non nisi rheumatici speciei est, a feri impuriotis decubitu, ligamenta & tunicae nerveo-glandulosae, quibus radices densium in alveolis maxillarum archus circumvestiuntur atque obfirmantur, valde lancinantis & ardentis febrosis; quae varia molestaque post se trahit symptomata.

##### §. II.

Nos non semel sed pluries observavimus, ut *Sape* nam,

*Odontalgia  
ma adu-  
algia ori-  
mar.  
Et vult  
vixit.*

naum, scapularum, humerorumque dolores, in capitis septenario transiisse laus, atque dentes pariter ac maxillas molestissime invasisse. E contra, capitis & dentium dolores, sede sua mutata, in humeros, brachia vel scapulas descendisse, idemdem à nobis haud raro est animadvertitum. Quin, per experientiam obvium est, maxillam superiorem cum dentibus suis, dolore & spasmo frequentius ac inferiorem affici.

## §. III.

*Interdum  
in ista den-  
tis: et hinc  
rejolet.*

Alia porro sedes est odontalgici doloris, qui in ipsius dentis cavitare, videlicet in funiculo isto vesiculari, ex membrana nervosa, vase arterioso, venoso & lymphatico composito residet, videlicet si is ipse graviter, vel nimis, à sero flagante, distensione, vel spastica constrictione afflictaur, praesertim ubi dens est cariosus, ipsique caries ad funiculum modo dictum peringit: siquidem certa & quotidiana experientia constat, cariosos dentes rheumaticis affectionibus maxime tentari, eo quod quam facile, ob imbecillitatem huius partis humores ibi flagrant atque subsistunt.

## §. IV.

*Symptoma-  
ta.*

Quemadmodum in arthritide dolor, rubor, tumor, & febricula praesens est: ita haec omnia quoque in odontalgia fieri animadvertimus. Jungitur insuper copiosa saliva ex ore profusa, quae non aliam agnoscit causam, ac spasmodicum doloris, qui dum vasa lymphatica & venosa restringit, liberum sanguinis & seri regressum impedit; quam ob rem a subsistente sanguine salivalem illum lancem in glandulosa faucium loca copiosius fecedere aequum est.

## §. V.

*Odontalgia  
ex congestio-  
ne humorum  
intra denta-  
lia.*

Rheumatismus interperat & subito mutati aëris plerumque febiles evadit; atqui non secus res in odontalgia cedit, quae in corporibus dispositis praesertim cacochymicis quam facile oritur, si ex calida subito in frigidam auram fecedunt, vel si vere & autumno tempestas per vices aultrina calida atque frigida est.

## §. VI.

*Frangitur  
frequen-  
tius et vi-  
res affligit.*

Uti foeminae praeter sexu virili rheumatismis magis sunt obnoxiae: ita etiam odontalgiam frequentius experiantur. Id quod maxime contingit, quando utero gerunt, vel defectu mensium laborant, aut alimentis acidis, salis & alvum adstringentibus, item dulcibus plus justo delectantur: quippe quae, etiam externe denti carioso admixta, delubrio saepe dolorem praeant. Nihilominus, si viros hic dolor apprehenderit, acerbior multo affligere solet.

## §. VII.

*Rarius  
rheumatism-  
us & ar-  
thriticus  
infertur.*

Experientia rursus constat, quod qui rheumatismo vel arthritide laborant, rarius odontalgia corrumpitur, sed dentes integros habeant; cum contra dentium doloribus magis sint expediti, qui huiusmodi artuum & muscularum affectionibus vacant.

## §. VIII.

*Faciliter  
venit.*

Qui dentium doloribus semel iterumque excruciantur, ii rursus ex facili & leviori causa in eundem incidunt, non secus ac in arthriticis & podagricis tensionibus id fieri affolet, propter debilitatem quam dolores huiusmodi pariter atque relinquunt.

## §. IX.

Acerbior dentium dolor in corpore sensibili atque impuro gravia inducit symptomata, vigiliam nempe, febrem, appetitum prostratum, delirium, refrigerationem extremorum, imo convulsiones, praesertim in infantibus, propter systema nervosorum partium in consortium sive moruam morborum communicationem pertractum.

*Aliter  
quodvis  
etiam per-  
tinet.*

## CURATIO.

## §. I.

Quoniam odontalgicus dolor, ab illiusve plerumque serosa oritur causa foris, utpote quae à sanguine copiosius ad caput congesta & lenius in vasis procedente, separata, in ligamenta tendineo-nervosa depluit; potissimum medendi huic molesto affectui in eo reconditum erit momentum, ut serum scorbuticum impurum primum à capite diverteretur & derivetur; dein, ut correctum preparatum atque mobile reddatur, per congrua emunctoria è corporis sphaera eliminetur; demum parti affectae salubri robore recondiliatur, & hac ratione materia peccantis decubitus atque affluxus praepediatur.

*Indicatio-  
nes.*

## §. II.

Primum quod concernit nostrum propositum scopum, huic clysterum injectiones peccantem humorem divertere grata, quam maxime optulabuntur. Ut plurimum enim sub gravibus quibuscunque dolorum tormentis alvus pertinacius renititur, quam per enema leniavum & stimula salinum emollire atque educere nihil est convenientius: utpote, à cuius applicatione ingens statim dolorum levamentum agnoscens recepsisse observavimus. Praestat tamen ea ex domesticis usant, quam ex variis purgantibus atque emollientibus speciebus curiosius constare. Dein quoque inter ea, quae humorum impetum à partibus superioribus ad inferiores invitant, pediluvia egregiam operam collocant: quae ex sola aqua pluviali vel fluviali cum surculis triticeis, adjecto saponis Venetico decocta preparari atque circa somni tempus in usum vocari possunt; adhibita tamen hac cautela, ut pedes diutius atque paulo profundius in ea dimittantur, neque nimis calide, sed tepide tantummodo admoveantur.

*Humor vi-  
sibilis ad  
superiora,  
per clyste-  
ra.*

*Pediluvia.*

## §. III.

Huic praedictae intentioni non minus succursant, quae leni stimulo alvum clementer subducunt, inter quae, uti in omnibus tam arthriticis quam rheumaticis, ita etiam in odontalgicis affectionibus, manuta & ex casta recenti parata, utpote quae simul acrimosam humorum contemperandi virtutem possideant, praesertim si in sero lactis dulci vel lacte asinino, aut etiam in sorte minerali v. g. acidulis Schweibachensibus dissolvuntur, praecipuas sibi partes vindicant.

*Op. levan-  
cium.*

## §. IV.

In corporibus aetate florentibus & quorum vas nimio sanguine turgent, si vel ob transpirationem prohibitam, vel alii demum ex causis, acerbior dentium dolor, primae atque ac secundae indicationi therapeuticae omni ex parte satisfaciunt venae in pede inserta sectio; quae utque tam

*Pina scilicet  
quandam  
adhibenda.*

tam ad humores ad superiora congestos, inferius invictandos, quam ad æquabilem eorum per omnis generis vasa circuitum retinendum ut & materiam hostilem à corpore eliminandam præsidium atque auxilium pollicetur insignissimum, aliis omnibus præferendum.

## §. V.

*Diaphoretica.*

Quod si materia peccans odontalgicos dolores efficiens, discutienda atque educenda est, egregie hac conferunt ipsa diaphoretica, blandiora tamen & sedativa simul virtute conspicua, è quorum numero electuarium ex rob sambuci, admixtis cornu cervi usio, antimoniio diaphoretico & natri aliquot granis, cum aqua florum sambuci propinatum, laudem certe meretur amplissimam, præsertim si repletur & regimen sudoriferum exactius paulo observetur.

## §. VI.

*Acidularum usus.*

Non raro evenit, ut horum dolorum sævitia à ferossa foveatur illuvie, quod fit in cacochymia, scorbutica, & catarrhosis phlegmaticis corporibus, ubi malum superius quoque reveritur. Tunc autem ego ad molestissimum malum præsciendum non certus, tutius nec præsertim, quam in convenienti thermarum vel acidularum usu inveni præsidium, præcipue si in subiectis tenerioribus & biliosis cum lacte asinino permiscetur.

## §. VII.

*Secundi speciei emollientibus repleti.*

Jam quod remedia externa concernent, sacculi ex speciebus paragonicis emollientibus, videlicet ex floribus sambuci, meliori, chamomilla vulgaris, bacis lauri, juniperi, semine carvi, milii & sale rosæ parati, qui si tepide applicantur, ex omni remedium genere securissima sunt. A suffraginis quoque v. g. fumo succini, resinae styriacæ, benzoes, olivani, gummi elemi, per infundibulum vel linearum opae dentibus affectis admixto, infigne dolorum levamen secutum fuisse novimus. Interca tamen non omnes æque hanc medicationem ferre possunt, & in quibusdam graves capitis dolores, hemicrania, vertiginem, oculorum dolorem præsertim sic excitatos fuisse observavimus.

## §. VIII.

*Aut. vitæ.*

Quod si vero dolor acerbior maxime in carioso dente consistit, liquor anodynus mineralis vel solus, vel cum balsamo nostro vine permixtus, opo gossypii denobis indinus egregium præstare solet levamen. In corporibus humidioribus una vel altera olei caryophyllorum gutta, item olei origani Cretici, nec non buxi destillati carioso denti instillata vel cum gossypio applicata, opem non contemnendam afferunt. Mixtura ex spiritu vini camphorato cum croco, calidior & opio permixta gingivis atque excavatis dentibus admodum, non secus ac epistomum linimentum in rheumatismo & antridie exteriori applicatum, insignis persæpe levaminis esse solet.

## §. IX.

*Dieta.*

Cæterum, uti accuratum vivendi regimen ad præservationem affectuum chronicorum, & etiam dolorum, utile semper ac proficuum est: ita illud ipsum in nostro affectu non minorem adferunt utilitatem. Dieta vero primaria in eo consistit, ut ægri ab omnibus salis acris induratis & nimium aromatizatis cibis, vino præsertim

acido & liquoribus spirituosius, omnibusque alvum durum & adstrictum quæ reddunt abstineant, auram frigidiorē, venum præcipue ex Borea flantem quam sedulo vident, caputque maxime ab eo arceant. Et sicut in omnibus rheumaticis affectionibus præcavenda nullum præstantius ipso sufficienti motu & exercitatione corporis datur remedium: ita id ipsum quoque in chronicis & sæpe recidivantibus odontalgia commendationem meretur.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES.

## §. I.

Quando atrocior odontalgia à dente carie infecto atque excavato proficitur, si sinus id permittat, cauterium ignitum ab exercitio chirurgico dextre applicatum, omnia decantissima etiam remedia superat: siquidem funiculo illo nervo, in quo doloris sedes est, exulso, & putredine, ignis ope, è dente sublata, dolorem non modo penitus exspirasse, sed & foris cariem prohibitam fuisse, pluries etiam in nobis ipsa observavimus. Quin hac ratione quoque dente servari potest, si modo ejus cavities postea cera cum mastiche mixta, quo impediatur ciborum & aëris frigidioris ingressus, instrudatur.

## §. II.

Quod si vero durum illud in dente dolorem excitans caries, cavitatem efformaverit minus idoneam, ut cauterium commodè non admitti possit: extrema tamen, atque interna quoque in usum vocata remedia nullius efficacie sunt, nihil minus à diutius affligente dolore gravioris mali periculum imminet: vix datur certius remedium, ac dentis affecti, à circumspicuo chirurgo, idonea encheiresi celebrata evulsio.

## §. III.

Sed tenendum circa hanc operationem, ne ipso in paroxysmo, ubi dolorum vehementia quam maxime urget, insinuantur. Neque facile in plethoricis, ubi capitis, temporum & genarum venæ tument, vasæque arteriola vehementius pulsant, nisi prius iusta sanguinis extracta fuerit quantitas, dentes evulsionem tentare convenit. Tenuatur enim prædictorum hinc inde recensitas observationes, lethalem persæpe hæmorrhagiam, à dentibus præsertim molaribus improvide extractis excitatam fuisse.

## §. IV.

Observationum fide constat, venarum sublingualium incisionem in graviori odontalgia eximiam tulisse opem. Nos etiam hoc medendi genus admittimus, sub hac adhibita tamen cautione, ut incisio venarum paulo subtilior sit, alvulæque libera existat: quin imo pediluvia in usum, prius quam vena secetur ducenda statimamus. Si vero nimia sanguinis copia corpus targeat, sanguinem è pedis vena detrachere expedit: ubi dolore adhuc persistente, postea forte rannas perturbare conducibile erit.

## §. V.

Peculiare id habent remedia odontalgica externa, ut nunc juvenamentum afferant, nunc in eodem corpore nihil efficiant, & nullum adhuc constans & perpetuum contra dentium crucians reperiantur remedium. Securissimum itaque

*Cautela.*

*Qua si non locum inveniant dente excidenda.*

*Solutio tamen non prius placet.*

*Sublingualium.*

*Extrema non perpetuo juvant.*

*Hinc aff.*

*Quoniam  
fructu  
ma.*

est, flagranum & acrium humorum lenem & successivam procurare discutientem, & ab aëris frigidi injuria parem affectum quam sedulo defendere: id quod succuli superni recensiti, mitiora quoque diaphoretica omni ex parte præstant.

## §. VI.

*Purgantia  
quoniam  
ma.*

In corporibus cachecticis, quorum vasa ingenti viscosi feri colluvie repleta sunt, & que artuum doloribus alias frequenter vexata fuerunt, blandiora evacuantia in cassum exhibeantur. Sed duriore curae hic opus est, atque ad paulo validiora properandum. Inter plura alia autem, quæ huic scopo intersunt, pilule ex gummi ammoniac depurato, trochiscis albandal, extracto fibrarum heileboni nigri, mercurio dulci, cinnabari præparato, croco & castoreo compositæ eminent, & ob laudatissimum succellum, expectationi desideratae respondent.

## §. VII.

*Mixtura  
dentium  
ma.*

Mixtura ex specie vini camphorato, essentia croci, nucistæ, & spiritui cornu cervi volatili vino concinnata, ad guttas aliquot naribus excipitur, admirandum plura in modum acutissimos etiam dentium dolores in momento sedat atque profligat: cujusmodi effectus a liquore anodyno cum balsamo vini liquido nostro maritato identidem expectanda. At vero dolendum maxime est, hæc dolorum expirationem modo ad tempus plerumque perficere. Ratio autem hujus phænomeni in eo posita est, quod nervi qui ad mandibulas, dentes atque nares tendunt, ex uno trunco pari videlicet quinto originem mutantur.

## §. VIII.

*Quoniam  
dentium  
ma.*

Dolores dentium si tanta ferocia insistant, ut cuncta remedia genera penitus eludant, ego insigni cum fructu porrecti pilulas, ita à me excogitatas: Rec. massæ pilularum alophraginarum drachmam, de slyrace drachmam dimidiam extracti croci grana sex. M. f. l. a. Pil. No. LX. D. S. 6. bis 8. auf einmahl.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## CASUS I.

*Odontalgia,  
ma.*

Serenissimus Princeps, firmæ & robustæ quoad fibras & habitum corporis constitutionis, qui inculpata, & constanti valetudine quadragesimum jam annum superaverat, continuis venationibus & vehementioribus corporis exagitationibus, sub inclementiori frigido & humido aëre, sub solis intensiori æstu, sub ventis sæviter siepe remanentibus, ita fatigavit vires, ut naturam ad permolestas defluxiones in capite & circumjacentibus partibus frequenter lasciverit. Quæ non modo in capite sed & in maxilla præcipue in dentibus acerrimum dolorem pariant, atque per intervalla ex capite in subjacentia loca collum, humeros, scapulas delatæ, atroci dolore musculosa ac nervosa hæc partes affligunt, principium vero asperæ arteriæ obidentes permolestam cum raucedine tussim inferunt. Ceterum sub quietiori jam corporis statu & vite insinuo ingravescente hæc symptomata videatur, quippe & ciborum appetentia minuitur, & alimenta minus probe digesta flatus & borborygmos cum alvo pignori excitate solent. Ego in consilium accessimus, primum atroci illi dentium dolori, qui valde urge-

bat, subveniendum esse duxi: quem in finem laetus affectum limen, ex una ballami nostri vice & duabus liquoris anodynii partibus inungere jussi; quod etiam gossypii ope denti qui canosus fuit admotum, levamen non mediocre attulit. Postea exquisitam vietus rationem imperavi: quæ in eo consistebat, ut omnem aërem inclementem, ventos impetuosos maxime, ac solis æstus evitaret, & exercitationes corporis, equo vel curru vehendo, vel ambulando cum moderatione tamen, quia is affectus erat, non intermitteret; loco potius ordinari decoctum temporarium ex radice chinæ, cortice ligni sassafras, passulæ, atque pauxillo cinnamomi paratum bibat, parcius vero vinis spiritibus utatur, vel saltem tenuia Mosellana & huic similia, aut valde diluta cum aqua hauriat. Præter rectam vivendi rationem, in qua constanter pergere debet, etiam hæc malo expugnando accommodata remedia ad usum proposui. Adeoque infusum Theiforme ex melissa, salvia, veronica, betonica, corticibus citri recentibus, cardamomo, jussu doli mixtis, mane sumendum in lecto cum lenioris doloris expectatione jussui. Ante prandium elixiri nostri balsamici drachmam cum pauxillo vini & aque capiet, atque ad alvum liberam sibi dandum bis in septimana passulas Corinthiacas siliabarinis ad usum, ante lecti introitum sumeret, consilia: ad nullum vero levantam, oleum amygdalarum dulcium sine igne paratum, cum duabus partibus silyri capillorum veneris permixtum, in avenaceo jukulo circa noctem usurpare auctor sui. Præterea frictions in capite & dolore affectis partibus mane & sero adhibendas, cum panis succini fumo imbuitis, calidis, plurimum commendavi, atque ante omnia ut caput & partes superiores a frigore munit, jussui. Cucupham quoque in capite gelandam ex herba majoranæ, sativæ, floribus spicæ, rosifinarum, chamomillæ Romanæ, succino, benzoe, slyrace, cardamomo præscripsi. Quibus remediis adjuncta per divinam gratiam, à molestis illis rheumaticis doloribus immunis reddita, jam sine ullo valendius impedimento ex voto vivit Princeps Serenissimus.

## Epicrisis.

Quemadmodum ad constantem tuendam sanitatem, & ad morbosas à corpore evitandas afflictiones, nil nec efficacius nec securius conveniens & sufficiente corporis motu, labore & exercitatione est: ita atenta etiam observatione animadvertimus, non modo ex intermissione corporis motu, sed etiam ex nimis, vehementibus inopportunity & sub inclementi celo insinuat exercitationibus viam ad morbos aperitissimam fieri: videlicet quodcumque ille subito omittitur. Nam quo celerior sub ipso monitione impetu & agitatior fluidorum & solidorum est motus & progressus, eo tardior & imbecillior possit evadere, quando prætoris corporis exercitium negligitur. Hinc pressio pede sanguinis & humorum stagnationes, decubitus, feri separationes, ejus extravasationes atque in subjacentes partes defluxiones, præsertim eas, quæ aëris injuriis expostæ imbecilliores & a naturali tono dejectæ fuerint, aliisque permolestia accidentia insequuntur; quemadmodum superius haud ignobile exemplum satis luculentum demonstrat. Ceterum, quoniam natura assiduis & quotidianis usque validioribus exercitationibus fuit adiecta, non penitus eas intermittebat, sed sub modo & moderatione continuandas esse censui.

Ff

Ca.

## CASUS II.

*Rheuma  
dumidum  
et  
calidum  
prospici-  
entem ca-  
sa ama-  
lante ali-  
gendum.*

Cum nuper ad aulam Serenissimi Principis vocarer, consultum me adit femina honesta aetate XL. annos nata, sanguine & succis plena, quae sub priori conjugio & ante illud etiam in primis juvenutis annis largiter semper sanguinis menstrualis fluxum experta est, atque, dum singulari fere anni liberis peperit, satis valens & salva permansit. In altero conjugio, quod plane fuit sterile, per aliquot annorum spatium, tempore potissimum vernali & autumnali, permolestia & gravitas in capite defluxionibus, co-ryza, gravedine, dentium acerbio dolore, tumoribus faucium, uvulaeque prolapsu misere admodum fuit tentata: quae symptomata duos, quandoque tres menses continuavit. Tumor internus faucium non mediocriter ita saepius compressit mandibulas, ut os deducere, nisi quantum sufficeret ad sorbillanda juscula vel tenuiores cibos capiendos, non poterit. Multis usâ domesticis & pharmaceuticis remediis: sed cunctis effectu plane frustraneo. Cum in plenitorem morbi statum ejusque causas inquirerem, cognovi eam cum marito inferiorem domus humili loco fite stationem inhabitare & in ipsa dormire, quae cum minus à ventibus perfari queat, sive inclusus quam facile vappidus & humidus reddatur; deinceps in quieto semper vitae genere versata est: terno in conjugio sterili vixit & menses longe pauciores quam superioribus annis experta, singulo quoque vere & autumnio venae sectionem in brachio admittere consuevit. His perspectis & diligenter expensis, vitiosi feri portus illuvium in hoc corpore, quam sanguinis redundantiam peccare judicavi. Quare non tam ad sanguinis quantitatem detrahendam, quam ad feri intemperati & impuri nimiam copiam impediendam imo è corpore exturbandam, & ad robur toti corpori, capiti imprimis, conciliandum medicamina consilium direxi. Suasi igitur, ut mutaret conclave & dormitorium, atque in loco diffusibili alicui vitam ageret: dein, ut intermedium tempore quâ libera erat ab hoc affectu, à copiosiori cibo, carnibus elixis & pinguioribus jusculis, à cuncta etiam abstineret, & corpus labore & motu moderatiori exerceat, praecepti. Loco ceterisvis crassioris aquam coctam cum cinnamomo, corice l. falsastras, passulis & quarta vini parte mixtam bibat; & ut singulis mensibus, bis vel ter pilulis meis balsamicis polychrestis, & eodem in septimana vicibus elixirio balsamico temperato utatur edixi. Denum balsamo nostro liquido caput invingendum, & aqua cum vino remixta, in qua aliquot guttulae balsami dicti instillatae, os frequentius colludendum commendavi.

## Epi&amp;rsu.

In ejusmodi diuturnis crebrius recurrentibus rheumaticis affectibus profligandis, medicus qui consultatur, probe semper prius statum corporis, causas antecedentes & concurrentes investigare debet: siquidem upurimum laxas & circumsp&ctas Philater, permolestias has diuturnas fluxiones seu rheumata, à tenuiore & excrementitio fero ex atonia solidorum oriundo potius, quam à sanguinis boni redundantia dependere atque produci deprehendet. Et tunc pessimo consilio largiores sanguinis detractioes propotuntur, quae naturae imbecilliores reddunt & ad morbo&sa afflictiones disponunt. Ego in doloribus rheumaticis arthriticis neque minus in catarrhis

defluxionibus, singulari semper cum fructu diam, ut ita loquar, emaciantem commendavi & imperavi; quae in detractioe copiosi alimentei, abstinentia, ab omnibus quae copiosum aliut nutrimentum tam cibis quam potibus, sufficienti motu & exercitatione corporis, tenuisque ac levi potu consistit; interpositio nonnunquam apoc balsamico laxante & roborante. A quibus auxiliis, in ejusmodi abigendis & avertendis morbis, ampliore me semper consecutum fuisse oport, ac ab aliis pharmaceuticis remediis omnibus, sancte adstruere & affirmare possum.

## CASUS III.

Juvenis annorum XXX. corpore carnoso & boni habitus, sanguine abundans, hyemali tempore domi bene passus & cibis nutritibus saturatus, viri quoque non raro haustulum interpotens, sub libero vernali, ventoso & humido coelo, non recto satis & munio corpore iser per aliquot milluraria facere debuit. Huc domum rever&to, ingens lassitudo corpus, caput mole&ta cum verugine gravitas, dentes vero immanis admodum dolor irru&bat atque invade&bat, qui noctu acerbior erat. Quam per annum sanguinis missionem non passus fuerat, ex meo consilio venae circa pedis malleolum facta incisio, & plus quam decem unciae extractae; quae vacuatio cum euphoria celebrata quantum horum path&marum remissionem largita fuit, pullu inde va&len&tor reddidit. Ipse sponte sua ante lecti ingressum, quam per syringam tabaci hauriret fumum, atque frigida&e fontanae meduram successu temporis eporavit, cubitumque petens corpus str&ois probe texit atque circumvolv&it. Hinc largissimus in toto corpore suboritur sudor per integram noctem manavit. Inde experges&ctus, omnis dolor à capite & dentibus, felicissime fuit ab&ctus.

## Epi&amp;rsu.

Quandocunque dolores gravativi & rheumatici artuum, capita, imo dentium, à sanguinis a&er & & & sic dicti consistens & rubicundi redundantia, quae imp&nditoris humorum circulus & secretionis atque excretionis imm&mor&is parens est, potius quam à feri impuri copia & decubitu in euf&rtia & bene passis corporibus oboritur; ipsa ratio sana medico-pr&ctica d&cl&at, ad liber&orem circulum sangu&ni & humoribus conc&id&ndum, sectionem venae rem&edium esse ap&ss&simum. Et tunc ordinario pul&su major, a&ctior & fortior post sanguinis vacationem sequ&tur, qui cerum minimeque fallax, ex redundante illo purpureo liquore morbum provenisse, indicium exhibet. Deinceps insignis atque purae fontanae frigida&e sudoriferas & discutientes virtutes, hic casus magis conspicuas atque illust&iores reddit. Ego semper in hac ha&resi fui, aquam frigid&am fontan&am pur&am, terre&stri&oris calc&rete vel salinae mat&rie expertem, incomparabilem multis in morbis pra&bere medicin&am, tum ratione frigoris fibras aton&itas firm&andas & robor&andas, tum respectu mineralis a&etheris spiritus, quo nulla aqua destituta, virtutis ident&dem am&cti; quin & ratione fluxilit&atis ac tenuit&atis, quae cr&ssos humores mobiles, fluxiles atque libero progressui aptos reddere va&let. Sed hoc rem&edium, quod unque magnae utilit&atis est, & recte heroicum dici pot&est, maxima eger cautions & circum&spe&ctione. Quam his&ce capitibus includere non dub&it&amus: quorum pr&imum est, ut imbecillo & tenui-

cor-

corpori, ubi motus languent & venæ sero surgent non exhibeantur: secundum, ut tantummodo corporibus sanguine, calore, & motu vegetiore adhuc plenis præbeatur, quo in corpus corporis ambum aëluari & distribui possit: tertium, ut non uno haustu, sed successively ac per vices ingeratur: quibus addimus quantum, ut corpus post epotationem vel motu ad fuciem usque exerceatur, vel in lecto calidis tegumentis probe foveatur.

## CASUS IV.

Odontalgia ex  
congrua  
dieta.

Fœmina XXX. annorum, victui crassiori salino indulgens & oleosæ vitæ dedita, sanguine abundans, alvum paucis crebrius ventem atque striclam, mensuricque defectum experitur. Sanguis est vena missus apparatus glutinosus. Autumno gravissimo corrigitur dolore circa nucham, qui scilicet ad nucham excedit, paritidem totamque dextram maxillam cum inflatione atque rubore occupans, in dente carioso epistemon lateris gravillimum dolorem excitat. Pulsus erat fibrilulatus, arteriæ fortiter circa tempora pulsabant, sinistri iniquus vel plene nullus, & perpetuo salivæ latex ore effluxit. Ut his modis faceret, externe utebatur linimento, quod habebat oleum hyocyami, curvi & parum camphoræ, a quo dolor minime mitigatus, sed potius exacerbatus fuit, inflammatione in facie aucta. Cuius viro est sequentibus. Primum mixturæ ex liquoris anodynæ uncia dimidia, camphoræ, laudani opaci cydoniati uniusque granis tribus paratæ, quædam guttas vel viginti, tribus de die vicibus sumit. Secundo, loco potus ordinari decocto hordei, fortioræ & radice ligni salutaris, cum semine papaveris albi in emulsionem reducto suis usus. Nuchæ & capiti loquens applicatus fuit linimentum: Rec. aquæ Archæolæ, spiritus florum sambuci ana unciam, spiritus salis ammoniaci drachmas duas, nitri artificialis, quod præparatur ex spiritu salis ammoniaci & spiritu nitri, camphoræ utriusque drachmam dimidiam, opii grana decem, olei nucisæ destillatæ guttulas quindæcim. M. Quod externis adhibuit, egrègium plane tulit solatium. IV. Mitigato paulisper dolore, alvus vacuata fuit cum infuso, quod capiebat folia fenugreci, rhabarbarum, agaricum, cremorem tartari, & passulas minores, cum aqua & vino. Ut ut vero dolores ex parte remiserint, remansit tamen fixus in gingiva circa dentes sedem cruciatus, cum insigni inflatione & rubedine, qui ad aliquot menses durabat. Ex consilio lesque medici, & opera chirurgi extracto dente, materia ichorosa & purida in copia successively ex alveolo effusa, cum plenaria doloris remissione. Foramen vero relictum usui adstringentis medicaminis fuit clausum.

## Epicrisis.

Ex hac morbi relatione discendum est, quod odontalgia frequenter conjuncta sit cum plethoræ seu erysipelacæ quadam diffusionione, quare etiam eodem modo ac via sanatio utriusque affectus insinuenda. Ex quædammodum in erysipelacæ affectibus externis applicata oleosa nunquam profuit, ita etiam in hoc casu ea non bene ferre potuit ægrotas, sed dolor potius discutientibus, temperatis & diaphoreticis aulcavit. In cacochymicis corporibus, maxime, si humorum adfociatur abundantia, frequentissime gignitur & quidem circa autumnum odontalgia, quo tempore etiam arthriticæ afflictiones familiarissimæ

Fréd. Hoffmanni Oper. Tom. II.

occurrunt. Rebus itaque talem eventum fortiter pibus, ad præservandam venæ scissio, decocta liquorum temperata, convenienter evacuantia, abstinentia a vino, cibique salitis acrioribus, utilissimam, depurando totam sanguinis massam, locam operam. Porro, cum fistula facile generetur in maxilla, quando in ejus alveolis materia acris purida stagnat & exitum non invenit, quo non modo ipsum dentem, sed ossæm etiam maxillæ substantiam exedit, corrodit & ulcus difficulter sanabile, quod cognoscitur ex dolore, tumore & rubore, nec non puridæ materie post compressam gingivalem canem effluxione, efficit; ut in ætate ipse dens extrahatur, quo corrupta illa materia non solum habeat exitum, sed etiam medicamenta proxime ipsi ulceri applicari possint, maxime est necessarium.

## CASUS V.

Fœmina XXX. annos nata, venarum sectioni diu adicta, quocumque anni, quocumque tempore utrum tulerit, omisit, ob vanum & nullis rationibus innixum metum, ne hoc evacuationis genus periculum potendat. Sed semper fere affectus est gravi odontalgia, juxta cum tumore faciei scissio. Inter præludia vero hujus recurrentis affectus, ad frequentiam illius præcidingendum usa est essentia, que consistat ex terra catechu, sanguioe draconis, quædam aluminis uli & spiritui viri; quæ tam externe, quam interne sumta, mox acerbissimi capitis secuti sunt dolores, cum summa præcordiorum anxietate, insigni virium defectu animique deliquio conjunctis. His cessantibus symptomatibus tumor utriusque maxillam occupavit, quem externa applicata cataplasmata non allevabant, sed exacerbabant, ita ut intensiori febre facta & incurantibus animi deliquio aboritur passus fuerit. Tandem emplastro manus Dei purinat ille in scizthofam duritiem abiturus tumor fuit depulsus.

## Epicrisis.

Gravidis familiarissimæ sunt propter plethoriam & cacochymicum statum, & ob impedimentum perspirationem, mensuricque defectum, odontalgia vel etiam erysipelacæ capitis & odontalgia affectus, qui matuta venæ sectione, & eorum usu, quæ alvum clementer cum euphoria & per epicrasin movent, monaque insuper & viâ moderato præcindi feliciter possunt. Si quis itaque extensionem humoris viscosi, si jam imminet imprudenter velit impedire, quod fit adstringentibus; non potest aliter fieri, quin materia a sanguine jam si gregata & corrupta in internas & nobiliores partes irruat, longe graviora symptomata inducendo. Notabile porro est, quod non secus semper sint cataplasmata ex discutientibus etiam composita, quia læpius repellunt facultatem, dum videlicet humida non quodvis ferre possit, nanciscuntur. Deinceps tumor lentus facili terasit in scizthofam duritiem, præsertim si nimis spirituosus discutientibus fuerit tractatus, quæ diutius adhæret, & difficillime resolvitur, neque facile emollescitibus ad suppurationem disponi potest. Egrègium vero virtutem non feret sed aliquoties talis in casu experti sumus, ad emplastro sic dicto Manus Dei, quod maximam partem ex gummatibus compolitur, atque in *Clavis Pharmacopœia Regiæ* descriptum est.

## CASUS VI.

*Dolor den-  
tis in perio-  
dico, ex  
vitiis &  
dilatata  
incuria.*

Vir sanguineo-melancholicus vino adfectus & dulcibus ultra modum delectatus, ex casuoso den- te dira sepius tormenta, præcipue autem tem- pore nocturno passus est. Dolor hic erat perio- dicus: incipiebat enim circa decimam horam, excrucians usque ad tertiam matutinam, nullo extrinsecus apparente tumore aut calore præter- naturali. In caviatæ densis hærebant particula spongiosa exquisitissimo sensu prædita. Hujus foraminis intrusa fuit essentia calidior, cui tan- tillum laudanti opiatæ admixtum erat. Ita quidem doloris atrocitas quiescebat, nec per biduum reversa est; sed tertio die recrudit, & eadem hora rediit: non autem eodem remedio, sed ex camphora indita remisit. Elapsis aliquot diebus, cum idem dolor recurrebat, nec camphora, nec præ- dicta essentia oleum levamen afferebant; sed po- tuit ad oleum caryophyllorum confugien- dum fuit, cujus una & altera guttula denti ca- rioso immissa levamen attulit. Accidit vero ut, cum sequenti septimana malum eodem modo in- fellebat, neque unum ex hisce tribus, una singula applicata facine, quidquam in allevando ma- lo præstiterint. Sensi, ut interne electuarium su- perius recensivimus, cujus basin continere rob sam- buci, repetitis vicibus sumeret; externe vero bal- samum nostrum vitæ naribus susciperet & denti essentiam calidiori indideret: quo dolor etiam mi- tigatus fuit. Tandem dentis extractione facta, dolor nunquam rediit.

## Epicrisis.

Hæc memoratu digna observatio luculentet docet, quam incerta & infida sint specifica sic dicta amodontalgica externa, idque hanc ob ra- tionem, quod sibi sunt & pororum in partibus solidis textura, & ab ea dependens debilitas non semper eadem maneat, sed brevi ab ipsa etiam medicamentis mutari possit: quo fit, ut idem re- medium non eundem, sed alienum plane sæpe numero præstet effectum. Parum itaque auxilii cum expectandum sit ab externa, consultius sem- per procedimus, si curam ejusmodi afflictum congruis internis remediis adgrediamur & pro-sequamur, affectamque partem tantummodo in temperato calore & in expiratione æquali & liberiori detineamus.

## CAPUT X.

## De dolore &amp; spasmo otalgico.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## § I.

Circa dolorum & spasmodorum doctrinam dum versamur, ille etiam qui ad aures pertingit & non minori servitia ac ceteri affligit, non re- tendendus est: licet breviter, quicquid de hoc af- fectu commemorandum, dicamus. Est vero otalgia gravis dolor, in aurium cavitate sive meatu auditorio consistens, a sero acri extravasato, & subsistente inera membrana nervæum meatum auditorium cingentem exortus.

*Definitio.*

## § II.

Pertinax hic aurium dolor, eos, qui rheuma- tismis & catarrhalibus defluxionibus sunt obnoxii, frequentius adoriatur, vel, si sudor confusus sup- primatur, aut caput sudore modicum ventis fri- gidioribus deflexio exponitur, progrossatur. Sæpe causa, inflammatio vel ulcus aurium est, ubi insignis ardor, dolor tendivus, pulsantius, rubor, febris imo delirium junguntur: interdum à ver- mibus excitatur, & dolor vagus lancinans atque rodens percipitur. Præclare ARETÆUS lib. II. cap. III. de aurium dolore sequentem in mo- dum dixerit: *Acutissimus porus difficillime saepe do- loribus vexatur, ut etiam occipitium teneatur & oculus atque buccarum musculus, & perserratione quadam tardissima tempora & caput. Ali- quando etiam humoris fluxus per easdem cavernas fit quem graeci rheumatismum vocant. Et ita jugis ut saepe vulneret aliaque corrumpt, & ossa carere incipiat.*

*Causa & symptoma.*

## § III.

Otalgia tanta sepius vehementia affligit, ut in provehentioris atque adultæ ætatis hominibus delirium exciet, cum summa inquietudine & anxietate conjunctum; quinimo epilepsiam sic fuisse introductam nos observavimus. Phlegma- ticos autem licet minori gradu infleat, horrendos tamen in choleris, capitis dolores cum qua- dam mentis alienatione, vigiliis & inquietudine infert.

*Prognosis & symptoma.*

## § IV.

Ratio, cur aurium dolores tam crudeliter læ- dant, ut tolerari vix possint, in eo potissimum posita videtur, quod membrana aurem que in- vestit, ossis illo manui firmiter annexæ, adeo- que magis tenditur, nec non à dura matre ori- ginem sortitur, nervorumque itreptu dives est. Quo magis autem membranae nervæ tense atque expansæ sunt, eo acutioribus doloribus et sunt obnoxie: quemadmodum id liquido appa- ret in peritostio, intra quod & subiectum os con- tentus sæpe humor ferenda symptomatica produ- cit, quod in panaritio alitque ossium vitis videtur est.

*Ratio & symptoma.*

## § V.

Sæpe otalgia symptoma febrium acutarum evadit, ubi materies morbosæ ad aurem per me- tastasis fit translocatio; quemadmodum in mor- bo Hungarico interdum evenit, ubi furdies vel ingens saltem auditus difficultas exoritur. Quæ si in declinatione febris accidit insalubre convales- centiæ præbet signum: sed tunc vinum in auris insertæ membrana & nervo acustico hæret. Quando vero metastasis ad aurem externam per- tingit, tunc otalgia suboritur, quæ, nisi cito lue- curramus, ob doloris atrocitatem demere vitam potest. Quæ ex lapsu vel casu in terram otalgiam patiuntur; ubi materiam viscosam per aures red- didere, è medio omnes sublatis sunt, teste RI- VERIO observ. XVIII. p. 291. HIPPOCRATES vero in *coac. praenot. pag. 538. §. 58.* de cunctis hujus morbi sequentia habet: *auris dolor perti- net, cum febre acuta & alio quodam signo aliquan- tum magis juvenem quidem sepius die occidit, & cuius delirio correptos, si non multum pau effluere- rit ex auro, aut sanguis è naribus, neque aliud quod- dam bonum signum compareat, Senariæ autem tar- dum & minus tollit: non & aut in suppuratone preveniunt & minus delirant. Verum nudi ex-  
hi*



his reciderant, atque sic percunt. Monere autem hoc loco debet, quod hoc decretum Hippocratis magis de dolore & tumore inflammatorio parotidum intelligendum fit.

adhibita spongiam calidam. Ipsam quoque cavernam involuta lana per specillum oleo calido tinctum, paulatim penetrant, atque ille lana detrita ferramentum detrahimus.

## METHODUS MEDENDI GENERALIS.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES.

## §. I.

## §. I.

Dolor cum  
parotid.

In curatione hujus dura tyrannide aures exercens affectus, omni ratione eo annitendum est, ut dolorum illa vehementia, quæ causam interdum gravissimam symptomatibus præbet, componatur vel saltem mitigetur. Id quod variis quidem modis tentari atque obtineri potest. Nos autem alius cunctis, pulveres nitrosos cinnabarinos, liquorem nostrum anodynum mineralem, nec non emulsionem seminum IV. frigidiorum majorum præferimus. Quibus nihil proficiemibus, ad opium risse correctum fugiendum est, quo nomine massam pilularum de Hyrace, *Stærcki*, *Wildegansii*, laudanum liquidum *Sydenhami*, vel cydoniarum *Helmstadii* commendamus.

## §. II.

Auritis.

Externe emplastrum anodynum tempore lateris affecti nec non pone aures applicatum, quod ex malliche, galbano, croco, oleo nucis expressio, castoreo, opio compositum est, desideratissimas fert superias. Dein etiam vapor ex lacte & speciebus fragrantibus atque emollientibus auri immixtus materiam peccantem non modo emendat, corrigat atque ad suppurationem disponit, sed & fibras nervas nimis tenas relaxando dolore salvit. Convenir quoque vesicam suilam decocto cum lacte ex floribus malvæ, verbasci, sambuci, meliloti, chamomillæ vulgaris, nymphaeæ, papaveris rhodados, semine lini & paululo croci repetam exteriori affecto lateri admoveo. Fumus quoque nicotianæ cum fistula ioveria auri immixtus, item millepedes in oleo olivarum vel amygdalarum amararum infusi, nec non oleum scorponum ad dolorem, si ab inflammatione vel ferro acri provenierit, compescendum, maxime valere credimus.

## §. III.

Humor  
si spumæ  
accideret  
dura.

Quemadmodum autem ubicunque humor stagnat atque subsistit, is promovendus atque discutiendus est: ita etiam pulveres diaphoretici, leniter nitrosi, cinnabarii, cum aquis diapnoicis atque analapicis propinati opportunissimam in hoc affectu locabunt operam. Plethorici si urgeat, vena secanda: atque alvus retinens clysteribus emollientibus, vel internis laxantibus ex manna, cassia & rhabarbato paratis, ad officium redigenda. Dignus certe est qui hac occasione commoveatur locus apud modo laudatum ARETÆUM, ubi curationem hujus mali pulchre admodum proponit. Utendum inquit, loc. cit. reque corporis atque abstinencia & silentio summo: etenim organo auditorio accepta voce aures necessario commoveantur, & propterea majores dolores efficiunt. Locandi præterea egrotantes calido in lecto, & si dolor coegerit, phlebotomandi, atque ertia de levi atque fastidioso reficiendi, & ob mitigationem doloris exterioris admovenda vaporaria tepidi liquoris vel sacculi ex polline tenera confecti. Tum cataplasmata laxativa, & cum dolor totum senserit, statim erui admovenda fuscipuga quas boradines appellant circa fines auriculæ, vel circa ejus posterius coccubita admovent, scarificando, Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.

Quandocunque dolor aurium à causa externa, immixta v. g. dura mole in aurem provenit, cujus rei exempla apud HILDANUM proflant, tunc in ipsa doloris levitate neutiquam tentanda erit extractio cum soccipe vel alio instrumento: eo, quod non modo frustra hoc tentamen sufficiat, sed & dolor mirum aducltis symptomatibus intolerabilis reddatur. Sub doloris enim impetu nervus auditorius meatus vehementer ipsino constringitur, ut adeo, quacunque demum etiam leviori vi externa accedat, dolor exacerbetur, & meatus sic angustior evadens, materiam exinus eo magis prohibeat. Rebus ita se habentibus, sonus fuscæ disti potius locum invenit applicatio, vel aliquot olei amygdalarum amararum in aurem instillatio: quippe quod præter vim demulcentem, sedantia quoque sacculat est instructum: qua ratione, dum membranas tenso emolliuntur & relaxantur, sola oborta stertatione, corpusculum illarum simul & semel sponte excutim fuisse, novimus. Atqui, cum hac apprimere quadrent, quæ monumenta suis reliquit TRALLIANUS, non possumus, quin ejus de hac re sententiam ad verbum recenseamus, quæ libr. III. cap. III. ita se habent: Si lapillus, aut faba, aut aliud quicquid in aurem incidat, speculum lana involvitur in resina terebinthina aut glutinosum quoddam tutigio, ac ubi in aurem injectum leniter protrahatur, & sternutamentum excitetur, os & nares obturatur. Nam spiritus intentione, quæ ita fit, id quod tenuis impactum est, expellitur. Hoc autem contritus facio diligenter adhibeo, ut quam primum exoneretur. Sin autem neque sic exierit, inflammatione oboriente, convulsionis saepe committitur, ut etiam acri de vena periclitentur. Quare oleum quoque tepidum frequenter infundere oportet: sic enim locus inflammatione liberatus, id quod infudit, facile eximitur.

## §. II.

Otalgia plerumque à causa interna solvitur & abscessu finitur, dum materia purulenta ichorosa, ex ipsis glandularum mearum auditorium exteriusne obfiderium atque cerumen altius largiuntur poris & tenuibus canaliculis, stillat. Ad quas etiam in infamibus, præsertim qui spongiosioris corporis sunt habitus, tanquam saepe humoris serosi fit affluxus, ut ingens ferendi & purulenti humoris copia quotidie exeat. Sub tali morbi statu humorum impetus per laxantia leniora, manna, rhabarbata, passulata, aliquoties repetita divertendus, vel pediluviorum, vesicatoriorum, aut cucurbitularum ope in provecliora præsertim ætatis hominibus, ad inferiora vitandus est. Hac ratione molestus hic aurium fluxus successively minuitur, & salvo auditis organo sanatio perficitur.

## §. III.

Quando major jam puris copia post inflammationem præcedentem ex aure effluit, tunc, præter ea, quæ humorum impetum, a capite & auribus divertunt, quæ leniter efficiant, putredineque resistunt

Quid  
opendum,  
si a causa  
externa in  
aurem  
incidat  
lappa nat-  
gineum?

Materia  
purulenta  
divina est  
fusa de  
veritudo.

Lenior  
est  
fusa.

resistunt exterius admovenda sunt. Veteres eo sine pastillos, ex aloë, croco, myrrha, sarcocolla, confecerunt, & aurium cavernis indiderunt, vel mullum ex vino factum cum mali punici cortice, nardo, amygdalis amaris, croco, myrrha, alumine, vel herbarum vulseranarum fuccis coctum, & caverna aurium, si humor fortius efflueret, infuderunt. Quia de re evolvens CÆL. AURELIANUS lib. II. cap. 3.

## §. IV.

*Tumor non  
subito in-  
hærens.*

Cavendum vero est, ne diutino aurium purulento fluxui, à quacunque etiã causa proveniat, externis validioribus exsiccantibus & fortioribus adstringentibus desubito obex ponatur. Exinde enim ingentem paronidium tumorem, cum summo dolore sævisque symptomatibus sliparum, profectum fuisse, nostra pariter & aliorum fide constat.

## §. V.

*Paronidium  
in fide  
atrigenda?*

Quandocunque febrilibus acutis supervenit atrox ille aurium dolor cum insuperfientia paronidium; non præsentium auxilium, ac in cucurbitularum cum scarificatione in nucha appositione, & solus cataplasma emollientis, ex caricis pinguibus, croco, melle, succo ceparum tostarum & radice kilinurum alborum parati tepido usu, me invenisse plena fide testor.

## §. VI.

*Si dolor vel  
strepitus  
vel tinnitus  
vel tinnitus  
vel tinnitus*

Si dolor à vermicibus aures ingressis ortum traxerit, lacte tepido auribus immisso hie eliciendi, vel oleo abstinu, nucleorum Persicorum aut amygdalarum amararum sunt enecandi.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## CASUS I.

*Oralgia  
sustentata  
et amplius  
pro brachii  
tumore  
et ap. lac-  
tis intra-  
re.*

Nobilissima Virgo quinquagesimum quæ jam complevit annum, activi ingenii, sanguineæ constitutionis, decem abhinc annos dolorificis parium externarum fluxionibus à sanguine nimium abundante, & ob ejus tardipem progressum impuriore reddito suborita continuo fere fuit obnoxia. Me quum hac de re consuleret, ut ter minimum singulis annis nimiam redundantis sanguinis quantitatem è selecta vena detrahi curaret, auctore fui: unde melius etiam se habuit. Consuevit vero hac sanguinis educatione æquinoctio autumnali intermissa, atque sudore nocturno usitato, ex improvida brachii dextri refrigeratione, cohibito, postero die ingenti dolore una cum tumore in eisdem brachii cubitu tentata fuit; qui adeo sensim crescebat, ut brachium neque flectere neque antoltere posset. Ad hanc molestiam abigendam, amicum fusu, frequentius ex gummanibus resinosis, succino, tacamahaca, uls est suffragio: quo remissior quidem dolor rediit, sed tumor mueta sede superiore humeri pariem invasit, qui insignem in magnitudinem crescebat. Huic cum à chirurgo emplastrum applicaretur, evanuit ex parte quidem, sed in dextrum capitis latus irruens, in aure proximam horrendum & acutum dolorem, ut vix ferendo illi par esset agrotæ, introduxit. Totum dein caput insigniter tumefactum comparuit, audientia aderat summa difficultas, atque è naribus aliquot sanguinis gutta cum mucosis multo humoribus secesserunt. Consilium meum, cum per medicinæ candidatum qui mihi ad manus erat exquireret, consilium primo omnium du-

xi, ut aperiretur vena pedis sinistri, quo abundanti nimium sanguini quodammodo exitus daretur; deinceps, ut infuso foliorum fenise & rubarbari cum decocto passularum minorum, fordes è primis viis blande educerentur. Quibus præmissis, tenent victum & pro posu decoctum, ex radice farfaparillæ, glycyrrhizæ & floribus papaveris rhodæis sumendum imperavi; atque ad successivam transpirationem & uberiores prævi humoris subsistentia promovendam distillationem, ut æquali læti calore corpus foveret, & mixturam, ex aqua florum sambuci, cornu cervi ulso, antimonio diaphoretico & pauxillo ritri frequentius usurparet, laterique dolenti sacculum supra descriptum leniter calefactum applicaret, fuals. Et ita circa undecimum diem, largo sudore sponte erumpente, totum corpus fuit persusum, evanescente penitus permolesto accidente. Cum vero audient gravitas cum dolore pressorio remaneret, consilium dedi, ut panis cum semine fœniculi igne cocti, recenter ex fumo extracti de difficili vapore meatui auditorio reiteratis vicibus admitteret. Quo pacto expurgata demum pilula balsamica & cephalica nostris, sordium mole, pristinae valentis sensim sensimque Nobilissima patiens fuit restituta.

## Epiresis.

Ex hujus affectus generandi, pariter ac eum curandi modo, medicorum juniores plura ad praxin utilis morienta capere de deprimere possunt. Primo, quod dolores ejusmodi rheumatici, à venæ sectione neglecta & sudore confuso saluari prohibito, originem suam ducere possint. Dein, quod ad eos abigendos suffragia non satis sint secuta remedia, dum totum cutaneum fibrarum nimium augendo, pravorum humorum motum ad interiora convertunt, quum poris ejusmodi viscosi humores sensibilibus corpora partibus & poris inhaerentes successive de placide commovendi, & ad liberiores exhalationem incitandi sint. Et quod, tertio, in ejusmodi pertinacibus rheumatibus profligandis longe magis circumspicere de efficaciter agat medicus, si non multis activioribus sudoriferis naturam lassat, sed tempus expectando, blandis & temperatis ad diagnosen disponentibus remediis utatur: qua ratione contingit, ut natura sponte sæpe citius & salutariter morbum solvat.

## CASUS II.

Generosa senex sexagenario major, macilentioris stature sed floride faciei, olim cum inter Westphalos medicinam faceret, consilium me adiit, qui à convivio, in quo vinum liberalius potaverat, sub aura nocturna peregre domum reversus, altero mane de gravato capite dolore, sinistram præteritum latus affligente conquerebatur. Huic mox dolor auri valde acutus successit, qui tam atrociter intra paucos dies invalefcebat, ut non modo omnem formam admitteret, sed & tremorem parium universi corporis cum frigore excitaret, adeoque non frustranea esset convulsionum metus. Intolerabilis plane dolorum tormentis miserrime excruciatum lenem inventi, qui non nisi à globo per flosopetum trajecto levamen operari: tante infanise de desperationi proximus erat. Exterius, dolente in parte nihil præternaturale conspiciendum erat. Itaque alius aliquoties à clysteribus ut aperiretur, cura:

*Oralgia  
invenit  
et ingula  
vix repa-  
re & fign-  
re refra-  
gatione.*

curavi: atque interne non nisi pulveres anepilepticos, cum nitro, cinnabari & pauxillo laudati opiani remissos propinavi, vaporem quoque decocti florum chamomillae cum lacte auri frequentius admoventum praecipui: eo quod intra meam auditorium consilium dolorem, conquerebatur. Tandem elapso die sepiimo, mitescens doloris levitas, corpus madore persufum, pulsus reditus sedatio & mollior, qui ante contractus & durus erat, urina quoque ansea valde tenuis & aquosa, crassius nunc sedimentum deposuit, & denique sponte aperto abscessu, ex aere successive duobus purulentae materiae cochlearibus effluentibus, omnia & singula gravia symptomata penitus remiserunt atque evanuerunt.

## Epicrisis.

Mirari omnino subit, senem nostrum tam valenti & robusta natura adhuc gavissimum fuisse, ut adeo gravem capitis affectum, qui totum nervosum systema afflixit, feliciter superare potuerit. Atqui in hoc genere haec ipsa curatio, quae plus naturae quam arti debetur, insignis auctoritatis naturae exemplum praebet. Venae sectionem cui non aditus erat, nobis admittere, nec fortioribus, sed lenissimis tantum remediis atrocissimum morbum in fene perfractare aequum duxi. Ex hac viri magna auctoritate in principatu Mindensi pollicens è tam gravi morbo evasio, mihi tum temporis juveni medico, magnam supra meritum meum famam & exaltationem conciliavit.

## CASUS III.

Generosae forminae, viduae consilii Auslidi filia, decem annorum puella, tenerioris & mollioris naturae, de languore, inappetentia & doloribus abdominis, pungitivo etiam circa hypochondria, querelas cum ejulatu insinuat maximas. Somnus erat exiguus, cum pavore plerumque comitatus. Praesentiam verum horum pathematum causam cum judicavisset; quae us & evocanda & expellenda accommodata videbatur, à me fuerunt praescripta: at vero in casum adhibita. In lecto detenta per mensem & ultra, perpetuas de hisce symptomatibus movebat querimonias. Tandem facta dolorum ex imo ventre evanescentia, cephalalgia cum auditus difficultate gravior tentabatur. Accessit assidua vigilia, adeo ut per quatuor & quid excurreret hebdomadam spatium ne horam quidem capere somnum potuerit. Quotidie delirabat; nec quicquam cibi vel potus assumpsit, auditu penitus amisso. Nihil ad vitam & vires conservandas praeter intimum cerevisiae cum pane cepit: quippe medicamina cuncta, omnia iuscula atque alimentorum genera respuebat. Frequenter agram invisibam: & quam urgeret consilium morlissimum mater, me nihil certi de morbo ejusque eventu edicere posse falsus sum, D.E.O. naturae & temporis opus relinquere consilium ducens. Tandem praeter omnem opinionem evenit, ut nocte multum purulentae materiae aere effluxisse deprehendimus fuerit, majori quantitate sensim succedente. Ita ad miraculum intra diem & noctem rediit somnus, revertis audinas, unat adhuc gravis, & pedetentim appetitus & vires revocatae sunt: verbo, D.E.I ac naturae beneficio reddita valentidini fuit nobilis puella, bona adhuc dupl & prospera valetudine utitur.

## Epicrisis.

Ex hoc quoque exemplum plane evinere & demonstrare potest, causas morborum adeo abstrusas saepe esse, ut mentis acie medicus vix eas penetrare possit. Videmus tamen iterum ex enarrata historia, quomodo solus atrocior capitis dolor omnes functiones animales & naturales pervertere imo propemodum destruere valeat, atque à sola violenta nervosorum & fibrosorum partium agitatione, commotione & distractione proxime proficiantur. Hinc etiam fit, ut dolore sublati, tanquam causa horum acerbiorum symptomatum proxima, omnia ad pristinum & naturalem statum redeant.

## CAPUT XI.

## De dolore podagrico &amp; arthritico vero &amp; inveterato.

## THESES PATHOLOGICAE.

## §. I.

Discrimen podagrae & arthritidis recentis ab ea quae radicata & inveterata est, insigne in prognosi & praxi medica habet momentum: nam illa est magis transitoria, aere florentes de sanguine ac succis plenos ob vitium in rebus non naturalibus commillum corripit, & rheumatismi simplicis species est; haec vero magis hereditaria, corpora imbecilliora invadit atque in sanguine & lero corrupta radices agit, difficulter etiam tollitur, & saepius ad mortem usque durat.

## §. II.

Quum nemo ideam, historiam, ac progrossum podagrae melius & rectius SYDENHAMO, qui ipse fuit podagricus, delineaverit; placet hoc loco ex ipso auctore breviter & concinne eam exponere: podagra exoritur Januario, aut incipiente Februario desuperat & nulla fere praesensione antecedente ingruit, nisi quod ventriculi cruditate, aut apopleia ad septimanas aliquot ager laboraverit; corporis interim inertentis quasi ventosa ex gravitate, qua in dies augeitur, donec tandem deinceps paroxysmus, quum paucis diebus perit torpor & quasi flammis accensus per femorum carnes cum aestu ardentissimo, tum etiam pridie paroxysmi, appetitus voracior, non tamen naturalis. Sanis lecto somnoque committitur; hora vero secunda post mediam noctem excitatur à dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque vero calcaneum, suram aut talum: hic dolor cum refert, qui essum dictarum dislocationem cernitur, cum sensu quasi aquae calidum non frigida partii aestu membranis affusa. Mox sequitur rigor cum horrore & febricitantia aliqua. Dolor cum hic primis remissus gradatim intenditur (pari passu rigor & horrores recedunt) idque in singulis horis, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, se ad variatam osculationem tarsi & metatarsi, quorum ligamenta obsidet, perbelle accommodat; nunc transiunt violentiam, vel ligamentorum istorum dilacerationem, nunc mortuum canis rodentis, quandoque pressuram & co-

Differe-  
ntia pod-  
agrae inv-  
eteratae &  
radicatae.

Historia  
podagrae ac  
Sydenha-  
mae.

afflictionem exprimens. Ad hoc, ita vivam exquisitumque habet sensum pars affecta, ut nec intercorum superincumbentium pondus, nec cubuli à fortiori ambulatione concussione ferre valeat: hinc mille convulsiones, sicut non ipso corpore, tum membri affectu mutatione assidua, doloris sedationem incassum exantibus; que tamen non contingit ante horam secundam tertianæ matutinae (decursu scilicet nycthemeri spatio à primo appulsu paroxysmi); quo tempore aget post materia peccata modicam digestionem & distillationem aliqualem, subitò à dolore respirat. Jam leni madore persusus somno concedit, à quo evigilans, dolore multum immixto, pariem affectam timore recenter occupatam cernit. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur, easdemque excusat tragedias, nonnumquam etiam ambo pedes in initio occupat: postquam utrumque pedem exercuerit, qui sequuntur paroxysmi abnormes sunt, sunt etiam quoad durationem; hoc tamen ubique servat, quod dolor noctu recrudescat, mane vero remittatur; atque ex serie horum paroxysmorum constat paroxysmus, qui dicitur podagra, duratur brevior pro ætate, &c. quod in vegetioribus, & in, quos podagra rariùs invadit, debet saepe quatuordecim su; in senioribus, atque in, quos saepius affligit, duobus mensibus; in vero, qui aliquot annos podagric fuerint, non prius valedicunt, quam aetate adulescentiam fugaverint.

## §. III.

Uterque progressus  
& terminatus.

Ad quatuordecim primos dies urina coloratio est, que post separationem sedimentum rubrum, & quasi arenula referunt deponit; nec aget ut plurimum nisi tertiam postulentorum quæ assumit pariem per vesicam reddat; alvus item ad dictos fere primos dies consipata est. Appetitus prostratus, rigor totius corporis sub vespertam, parium etiam non affectum gravitas & molesta sensatio integrum paroxysmum comitantur. Recedente paroxysmo excipit pedis affecti prius vix ferendus, maxime inter digitos, unde decidunt furfures, & pedes ipsi quasi ab epoto veneno desquamantur.

## §. IV.

Symptoma in morbi  
post annum  
aliquo in  
falsitate.

Atque hoc modo se habet podagra regularis, cum vero vel indebita medicatio turbetur, vel dismutetur invaserit jam per annos aliquot, phaenomena sunt multum diversa à jam descriptis. Jam manus, carpos, cubitus, genua, aliasque regiones occupat; quandoque digitos distorquens, motu paulatim privatus, tandemque concreciones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam vel oculos cancrorum emulantes; nonnumquam in cubitis tumorem subalbam ciet, fere ad ovi magnitudinem, qui sensum inflammatur; nonnumquam femur occupans, sensum exhibet quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili; ad genu exinde preens, id acutus urget, artus jam habet aget fere undequaque contractos & impeditos, ita ut claudicat, & per moleste prorepit.

## §. V.

Descriptio  
articulorum  
et aliorum  
sim.

Ex veteribus omnium optime historiam arthritidis descriptit CÆLIUS AURELIANUS Lib. V. cap. II. morborum chronicorum hunc in modum: *sequitur autem passio articulorum tenetor torpor, atque formatio eorum articulorum qui tanguntur, & difficultu flexio, atque rursus*

extensio: item gravado & vacandi dulcedo, & ad parvam motum vehementem labor, atque dormientibus sensus quidam resonantium articulorum, & cum de somno surrexerit, veluti saltu eadem parium affligitur: tum horror, vel rigor, atque tremor sine ulla manifestata ratione parium sequuntur. Dehinc color pallio se excolere cupit, in podagric dolor alterius pedis, aut utriusque cum punctationibus nascitur, incipit à vestigio aut planta cavitate, vel sapit à majore digito, atque tunc corpore, & gravidine, & difficili motu, cum horrore rigido, atque inequali per membra, & aliquando pinicis fervore, aliquando frigore, ut alii refrigerantia, alii calida desiderant agramantia, & propterea quidam alteram calidam, alteram frigidam podagram putaverint mutandam. Item initio, in sape contingit, similis color parvium atque sanarum videtur parium, atque tunc aequalitate, nullo emergente timore. Debet inflatio parium su cum rubore. Quapropter relevatio altioris sape sequitur. Tum preterea passio articularis sufficitur passio, cum in munis omnium coagur articulorum consensus, & facile ex articulo in articulum venit dolor, nec deficiat articulus cum illo invaserit nodos. Saepè denique prior articuli dolore declinante secundus invaditur, atque eodem similiter miscetur tertius simul exordium, consentiente etiam vesica, atque spica majoribus nervis, quos tunc appellat: & in stomacho etiam nausea vel vomitus incitantur agramantes. Tunc articuli tumores inflantur, ac deinde durefcunt, & solidi fixam faciunt qualitatem: tunc etiam nigrescere efficiuntur, atque contorti, ut in aliquos partes digitis vertantur, aut reflexi supinantur, aut viciis adfixi incumbant, & aliquando humore purulento vel mucilento collecto, aut viscoso generent poros, quos non transire dicere poterimus: debet etiam lepidi sufficere, qui quidem articuli solent, & cutem distendunt, atque erumpentes prominent, & chirurgia detrahantur: aut exsurgent cyathis, cum ferramento tollantur, quod nos lauteolam dicere poterimus, & rursus resurgant. Tum membra dolentium parium, cessante nutrimento, tenuata languescunt, & arida efficiuntur. Erunt præterea agramantes parvii ex causis mobilis atque tractandi, siquidem motum vel actum non sine querela accipiant.

## §. VI.

Podagra igitur rationem formalem, si rectius investigare velimus; consistit ea ipsi in vehementi spismo, quo membrane ac ligamenta nerveo-tendinola, quibus ossa in sedibus suis collocata retinentur & firmantur, violenter laniantur, divelluntur, distrahuntur saepe ad rupturæ usque vel palis infixi sensationem, à fero vitio acrisulso, per minimas arteriolas & exiles glandulas ligamentorum copiosius advecto succus, cum febrili motione & partis adfecte inflammatione conjuncta.

## §. VII.

In hoc affectu atrocem spasticum dolorem fibrillarumque & membranarum nervarum striduram excipiunt atque indicant varia phaenomena & que hoc dolore correptis contingunt symptomata: videlicet invadente dolore pori cutis in pede angustantur, influxus sanguinis & refluus debitus impeditur, sudor ac transpiratio nunc cohibetur, nunc augeatur, membrum rigore

Raris  
fieri  
multo  
podagra.

Symptoma  
in spismo  
debentur.

ac rubore concutitur, venae disparent, & valde sensibilis in parte affecta diffusio & dila-  
tio percipitur, concomitante aestu, rubore & suble-  
quente tumore. Spasmus autem hic non tantum  
in affecta parte incipit & subsistit, sed ulterius  
serpit, inque confensum trahit alias eximioque  
sensu prædita internas partes, quæ, simili sym-  
ptoma affectu, varia producit symptomata. Unde  
non ignota potest esse ratio, quare frequens osci-  
tatio, flammæ descensus per sensoris carnes, hor-  
ripilatio per dorsum ac lumbos, ac febriculosa  
pulsus, præcordiorum anxietas, animi detectio,  
formi inquietudo, torpor atque vermiculatio ar-  
ticulorum, ciborum inappetentia, nausea, in fu-  
ris quasi convulsio, vomitus ubi imminet paro-  
xyismus vel jam præsens est, ægros infestet? quæ  
omnia ex spasmodica contrictione & inde resis-  
tente sanguinis motione non possunt non origi-  
nem suam reperire.

## §. VIII.

Id demon-  
stratur.

Hujus argumenti veritas, nimirum quod ar-  
thritici & podagrici doloris essentia in spastica fi-  
brillarum nervorum contractione versetur, ulter-  
ius exinde clarius demonstrari potest, quod,  
quandocunque materia lerosa acris arrodentis in-  
dolens & paribus doloribus perverfa medicatio-  
ne aut alia foratica causa ad nobiliores internas par-  
tes nervosa repellitur, atroces in istis doloribus  
& spasmus excutitur. Ita in praxi frequentibus  
& fere quotidianis constat observationibus, a  
materia podagrica retrocedente, si ea fertur in  
cranii membranas, gravem cephalalgiam, in  
membranas dentium atrocem odontalgiam, in  
tunicis ventriculi, ejus spasmum, singulum,  
vomitus seu cardialgiam, in pulmonum tunicas  
nervosa, tullum convulsivum & asthma spasma-  
dicum, in membranas costarum pleuritidem spu-  
riam, in tunicas intestinorum, gravissima tormi-  
na & colicum dolorem, denique in viis urinariis  
& vesica ischuriam & spasmum excitari.

## §. IX.

Causa effi-  
ciens.

Exposita sic indole podagræ, quæ in spasma  
dolorifico, omnium ferme symptomatum pa-  
rente consistit, excutendum ulterius remanet,  
quamnam hujus effectus causa, atque in quibus-  
dam paribus generis mali existat? Medicorum  
recentiores ferme omnes in hac sententia viden-  
tur convenire, podagram morbum esse metastati-  
ticum salisum, a collectione salis fluidi acris sti-  
mulantis intra membranas ac ligamenta articula-  
rum productum. Cujus generis autem ac ingenti  
illud sal sit, dissensire videntur. Alii acidum, ali  
sal tenue corrosivum biliosum, alii austerrum &  
stypicum principium incusant. Nos purum &  
sibi relictum acidum in animantium corporibus  
vix reperiri existimantes, tartareum illud esse as-  
serimus, ita tamen, ut acidum quod figuram  
suam scindentem spiculatam, huius fecus ac in  
tartaro prædominetur. Interim tamen non ne-  
gamus, pro diversitate morbi atque ægrorum  
natura ac temperamento, & pro casualium an-  
tecedentium diversâ indole, majori volentis ac-  
cridine biliosa, vel fixiori, serum, quod salum  
morboforum est vehiculum, esse imbutum; un-  
de etiam arthritis variat, & volutis & fixus ex-  
surgit dolor, magis vel minus ardore atque in-  
flammatione insensibilis.

## §. X.

Quæ su-  
perius sta-  
bilium.

Multi autem sunt, quæ peccantem materiam

tartaream subinde peccare evincunt. Etenim ex-  
perimenta compertum est, ad calculum dispositos  
uplurimum evadere podagricos, & hos & con-  
trario calculo tentari; ita ut affectus hi invicem  
forerentur, & unus in alterum facile abeat. Se-  
rum autem in dictis morbis tartarea falsedine im-  
butum esse, nemo qui gnarus rerum medicarum  
est, igitur inficias. Accedit, quod in consummata  
podagra vel ichiastide ligamenta juncturarum  
etiam a sabulo tartareo vel subsistente repleta in  
feclibus fuerint. Quin imo topiacea mate-  
ria, quæ intra articulos in senum qui acido abun-  
dant, podagra, copiose quandoque reperitur at-  
que eximietur, manifestissime naturam tartareæ  
falsæ, quod ex acido & copiosa terra confusum  
est, demonstrat. Ita KERCKRINGIUS in  
spiculis, anat. obs. 28. sub examine chymico ex  
epistodi topii sive materia podagrica, elicit  
spiritum quandam inter spiritum tartari & falsæ  
ammoniaci quoddammodo medium, hoc nimis  
num acidiorum; illo vero mitiorum: & oleum,  
nec tartari fuscio colore, fetore & consis-  
tentia in omnibus simile: nec non sal ex capite  
mortuo quod extrahit, ab eodem sale tartari  
parum abluenda, nisi quod sapore quodam ex-  
traneo infestus, ingratam quandam pariebat  
nausam.

## §. XI.

Sic observantur quoque sive ab auctoribus, & sive  
podagricorum excrementa nimirum spiritum, urina-  
nam, sudorem collecta, prævia evaporatione,  
præbuisse materiam candescentis concretæ in tar-  
tari consilientiam insignem copiam, vid. PE-  
CHLINUM obs. 35. & KERCKRINGIUM  
l. c. Notavi ego in Viro generoso, qui subinde  
podagra divexari solet, sequentia: hic paroxys-  
mus imminens præferre solet maxime ex  
colore a nulli, quem digito gerit, ex mercurio  
mediane venæ ac tunica confecti, qui aliquot  
dies ante paroxysmum & per totum morbi cur-  
sum livorem ac nigredinem contrahit, qui sponte  
tandem definit, pristino redeunte colore sub  
declinationis tempus. Id quod curiosum phenome-  
non mea sententia effluvia salino-sulphurea per  
transpirationem procedentibus adhibendum veni-  
nit. Taceo materiam in articulis podagricorum  
collectam, & quandoque vesicatoriorum vel alio-  
rum remedium ulu effluentem, summe corro-  
sivam, ipso sensu teste, naturam præ se ferre.  
Confirmare inter alia præteritiam tartareæ fluidi  
falsæ in podagricis videtur nimia potatio vinorum  
tartareo talimodi succo scatentium, quæ poda-  
gram generare solent frequentissime; item nimia  
ciborum appetentia & voracitas, maxime ante  
tempus invasionis, quæ sine dubio lymphæ as-  
sæ abundanti in salivæ & gastrico fluido debet-  
ur.

## §. XII.

Conspicitur autem tartareum hoc sal cum  
mucilaginoso ac pingui, quo articuli & junctura-  
re omnes gaudent, tore ac glutine, quod se-  
cundum naturam insipidum, ossa, juncturas, ac  
cartilagineas levigare & obducere solet. Notabi-  
le enim est, sub membranoso ligamento, quo  
articuli firmari solent exsare tunicam mere glandu-  
losam ac vesiculosam, quæ etiam synovia sedes  
est, in quam terminantur maxime in homine  
multæ valorum sanguiferorum ramifications,  
hæcque tunica, propter laxitatem suam minime  
inservit ossium conjunctioni, sed mucilaginem  
certam insar ovi albuminis, licet non semper

Id conspi-  
ciunt cum  
mucilagi-  
ne glandu-  
losam con-  
cretam.

ado

adeo clara & limpidam fecerunt. Præterea in majoribus articulis exstant quoque corpora glandulosa pinguedine obfita, quæ similem mucilaginem a copiosis sanguineis vasculis ibi fecerunt ad lubricandas juncturas ipsalque ob incallescencia & attritione conservandas, uti copiose pariter ac folide id deduxit celebris Anglus CLOP-TON HAVERS, in *Osteologia*. De hoc ipso glutine articulorum jam dudum divus HIPPOCRATES in *Litr. de lacu in bovine*, sequentia pronuntiavit: *Humidum nativum articulo-rum ubi mole valet, male habent articuli; ubi bene, & ipsi articuli.*

## §. XIII.

*Ex oleo coagulato, quod cras-sius est, coagula me-dia est.*

Quociescunque itaque serum salum excrementitium in sanguine superabundans descendit per glandularum poros nimis laxatos ad ipsos articulos, non modo coagulum mucilaginis efficit, quod difficiliter potest solvitur, vel etiam, si in copia adhaerit, in gypseum corpus tandem convertitur, verum & intra subtilissimi serus membranas incarcerationum propter angustissimas vias, minus commode propellitur nec evagoratur, sed deicribiles cruciatus in parte affecta faciunt: cujus serpius tanta est sensibilitas, ut omnia quantumvis leniter admodum tegumenta vel medicamenta officiosumque manum vel è longinquo reformidet. Attentione dignum est, nihil magis mucaginem articulum destruere atque coagulare, quam acidum tartareum sal lenius v. g. acetum vini, vel vinum rubellum album, necque tantam mutationem atque coagulationem ipsi inducere aliud potens, un oleum virioli &c. sicuti id variis experimentis clarissime demonstravit *Clopius Havers l. c. p. 258.* evidenti scilicet documento, vina tartarea æquissima esse ad procurandos paroxysmos arthriticos, ubi tonus glandularum debilitatus est & patens aliquam ad hunc affectum dispositionem habet.

## §. XIV.

*In podagra solida p-rem sal-phuratum, non &c.*

Quemadmodum vero in senibus neque minus in hypochondriacis & calculosa nephritide laborantibus podagricis serosis sanguinis pars tartareo fixiori acido resecta est: ita in corpore bilioso calide temperaturæ virili, ubi arthritidis & podagra magis calida vaga, dum ex una parte in altum transit, serum biliosius acerbis sulphureis immo alcalinis onustum est. Sic *Alta Erud. Ann. 1698.* referunt, Medicum Anglum *Calbach* serum podagricum miscuisse cum syrupo violarum, & semper colorem cæruleum in viridem mutatum observasse.

## §. XV.

*Paralyti-cum pod-agricum, su-um p-rem.*

Deinceps quoque illud animadversione dignum est, quod nullus paroxysmus podagricus sine motu febrili sit, quo præcedens lassitudo corporis inquietas, horripilatio, refrigeratio extremorum, oscitatio, alvi obliquo, pulsus citatio, sitis, vigilia & subsequens aestus, ejusque circa noctem exacerbatio, urine in principio tenuis & aqueus, spissius vero remittente, crassus cum sedimento, neque minus solutio doloris & spasmus per sudorem copiosioris latis evidentior arguant: cujus motus febrilis beneficium sit, ut excrementis ferossæ salinæ peregrino charactere imbuta sordes, ex parte per viam generis in corpore nostro organico constituta colatoria & emundatoria foras salutariter eliminantur atque excernantur. Hic motus quoque auc-

tior febrilis solidorum & fluidorum, qui non actu electivo, multo minus morali & rationali sit, genuina causa est laborum dolorum ac spasmus in partibus extremis, qui paroxysmus in podagra nunquam non afflictorum, dum videlicet ad nervosas & valde sensibiles texturæ articulorum membranas & ligamenta, quibus complures exiguae glandulæ inhaerent & quæ minus congrua sunt salium excrementorum emundatoria, cum impetu impulsus serosis sanguis advehitur & congeritur, ubi postea ichorosis ille latex præter naturæ ordinem separatus, stagnans & subsistens ejusmodi atroces naturæ humanæ plane insensos spasmos & dolores concitat; qui quo vehementiores sunt, eo plus febrilem aestum incendunt, atque symptomata exacerbant. Si quidem id probe tenendum est, duplicem in paroxysmis ejusmodi arthritidis & podagricis observari febrem, essentiali & symptomaticam, illa ad naturam catarrhalis, vel in sanguine ad synochæ simplicis genus accedit, cum qua paroxysmus incipit & progreditur, noctuque habet suas exacerbationes: altera vero symptomatica doloris acerbioris febriosa est, & inflammationem insinuat.

## §. XVI.

Quod autem humor vitiosus non intra omnes articulos & quidem mediant tunicâ ligamentorum glandulosa, sed dumtaxat certis in partibus sepiatur, ut videmus in chiroagra, gonagra, podagra & affectione ischiatica; id potissimum tono & robori destructo horum ligamentorum, quæ articulos firmant, adscribendum est. Quod vero ad pedes frequentius feratur ac descendat, hæc subesse ratio videtur, quod pedes frigori humido, quod valde eorum naturalem motum lædit, plus quam alie partes exposti sint; deinceps quod à calorem pressione ac strictione copiosi tubuli arteriosi & venosi minimi, per quos libere humor redire & circulari debet, valde comprimantur: accedit quod lentior & tardior per poros a fonte caloris corde nempe remota, ut finem etiam perpendiculararem, lymphæ ac humorum sit circulatio. Superest adhuc una ratio & quidem præcipua, scilicet quando pedes dolor affligit, cogitur quiescere, ne deterius fiat malum; quies autem ulterius nocet, dum humores ad motum cessantem, illi magis tenaciter subsistunt, & ita imbecillitas augetur: sic edocemur familiari exemplo, quando pedem diu in uno situ tenemus, verniculationis sensum oboriri. Vocanda hæc quoque est in auxilium, nativa podum imbecillitas à parentibus podagricis contracta, quæ partem in spiritusæcennia humorum deficientem, & inde resulante partium solidarum maxime extremarum debilitate, vel in ipsa prava textura & conformatione, & pororum dispositione consistit. Idem obinet in aliis artibus, quas occupare solet dictus dolor arthriticus.

*Ratio cur-materia-nalis p-rem-sal-phur.*

## §. XVII.

Unde vero tanta feri excrementi ex parte salii & tartari, ex parte etiam acris biliosi colli-vies, in arthritidis & podagra subiectis corporibus ingeneretur, quæ proinde & motuum febrilium podagricorum & acerbissimorum dolorum vetam & materialem causam constituit, vix aliam quam naturæ agrotationum debilitatem & vitium in usu rerum non naturalium commissum reperitur & inculare licet. Per naturæ debili-

*Critique-feri morat-pressionem.*

*et debili-tas.*

debilitatem vero nihil aliud intelligimus, quam talem, & a raritate, solidorum, quæ fluida continent, movent, imo motibus vitalibus secretoria, excretoria præfunt, non fatis validam & robustam conformationem & structuram a parentibus potissimum acceptam: hinc natura debiles & morboſi parentes, ut sunt hypochondriaci, hæmorrhoidarii, podagrici, calculoſi, aliique anomaliis motibus obnoxii, etiam liberos in hos morboſos proclives generant. Nam quando ipsos podagricos, qui diutius hoc morbo affecti ſunt, ſpectamus ac conſideramus, plerique ſunt habitus minus fibroſi, ſpongioſi, tenerioris, qui nervos & tendines habent exiguos, copioſis de valde exilibus vaſis donati, qui ſanguine multo ſeroſo, qui è venis emiſſi in oculos incurrit, abundans, & hinc etiam in primis annis narium hæmorrhagiæ & in prope-nore ætate hæmorrhoidum fluxus ſunt obnoxii & afflicti, animi quoque ſunt inconstantioris mobilioris, ad omnia genera paſſionis vitalibus motibus nocivæ proclives; quæ cuncta ſatis totius nature microconſiſtentiæ imbecillitatem arguunt atque demonſtrant. Accedunt poſtea ſæpius inſignes diæte atque in regimine vitæ aberrationes & vitia, quæ ita ſunt comparata, ut non modo partium ſolidarum ſonum, robur ac vim ſyſtalticam motricem plus debilitent ac labefactent, ſed etiam multos crudos, impenetratos, nature & ſucciſ vitalibus, qui blandi eſſe debent, plane alienos humores invehant, & ob imminutum ſalutarium excretionum negotium plus juſto in corpore retineant & accumulent.

## §. XVIIII.

Ad quam  
conſiſtentiam  
Veniunt  
immoderate.

Ex iis vero, quæ nervoſis & motricibus partibus vires & robur ſubducunt, primum merito locum Venus immoderata obtinet. Nam ſemen, uti debiliſſimæ & ſpirituoſe lymphæ in ſanguine ſoloboles eſt, ita ſi immoderate exhauritur, non poſſet aliter fieri, quam & partes fluidæ ſubtiliorem & blandam ſpirituſcentiam, ſolidæ vero vigorem & elaterem amittant. atque adeo omnes functiones corporis non exiguum inde capiant detrimentum. Ex hinc poſſet etiam ſecundum ſcila Hippocratis, ratio repeti: quare pueri, quare mulieres & eunuſti non facile podagram patiuntur? Hinc quoque poſſis Bacchi & Veneris ſilia nuncupata eſſe; unde antiqui verius:

*E ſolvilumba venere, ſolvilumboque  
Baccho, creata eſt ſolvilumba choragæ.*

Et Latini Poetæ carmen:

*Ut Venus enervat vires, ſic copia vini,  
Et tenet greſſus debilitaque pedes.*

Notabile autem hoc eſt, quod arthritis ex abuſu Veneris ſæpius vice ſuam originem petat, & quod omnes arthritis & podagrici, propter ſol illud tenerum ſtimulant in lymphæ & ſanguine contentum, ad Venerem præ aliis magis ſint proclives, adeoque magis magnique enervando vires, malum conſumacius reddant.

## §. XIX.

Præterea  
ſpiritus  
corporei  
noſtri  
motores.

Præterea ſpiritus, corporis noſtri motores, non parum invertit & nervis debilitatem addit vini & maxime generoſi vel ejuſdem tartarei acidi largior poſus, uſupote partes vini ſulphureæ nimis celiter per venas rapiuntur ad caput, ſubeuntque poros nervorum & ſpiritus leſe alloſciant, quorum craſis ob cruditate & heterogeneam indolem ſuam valde invertunt, ut munere ſuo in regendis machinæ artibus deſungi minus recte queant Experientia multiplici deprehenſum

eſt, nihil plus ad tartaream illam, aut quomodocunque appellare libet, materiam podagricam & arthriticam generandam aptum eſſe quam vinum; quæ eſt in corporibus quibuſdam ſequetur, tamen in illis quæ viſcerum debilitate laborant, ſervantur atque in ſanguine accumulatur.

## §. XX.

Dant tamen vinorum magna diverſitas. Quæ enim in arenoliſ terris proveniunt, minus materię ejuſmodi tartareæ continent. Dixit WEP. FERUS Dec. I. M. 2. r. 39. raris apud Syrii huſanos eſſe podagricos & calculoſos, neque cinnuliſvos motus frequentes, & poſſimum id fieri a vino rubello ſalubri. Sic etiam memini Jenæ, quamvis ab incolis ejus loci ſatis liberiter bibantur vina vernacula, non tamen multos eſſe podagricos. Contra obſervatum fuit, quæ in terra pingui argilloſa & limoliſ proveniunt, ad fovendam podagram eſſe pariſſimam; cujus generis ſunt *Bohemica, Hungarica, Auſtrica &c.* Neque obſtat, vina magnam quantitatem tartari terreſtris, qui ſæpius vias urinarias magis detergit, poſſidere, ut in podagra progredienda minoris efficacię ſint aliæ, quæ talem quantitatem non complectuntur, ſed forſitan ſubtiliori ac penetrantiori acido, quod cum ſacis vitalibus ſacillimam ini copulam, inſtructa ſunt. Sic vini *Teckeviſi* libræ quatuor deſtillatæ vix drachmam dimidiam; totidem autem libræ *Rhenani* drachmas minimum quinque largiuntur. Multo magis autem talia vina nocent, ſi ad ebrietatem uſque impurgantur, quo ſpirituſ vigor naturalis magis exſtinguitur & lymphæ tenuis inſiſſitur, ut deinde viſcerum tono debilitato minus commode illa, quæ in viniſ nociva atque pernicioſa ſunt, excludi queant.

## §. XXI.

Sicut affectuum immoderantia in excitandis & fovendis morbis plurimum valet: ita id maxime in chronicis affectibus, inter quos podagra primas tenet, animadvertimus, & quidem hunc poſſimum ob rationem, quod diuturnior triſtitia animæ angor, intenſior cura ac ſollicitudo, profundior quoque & haud interrupta meditatio, neceſſarias corporis vires ſuffundendo, vitales humorum motus, neque minus ſecretorios & excretorios imminuendo, exaduerſas paſſiones atque materiam, impuriſſimas videlicet variis generis ſalino-ſulphureas, ad geneſin huius affectus ſubminiſtrant. Ita vehementior quoque animi commotio & ira ipſos arthriticos paroxyſmos ſubito ſæpe cum febrili quodam tono excitat.

## §. XXII.

Uterius, luxuria, nimia voracitas, continuæ comellationes, cum vita ſedentaria otioſa & deſidi ſi conjunguntur, neque minus exercitiorum intermiſſio & ex mobiliſ vitæ genere quietum & motus expert, & podagræ & aliis pernicioſioribus morbis ingenerandis mirifico vellicantur. Nihil enim magis, præterquam nimia ingeſſionum copia cum deſidia, magnam illud excretionum, ſine quibus ſanitas conſiſtere nequit, negentium ſupprimendo, ad impuroſum humorum redundantiæ, a quibus deinceps dolores, febrileſque motiones proveniunt, corpore ingenerandam conſerre, ætæna conſideratione dignum.

## §. XXIII.

## §. XXIII.

*Transpiratio  
in proba-  
tionem.*

Et quoniam sufficienti, per jugem transpirationem facta, sordium valde activa indolis aquofo-salinarum halinuosarum expulsiōe, corpus ab innumeris morborum afflictionibus nec non à paroxysmis & recidivis immunes redditur: ita etiam in rebeli isto podagrico affectu, qui in corporibus gracilioribus minus densi & obeli habitus, perspirabilibus, paulo rarius fidem fixiorem tenet, neque in hominibus opificibus & qui labore & motu corpus continuo exercent facile gignitur, id ipsum observamus. Quare etiam æstivo tempore arthritici & podagrici paroxysmi silere & con- quiescere solent; cum, è contrario, qui densi & pinguiora habuit sunt, licet à laboribus corporis & manuum vacent, crebrius & diutius hoc affectu exerceantur, qui præsertim autumnali humido & frigido aëre, subita tempestarum mutatione ingruere & tragediam ludere solet: quoniam sudores consueti intermissionem, notabilique transpirationis, quæ ex indusis inspectis cognoscitur, atque excrementorum inter pedis digitos defectionem, immixtionem deflagrant paroxysmum sæpe à nobis observatum est.

## §. XXIV.

*Memoria-  
rum con-  
fessionem  
describit.*

Inter antecedentes doloris podagrici causas, non exiguum locum fluxuum sanguinis consuetorum, hæmorrhoidum & mensium intermissio vel interceptio ruri videtur: siquidem & firma experientia & unanimi veterum consensu & auctoritate confirmatum habemus, feminas, quamdiu mensis rite fluunt, & viros in quibus consuetus hæmorrhoidum fluxus rite, ratione modi, quantitas & temporis se habet, à molestissimis huius afflictionibus immunes degere, imò hos fluxus doloribus istis supervenientes, corpora ab iis præservare: ex adverso vero, si solum hæmorrhagice vacuationes, vel ex vacillante naturæ robore, aut ex perversa diæta, vel importuna & imprudens medicamine resistunt, deficient, vel supprimuntur: atroces dolentissimas has passionem generati immo recrudescere & ingravescere observatione identidem firma & stabili constat: ut itaque ex hisce observatis clarissime elucet, quoniam ad depurandum sanguinem & ad morbos ex feri vitiosi colluvie succrescentes impediendos, hæc solennes licet præter naturam contingentes sanguinis excretionem valeant. Ex quibus tamen nevisquam id consequitur, ut nonnullorum nostri ævi medicorum & theoreticum & præcticum dogma fert, tantum à fluxu hæmorrhoidali, ejus defectu & frustraneis ad eum excitandum naturæ moliminibus, originem bujus truculentum affectus ascendendum esse, & totum curationis opus ad illum provocandum collinearè debere; cum hujus hypothesen patrum, plethoram pro causa proxima materiali possimum habeant, una ei inter remotas locum concessant. Nos vero vitiosum feri dyscrasiam atque impuritatem potius ad excitandum hunc affectum maximum momentum asserere arbitramur, cum nota nobis sint exempla, sub ipso paroxysmo podagrico, calculo & arthritico, hæmorrhoides fluxisse: id quod inter alios, celeberrimi nominis medicus B. DOLÆUS, crebro per litteras apud nos conquisitum est.

## §. XXV.

*Prognosis.*

Ratione morbi eventus, quoad prognostica hæc observantes rarius fallunt: Podagra non

facile è medio tollit hominem, nisi humor vitiosus, ob magnam virium expultricium imbecillitatem, ad summam corporis coricem propelli nequeat, sed inuicem retineatur: vel ab errore medentis aut ægrotantis ad interiora repellatur, quod HIPPOCRATES *libr. de affect.* affirmat: & tunc gravibus supervenientibus morbis, ut sunt lethargus, hemiplexia, apoplexia, asthma convulsivum & suffocativus catarrhus, peripneumonia, hydrops, inflammatio ventriculi & intestinorum, extinguuntur.

## §. XXVI.

Quemadmodum, quibus congenita & hereditaria est arthritica & podagra, & qui ex pravo vitæ genere primis in eam annis incidunt, rarius diu vivunt: ita iis, qui demum præventioni ætate atque in senectute, dolore corriguntur podagrico, longævitate promittit; dum arthritici & podagrici paroxysmi re vera criticis, humores excrementis, impuri senectuti familiares corporique infensi, hac ratione expurgantur.

## §. XXVII.

Podagra incipiens, præsertim si rheumatismi sanguinei species est, moderata & conveniendi diæta congruique remedia, sanguinis præsertim missionibus opportune instituitis, facile præcaveri & tolli potest: uti vero jam multoties & singulis fere annis paroxysmus recurrit, & quos affligit, in articulis tophos habent, sicca alvo vexantur & senes sunt, uti testantur HIPPOCRATE *libr. II. prædict.* nulla humana arte sanari possunt: hæc possimum ob rationem, quia virium non tam in fluidis, sed in solidis, eorum tono, robore, textura & conformatione naturali destructa, quod non facile tollitur, consistit. Hinc verus dictum enatum: *solvere nodosum nefcis medicina podagram.* Optime vero HIPPOCRATES *l. c.* ratiocinatur: *juvenes nondum callos habentes curari possunt, si accurate vivunt laborisque sint amantes, alvumque bonam & apertam habeant.*

## CURA PRÆSERVATORIA.

## §. I.

Quamvis valde difficilis eorum morborum, qui congeniti sunt, quorum causa in labe tam fluidarum quam solidarum partium consistit, & quæ à prava vitæ & diæte ratione foveantur, ac in habitum quasi degeneraverunt, sit curatio; atamen facilius longe & expeditius est eos præveniendi, præcaverendi, & averendi via ac methodus. Quam cum medicus omnino & recte cognoscere & prudenter applicare debeat; nobis eam hic exponere est proprium: utpote quæ possimum in causis hujus morbi, remotionibus dictis, declinandis & removendis consistit.

## §. II.

Primo omnium, qui vult degere immunis à pertinaci tam podagrico quam articulari affectu, semper sit, quantum possibile est, ab usu Veneris maxime immoderate; quam corporis languor & dolor subsequitur: subito namque exhaurit subtiliores spiritus, caput debilitat, mentem ac sensus infirmat atque convellit. Dein ebrietatem, copiosam vini potationem & liquo-

*Juvenes  
podagrici  
rarius diu  
vivunt.*

*Senes  
curari  
longius.*

*Discipline  
prædicta  
facile ab-  
stinent.*

*Juvenes  
nondum  
callos  
habent.*

*Præserva-  
tio facili-  
or curatio.*

*Prædicta  
autem  
pho-  
nomena  
debet.*

*Abstinere  
liquo-*



liquorum inebriantium ingurgitationem omni cura & studio fugiat: quippe hoc pacto multos ab arthritide liberatos novimus. TRINCAVELLUS *de ratione cur. partium. hum. corp. affecl. lib. XII. cap. XI.* tradit, se novisse medicum Veneris, qui, cum non parum infestaretur à podagra & ad senium usque, & solum primum aeger in quinquennium vinum interdixisset, iter tandem ab omnibus molestiis ita evaserit, ut amplius usque ad ultimum senium imo ad mortem horum dolorum ficeret expertus. Id quod CELSUS *lib. IV. cap. 24.* egregie confirmat, perhibens: quidam cum toto anno à vino, mulso, Venere se temperasset, securitatem totius vitæ consecutus fuit. Et SOLENDER *S. P. conf. I.* refert, viduum quandam Hispanicam, cum usum vini, quo tamen pro more gentis paucissimo & dilutissimo usua fuerat, omisisset, podagra amplius non fuisse tentatam. Quin imo plures talia modi historie notissimæ sunt eorum, qui, vel in carcerem congesti vel ad paupertatem redacti, cum à vino abstinerent, ab arthritide & podagra liberati sunt. Hinc præstat ad præsciendum gravissimum morbum, aquam puram & leviorem quam vinum bibere. Ex hydroptia enim neminem facile est, qui hunc in morbum probatur: quorum exemplum apud BRUYERIUM *de re cibariis lib. XVI. cap. 13.* SCHENCKIUM, HERM. von Heyden, de podagra, & PECHLINUM legi atque evolvi possunt.

## §. III.

Quædam  
non quam  
desuper pro-  
fuerunt.

At vero quamvis nonnullis podagricis vinum admodum sit inferum, negandum tamen non est, dari casus, ubi venenali quædam & intestinorum imbecillitas à frigido humore, ut cum veteribus loquar, orta est, in quibus ad vinum refectionem admitti illud debet, maxime si diluatur cum aqua & verus excoctum optime notæ assumatur: quod eo magis locum invenit, si in consuetudinem abiit vini potatio, nec ad ejus usum ægrotans propius ferriat incommode: de qua re confert meretur PECHLINUS *abf. XXXVII.*

## §. IV.

primus ci-  
bus.

Porro qui vitam à podagra liberam ducere, vel ejus dolores lenire atque mitigare intendunt, temperent sibi à multo cibo tam in paroxysmo, quam extra morbi accessum. Vere scribit HIPPOCRATES: præcipuum sanatus studium est, non satiari cibi & impigritas esse ad laborem. Sique profecto quid est, quod vitam servare possit à morbis diuturnis immunem, temperantia in victu est: hac enim alacritas & ingenio & corpori accedit. Consistit autem hæc temperantia in eo, ut vel bis de die parum cibi assumamus, nec plenarie appetitum satiemus & cornam intermittemus: id quod podagricis minime commendat TACKIUS p. 97. item SYDENHAMUS p. 579. qui prandium solum commendat: humoribus digerendis cum lectus solum sit dicendus. Præcipue autem in paroxysmo à cibo abstinendum est. Nam ejus accessio, ipsi HIPPOCRATE teste, damno est: Eo enim tempore, inquit, ressi sunt humores ad centrum corporis, unde opprimunt maxime etradu respiratio, & aliena regio ab impuris succis occurrunt. Si cibum tunc dederis in imparitatem ille abiit, ac diserto hypochondrio opprimunt pelles, unde anxia respiratio & calor cordis major.

prof. in po-  
dagrica.

## §. V.

Facile hinc apparet ratio, quare egeni ram sint podagrici, magis autem opulenti, voluptuosi &c. qui per multas horas mensi accumbunt, utriusque intus abdomen distendentes. De opulento quodam Germano SCHENCKIUS apud Cassi de Riet Camp. *elyf. jar. quest. tradit*, quod hic, cum otio, deliciis, luxuque circumflueret, familiarem huic vice podagram arthritidemque adeo miserabilem contraxerat, ut non nisi duobus suffultus adjuvante familia promoveri loco potuisset: verum lapsus scilicet rebus ad paupertatem redactus tantam, ut & opibus destitueretur & famulus, nec nisi frugalis mensa ad vitam suppleret; hoc frenus & poculum ipse flos incescerit, & à podagra prolix defensus fuerit. Non incommode hinc PETRARCHA: Si à podagra, inquit, liberari cupis, aut pauper sis speres, aut ut pauper eras. Multos ab hac aggritudine liberasse traditur paupertas, vera defas atrox corporum: quædam vero frugalitas, quæ voluntatem seu solum & imaginariam paupertatem deserit. Vidisti aliquis perpetua viam abstinentia curatus ita sit, dolore dolo, clavus clavus pellitur, ut antiquo dicunt proverbio. Specialiorem autem paulo diutem podagricis commendat atque præscribit GALENUS *lib. VI. de sanit. tuenda*, his quidem verbis: intemperantes in podagram & alios distinos morbos occidunt, à quibus ita via se explorare n-quænt. Cevendus ab edulibus ex pasta, ab acidis fructibus, cepis, allis, salsis, lardo, carne sulta. Ceterum Vinum Mollicianum aut Neccarinum aqua destillata dilutum bibendum. Alvus sollicitanda passulis, prunis Damascenis. A canibus quoque annosis & pinguis abstinentum. Parari debet vestimentum pelibus agnina consutum.

## §. VI.

Postremo, qui à cruciatibus podagricis & articularibus immunes degere cupiunt, temperare sibi debent ab omnibus gravioribus curis, animi laboribus, meditationibus & perturbationibus. Hæc enim elogio Sydenhami ad dissolvendam spiritum, qui sunt digestionum instrumenta visum, ac proinde ad podagræ incrementum multum faciunt. Refert PORPHYRIUS in vita Plotini quendam Regulum, quam capus esset pedibus, sese ab omnibus curis abnegasse & à podagra fuisse liberatum. Tanti, inquit, in hoc morbo vincendo, animam quietam habere! Ceterum commendandus est podagricis labor ac motus, qui firmitudinem & robur paribus faciet, transpirationem promover, cruditates dissipat, ad totius corporis habitus immutationem aptissimus, atque optimus sanguinis depuratorum est, dum omnis generis excretiones promovendo, ab ejus naturali temperata crasi sive temperie alienas, impuras salino-sulphureas partes per congrua emunctoria separant. Elegantissime scribit HIPPOCRATES *libra. prædict. n. 162.* curari podagricos posse juvenes, in quibus nondum sunt facti calli, qui laborem amant, qui vivunt accurate, & quorum alvus fluida est. Exercitium autem hoc non nimis sit vehemens, sed moderatum, quale est vectio in curru, ambulatio, scalarumque repetita ascensio.

Cura & melioratio  
non fugienda.

Motus cras-  
sus infla-  
mentum.

## §. VII.

Celeberrimus & maxime circumspiciendus trium Imperatorum Archæus JOH. CRATO *conf. 14.*

tenet. I. hoc pro praeservatione podagrae consilium suppeditavit, dignum quod huic tractationi inferamus: *Primo monendi sunt podagrici, ne ulla modo corpus medicamentis affligant, sed recta vitellus ratione & mediocri diligentia articulos dolores vitari possit sibi perscrutentur. Abstineant à vini Moravica, Aulstici, Hungarica, dulcibus & crassis: maneat cervice triticea. Ventrículo robor medicamentis purgantibus non debilitetur. Nostri pilula non possunt hanc dimidia auge coenam, quae su parvior, singulis septimanis, desina quae est scrupulus, capere. Singulis diebus matutine de nostro stomachali sumas. In lecto matutine sudet quotiescumque poterit: nam quo frequentius hoc fecerit, eo ruiorem se esse putabit. Mundare pedes oportet cum sponsa intincta vino rubro, in qua sal sit decoctum. Topica minus potius quam nimium est facienda. Aer frigidus & humidus vitandus est.*

## §. VIII.

Quibus hi  
afflictis  
hereditariis  
& chronicis  
sunt curandi  
dietae  
sunt ser-  
vanda.

Praeservatoria haec cura uti universalis fore est, & ab omnibus ac singulis qui à gravibus valedudinis incommodis immunes esse volunt, servanda: ita potissimum quadrat & necessaria admodum est, in afflicto tam arthritico quam podagrico, quando à parentibus liberi femini quoddam multiplicativum ipsi vitalibus humoribus altius infusum, & quod inter putatione vel adolescentiae annos jam tum se exerceat incipit, acciperent, quo in prima quasi herba suffocetur. Atque etiam haec ipsa cura dietetica ad eos spectat, quos jam per plures annos hoc malum & chronicum & quasi habituale factum exercuit: eo fine & scopo, ut minimum dolores ac symptomata leviora & minora inde reddantur, breviores quoque fiant paroxysmi, & roborata sic quodammodo natura deterioris & exitialis afflicti, qui excipere nunquam non solent podagram perniciem & chronicam, corporis vires valde infringentes arceantur.

## DE CURA SPECIALIORI PODAGRICORUM MEDICA.

## §. I.

Podagra  
radices  
non per se  
aspiciantur.

Opeandum quidem serio & vehementer est, ut tam efficacia in rerum natura extarent remedia, quae huic difficillimo morbo, ubi longo tempore in succis vitalibus & nervosis partibus radices egit, extirpando sufficerent: sed, quoniam talia nondum per experientiam cognita atque comprobata sunt; eo tantummodo laborandum est, ut non modo dieta praescripta servetur, sed & aliis remediis languenti corpori succurratur, quo recursum huius mali, si non profusus tolli possit, pauciores tamen & breviores evadant, levioribusque symptomatibus stipant incedant paroxysmi. Est cum ordinario fere horum periodicorum dolorum, sive febris potius rheumatico-podagrica incurrit fieri solet tempore vernali, item ante & post solstitium hiemum; opus est, ut ante congruis evacuantibus, alterantibus & massam sanguinis depurantibus, viscosos humores doloribus istis podagricis pabulum ministrantes, quo potius eo feliciter paroxysmus sustineri possit, & corrigamus & eliminemus.

## §. II.

Praeservatio

Ad hunc scopum, ex voto obinendum, ego sanguinis mulsionem decenti tempore & quidem ante aequinoctium vernum, ubi massa sanguinis

& feri singulari quodam interno ebullitionis quasi motu agitur, & sic heterogeneae partes quae in eorum profundiori ac interiori nexu tectae & involutae haerent, extorsum vernum, unde omnis generis febres exanthematicae, catarrhales, rheumaticae arthriticae originem suam mutuunt, celebrant magni admodum facere soleo: id quod optime succedit, ubi corpora non adeo firma fuerint, quae bene appetunt, vitae sedentariae indulgent, laetitia delectantur. Longe vero magis necessaria est vena scissio in iis, qui ob laxiorem multum exilibus vasculis donantur corporis habitum multum sanguinis & feri ingenerata & ad haemorrhagicas excretiones proclives sunt, praecipue si haec resistent vel parces evadant. Et quoniam ante & post solstitium brumale mensis Decembris, Januarii, Februarii, plerumque infolens & ingravescent podagrici dolores, ego in fine Octobris si res potula verit & plenitudo valorum evidens fuerit, sanguinis mulsionem suadere solitus sum.

## §. III.

Deinceps non possum non ego hoc loco candidè fateri, quod a cucurbita cum scarificatione dorso pedis, singulis trimestribus apposita, insignissimum allevamentum in pluribus, atque etiam in me ipso, qui non immunis fui ab ejusmodi insulibus podagricis, licet obusioribus & non diu persistentibus, experiri solem. Rationem si quis huius effectus exposcere velit, haec satisfacere posse videtur: quod in nulla fere corporis parte, difficilior sanguinis circulus ex arteriis in venas, quam in extrema pede ejus praeterit, digitis procedat; nulla etiam pars sit, quae tanta copia musculorum tendinum, membranarum & ligamentorum tendine nervorum, vasorum etiam sanguineorum instructa sit, ac extremi ipsius pedis compages. Quodcumque itaque haec partes, ab ipsa nascitur, imbecillitas quodam vicio laborant, non mirum est, sanguinis circulum sive itum ac reditum in illis ipsi admodum esse segnem, tandem & impeditum, praeteritum quando ille copiosior fero, excrementis salinis partibus repleto scaret, & tempore paroxysmi, qui semper febrili motione fit & incipit, majori copia ad has partes appellatur: unde non possunt non humores stagnare, & vasa nimium distendendo eorumque nervos membranas divellendo, dolores, cum inflammatione licet leviori producere. Aequi hinc utilisissimum omnino est, ut sanguinem superfluum & stagnantem per has partes valde ad circuitum difficiem & vena extrahamus, & sic ejus liberiori progressum promovemus.

Cucurbita  
cum scarifi-  
catione  
dorso pedis  
apposita.

## §. IV.

Quoniam paroxysmorum & rheumatico-arturiticorum & podagricorum evidens & materialis causa, in feri excrementum abundantia & colluvie consistit: atque huic ingenerandae vitata prima in regione alimentorum digestio & cruditatum proveniens multum vellicatur, complures non minus perici ac erudit medicorum sanguis mensibus vomitum exciandum commendant, ut ventriculi & duodeni cavitates, & qui huc pertingunt ex hepate & pancreas canales a semina crudorum & viscosorum humorum expurgentur. vid. HILDANUS *cent. VI. obs. 34.* MERCATUS *de morbis intern. lib. IV. cap. 18.* RIVERIUS *in Praxi lib. VI. SYLVIVS in Pr. pag. 153.* Alii vero pro cura vernali vel autumnali, ad primam regionem & totum corpus a sordibus pro-

Praeservatio  
per se  
aspiciantur.

probe expurgandum, infusa ex variis laxantibus, roborantibus & aperientibus concinnata usurpanda suadent.

## §. V.

*Therma  
Carolina  
omnia re-  
media fo-  
pant.*

Ego, ut fideliter & candide pro more meo dicam, non certius, non efficacius & magis genuinum in ejusmodi affectibus & avertendis & minuendis, vel, si medicina inopportuna turbatis moribus intro inervia vitiosa materia fuerit in ordinem redigendis, quam in usu thermarum & quidem Carolinarum inveni remedium: quarum virtus & energia, in calculo, podagra inveterata, & in hac, si fuerit ad interiora repressa, ad partes exteriores revocanda, hemorrhoidum quoque fluxum, si causam & occasionem malo suggererit, restituendum, incomparabilis est. Cujus veritatis permulta imo illius exempla, adducere integrum esset, ut adeo, qui eam vel in dubium vocare vel plane negare gestura, aut improbaretis, aut inficere se ipsos acculerent. Nam haec aquae in larga satis quantitate potatae, ob spirituosum quo pollent elementum, & ob salia mineralis propter quae in sinu fovent, tenues non modo & fluxiles reddunt humores, atque obstructa & infarcta minima vasa aperient, sed & per omnia quae evchendis a corpore alienis & morbidis humoribus dicata sunt excretoria, per hepaticos ductus videlicet, per alvum, per subcutaneum emunctorium, per vias urinarias, per mucum bronchiorum & narium, copiosissime & sine ulla viiura jactura per multos continuos dies materiam peccantem educunt. Hinc certe universalis morborum chronicorum praeservatorii & curatorii nomen, si non alioquin malum egerit radices, jure sibi vindicare possunt: siquidem ego, qui has saluberrimas aquas viginti circiter vicibus frequenteravi, sancte affirmare possum, quod non per artem existat vel inveniri possit tale remedium aut medicina, quae huic, quam benignissimum, qui curam etiam corporis usum habet & semper habuit Creatoris beneficio pietatissimo animo acceptam referre debemus, aequiparari possit. Atqui id etiam observavimus, quod si sub ipsa cura irruat hic affectus, longe minor, brevior & placidior semper procedat & finiat. Neque etiam aliis mineralibus fontibus thermalibus de quas acidulas salutare vulgo consuevit, modo pro differentia corporum & naturarum recte & cum debito regimine & convenienti methodo praecribimus, usurpentur, commodeantur, laudes & energias suas detrahere volumus, cum passim etiam indubia ad sine faulstissimi effectus in ejusmodi radicatis & chronicis morbis exempla. Possunt vero temperatioris aquae minerales, ad quas pertinent *Wildunger, Selterana, Veteranenses* in Silesia, loco potus, si tertia admisceatur vini pars, per totum anni decursum in usum duci.

## §. VI.

*Quibus  
non infu-  
sione potus  
est tempe-  
rantes.*

Postremo quoque poribus diluennibus, acrimoniam salium temperantibus & demulcentibus, semiterque evacuantibus, ut sunt lac, serum lactis, sumum, tum praeservandi tum curandi scopo adhibitis, virtutem ascribimus, quippe eam extulisse multiplici experientia comprobantur est. Id autem remedium genus, in eodem morbo antiquissimos jamjam maximi fecisse, HIPPOCRATES & CELSUS loquuntur. Ille enim passim speciatim in *lib. de affec.* in difficillimis podagricis & articulationum doloribus, lac asinum commendat. Hic vero *lib. IV. cap. 24.*

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. II.*

ita scribit: *quidam cum asino lacte pox ex toto se eluxerit, in perpetuum hoc malo exuerunt.* Praeterea quoque PLINIUS, *sunt inter exempla, inquit, qui lac asinum bibendo liberati sunt podagra, chiroagraque.* Novimus nos non paucos lactis bubuli per aliquot annos usu, item aquae pluvialis pro potu ordinario, per plures a doloribus podagricis annos immunes visisse. De cura vero lactea prudenter influenda, infra in cautelis & monitis plura subiiciemus.

## §. VII.

*Diaphoretici  
sunt a loco  
dantur.*

Porro, ad methodum tam praeservatoriam quam curatorem, nihil securius, nihil accommodatius, regimine diaphoretico, saluari consilio procurato, inveniri potest. Nam si verum, uti est verissimum, quod sanguis serosus impurior, qualis maxime ex transpiratione prohibita redditur, causa antecedens & materialis paroxysmorum podagricorum sit; ipsa certe sanior diluatis ratio, quae experientia confirmatur, atrocem hanc morbum, quam optime & nullissime, facta liberiori transpiratione, vel ea quae secundum naturam sit restituta, esse remedium omnibus aliis superius. Ex quoniam hac de re insignissimus & notabilis admodum locus in CAROLI PISONIS utilissimis observationibus: *de morbi à serosa colluvie oriundi Sect. V. cap. II.* extat; operae pretium nos duximus eundem nostrae translationis subnectere. Verba autem laudati elegantissimi Auctoris hac sunt: « Denique quod spectat ad « vacationem feri per eum etiamque sensibilem, « hanc plurimi facio, ut debeat, quia & revulsio- « nis vim habet, & maxime est opportuna in his « affectibus, quippe quae naturae convenientissi- « ma, cum ea feri portio, quae per eum infen- « sibiliter ex naturae infinito continetur quotidie « exspirare debet, suppressa quacunque ratione & « interitum depulsa materiam praestet arthritidis « doloribus, ut aenebac demonstrantur. Quamob- « rem consulo, ut illustris Praeful sudorem quo- « tidie, si fieri potest, aliqua arte promoveatur, « certe insensibilem exspirationem: quod ut con- « sequatur, imprimis densitate cutis, quam infert « inclementia aëris, praesertim hyemico tempore « consulere debet, nam quae a polysarcia aut ae- « tate densitas inferunt, de ea nulla providentia « haberi potest. Ergo accurate videat, ut bene « tectus incedat semper, & de nocte possimum « stragulis levisbus quidem sed calidis, pluma vi- « delect aut pelle insarctis delapsus subterque stra- « tis operus dormiat, & ita operus ut sponte « sudor, sub diluculum erumpat: quod eveniet, « si non ita de mane expergantur, fed aliquan- « tisper quietem in lecto longiorem capessat; & « si sudor nihilo minus non erumpat, si multa « longaque provocetur universi corporis frictio- « ne. Quod si eo frustreretur, aut huius modus « eum provocare tardiorum illi est, suadeo cer- « te, ut semel in hebdomade hypocaustum jeju- « nus adeat, ibique per horulam sudet, quod « primum tentabit, ubi plethorae corporis venae « sectione prius providente, ut avertat cutaneos « affectus, qui ab insolito hypocausti usu spon- « te emanare solent. Atqui si his artibus sudor « erumpens minus emendanda colluviei feri « in corpora habita stagnantes sanificare po- « test, certe auctor sum, ut ineunte vere & au- « tumno, quibus anni temporibus fluxiones re- « petere solent, utatur decocto sudorifico si- « ve farsepaeille vel radicis Sinarum, idque « per unam aut alteram septimanam, vel certe

G g 2 *sympo*

*7. Symp. Ambrosiano, si metus sit a viscerum & languinis reflu.*

## CURATIO.

## IPSO IN PAROXYSMO.

## §. I.

*Imminente  
paroxysmo  
autem sub-  
dormi.*

Ego imminente paroxysmo, qui ex lassitudine insolita & inquieti, appetitu adactio & gravitate capitis & artuum cognoscitur, primam regionem ante omnia leniit a fordibus alviis, neque minus a collectis in duodeno & reliquis intestinorum canali visiosis humoribus deplendam, & expurgandam suadere soleo; id quod tutissime tum per clysteres emollientes & temperate carminativos, tum inerte per infusa rhabarbarina & mianata, cremore tartari exaltata, perfici potest. Memini, me olim statim sub initio doloris podagrici & arthritici, insigni saepe cum fructu usum fuisse sequenti mixtura: rec. aquae storum acacie uncias duas, cinnamomi sine vino unciam dimidiam, pulveris Cornachini drachmam, syrupi rosarum laxativi, vel cichorei cum rhabarbari medicorum semis. Nam instat aphorismi practici medicorum juniores teneant hoc: minores semper doloris evadere, in quocumque etiam loco consistant, si prima regio prius fordibus suis, ante usum aliorum medicamentorum, probe fuerit expurgata; quae alias mirando in sanguinem inque partes affectas penetrando, & dolores intensiores reddunt, & graviora symptomata producant. Atque in eo quoque laudandum est SOLENANDRI consilium, quod extat in *Oper. suis* p. 78. ubi scribit, se in paroxysmi podagrici principio magno cum succellu exhibere aliquod purgans solere, primum id edoctus ab ALEX. TRALLIANO *lib. II.* Et singulare esse, PECHLINUS *lib. 26.* eruditissime inquit, quod arthritici leniorem plerumque experiantur insulsum, detracta ex primis viis visiofa materia.

## §. II.

*Alacris  
vitiis per  
dagrici per  
manipula  
eruent ante  
flum diti-  
flanda.*

Cum vero omnis doloris articularis & podagrici paroxysmus motum febriem comitem habeat, cujus enim beneficio, natura optima morborum medicatrix, solenniter & felicissimo saepe cum succellu morbum curare, & quae cum exciatur visiofa & hostilis materia convenienti tempore, per congrua emundatoria evacuare atque foras rescindere solet: idque in doloribus maxime per sufficientem & auctiorem transpirationem perfici, dum non modo nota sanguinis & feri massa depuratur, sed & ipse dolorem in pedibus creat visiofus humor succelliva diffusione & exhalatione excutitur; prima ac princeps medentis debet esse intentio ac cura, ut placidam continuum & non interruptam diaphoresin, suo consilio de auxilio procuret & moderetur. Praestare id opportunissime possunt ipsa infusa, quae loco Thee, ex herba cordii, cardui benedicti, veronicae, radice glycyrrhizae, corticibus citri recentibus parantur: cui scopo identidem egregie inserviunt mixturae, ex aquis destillatis, cardui benedicti, galegae, scorodii, succo citri, lapidibus cancerum, antimonio diaphoretico, cinnabari, nitro purificato, & syrupo acetosatis citri, singulis debita dosi & proportionem sumtis concinnandae. Instat omnium vero potest esse liquor noster anodynus mineralis, si

*Quo spe-  
lioni infu-  
sa Thee &  
mixtura.*

cum quarta parte spiritus Bussi, & tartari volatilis roboretur: de quo triginia vel quadraginta guttae pro dosi, ex ordinario decocto vel infuso jam laudato propinari possunt. Praestat vero ejusmodi medicamenta mane, cum expectatione lenioris sudoris in lecto exhibere. Vespere & circa noctem pulveres temperantes bezoardici nitrosi, cinnabarini, cum aquis analeptici, diaphoretici, vel cum emulsione amygdalarum dulcium aut seminum quatuor frigidiorum majorum commodissime porrigi possunt.

## §. III.

*Reperit mi-  
nus mi-  
ne.*

Expedi etiam pro feliciori sanationis obtinendo scopo in hoc affectu, pro ordinario potu, decocti temperantis & diluentis paulo liberaliorem usum commendare, ex quo summum me saepius fructum percepisse recorder. Species haec sunt: rec. radicis chinae, farfapariillae, polyopidi ana uncias duas, liquoris, cichorei ana unciam, corticis ligni falsiferae unciam dimidiam. Quorum dimidia pars in quinque aquae mensuris & una vini coquantur ad consumptionem septimae partis: quo decocto non modo pro ordinario potu & ad extinguendam sitim utendum, sed & ex eo medicamenta propinanda sunt, atque insuper singulis duabus horis, octo unciae calide bibendae sunt, idque statim a morbi insulsum faciendum. Inde urina copiose ferat & corpus in continua perspiratione servatur, alvus quoque fluida & laxa manet; si vero haec officii sui fuerit inmemor, supra propositum laxans exhibendum; alvine quoque ab omnibus jussulis pinguibus munitibus expedit. In doloribus autem vagis praesentim a scorbutico humorum inquinamento qui oritur, serum lactis dulce vel acidulum, item fons Scleranus cum lacte remissus utilissime pro potu dantur.

## §. IV.

*Reperit mi-  
nus mi-  
ne.*

Ad mitigandos artuum, si acerbius affligantur dolores, cautissime cum ipsis topicis procedere aequum est: quia multiplici experientia teste, plus damni quam emolumenti amulisse constat. Consulius autem & securus est, partes dolentes cuticulis levioribus plumaceis involutas, in quiete & temperato aequabili calore retinere, ut lenis & successiva humoris visiofi diffusio procuretur. Ceteris vero externis omnibus minus noxiis, antiquissimum illud cataplasma, ex mica panis albi, lacte, viello ovi, croco & floribus sambuci paratum, mea quidem sententia praefertendum erit. Potest etiam, praesentim in arthritide vaga, succus lumbicorum terrestrium addi. Novi quoque non sine insigni levamine in acerbioribus doloribus, frustum carnis ex recentis maclao animante pari affectu applicatum fuisse: quod post viginti quatuor horas amonui, foetidum sparsit odorem. A rinctura sulphuris volatilis, quae ex calore viva, sale ammoniaco & sulphure paratur, cum charta bibula, membris affectis, non quidem statim in principio, sed circa finem & ubi topi metuendi admodum, ob fortorem procuratam discussionem, effectus laudatissimos videt: sed non omnes hoc medicamentum, ob summum, quem spargia factorem, ferre possunt. Dolore & paroxysmo subitum, quando ingens in partibus affectis imbecillitas morendique impotentia remanet, balsamum nostrum spirituosum liquidum, cum aqua Reginae Hungariae dilutum, moderate inunctum insigni robur afferre crebro observamus.

CAUTELE ET OBSERVATIONES  
CLINICÆ.

## §. I.

*Præfatis  
in quibus  
dam rebus  
admoneri  
debet.*

Venæ sectio, utriusque in corporibus, quæ sanguine plus quam sero abundans, atque in ætate juvenili constituta, diutè simul laeta vinosa delectatur, ad præcavendum paroxysmos podagricos & arthricos utilissimam præstet operam, atque etiam, uti a defectu excretionis hæmorrhoidalis vel menstrualis morbus vel ejus paroxysmus metuendus, plane necessaria sit; neque etiam imminente paroxysmo in arthride valida & vasa reformidanda, sed intereipere admienda: nihil minus uti corpus valde debilitatum, excrementis feri copia obestum, ex vicio bonæ digestionis & excretionis insufficiencia prognati, cautius est ab ea abstinere, & quidem hinc de causis, quia cum excrementis sero, portio etiam constitutis sanguinis non sine virum iactura amittitur; secundo, quia critica ille naturæ motus ad exteriora & peripheriam corpora vergetur intercepti potest, quod in febribus erysipelaceis sæpius fieri videmus; terio, quia, candide quod fateri debet, aliquoties post venam sectam acerbiores symptomatum impetum adiuvaverit.

## §. II.

*Cura  
ita.*

Circa curam podagræ per lac, sive potius ejus paroxysmorum ad magnum & notabile tempus suspensionem, id observavimus: quod, si hæc finis ad pristinum victum & vivendi genus ægrorum redierit; vel ipsi paroxysmi bono ordine reverti cœperint, vel loco horum, in corporibus præsertim senilibus & imbecillioribus, pathemata hæmorrhoidalia, in abdomine colica, ventriculi cardialgicæ inflationes, dolores nephritici cum ichthuria, & non adeo longum post temporis spatium mors fuerit infecta. Insuper etiam circa hæc curam, quæ alias ad expurgandos atque averendos arthricos & podagricos dolores, non desinimus laude & effectu, id monendum ducimus, quod, ubi corpus plethoricum, vel sero abundantiori impuro turget, vel ob motum ventriculi & intestinorum labefactum, prima regio semper sine creditibus vitiosis oblecta est, aut si pathemata hypochondriaca, quod sæpius fit, subsint, atque ipsa natura læticia respuit, prorsus hanc damnandam esse judicemus, quippe in viscerum ultionem insurrexum, in cachexiam, hydropem & hæticam febrem tali pacto ægrorum præcipuari posse certum est.

## §. III.

*Purgantia  
sunt, si ipsi  
in dolore  
non solum  
habeant.*

Recte monet CRATO lib. V. in consil. quod fortiter & violente impetu evacuantur, eo quod naturæ & imperio ventriculo vinum inferat, nequaquam inchoantibus & perseverantibus doloribus exhiberi debent. Hinc perine TRALLIANUS lib. XI. p. 601. suadet, in podagra talia purgantia esse adhibenda, quæ stomachum non solvant, & addit rationem hanc: nam hujus cura in omnibus affectibus haberi debet, ut ne venarum et ab his quæ adjuvantur offendatur. Ipsi n. neque inferant omnes nervi consensum & fluxum tenentur.

## §. IV.

Quod attinet ad decoctum Viennense, nostro tempore ad podagram curandam medicamentum famigeratissimum, cujus infusum veteris una cum modo usurpandi in M. N. C. cent. I. obf. paulo curatius describuntur, à multis qui eo ipso uti sunt, magnopere quidem collaudatum memini, quorum autem corpora robustiora paulo constitutionis erant. Neque prorsus qui usum improbare velim: sed, quoniam plerumque debilis, tenerior, & sensibilibus naturæ podagrica affectione laborantes esse solent, ab hermodactylis & a ligno guaiaco, quæ istud ingrediuntur, & omnino sale acris stimulantia prædita sunt, libere abstinere, qui securiora tantum amo & approbo, quæ inter hoc quod supra à nobis traditum est decoctum præcipuum locum obtineant.

## §. V.

Externa remedia partibus dolentibus applicata, uti raro carcant nota, longe tamen periculosissem in corporibus sanguine vel sero impuro repletis, sive cacochymicis, sensibilibus naturæ, hypochondriacis & hæticis, in quibus nervorum & sistorum systema spasmi jam adhaerum est, fortiuntur eventum: siquidem plurimum observationum fide constat, lethalia horum applicationem exceperit affectus, quos inter apoplexiam, hemiplegiam, memorie amissionem, asthma convulsivum, cardialgiam, colicam spasmoticam, ventriculi & intestinorum inflammationem nominasse sufficit.

## §. VI.

Topica spiritinosa ac camphorata in subjectis debilibus & humidioribus non adeo nocent: in siccioribus vero, si materiam podagricam non repellant, ad calculum tamen disponent, vel phosorum generationi vellicantur, aut molitissimas partium contracturas relinquant.

## §. VII.

Non possumus non, iterum iterumque monere, in affectibus podagricis & articularibus, paucioribus & fidis remediis tantummodo utendum esse, repellis inficulis & acridibus, quæ sæpius damna intulisse animadverti. Hinc multi perplacent, quæ tradit Christ. Romanorum Medicus ALEX. PASCOLIUS Oper. tom. III. Sect. III. cap. V. p. 220. At enim vero, inquit, ut quicquid in eo morbi gerat, quoniam in publicis hospitibus non minus, quam in edictis aliorum privatis, crebro præ manibus habuimus, ad hoc tempus observavimus, urgente n. nostri moris est faciemus, proferre non dedignamur eos, quibus aut nihil proficit, aut nihil promovendum in rheumatismum fecimus. Felicitas in plurimum evasit, quem alii, quæ valde arduis præfidiis susceperimus. Quæ res porro esset, ut posteris auctis ejusmodi ægrorum tractando, præter victum tenuem & conjugium, ac uberem potum ex aqua vel simplici vel per levem infusionem ut sarsaparilla, glycyrrhizæ, florum papaveris rhocados, hisque simul mixtæ, nihil aliud præbere consueverimus; quo solo tempore processu, sudores plane critici, optimo non successu excreverunt.

*Pauciora  
et fides  
remedia  
ut respiciantur.*

## §. VIII.

*Vena scilla  
respicit.*

Galliarum medici celeberrimi, quos inter CHESNEAU, BOTALLUS, RIVERIUS, CAROL. PISO, referendi, in doloribus podagricis & arthriticis crebro repetitam venæ sectionem maxime laudant & commendant, prætervandique potissimum sine & scopo celebrant: quæ tamen methodus in nostris septentrioni vicinis hominibus, quorum corpora non tantâ sanguinis abundantia cupia, haud curate quadrat. Nihilominus, si morbus non adeo inveteratus & corpus ad sanguinis abundantiam ingenerandam penum fuerit, levior & sæpius repetenda venæ sectio, seu singulis potius mensibus in pede admissa scarificatione, præmissio tamen semper levis laxante, non erit instructuosa. Estimamus plane esse locum, quem de venæ sectione utilissimè frequentius repetita, habet laudans PISO L. c. Scil. V. cap. I. p. 406. hic merito apponendus: *Alido autem, inquit, singulis mensibus, quoniam eadem experientia me docuit, quicunque per r. inducias vel punctionem septimanarum ager corpus refecerit, sanguinisque jacturam reparaverit, tum prima quoque commotione aëris & alteratione sive ad algorem, sive ad astum omnino arthritico revertere. Et certe sæpe auctori majores viros ex arthriticorum familia, nihil longo usu repperisse retardandis colibendisque fluxionibus arthriticis, si non profusus tollendis, ipsa vena sectione, eoque usque usum etiam in afflicta aetate non reformidasse. Itaque repetita placet vena sectio & per epuratum: quod si præbatur, nemo non videt omnino parca manu esse administrandam, & quantitati hunc esse scopum, ut providenter duntaxat ne surgat sanguis in vasis & orgasmo spontaneo commoveatur.*

## §. IX.

*Tumor à  
fibrositate  
morbi rati-  
bus causam  
ostendit.*

Paroxysmo finito & morbo soluto, in corporibus spongiosioribus habitus & sanguine seroso turgens remanet læpiscule pedis affectu insignis & valde diffusus, qui impressa digiti vestigia relinquit, tumor, caute profecto tractandus: nam si quis cum pro incipiente hydropre habuerit, & ad hunc præcavendum vel abigendum, validioribus purgantibus uti velit, in non leve sanitati & vite damnum infligere poterit. Opus tunc potius est junioribus laxantibus balsamica virtute eminentibus, ut sunt rhabarbarum in substantia, pilule Cratois, Becheri, nostræ, mediocri quidem dosi, sed crebrioribus exhibitæ uti. Externe autem pulvere, ex farina fabarum, camphora & floribus sambuci conspergendi pedes, & leniter non auctum nimis valde, vinculis, ne uberior feri fiat affluxus & stagnatio, constringendi.

## §. X.

*Teguli re-  
solvendi.*

Ad topicos discutendos & resolvendos in senili & inveterata podagra, ego non præsentius, ipso balsamo sulphuris antimonii, quod ex fale sonarum teguli antimonii simplicis, superinfuso oleo terebinthinæ & juniperi paratur, me deprehendisse, allereare possum.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## CASUS I.

*Podagra ab  
empyria  
retracta  
juniperi.*

Vir sexagenarius major, sanguineo-cholericus, sanguine & succis plenus, habitus corporis ro-

busti, animique ad iram valde proclivis, per complures annos doloribus convulsivis, colicis, spasticis, nec non podagricis misere divexabatur: quorum tamen malorum solamen, in usu *Carsinæ* singulis annis adhibitarum, nunquam non præsentissimum invenit. Nihilominus, nescio sub quo infausito fidere, prudentissimus vir in empiricorum infelices manus irruit, qui, fiduciam addentes amplissimam, nostro pedibus per aliquot dies laboranti pulverem commendarunt, cujus dosi admodum quidem exigua, sed sapor valde confringens, & metallice sine dubio mercurialis & viriolice naturæ erat. Oblata duabus singulis horis dosi, hacque ad duodecimam usque reiterata, omnes dolores & crucianus simul & semel conquieverunt. At vero altero die, in gravissimas incidit cardialgicas anxietates, cum inquietudine, ventris tormentis, alvi perinatissimæ adstrictione, animique intercurrente deliquio, comitatus: insuper nec corpus nec caput credum domare poterat: quæ symptomata brevi post, cum insulso apoplecticus exciperet, corpore mirum in modum inflato, capite in immanem molem turgescere, sanguineoque sero ex ore & faucibus effluente, nimis confidentie penas morte miserissima lare debuit.

## Epicrisis.

Funesta hujus catastrophæ causa, vix alia inveniri vel excogitari poterit ac infestis remediis antipodagricis assumto: quandoquidem sensibilibus corporibus, si spasmoticis primarum viarum tentantur constrictionibus, ejusmodi mercurialis & metallica remedia semper nocentissima sunt, eo quod non nisi spastica quadam strictura operationem suam exerunt, & ita universum nervorum genus male afficiunt. Cui etiam in nostro casu repentina dolorum podagricorum remissio adscribenda venit, dum videlicet ob spasticam stricturam parium externarum, materia podagrica intro coacta fuit; qui spasmus simul effecit, ut sanguine plus solito ad pedes & caput propulso, ex nimia vasorum distensione ejus extravasatio in cerebro oborta fuerit. Hinc omnibus & singulis qui praxin exercere solent, non sine summa ratione suademus, ut in quibusvis morbis spasticis qui in sensibilibus præterea corpora incidunt, cane & angue pejus, cuncta mercurialium, metallicorum, emeticorum atque acriorum purgantium genera, fugiant: inter quæ etiam mercurium dulcem, aurumque fulminans, ob inaspirati successus, quem sæpius sub ejusmodi circumstantiis observavimus, effectum, reponere non dubitamus; siquidem à pulveribus sic dictis laboribus non raro maximas præcordiorum anxietates, comitæ singultu, in podagricis obortas, doloribusque licet mitigatis omnia istius pejora reddita fuisse novimus.

## CASUS II.

Vir illuistris quadraginta & aliquot annorum; rheumatismis scorbuticis crebris affectus, tumore erysipelaceo in dextro cornu pedis, quod ulcus olim purulentum materiam continenter stillans obfudit. Hic tumor inflammatorius radium rubicundum a glandulis inguinalibus, ad extremum usque pedem emisit. Altero die dolor metatarsium pedisque sinistri pollicem sin-

*Tumor po-  
dagicus ery-  
sipelaceo re-  
tractus.*

SEX

arox cum infigni tumore invafit : unde plane immobilitas redditi pedes fuere. Chirurgus in principio ftatim ad eryfipel<sup>is</sup> profligandum fpirium camphoratum crocatum applicavit, & cum in alterum pedem dolor tranfret fpiritus removit, & hujus loco ficcos pulveres cum camphora mixtos applicuit. Inde mox notabili dolum levatio & remiffio in utroque pede fuceffit : non ita multo poft autem tam gravis circa praecordia anxietas & diaphragmatis conftrictio, ut omnem penitus refpirationem tolleret, cum afth & plenaria appetitus proftitratione fecta fuit, quibus alvina obftructio, cum inflatione affociabatur. Praefcripti quum me confultum adirent, ad alvum leniter educendam, decoctum mannarum ; & ad ftatus difcutiendos materiamque retrocellam fudore diffundam, aliquot liquoris anodyn<sup>i</sup> mineralis cum tertia fpiritus Bulfi parte remixti dolos propinavi. Quo pacto & totum mox corpus largiffimo fudore perfundebatur, & ipfe haemorrhoides quibus aliquando affluens erat, denovo fluere coepit, omniaque fic evanuerunt fymptomata penitus evanefcentibus.

#### Epilepfia.

Similis fere cafus, qui evidenter camphoratum externum ufum in podagra noxium declarat, aliquot ante annos in Illuftriffima fcienna mihi occurrit : haec enim poftquam minium cum camphora remixtum pedibus podagra tentatis applicaffet, haec quidem fuit, alii non multo poft cardialgici dolores, fumma virium proftitatio, vomitus, inquietudo, cum afth febrili, alvina retentio & leve delirium accedebant ; quae fymptomata ftatim ab oblato cum emulfione ex feniibus IV. frigidi pulvere praecipitante nitro, cum tertia parte grani unius camphorae permixto pro dofi, remiferunt, & materia podagrica ad exteriores partes reverfa eft. Siquidem ego paffim quoque animadverfi, camphoram, cum exterius applicata noxam inuliffet, interne exhibitam illata damna refarciviffe. Memorabilis quoque eft obfervatio, quam recent<sup>er</sup> HAGENDORNIUS *Cent. I. obf. 28.* ubi mercator ex dolore & tumore fcorbutico laborans, applicato epithemate ex aqua diftillata cum ceruffa & camphora, doloribus fedatis, loquelam amiffit nec brachium movere potuit. Neque vero in totum camphoram ejufque fpiritus in tumoribus & doloribus partium extremarum dammare & rejicere animus eft, fed prudentia & diftinctione naturarum opus elle velint : nam qui in artis verfatus exercitio, fubinde experiantur, non omnia omnibus promiffue prodeffe, atque id maxime valere in topicis, dum quod alterum juvat, idem alteri nocet. Eft autem caufa non tam difpofitio peculiaris humoris peccantis, fed potius ipfa terfiva tonica fibrarum, pororum & vaforum cutis confitutio : habent enim omnes partes, & maxima quae emunctoria & colatoris vices gerunt, fuam peculiare robur, tonum, tensionem nec non fuam quoque dilatationem, quae fpecies motus ad fecretiones & excretiones fumme neceffaria, dependit poffimum a fluidi nervi influxu & nervorum membranarum tensione : qualis itaque haec fit in omnibus individuis & etiam morbis eorumque temporibus, in exhibitione topicorum provide animadvertendum eft ipsis meden-

tibus. Quia enim non videt, fi pori nimis fuerint conftricti a dolore & fpafmo, nequam tunc fpirituofa calida conferre, fed potius ea quae blande conftrictas partes relaxant ; contra fi nimia eft poft dolorem relaxatio, quod apparet ex tumore, dolore minori reddito, omnia unguenta humida unctuofa anodyna valde nocere, & potius tunc liminentia fpirituofa nervinis utendum effe. Deinde unum quodunque topica egregie mulceant dolores & fctrem mitigationem reddant, nihilo minus non femper illud valet, etiam in eodem individuo, paucis : quo robulior in expellendo eft natura majorque corporis adeft vigor, major quoque motus intertus ; eo minus periculi inducunt externa decenter applicata ; quae tamen, fi vigor motuum celfet, fi aëris fenfus vel ftatus caetheticus fupervenerit, plane funt fependenda. Illud enim unice intendat medicus neceffe eft, ut externis non filat evaporationem materiae peccantis, fed eam promoveat : verum, quoniam magna rudentia in hac re opus eft, ficutus potius eft abftinere ab omnibus externis de totum negotium curandi internis committere, parcius affectas in blando tepore fervare. Dein etiam hoc obfervavimus, topiorum generationem, quae fit maxime in arthritide fixa, inprovidae non raro exteriorum applicationi deberi, itupefacientibus praeterit & infirigidantibus. Meretur hic adduci B. WEDELIUS qui in *tr. de medicament. facultat.* fcribit : *Frequenti experientia edocti fumus, plus damni ipfos podagricos inde paffos, imo plures ex arthritide vix hoc modo fuis fixam acceperiffe, plurimos vero topios, quod ufurpaverimus multum & piagnus emplaftica.* Hinc & ipfe GALENUS *method. medendi. libr. IV. cap. 3.* topios in articulari morbo produci recte memorat ex humore glutinofa & craffo, quando is non paulatim digeffus, fed violente remediis totus fimul exficcat<sup>us</sup> eft : & FERNELIUS *conf. 12.* geminari inde dolores obfervat. Caeterum non omnia topica, plane exterminanda effe in externis articulorum doloribus arbitramur ; fiquidem quando adfectus partium inveteratus cum torpore quodam & infenfibilitate relict<sup>us</sup>, qualis in fenilis aetate, faepiffime evenit, tunc fedata prius iuxta sanguinis & humorum ebullitione, ad robortandos nervos, & invitandum fpirituofa elufici fluidi influxum in imbecilles partes, nervina liminenta balfamica virtute nobilitata, expectationi & medici & miferi aegrotantis eximie fatisfaciunt.

#### CASUS III.

Vir fanguineo-melancholicus annum agens quadragefimum quartum, habitus corporis ftrictioris, a decem annis paffus eft dolores tarfum pedis obfidentes, qui tamen non adeo vehementes erant, fed diaphoreticis facile cedebant, ut plurimum autem circa menfem Januarii revertebantur. Hi quatuor ante annos acerbiores facti aegrum lecto adfixerunt, abhinc autem duobus annis praedicto tempore adhuc gravior affligerunt. His cum ipsis luctaretur aegrotans, ingenti terrore affectus eft, quem diuturnior cura & animi angor excepit : quo pacto dolores interiora occupantes, anxios in abdomine cruciatus excitant ; qui mox remiferunt, mox re-verfi funt. Elapfi aliquot feptimanis leviffimo

*Podagra, non dolens et frigida, tenax.*

Gg 4 Frigo-

frigore regnare, iuxta suscipere honestus vir debuit: à quo tempore dolores longe truculentiores invalere, qui ventrem, brachia, fauciumque interiora aggressi, quandoque in capite subsistebant, atque somnum & quietem admodum turbabant, aliquando etiam effluxum materię fœtidę purulentę ex aure interna egregio cum allevamento excitabant. Mense Junio eisdem anni acidula Egrana usurpavit, sub quarum usu quidē dolores fluierunt & cuncta bene successit: absoluta vero cura abdomen multo atrocius affligentes, appetitum penitus profligarunt: ubi alvus pigra, urina coloris naturalis sed purior reddebatur, virum adorat dejectione, & æger de fixo ac duro tumore supra umbilicum conquebatur. Nautica quęque premebatur & salvia copiose ex ore sæpius emanavit, vomituque nonnunquam de alimentis & medicamentis rejecta sunt: siquidem dolor superiora petere, fauces constringere atque ad scapulam usque se extendere sæpius solebat. Flatus ventrem distendentes per totum hinc inde intestinorum canalem cum fluctuatione & borborygmo percurrerant, & ad infimum rectum ubi pervenerunt, mox regurgitabant, cum quasi exitus ipsis præcluderetur. Notum dignum fuit, quod per periodos dolores in infestissime, hora pomeridiana quarta, media nocte & ante meridiana decima dum accesserunt. Variis usus est remediis, & præcipua medendi intentio eo fuit directā, ut ad ipsius pedes rursus derivaretur infecta materia. Hinc frictions, pedilavium in usum vocata, venę quoque in pede celebrata scilicet. Hirudines tandem applicatae, nimis cum camphorati sine diaphoretico admixta, nec usus carminativorum, stomachicorum balsamica temperata virtute ineluctum neglectus; alvus quoque clysteribus, lenioribusque laxantibus ad officium reductus. Sed successus speratus fœlisse. A nulla tamen re præsentius levamen ac à potu lactis calidi cum infuso florum sambuci tenuiter expertus est, quippe per duos quodque dies ab eo assumto dolores conquieverunt. Quatuor albine sepiimanis elixir stomachicum ex amaris balsamicis extractis concinnatum exhibui, à cuius frequentiori usu, dolores sopiti, viresque cum appetitu crectę fuerunt, adeo ut patienti domo egredi functionibusque suis præesse puerit. Sed inconstans hæc valetudo fuit, siquidem in manu de dorso dolores rursus apparuerunt, sinum impediverunt, & tumor umbilicalē regionem obduca, exterius manu percipi ponit. Tandem his malis dirius insistentibus, succumbere nosse debuit, documentum fac clarum relinquens, contra mortis atrociam nullum inveniri remedium posse.

#### Episcipis.

Ex præfata historia liquide apparet, quam conatus morbus sit ille, & quantum negotii creet moderantibus, qui ex doloribus podagricis in corpus retrocedentibus ortum suum habet. Singulare illud est, quod materia, abique dubio, velicans acris, indolis plus minus fixę & volatilis, si in externis articulis membranis subsistat & ipsi denegent sedes de exina, occupet in abdomine viscera membranacea, nempe intestina, quę maxime ex membranis tendinoso-nerviis constituta sensu acutissimo prædita sunt, & similibus structurę ac texture cum ligamentis ar-

ticularum nervo-tendineis ac glandulosis sunt, unde etiam propter affinitatem & structurę communionem materia podagrica mox transit ad intestina, mox rursus ex ipsis ad articulos. At vero, quod talem viam ex modum servet materia podagrica retropulla, jam HIPPOCRATES suo tempore eleganter notavit lib. VI. *epidem. part. IV. aph. 3. u. Sect. II. p. 20.* hisce verbis: qui articulari morbo detentus intestini dolore dextra parte vexatur, quiur erat; hoc autem curato magis dolebat. Ex memorati hanc in rem digna fuit, quę tradit SOLENERANDER in *Consil. pag. 77.* ubi ait: in cura habui nobilem inveterata arthritide occupatum, in sexagesimo quinto ætatis anno constitutum, qui cubito dolore repressus fuit. Antea etiam, in artibus revocaretur, pedem letantibus, frigiditatem, venę scissurę in pede, monitus ab Hippocrate & Benedicto Sylvano in *Consil. Obsit autem Senior medicus & æger interit. Atqui ego, pergit, idem plane observavi in muliere, quę arthritide fere semper laborabat, quando à doloribus coli liberata erat, & vice versa, cessantibus coli doloribus misere ex juxtura afflictaur.*

#### CASUS IV.

Vir statuz mediocri, circiter septuagenarius, temperamenti, sanguinei habitus corpora spongiolioris & robustioris, podagricis crebris afflictus doloribus, aliquot albine mensibus ad sedandam cruciatum atrociam, ipsa in paroxysmi accessione, partes dolentes, spiritus quodam à pharmacopœo sibi misso, inunxit, à cuius cretiori & continuato usu, omnis propemodum dolor evanuit. Exacto aliquot sepiimanarum spatio sæva in abdomine tormina passus est, juncta cum vomitu & alvo adstrictissima. Medicus in consilium accessit, ob iterum illius passionis, alvum clysteribus aperiri curavit, aliaque interna, quę inflammationis restituta & dolorem levant, in usum vocavit. Inde non modo cessavit vomitus, alvique soluta, sed & sedatus fuit abdominis dolor, ita prorsus, ut æger è lecto surgere & in publicum rursus prodire potuerit. Sed paucis interjecto tempore paroxysmus modo descriptus, quia hæc valetudinis spes non diu perseveravit, rediit, nisi quod vomitus lenior fuerit: & tandem iterum in usum vocatis medicamentibus ad sanitatem productus est. Duabus vero elapsis hebdomadibus inde paroxysmus repetit, & adhibitis denovo remediis parit. At vero aliquoties reversus iterumque depulsus est: remansit tamen omnium ciborum salbidum, coepulque in dies consumi cepit. Interea nunquam rursus podagra afflictus fuit, oculiduoque nulla amplius periculis tormina: appetentia vero omnis perit, nec alvus nisi adjuta respondit, urina rubicunda, & temper adfuit oris ficcitas cum humidi desiderio, lectumque perpetuo custodire apertus debuit; qui rebus ita constitutis, inter vivos esse tantum desit.

#### Episcipis.

Morbi, quem depinximus, decursus atque eventus, plurimos admonere poterit, quam caute & circumspecte cum podagricis lenioribus ratione topicorum agendum sit: siquidem ipsa natura, per senium & morbi vim debilitata, tandem fatiscit, atque ad forum acrempurum, quod



artuum doloribus materiam subministrat, per criticum & febrilem morum ad extremas partes & ambitum corporis propellendum, redditur minus idonea; quare materia peccans in corpore remanens nervosa & membranacea ventriculi & intestinorum natica infestat, ventricusque tormina efficit: quæ si interna inflammatio excipit, ægri vel subito à medio tolluntur, vel succellive marasmo aut hæcico calore vires ipsarum carnem defurante consumuntur. Notabile vero in præfata morbi historia fuit, quod podagrica dolor non sedierit, sed per paroxysmos, huius loco, ventris tormina, vomitus, sitis, inappetentia afflicta; quæ tamen symptomata per clysterum oleosum, medicaminum diaphoreticorum, cinnabariorum cum castoreo remissionem usum exspiravit: unde consensus intestinorum cum partibus nervosis & tendinosis manuum & pedum, quem in podagricis & chirurgicis affectis quam maxime observamus, liquido nunc evincitur. Nam in prædi medica perpetuum fere est, atrocia ventris tormina ut plurimum transiisse ad artus viciis humore solvi, & retropullam etiam materiam arthriticam vel podagricam acerbiora ventriculi & intestinorum tormina & spasmos sequi. Alvus ejusmodi in casibus, ob totum primarium viarum destructum, officii sui nunquam non obliviscitur, atque per clystera sollicita parum excrementorum, sed multos foetidos flatus emittit. Ceterum in senibus, appetitus omnimodo viriumque prostratio, sitis & oris siccitas, lentam febrem, mortemque imminere indicant.

## CASUS V.

*Podagra in hæmorrhoidali fluxu adfecta, ac æstus in aëre sensus.*

Vir sexaginta annos natus, spongiosi corporis habitus, hæmorrhoidali fluxu adfectus, dolorum podagricorum utriusque, vere & autumnio incunabula, tentatus fuit insulubus. Circa æstatis exitum, horatus fructus refrigerantes liberalius paulo ingessit, & contra podagricos dolores panacæam sic delatam ab empirico assumpsit: quæ constabat, ex opii crudi in frustula dissecti drachma, cui duæ aquæ liliorum convallium spiritalis uncie affusæ fuerunt, & ita leni digestionē steterunt. Hujus liquoris cochleare circa lecti introitum medicaster lumendum jussit: cujus usus, quod placidiorem somnum conciliabat, per aliquot septimanas continuatus est: & paroxysmi, circa conductum alias tempus infestare soliti, mirum in modum allevati sunt. At vero, elapsis aliquot hebdomadibus, mensis Octobris, febribus cum totali virium suppressione, extremorum frigore & perpetua frigiditate infecta, ægrum omnium præter opinionem jugulavit.

## EPIGRAMA.

Dici vix potest, quod tamen quotidiana declarat experientia, quam periculosum sit, confusos podagricorum paroxysmos valentioribus remediis suppressere, & materiam illam acrem causticam, quæ solenniter, una cum dolore, per congruam emunctoria procerudit, inus recondere: quippe tali modo purum internarum inflammationis, spasmi vel spasmationis, quam in nostro ægro præsentem fuisse nulli dubitamus, perpetuo fere subsequamur. Non ponit autem non, propinata narcotica medicina in corpore laxiora habuit, senio vicino & à refrigerantium fru-

ctuum abusu jamjam debilitam, insaufum relinqueret effectum: quippe practicum fide dignorum observationes confirmant, à solo refrigerantium abusu, corpora podagricorum orci faucibus tradita fuisse.

## CASUS VI.

Ante quadraginta propemodum annos, cum in principatu Halberladiensi, provincialis medicus munus obirem, me consulebat Illustris regiminis Confiliarius, qui parente hypochondriaco & podagrico natus, jam per decem annos & ultra, vix enim tunc trigelimum quartum superavit, & hypochondriaci pænam habuit & doloribus podagricis fuit afflicta. Vere & autumnio potissimum invadebant paroxysmi, cum gravata artuum lassitudine, appetitusque aucto, quem poltea sequebatur horripolio cum extremorum frigore & tremore; vominaque crebriora, quibus liquamina pinuosa & valde coarctiva acida, quæ de densa stupesciebant, & pavimento intrinseca ebulliebant, copiose educabantur. Succellit dein febrilis æstus, & seruo vel quarto die acerbis doloribus pedes opprimebant, qui ad aliquot sæpe septimanas persistebant, & de tumore sudore foetido acidum spirantem perque plures dies durante solvebantur. Id vero erat memorabile, quod, si vomina non præcessissent, paroxysmi diutius semper & acerbis pedes affligerent. Inter medicamenta, quibus per complures annos usus fuit, non præstitit solamen atque lenimen, quam in pulvere absorbente nitrolo, & essentia horum liliorum convallium, cum spiritu vini phlegmatico extracta & sexta parte essentiaë calstori remota expertus est. Tandem Illustris hic vir quinquagesimo ætatis anno, febree acuta Bernini defunctus est, & dissecto corpore pancreas totum scirrhosum, & valde navescentes etiam glandule mæstenterii repente fuerunt.

## EPIGRAMA.

Hypochondriacos procedente ætate demum fieri podagricos experientia testatur, id quod ratione quoque demonstrari evidenter potest. Utique videlicet affectus natura debiles & a parentibus iidem morbis laborantibus genitos quam maxime infestat, atque primarium vitium potissimum in depravata alimentorum digestionē, crudorum succorum abundantia, & excretionum, quæ sanguinis & humorum depurationi inserviunt, defectu consistit. Deinceps aliquot exemplis comperit habere, in dissectis corporibus & hypochondriacorum & podagricorum, ubi ex superveniente alio morbo extincta fuerunt, inter alias viscera corruptiones, pancreas scirrhosum maxime deprehensum fuisse, & ubi tale quid reperiunt fuit, ingentem semper acidoponticorum humorum prima in regione colluvies adfuisse, quæ appetitus præter naturam aucti, cardiacæ anxietatis, obstructionis alvine, ructuum & vomitionum acidulorum succorum vera causa exhibuit. Quam inimicum vero acidum sit ad sanguinem delatum, dum temperatam ejus & gelatinosam crasim imo fluxilitatem destruit, præternaturalem spissitudinem ingignit, excretionem retardando, cacochymia & viscidie & tartareæ genitrix sit; ita quam facile, quæ fundamentis physico-mechanicis morborum generationem explicare novit, potius penetrare, Ego itaque semper cum singulari fructu & hy-

*Podagra hæmorrhoidali fluxu adfecta, ac æstus in aëre sensus.*

pochochondriacis & nephriticis & podagricis, tum ad symptomatum mitigationem, tum etiam ad sanationem, si adhuc ejus spes fuerit integra, medicamenta quae acutum deservant in primis viis, ut sunt absorbentia sibi relicta terrea, quae subinde, cum in sal neutrum degenerent, alvum largius saepe ac si purgans summum fuerit, solvant, exhibeo; atque insuper elixiria amara temperate balsamica, cum lixiviosis mensuris parata frequentius usurpando, inungere ac commendare soleo. Tandem in praefata morbi historia id commemoratu dignum est, quod etiam in aliis saepe annotavi, leviore semper arthriticis & podagricis paroxysmos fieri, quando natura vel sponte vel arte adjuvata sese à colluvie visioforum humorum per vomitum ante accessum liberaverit; manifesto indicio, originem dolorum esse in primis viis: in cujus asserti confirmationem ipsum adduco MARTIANUM, qui ita dicit: *in arthriticis doloribus, ob acorem in ventriculo peccantem à doloribus correptos mentis, qui ab isdem liberati vel levati fuerant, ubi acida convulsant.* Quod idem idem comprobat SYLVIVS *Oper. pag. 786.* aperte scribens, hanc curam per vomitionem utilissimam arthriticis, multoque à se confirmatam experientia. Imo eadem ratione non paroxysmum tantum imminuentem sublevari, sed & novi impetus femina exincta fuisse idem eodem loco scriptum reliquit. Atque ALPINUS *de medicina Aegypt.* multos se vidisse, qui, cum à podagrae calculoque doloribus excruciatii fuissent, crebro usu vomitorii egregie adjuv fuerunt, affirmat.

## CASUS VII.

*Podagra hereditaria inveni-  
ta in corpore reman-  
enti, & senilis co-  
pula & atrox.*

Vir generosissimus, sexagenario major, ob insignia merita in summa dignitate in hac provincia constitutus & Illustris regiminis consiliarius, tenerioris & sensibilibus quoad corpus & animum constitutionis, à parente qui fere per totam vitam fuit podagricus, & pedes topiis oblectis habuit, gemas, ante triginta fere annos pathemata hypochondriaca, rheumatica, & podagrica expertus erat, quae procedente aetate magis invalescebant, & una moderata admodum diata & vitae ratione inculcata usus fuerit, singulis tamen annis vere & aequino ob podagram affligentem lecto decumbere, mox breviori tempore mox longiori intervallo, coquebantur. Aliquando vero consueta podagra, praevis morem & consuetudinem, solito tempore non recurrebat: sed quia materia viscosa inera succos vitales retinebantur, multas ac gravissimas tentabantur symptomatibus: continuus nempe ventriculi eructationibus, cordis palpitationibus, tremore artuum, inquietudine, dolore capitis acuto, tractorio, lancinatorio, circa tempora, circa nucham, accedente cogitationum confusione memorieque debilitate. Consultabam me atque Clariss. D. D. STRAUCHIUM Archiatrum Marisburgensem, qui saepius frequenteraverat Carolinam, atque inprimis ex nobis quaerebat, num has thermas sanitas suae profuturas judicaretur. Hic longiori experientia edoctus, statim consilium probavit: cui ego quoque facile assentiebam: & ille cum eo ad fontes hos salutiferos profectus fuit, à quarum interno usu decenti cum regimine insinuo, in aetna & ultima cura, vehementi paroxysmus podagricus, qui tamen non nisi per septem dies durabat, ipsos pedes corripiebat, remittentibus mox omnibus prioribus symptomatibus. Inde optime quam se habuisset, bis adhuc victus,

aquas haec thermales cum summo fructu semper usurpavit.

## Episcopus.

Ego sane complura possem recensere & allegare exempla, quae mirabilem & incomparabilem plane horum fontium virtutem & effectum in atrocibus & consummatis morbis expugnandis, qui ab arthritica & podagrica materia remanente in corpore vel improvide retro-pulla oborti fuerant, demonstrare valeret; qui potissimum in eo consisterent, quod materiam morbosam ad pristina sua loca ex interioribus relegaverint, conquecente mox omnium symptomatum periculosisssimorum syndrome. Vidi colicis spasmodicis, vidi asthma convulsiva, affectus soporosos, morbos melancholicos cum sensuum & rationis perturbatione conjunctos, perniciatissimasque tules, atque pulmonum infarctus, qui non nisi à materia podagrica remanente vel retrocedente originem suam habuere, hac ratione divino adjumento felicissime subactos & curatos; maxime vero, si non semel, sed bis vel ter in usum decentem fontes ducti fuerint.

## CASUS VIII.

Vir generosus, perbrennus Chiliarcha, non procul à hac urbe degens, corporis macilentioris, fibrosi tamen & robusti, superato jam senectutis & sexto anno, in gravem & exitalem incidit morbum, cujus profligandi causa me in consilium vocavit. Is jam ante decem annos doloribus podagricis, minoribus tamen & obusioribus vernali tempore fuit obnoxius, neque minus his desidentibus, acerbis abdominis doloribus, sive potius intestinorum stricture spastica vexatus. Annus annum Generosus hic vir, sub initium hiemis, praegressa vehementi corporis refrigeratione, neque minus ingenti aetate, quam tamen prudenter compressit, indignatione, delubio truculento ad suffocationem usque asthmate convulsivo corripitur. Ego tertio die accedens morti ferme proximum inveni: nam sub summa virium prostratione ad animi usque defectionem, pulsu duro, debili & tremulo, extremorum frigore, & sub cogitationum ac rationis turbatione, atterime & cum sonitu spiritum ducebat. Primo omnium chylitres injiciens, ad foeces alvinae cum flatibus educendas, curavi: dein mixturas blande diaphoreticas & discutientes, singulis horis fumendas, praescripsi. Factum hinc DEI beneficium est, ut ad omnium adstantium admirationem, intra quinque dies somnum, qui plane fuerat animae sublevari, capere & respirare sine molestia aeger coepit, atque successively ingentem viscosam materiam copiam tussu eiecit. Verum non ita multo post, de doloribus ac cruciatibus ipsis abdominis Generosissimus vir conqueratur, qui in dies incrementis intolerabiles evasere. Alvus adstrictissima, praecordiorumque aditus anxietas atque inquietudo. Sed singula haec adhibitis idoneis remediis, expulsa à sede sua materia hostili, conquelescere coeperunt: relicta tamen statione sua in regionem inguinalem non procul à virili membro hac ipsa descendit, atque in musculis ibi conspicuis, praecedente gravi dolore & inflammatione, abscessum efformavit insignis certe magnitudinis, qui post supurationem factam demum apertus plus quam

*Podagra levior, et  
hæc & re-  
frigerationis  
salsa prae-  
vius &  
mucositas.*

libram puris per vices fundebat. Dum consolidari coepit, truculenti dolore pedes infestare ceperunt: quos etiam commoda medicina abegimus, relicta tamen debilitate & tumore cedematoso. Decursus autem hujus morbi valde anticipis & difficilis per trium fere mensium spatium duravit. Iamque valetudini perfectae suae reddidit Generosissimus aegrotans.

#### *Epiërifu.*

Medicamenta, quae in toto hujus morbi decursu in usum dunt, non alia fuerunt, praeter clysteres & cataplasmata, quam mixtura ex pilula, aqua cardui benedicti, florum sambuci & cerasorum nigrosum, adjectis, pulvere meo beoardo leniter camphorato, succo citri, liquore anodyno miserali, & succo papaveris albi composita: quandoque mixtura simplicis aliquot guttas pro dosi adjeçit. Quae plus quam virescens renerata usus fuit. Praeter haec, infusum Thuisforme, ex herba veronica, salviae, floribus sambuci, semine fenniculi, & decoctum nostrum usitatum pro potu ordinario largius sumendum praeci, interpositum interdum electuario vel elixiro pectorali; quia tussis longo tempore insistebat. Ceterum me tam vehementem metasta-

sin in morbo nunquam observasse memini. Atque ex hac morbi historia & curatione, illud curiosi naturae & medicinae scrutatores, meo quidem iudicio, addiscere possunt, eam esse naturae quae dolores in articulis creat & fovet indolem & crassam, ut vix ab ulla medicina immutari, alterari & ejus perniciosa vis destrui possit: licet enim in praesenti casu reliquerit suam sedem, nihilo minus salva hostili indole & crassi permanente, eandem suam vim in aliis & contiguis locis exercuit, ut adeo remedium, quae vulgo & a chymicis aequae ac medicis nimis in praxi versatis, taneis laudibus passim venditantur ac celebrantur, & ad aucupandum magis argenteum quam salutem assectendam agita sunt, inanis atque plane impotens facultas clare demonstrari possit. Cordatus autem & prudens medicus in sanando ejusmodi morbo nihil aliud assicere vel praestare potest, quam ut temperem & texturam earum corporis partium quae nondum simili vicio affectae, integram servet, quo morbida materia successiva & blanda evaporatione & diffusionem per universale cutis emunctorium feliciter excludatur.

Plures invenies observationes in *consult. medic. sect. IV. CLXVII. CLXX.*

## FINIS.



